

TRAITÉ PRATIQUE
DES
MALADIES DE L'ENFANCE

FONDEUR

SUR DE NOMBREUSES OBSERVATIONS CLINIQUES.

PAR

F. BARRIER, D. M.

Chirurgien en chef désigné de l'Hôtel-Dieu de Lyon,
Ancien interne de l'hôpital des Enfants malades de Paris,
Membre de la Société médicale d'émulation de Lyon,
de l'Académie des sciences de Dijon, des Sociétés de médecine
de Montpellier, de Strasbourg, de Gand, etc.

DEUXIÈME ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE.

—
TOME SECOND.
—

PARIS.

FORTIN, MASSON ET C^{ie}, LIBRAIRES,
Place de l'École de Médecine, 1.

LYON.

CHARLES SAVY JEUNE, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
Place Louis-le-Grand, 14.

—
1845.

**YALE
MEDICAL LIBRARY**



**HISTORICAL
LIBRARY**
The Harvey Cushing Fund

sssez éloignés du château de Beauregard.

(es) par une chas

rons, en passant

n devait clore ce

ommencement de

uivit le dimanche

Les choses en é

an éprouva pour

lle ne se sentit pa

euse; et nous ap

aitre des deux cò

eut-être superflu

endant encore co

our, et il se voua

on consolante qu'il pourrait lui être utile un

còté de ce pressentiment, il trouva la convic-

urait à souffrir bien souvent pour elle; mais,

epos en attendant qu'elle le fût d'action, qu'il

n sondant les abîmes de cette âme malade de

ranchement fier de son nom. Simon comprit

TRAITÉ PRATIQUE
DES
MALADIES DE L'ENFANCE.

TRAITÉ DE MÉDECINE

MALADIES DE L'ENFANCE

Lyon.—Imp. Dumoulin, Ronet et Sibuet.

TRAITÉ PRATIQUE

DES

MALADIES DE L'ENFANCE

FONDÉ

SUR DE NOMBREUSES OBSERVATIONS CLINIQUES,

PAR

F. BARRIER, D. M.

Chirurgien en chef désigné de l'Hôtel-Dieu de Lyon,
Ancien interne de l'hôpital des Enfants malades de Paris,
Président de la Société médicale d'émulation de Lyon,
Membre de l'Académie des sciences de Dijon, des Sociétés de médecine
de Montpellier, de Strasbourg, de Gand, etc.

Les maladies des enfants sont, pour la pratique un objet de la plus haute importance, et qui exige une étude spéciale; car le tiers de tous les malades sont des enfants, et les affections dont ils sont atteints présentent une physionomie particulière. On peut être à la fois très-bon médecin pour les adultes et mauvais pour les enfants. En effet, il ne suffit pas, comme quelques-uns le croient, de diminuer simplement les doses des médicaments, mais la séméiotique est différente, la pathologie et la thérapeutique sont modifiées, en un mot, les maladies ont un autre caractère. (HUFELAND.)

DEUXIÈME ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE.

TOME SECOND.

PARIS.

FORTIN, MASSON ET C^{ie}, LIBRAIRES,
Place de l'Ecole de Médecine, 4.

LYON.

CHARLES SAVY JEUNE, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
Place Louis-le-Grand, 14.

1845.

FRATTE FRATTORE

1844

FRATTE FRATTORE

1844

FRATTE FRATTORE

1844

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

RJ44

845B

2

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

FRATTE FRATTORE

TRAITÉ PRATIQUE

DES

MALADIES DE L'ENFANCE.

SUITE DE LA SECONDE PARTIE.

MALADIES DE L'ABDOMEN.

SECTION II.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN.

Les maladies de l'estomac et de l'intestin, qui demandent chez les enfants une description spéciale, ne sont pas très-nombreuses. Ainsi les hémorrhagies, les névroses, les cancers sont assez rares pour qu'il nous soit permis de n'en point parler longuement.

Les phlegmasies gastro-intestinales se prêtent à quelques considérations spéciales; nous nous efforcerons de ramener à sa juste valeur le rôle que jouent ces états morbides depuis la naissance jusqu'à la puberté.

Nous pensons qu'il est indispensable de distinguer de ces phlegmasies certaines lésions de sécrétion que nous décrirons sous le nom de diacrisis. Ces maladies sont très-fréquentes dans l'enfance; plus souvent qu'aux autres âges elles sont graves, soit par les désordres immédiats qu'elles

entraînent dans les fonctions digestives, soit par leur tendance plus grande à éveiller la susceptibilité des autres organes et surtout celle du système nerveux.

Enfin dans cette seconde section nous ferons l'histoire de la fièvre typhoïde pour cette seule raison qu'elle a son principal siège dans l'intestin.

CHAPITRE I.

DE L'INDIGESTION.

L'indigestion est très-fréquente pendant tout le cours de l'enfance, mais elle diffère peu au fond de ce qu'elle est aux autres âges. On doit toujours la regarder comme une perturbation momentanée de l'action de l'estomac ou de l'intestin dont toutes les causes se réduisent à un défaut de rapport entre l'aliment et la force digestive. Le tube intestinal étant dans un état parfaitement normal, l'indigestion peut suivre l'introduction de mets trop abondants ou de mauvaise qualité; d'autre part, on la voit survenir malgré un régime bien entendu, si une cause pathogénique quelconque surprend le canal digestif dans un moment où ses propriétés vitales sont exaltées. Dans tous ces cas elle suppose préalablement à l'ingestion des aliments, l'intégrité des organes et leur retour à l'état normal par le seul fait de leur déplétion. Sans ces deux conditions, elle ne serait qu'un phénomène symptomatique de quelque autre maladie.

C'est presque toujours l'incurie des parents qu'on doit accuser des indigestions si communes dans le premier âge. Sans doute, lorsqu'il s'agit de tracer les règles du régime qui convient aux enfants, il ne faut pas perdre de vue que chez eux le besoin de réparer les pertes de l'économie est toujours plus pressant, que l'appétit se réveille presque aussitôt que satisfait; mais il ne faut point pousser les conséquences de ces principes jusqu'à l'abus. Si les repas doivent être fréquents, assez rapprochés les uns des autres pour que l'appétit ne se change point en faim et en souf-

france, il faut au moins les séparer par des intervalles assez longs pour que les digestions n'anticipent pas les unes sur les autres et que l'estomac ait des instants de repos. Il est plus facile et moins nuisible qu'on ne le pense généralement, de régulariser les heures des repas, et si cette pratique trop rigoureusement appliquée a des inconvénients chez les enfants à la mamelle, on ne saurait trop conseiller de la mettre en usage à une époque plus avancée de l'enfance.

L'indigestion, quant à ses phénomènes immédiats et consécutifs, diffère peu chez les enfants d'un à quinze ans et chez les adultes. Il suffit de remarquer que chez les premiers elle est en général plus légère et n'amène qu'un dérangement tout-à-fait passager de la santé, lorsque d'ailleurs il n'existe aucune autre cause de maladie. Chez eux le vomissement est si facile que la surcharge de l'estomac cessant immédiatement par cet acte, la digestion continue à s'accomplir sans accident notable. Si cependant les aliments mal chymifiés passent dans l'intestin, celui-ci irrité à son tour opère une chyification incomplète; les coliques, la diarrhée et d'autres symptômes peuvent prendre naissance. Il y a alors indigestion intestinale consécutive à celle de l'estomac.

Ce que les auteurs ont dit du vomissement chez le nouveau-né, se rapporte en partie à l'indigestion gastrique, et en partie à d'autres affections dont il n'est que la conséquence. Dans l'indigestion la plus simple, le nourrisson ne vomit que l'excès de lait qu'il a ingéré dans son estomac. C'est ce qu'on voit chez les enfants qui têtent avec avidité, surtout si la nourrice a beaucoup de lait. Dans ce cas le vomissement est moins une maladie qu'un effort heureux de la nature qui décharge l'estomac et lui permet de chymifier plus complètement le reste des aliments. Ce simple *regorgement* ne compromet ni la santé, ni le développement de l'enfant. Il ne réclame par conséquent aucun moyen thérapeutique. La nourrice doit seulement veiller à ce que son nourrisson ne tette pas une trop grande quantité de lait à la fois.

Si l'indigestion n'est pas due à des repas trop copieux,

et si rien n'indique une maladie de l'estomac, il faut soupçonner que le lait de la nourrice n'a pas des qualités parfaitement convenables. On voit tous les jours des écarts de régime, des émotions morales, le retour des menstrues, le coït, etc., produire chez les nourrices un trouble de la sécrétion lactée qui devient la véritable cause de l'indigestion du nourrisson. Mais, chez d'autres femmes, la sécrétion mammaire, en l'absence de ces causes, et par suite d'une disposition individuelle, est telle que son produit est habituellement modifié dans sa composition. Enfin le lait peut devenir nuisible par cela seul que son ancienneté n'est pas en rapport avec l'âge de l'enfant, car on sait que sa composition n'est point identique aux diverses époques de l'allaitement.

D'un autre côté la cause de l'indigestion peut résider dans une idiosyncrasie de l'enfant. Ne voit-on pas à un âge plus avancé, des aliments réfractaires à l'élaboration de l'estomac chez certaines personnes être parfaitement digérés par d'autres. Ainsi le même lait donné à deux enfants sera vomé par l'un, digéré par l'autre; tant il est vrai que dans les limites de l'état physiologique l'activité de chaque fonction a des degrés fort variables.

En face de ces deux ordres de causes, la conduite du praticien doit être différente. Si c'est le lait maternel dont la composition paraît vicieuse, il est évident qu'il faut donner à l'enfant une autre nourrice. Avant de recourir à ce moyen extrême, on peut essayer de modifier la sécrétion mammaire, d'abord en écartant toutes les causes qui peuvent la troubler, ensuite en corrigeant l'imperfection des digestions de la mère par des moyens appropriés. A cet effet on conseille souvent l'eau de Seltz, les limonades et boissons rafraîchissantes, les émulsions, de doux laxatifs, l'acide tartrique, la magnésie, et autres médicaments de ce genre. Par leur usage la sécrétion du lait devient plus parfaite. Il est même des cas, comme nous allons le voir, où l'on doit essayer de donner à ce produit des propriétés qui lui manquent à l'état normal.

Lorsque l'indigestion dépend de l'idiosyncrasie du nouveau-né, il faut tâcher de reconnaître en quoi consiste

l'impaisance de l'estomac, rechercher si les sécrétions gastriques sont vicieuses, ou si c'est une simple irritabilité des nerfs de la tunique charnue qui provoque le rejet des substances ingérées.

On sait que la chymification du lait commence par sa coagulation due à l'action des acides gastriques. Si donc un enfant vomit une demi-heure ou une heure après son repas, il doit vomir du lait coagulé. Si le lait est encore liquide, on doit présumer que les acides gastriques manquent ou sont peu actifs; mais ce phénomène est très-rare chez l'enfant à la mamelle, et quand il se montre il dénote un état pathologique reconnaissable à d'autres signes. Beaucoup plus souvent les matières vomies indiquent une prédominance des acides gastriques, les caillots caseux sont durs, l'haleine de l'enfant a une odeur aigre très-prononcée, on trouve dans les selles une grande partie du lait encore coagulé et non décomposé. Il est probable qu'alors le second acte de la chymification, c'est-à-dire la liquéfaction du lait coagulé n'a pu s'accomplir, soit parce que les sécrétions acides de l'estomac sont trop actives, soit parce que la bile est insuffisante à les neutraliser. Les absorbants et les alcalis sont alors nécessaires, comme dans la diarrhée acceusante qui ne diffère que par sa continuité et son intensité de l'état pathologique qui nous occupe en ce moment. Comme celui-ci ne se manifeste qu'à l'instant des digestions et se détermine aucun trouble dans leurs intervalles, il faut administrer de préférence les absorbants et les alcalis peu de temps après l'ingestion des aliments. Pour diminuer la tendance du lait à s'acidifier et pour augmenter son alcalinité, on peut, comme le conseille Roen et comme nous l'avons dit ailleurs, prescrire à la nourrice l'usage habituel de ces médicaments. Pour favoriser la liquéfaction du coagulum et son passage dans l'intestin, il est utile d'exciter l'estomac par une légère infusion de thé, ou d'augmenter la proportion d'eau du lait ingéré en donnant à l'enfant quelques cuillerées d'eau sucrée, peu de temps après qu'il a tété.

Chez quelques enfants le vomissement paraît plutôt la conséquence d'une simple irritabilité anormale que d'un

vien des sécrétions gastriques. Dans ce cas il se manifeste non-seulement après l'ingestion du lait ou d'autres aliments, mais aussi après celle des boissons qui pour être absorbées n'ont besoin d'aucune élaboration préalable. Il annonce une exaltation de l'irritabilité des toniques muqueux et musculaires qui ne permet pas à l'estomac de supporter la distension pendant tout le temps nécessaire au passage des liquides dans les vaisseaux absorbants. Cette irritabilité se rencontre souvent dans la convalescence des maladies qui ont exigé une diète rigoureuse. Elle rend aussi compte des vomissements qui se déclarent dès les premiers jours de la vie et dépendent de ce que l'estomac n'a point encore l'habitude de ses excitants physiologiques. Enfin il lui faut attribuer ces vomissements produits par des émotions morales, la frayeur, la crainte, etc., dont l'influence, comme Rosen l'a fait remarquer, a souvent, chez les enfants, des suites très-fâcheuses. Ce trouble d'inscrvation ne doit pas dans tous les cas être combattu d'une manière active; car il peut s'éteindre peu à peu spontanément. Mais s'il est très-intense, s'il empêche presque constamment les digestions, comme il peut être funeste par lui-même en donnant naissance à quelque autre maladie, il faut le combattre. On lui oppose d'abord un régime aussi doux et ménagé que possible, et des sédatifs locaux et généraux, tels que des fomentations émollientes sur la région épigastrique, des bains tièdes; à l'intérieur, l'eau de fleurs d'orange, de laïné, de tilleul, le sous-nitrate de bismuth, et enfin dans les cas graves où le vomissement est opiniâtre, le laudanum de Sydenham et le sirop de pavots blancs à doses proportionnées à l'âge des petits malades.

Les effets de l'indigestion ne se bornent pas toujours à des phénomènes locaux. Lorsque le vomissement ne débarrasse pas promptement l'estomac des aliments qu'il ne peut digérer, cette surcharge en se prolongant devient l'origine de beaucoup d'autres dérangements fonctionnels. C'est surtout sur le système nerveux qu'il faut redouter leur action. On voit dans certains cas des symptômes cérébraux tels que la céphalalgie, l'assoupissement, des convulsions,

mettre la vie d'un enfant en danger uniquement par suite d'un écart de régime. Le traitement présente alors les mêmes indications qu'à un âge plus avancé, c'est-à-dire que tantôt il faut stimuler l'action de l'estomac par des toniques et des excitants, tantôt provoquer l'évacuation immédiate des aliments par un vomitif, tantôt enfin calmer par des antispasmodiques ou des antiphlogistiques l'irritation nerveuse ou l'inflammation qui succède aux phénomènes de l'indigestion. Dans ces cas le traitement n'offre rien de spécial chez les enfants, et nous devons nous borner à ces courtes remarques. D'ailleurs nous reviendrons nécessairement sur ce sujet quand nous ferons l'histoire des convulsions.

CHAPITRE II.

HÉMORRHOÏQUES GASTRO-INTESTINALES.

Les hémorrhagies de la muqueuse digestive sont peu communes dans l'enfance. Celles qui sont dues à une dégénérescence cancéreuse ne s'observent presque jamais, et les tubercules, quoique fréquents dans l'intestin, y donnent fort rarement lieu. La dathiaentérie s'en accompagne moins fréquemment que chez l'adulte, et la gastro-entérite proprement dite induit peu sur leur production. Quant aux hémorrhagies idiopathiques, elles ne sont pas moins exceptionnelles. Le flux hémorroïdal en particulier appartient presque exclusivement à un âge plus avancé, et l'absence de la menstruation chez les petites filles, les met à l'abri de ces hémorrhagies supplémentaires qui ont lieu chez certaines femmes dysménorrhéiques par la surface de divers organes et quelquefois par celle des voies urinaires. Cependant il n'est pas impossible d'observer chez les enfants quelques cas d'hémorrhagie périodique des premières voies. « Il y a dix mois, écrivait en 1825 M. Armand de Rochefort, que je fis consulté pour un enfant de huit

ans qui depuis sa première année éprouve tous les mois un flux de sang par le rectum. Cet enfant est d'une bonne constitution et jouissant d'une brillante santé. Il a les cheveux noirs, le teint coloré, la poitrine bien dilatée, les viscères abdominaux sont dans l'état normal; toutes ses fonctions s'exécutent; la verge est développée; les testicules sont descendus dans le scrotum. Cet écoulement, qui dure de trois à quatre jours, est précédé des symptômes suivants: malaise général, céphalalgie, quelques coliques, douleur lombaire, pesanteur dans les cuisses et les jambes. Enfin paraît le flux; pendant celui-ci les fonctions ne sont point altérées, l'enfant a de l'appétit, digère bien. Le poids est assez développé, cependant l'enfant est un peu pâle. Au bout du quatrième jour il reprend sa vigueur ordinaire. J'ai examiné l'intérieur du rectum, et je n'y ai rien trouvé d'anormal, j'ai vu sept à huit fois le petit malade dans ce cas (1). — Il est à regretter que l'auteur de cette observation n'ait pas indiqué s'il y avait dans la famille une disposition aux hémorrhoides qui pouvait être héréditaire chez l'enfant, comme c'est l'ordinaire.

Les hémorrhagies gastro-intestinales qui nous intéressent le plus sont celles qui surviennent : 1^o chez le nouveau-né par suite de causes que nous allons étudier, 2^o dans tout le cours de l'enfance par l'effet d'une diathèse hémorrhagique qui se traduit presque toujours en même temps par des épanchements interstitiels de la peau, c'est-à-dire par un purpura. Dans ce dernier cas, elles ne sont qu'une fragmment d'une maladie plus générale dont nous ne pourrions sans inconvénient les séparer, et dont nous ferons l'histoire dans une autre partie de cet ouvrage. Celles qui sont indépendantes de cette diathèse hémorrhagique sont excessivement rares et presque jamais idiopathiques. Dans le petit nombre de celles qu'on a rencontrées, on a eu lieu de soupçonner et même de constater anatomiquement qu'elles résultaient d'une lésion antérieure de la muqueuse gastrique ou intestinale. C'est ainsi que M. Moret

(1) *Gazette médicale*, 1823, page 267.

trouvés (1). M. Gendrin dit en avoir vu trois cas (2). M. Rahn-Escher, médecin à Zurich, a publié un travail très-intéressant sur ce sujet en 1855 (3). Le docteur Kinwisch en a inséré quatre exemples dans un journal allemand, dont la *Gazette Médicale* a reproduit l'analyse (4). Enfin l'on trouve quelques autres observations éparses dans les divers recueils périodiques de médecine.

L'ensemble des faits actuellement connus permet d'établir que cette maladie, sans être fréquente, mérite cependant d'être étudiée à part, et l'on s'étonne que M. Valleix ne lui ait pas consacré quelques pages dans sa *Clinique des maladies des enfants nouveau-nés*. Sans doute il n'aura pas eu occasion d'en voir beaucoup d'exemples, et il est à regretter que ses recherches ne soient pas venues contrôler celles de Billard qui n'ont pas toute la valeur qu'on serait d'abord porté à leur accorder. En effet, cet auteur nous dit qu'il a rassemblé quinze cas d'hémorrhagies intestinales, qu'il les considère comme passives, c'est-à-dire comme le simple résultat d'une gêne apportée à la circulation veineuse. Or, dans les deux seuls cas qu'il raconte en détail, l'hémorrhagie s'est montrée chez des enfants atteints de muguet dont elle n'était peut-être qu'un effet ou une complication. Ceci prouve encore, pour le dire en passant, et comme nous l'avons déjà démontré, sous quel point de vue étroit et vicieux cet auteur a envisagé le sujet; puisqu'il n'est pas une seule des différentes maladies de l'appareil digestif à l'étude de laquelle il ne vienne mêler celle de cette affection.

Quoi qu'il en soit, d'après Billard, les hémorrhagies gastro-intestinales ne seraient que la conséquence d'une forte congestion passive produite elle-même par une gêne de la circulation générale. Il pense que dans les cas qu'il lui a été donné d'examiner, l'état apoplectique venait du séjour prolongé de fœtus phtériques dans des bassins

(1) *Traité des maladies des enfants*, p. 216, 5e éd.

(2) *Extrait phil. de méd. prat.*, t. I, p. 189.

(3) *Observ. sur les hémorrh. des nouv. nés chez la ref. suédoise*. *Gas. méd. de Paris*, 1855, pag. 101.

(4) *Sur l'apoplexie cérébrale des nouveau-nés*, *Gas. méd.* 1851, p. 627.

resserrés et de l'établissement incomplet de la respiration et de la circulation pulmonaire. Cette explication ne paraît pas applicable à tous les cas. D'abord on a objecté que les accidents seraient infiniment plus fréquents si l'état apoplectique en était la véritable cause. Mais, ce qui est plus concluant, c'est qu'ils ont été constatés en l'absence de tous les caractères de la pléthore, comme l'a démontré M. Rahn-Escher dans son mémoire. Ce médecin les fait dépendre d'une hyperémie locale du tube digestif due à une prédisposition particulière et à une faiblesse native, tandis que l'établissement difficile de la circulation pulmonaire ne serait qu'une cause occasionnelle. Selon lui, la prédisposition serait le résultat de conditions propres à la mère. Les femmes qui avaient donné le jour aux enfants qu'il a observés « étaient lentes, d'un tempérament bilioso-nerveux; toutes avaient été sujettes à une irritation du système nerveux ganglionnaire, à des désordres dans la circulation abdominale et à un trouble dans les fonctions digestives pendant et souvent hors l'état de gestation. Rappelons-nous encore que le père de trois de ces enfants avait succombé à une affection cancéreuse de l'estomac. Ne peut-on pas admettre dès-lors une disposition communiquée par les parents, et surtout par la mère, au fœtus, à une sorte de désordre dans la circulation abdominale et à une atonie des vaisseaux qui aurait déjà, pendant la vie utérine, donné lieu à une sécrétion morbide des intestins, comme le prouve le contact plus forcée du mercure. » Peut-être trouvera-t-on, avec M. Olivier, d'Angers (1), que l'état de santé de la mère a été trop vaguement indiqué dans les observations du médecin de Zurich, mais on ne doit point toutefois refuser d'admettre que le mauvais état de la femme pendant la grossesse peut affaiblir la constitution de l'enfant et le prédisposer aux hémorrhagies par débilité et atonie du système circulatoire. M. Goudrin, en mentionnant les faits de sa pratique ne dit rien de la santé de la mère. Sur cinq enfants, trois

(1) Note de la page 356 de l'ouvrage de Billard.

étaient nés sans grande difficulté et avaient eu une perte de sang abondante, « les deux autres étaient morts deux ou trois jours après la naissance avec des phénomènes apoplectiques ; la congestion sanguine gastro-intestinale était excessive et hors de proportion avec l'hémorrhagie faible qui ne s'était manifestée par aucun symptôme pendant la vie (1). » Les quatre enfants observés par M. Kinnisch étaient à terme et bien nourris ; ils étaient venus au monde par des accouchements faciles et réguliers ; chez deux d'entre eux la ligature du cordon avait été faite trop tôt, et chez un troisième on fut forcé de le relâcher pour faire sortir un peu de sang, à cause d'une cyanose très-promoquée.

Sur les quinze exemples rassemblés par Billard il y avait huit enfants de un à six jours, quatre de six à huit, et trois de dix à dix-huit jours. Sur les cinq cas de M. Gendrin, il y a eu deux enfants morts le troisième jour, un le quatrième, un le sixième et un le onzième. Sur les trois faits rapportés en détail par M. Bohn-Escher, l'hémorrhagie est survenue deux fois le second jour, une fois le quatrième. Enfin dans les quatre cas racontés par M. Kinnisch, la mort est liée dans les premières quarante-huit heures. C'est donc en résumé dans le cours de la première semaine après la naissance que se déclare la maladie ; elle devient de plus en plus rare dans la seconde et troisième semaine. Le sexe a probablement peu d'influence, car sur vingt-un cas dans lesquels le sexe a été noté, nous trouvons douze filles et neuf garçons. Billard se base sur la constitution et les conditions générales des sujets, tandis que M. Bohn-Escher a signalé la faiblesse et la délicatesse de la constitution des sujets dont il a donné l'histoire.

L'hémorrhagie a bien plus fréquemment son siège dans l'intestin que dans l'estomac.

Les symptômes sont obscurs et le diagnostic difficile, tant qu'il n'y a point issue du sang au dehors. Voici d'après quelles données on pourra présumer l'existence de l'hémorrhagie. Nous savons que chez certains enfants, liés à

(1) Ouvrage cité, t. I, p. 436.

un état apoplectique, elle est en quelque sorte le plus haut degré de la congestion qui se fait alors sur les téguments internes comme à la peau. Or, toutes les fois qu'un enfant naît dans un état apoplectique et que celui-ci persiste pendant les jours qui suivent la naissance, on peut présumer l'existence d'une congestion sanguine des muqueuses et redouter l'invasion d'une hémorrhagie. Si celle-ci arrive, mais est peu abondante, elle ne fera point disparaître l'état apoplectique ni même la congestion de la muqueuse digestive, et dès-lors le diagnostic sera nécessairement très-incertain, jusqu'à ce qu'un peu de sang soit aperçu dans les vomissements ou dans les selles. Si au contraire elle est abondante, la plethore diminuera, disparaîtra et fera même place à un état général d'anémie. Dans ce cas le sang ne tarde pas, si la mort n'est pas immédiate, à être rejeté par la bouche ou l'anus. Dans d'autres circonstances, l'état apoplectique ne préexiste point, mais alors l'afflux de sang ne peut avoir lieu sur les viscères abdominaux sans amener la décoloration de la peau, son refroidissement, la petitesse et la fréquence du pouls, l'angoisse de la respiration, sans produire, en un mot, les signes extérieurs de l'anémie. Dans quelques cas observés par M. Balm-Esch, ces symptômes joints à de l'agitation, à une espèce de frisson et à des mouvements convulsifs, ont paru précéder l'exhalation sanguine, en sorte qu'il y aurait eu ces phénomènes initiaux et précurseurs qui annoncent presque toutes les hémorrhagies spontanées à un âge plus avancé. Lorsque l'hémorrhagie est opérée, ces phénomènes généraux sont de plus en plus marqués; en outre, le ventre se ballonne, paraît un peu douloureux, mais ne présente ni chaleur ni tension notables; il y a comme des syncopes, et bientôt l'issue du sang par les voies naturelles se laisse plus aucun doute sur la nature des accidents. Il peut en rester sur le siège précis de l'hémorrhagie qu'on a vue très-rarement, il est vrai, fournie par la rate dans un cas d'inflammation gangréneuse de cet organe, suivie de perforation de l'estomac. Le sang pourrait aussi venir du foie ou de quelque autre organe mis en communication avec la cavité

gastro-intestinale. Enfin l'on ne pourra presque jamais savoir dans quelle partie de l'intestin le sang a été excréé; néanmoins on peut conclure avec M. Rahm-Escher, d'après la régularité des selles, le mélange intime du sang avec le méconium et les matières fécales, dans certains cas d'après l'aspect du sang qui semble avoir subi un commencement de digestion, que l'intestin grêle a été le siège de l'hémorrhagie. Des phénomènes opposés pourraient faire placer le siège du mal dans le gros intestin, et enfin l'hématémèse, le développement et la matité de l'estomac, signaleraient la gastrorrhagie. De reste, tâtons nous de le dire, ces différentes questions de diagnostic sont fort secondaires; pour le traitement, la seule chose importante est de reconnaître qu'une hémorrhagie a lieu dans un point quelconque de la cavité digestive.

Suivant Billard, la terminaison de la maladie est presque constamment mortelle. Elle a été heureuse au contraire chez quelques-uns des malades cités dans le mémoire de M. Rahm-Escher, mais à l'affection primitive succéda une espèce de catarrhe ou plutôt de chlorose dont on ne put triompher complètement.

Le traitement de l'hémorrhagie des premières voies, chez le nouveau-né, n'est point identique dans tous les cas. D'abord, comme Billard le dit avec raison, « on ne saurait trop recommander aux accoucheurs entre les mains desquels naissent des enfants que la longueur de l'accouchement a réduits à un état imminent d'asphyxie, de laisser couler une certaine quantité de sang par le cordon ombilical. » Lorsque par l'oubli ou malgré l'emploi de cette précaution, les enfants sont évidemment pléthoriques, rien n'est plus rationnel pour prévenir ou arrêter l'hémorrhagie que d'appliquer une ou deux sangsues à l'anus. En l'absence de la pléthore, et surtout s'il y a déjà même par le fait de la perte sanguine, on ordonnera une boisson froide et légèrement acidulée avec le sirop de coings ou quelques gouttes d'acide nitrique ou d'eau de Rabel. Des lavements de même nature seraient très-utiles si l'enfant pouvait les conserver. M. Rahm-Escher préfère les astringents unis aux

mucilagineux. Ainsi, dans plusieurs cas il donne une émulsion mucilagineuse avec la magnésie, l'alun et le miel ; dans d'autres il remplace l'alun par la ratanhia ; comme boisson il donne l'infusion de pépins de coings et prescrit des fomentations sur l'abdomen avec le vin rouge ou la décoction de quinquina ; il met les petits malades à la diète absolue. Contre l'état catarrhique consécutif il conseille des toniques légers, des substances amères mucilagineuses, plus tard les préparations martiales, particulièrement l'hydrochlorate de fer et d'ammoniaque, les loins gélatineux, aromatiques et toniques, et enfin une diète convenable, le lait de femme avant tout, à son défaut le lait de vache avec du pain et de légers bouillons non salés, avec des tablettes de limaçons, etc.

CHAPITRE III.

DE L'INFLAMMATION GASTRO-INTESTINALE.

La gastro-entérite, en tant qu'elle constitue par elle seule une affection isolée est beaucoup plus rare que ne l'ont donné à entendre ceux qui, dans ces derniers temps, ont étudié cette maladie sous l'inspiration de la doctrine physiologique. Nous accordons volontiers que, comme état morbide léger, ou plutôt comme élément, elle entre dans la constitution d'un grand nombre d'affections composées, et nous concevons jusqu'à un certain point que dans les diarrées gastro-intestinales quelques médecins subordonnent tous les phénomènes pathologiques à un état de sub-inflammation de la muqueuse digestive. Cette opinion ne diffère de la nôtre qu'en ce qu'elle accorde à l'élément inflammatoire de ces affections une prééminence que nous croyons appartenir à l'élément sécrétoire. La gastro-entérite se présente encore fréquemment dans certains états morbides très-complexes, tels que les fièvres éanthématisques internes et externes. Dans cette classe de maladies qui comprend la rougeole, la scarlatine, la va-

riole, la fièvre typhoïde, la gastro-entérite est analogue à l'inflammation des muqueuses de l'œil, du nez, de la bouche, de la gorge et des bronches, qui accompagne ces diverses maladies. Elle est simplement érythémateuse dans la rougeole et la scarlatine, et se dissipe le plus souvent peu de temps après que l'éruption s'est faite à la peau. Dans la variole cette inflammation peut aussi n'être qu'érythémateuse, et enfin dans la fièvre typhoïde, elle reste souvent à ce degré. Mais dans toutes ces maladies la phlegmasie peut revêtir des formes plus graves qui alors en font une véritable complication. C'est ainsi que certaines diarrhées dépendantes de la rougeole sont de nature inflammatoire. Dans la scarlatine on voit aussi quelquefois l'inflammation se fixer dans l'intestin et y déterminer une altération des plaques de Peyer fort remarquable. Dans la variole on peut voir des pustules se développer dans différents points de la muqueuse digestive, ou celle-ci être le siège de diverses lésions qui annoncent plus qu'une simple phlogose érythémateuse. Enfin, dans la fièvre typhoïde, quoique le cas soit rare, il n'est pas impossible de trouver les traces d'une véritable gastrite ou d'une gastro-entérite, outre celles qui sont propres à la lésion des plaques.

Il est une autre maladie appartenant presque exclusivement à l'enfance, dans laquelle la gastro-entérite existe à titre d'élément et non comme seul état morbide, nous voulons parler du muguet. Nous avons vu en effet qu'on peut le considérer comme une inflammation siégeant dans une plus ou moins grande étendue de la muqueuse digestive, et qui n'emprunte sa forme spéciale qu'à deux circonstances principales, savoir : 1^{re} de s'accompagner de sécrétion pseudo-membraneuse, surtout dans la muqueuse sub-diaphragmatique, 2^{re} de se rattacher à l'acte d'évolution organique par lequel il s'opère immédiatement après la naissance une rénovation de la cuticule des membranes tégumentaires externes et internes. Nous avons démontré que cet acte du développement de l'enfant ayant pour conditions une activité insolite de la circulation capillaire des muqueuses, alors que ces membranes n'ont pas encore

acquis l'habitude du contact de leurs excitants physiologiques, il y a ainsi réunion des circonstances les plus favorables au développement d'une phlegmasie. C'est donc, suivant nous, au muguet que se rapporte presque exclusivement la gastro-entérite des nouveau-nés, et les cas sont rares dans lesquels on peut constater la gastro-entérite franche indépendante du muguet. Cette manière de voir se rapproche de celle de M. Vallée, qui regarde l'inflammation gastro-intestinale sans muguet sub-diaphragmatique comme très-rare, et avoue n'en avoir observé que trois cas sur un assez grand nombre de malades. On trouve dans Billard lui-même la confirmation de ces idées. Si l'on se contentait de consulter les titres des chapitres où il traite des maladies du tube digestif, on pourrait croire que rien n'est plus fréquent que la gastrite, l'entérite et la gastro-entérite franches chez les enfants nouveau-nés. Or rien n'est plus éloigné de la vérité. Les observations qu'il raconte sont peu détaillées, incomplètes; néanmoins elles renferment pour la plupart la preuve de ce que nous avançons, à savoir que presque toutes ces phlegmasies gastro-intestinales n'étaient autre chose que des cas de muguet; c'est ce que nous allons démontrer.

Billard admet quatre espèces d'inflammations dans le tube gastro-intestinal, dont la première est l'inflammation érythémateuse. Il cite un cas dans lequel cette inflammation était bornée à l'estomac. Nous accordons qu'il y a eu dans ce cas une gastrite idiopathique, mais Billard remarque lui-même que cette inflammation est très-rarement bornée à l'estomac, et il donne presque à entendre que ce cas est le seul qu'il ait recueilli. Plus souvent il l'a trouvée dans l'intestin exclusivement et dit en avoir réuni jusqu'à quarante cas chez des enfants âgés d'un jour à un an. Or, il s'agit de savoir si cette entérite existait en l'absence du muguet, et c'est ce qui reste douteux; car d'après la manière dont cet auteur considère le muguet, il est évident qu'il en sépare la gastro-entérite ou l'entérite qui l'accompagnent d'ordinaire. Ainsi arrive-t-il que la seule observation d'entérite érythémateuse qu'il rapporte nous

montre la coïncidence d'un muguet de la bouche très-caractérisé. On peut induire de là que dans beaucoup de cas l'entérite érythémateuse de Billard a dû coïncider avec le muguet de la digestive sous-diaphragmatique et n'était qu'une dépendance de cette maladie elle-même. En effet, ce cas ne différait des cas ordinaires de muguet que par une plus grande intensité des symptômes abdominaux. Tout nous porte à croire que ce que nous venons de dire de l'entérite s'applique à la gastro-entérite dont Billard ne cite aucune observation, se contentant de dire qu'elle est très-fréquente, sans nous mettre à même de distinguer jusqu'à quel point il l'a vue isolée du muguet.

La seconde espèce d'inflammation est celle que caractérise une altération de sécrétion. Elle n'est autre chose que le muguet lui-même dans les cas où le produit de la sécrétion se montre dans l'estomac ou dans l'intestin.

La troisième espèce est l'inflammation folliculeuse, limitée à l'estomac, cette forme de phlegmasie telle que Billard l'a décrite, constitue effectivement une gastrite propre au nouveau-né. Mais lorsqu'elle siège dans l'intestin, elle nous paraît se rattacher complètement aux diarrées.

Enfin la quatrième espèce d'inflammation est caractérisée par une désorganisation de tissu, consistant soit dans un ramollissement considérable, soit dans une gangrène. Les trois cas de ramollissement gélatiniforme de l'estomac rapportés par Billard ne sont autre chose que des cas de muguet dans lesquels l'inflammation gastrique a eu une grande violence. L'intestin peut être le siège d'altérations analogues. Quant aux cas de gangrène, ils sont très-rars et n'offrent rien qui paraisse bien spécial à l'enfance.

Il résulte de l'ensemble de ces remarques qu'à part la gastrite folliculeuse de Billard, l'inflammation gastro-intestinale chez les nouveau-nés se rattache presque constamment soit au muguet, soit aux diarrées. Ce résultat ressort ainsi directement de l'ensemble des faits que nous avons personnellement observés dans la première époque de l'enfance.

Chez les enfants d'un à quinze ans la gastro-entérite, la gastrite et l'entérite constituent rarement des états morbides essentiels et complets, c'est-à-dire soumis dans leur manifestation, dans leur marche, leur durée, leur terminaison et leur thérapeutique aux mêmes lois qui président à d'autres maladies essentiellement inflammatoires; nous soutenons que cela est au moins aussi rare chez les enfants que chez les adultes.

En preuve de cette assertion nous reproduisons le relevé numérique indiqué dans notre introduction, page 35. Nous trouvons que sur cent vingt-deux cas appartenant aux maladies de l'abdomen, il y a en a eu cinquante-quatre de diarrhée, dix de maladies gastro-intestinales inflammatoires ou saburrales, deux d'affection vermineuse et un d'ulcération du duodénum. Sur ces soixante-sept cas, les seuls dans lesquels des observateurs induits de la doctrine physiologique auraient pu faire intervenir l'inflammation comme élément morbide prédominant, nous dirons que les cinq sixièmes au moins des cas de diarrhée doivent appartenir aux diarrées; qu'il en est de même de la plupart des cas initiaux; maladies inflammatoires ou saburrales; que, dans les deux cas de vers, l'inflammation ou n'existait pas ou était consécutive; et qu'enfin les ulcérations du duodénum étaient probablement le résultat d'un empoisonnement. Ainsi nous arriverions à établir qu'à peine sur ces soixante-sept cas il en est une douzaine qui mériteraient le nom de gastrite, ou d'entérite, ou de gastro-entérite, et de ces trois maladies l'entérite est la seule qui ait été positivement constatée à l'autopsie de quelques sujets.

Ces relevés ne portent que sur un espace de temps assez court; mais comme ils sont très-complets et qu'ils ont été recueillis avec le plus grand soin, nous les croyons très-utiles pour appuyer notre opinion sur la rareté de la gastro-entérite idiopathique. Sans ces preuves nos assertions garderaient cette valeur vague et approximative qu'on peut reprocher trop souvent aux opinions médicales, même parmi celles qui empruntent le plus d'autorité aux noms de leurs auteurs. D'ailleurs nous ne nous appuyons pas

uniquement sur les *rebetés* que nous venons de présenter. Soit avant, soit depuis l'époque qui nous les a fournis, nous n'avons laissé passer aucun fait important du domaine de la pathologie de l'enfance sans en conserver des notes plus ou moins détaillées, et l'ensemble de nos remarques, à mesure que nous avançons dans la pratique, ne fait que confirmer notre manière de voir.

Comme contre-épreuve nous avons cherché des observations dans les traités, surtout dans les recueils périodiques; nous y avons trouvé un assez grand nombre de faits intitulés : *gastrite*, *entérite* ou *gastro-entérite*; mais en soumettant ces observations à une analyse rigoureuse, nous avons vu que la grande majorité en se rapporte nullement à la gastro-entérite telle que nous la comprenons et que nous l'avons définie tout-à-l'heure, mais à des inflammations symptomatiques d'autres maladies, ou à ces affections de formes diverses qui pour nous constituent les *diarrhées gastro-intestinales*.

Ce que nous venons de dire doit présenter que nous n'avons pas l'intention d'insister beaucoup sur la gastrite, l'entérite et la gastro-entérite chez les enfants. Nous nous bornerons : 1° à décrire la seule forme de gastrite qui appartient spécialement à l'enfance, la gastrite folliculaire; 2° à indiquer les symptômes des inflammations gastro-intestinales dans le premier âge, qu'elles soient idiopathiques ou symptomatiques.

La gastrite folliculaire a été décrite par Billard d'une manière un peu confuse, parce qu'il n'a pas voulu séparer deux états morbides qui n'ont de commun que le siège et qui ne semblent être que très-rarement deux degrés différents de la même maladie. Ainsi, il a étudié ensemble le développement simple des follicules muqueux de l'estomac et leur ulcération évidemment inflammatoire. Il y a entre ces deux états pathologiques deux différences essentielles : la première est que la turgescence simple des follicules gastriques coïncide ordinairement avec celle des follicules intestinaux, tandis que les ulcérations folliculaires de l'estomac se montrent souvent seules et n'existent point en

même temps dans l'intestin; la seconde différence consiste dans l'époque de l'enfance à laquelle ces deux états morbides se manifestent; ainsi la gastrite folliculeuse appartient aux enfants très-récemment nés, tandis que la turgescence des cryptes gastro-intestinales se manifeste plus tard, surtout à partir de l'époque de la première dentition. Cette seconde lésion appartient donc tout entière aux diacrisis.

Les faits observés par Billard, par M. Ollivier, d'Angers, et par nous-même, établissent positivement que la gastrite folliculeuse se développe le plus souvent avant la naissance, vers les derniers jours de la vie intra-utérine. On la trouve presque exclusivement chez des enfants qui succombent du premier au deuxième jour après la naissance, et ses caractères anatomiques sont tels qu'ils annoncent une acuité dans la maladie, plus grande que l'âge du malade. En effet, un plus ou moins grand nombre de follicules sont détruits par des ulcérations arrondies, quelquefois très-régulières et comme faites avec un emporte-pièce, du diamètre d'un à trois ou quatre millimètres; leur fond est ordinairement d'un beau jaune, et leurs bords un peu tuméfiés d'un rouge carmin, vif, qui tranche sur la couleur pâle de la muqueuse dans le voisinage. Ces solutions de continuité intéressent la tunique interne de l'estomac dans toute son épaisseur, mais ne dépassent point la couche cellulaire sous-muqueuse. Elles affectent exclusivement les follicules; car lorsqu'elles sont encore peu avancées, on retrouve dans leur fond ces follicules non encore détruits, et une pression modérée en fait surgir une gouttelette de mucus plus ou moins altérée. Enfin la coïncidence d'un grand nombre de follicules simplement tuméfiés, tantôt pâles, tantôt rouges, fournit un nouvel indice sur le siège précis des ulcérations. Assez souvent ces ulcérations, dans la plupart desquelles une inflammation vive est évidente, ont amené une exsudation sanguine qui s'annonce soit par des flocons épais d'une couleur bistre, soit par des stries de sang vermeil. Plus souvent encore l'estomac contient une certaine quantité de mucosités filantes. L'état de la muqueuse entre les ulcérations est

variable. Souvent elle est pâle et saine ; d'autres fois elle est rouge, enflammée. Tous les caractères que nous venons d'indiquer, les progrès des ulcérations et leur nombre prouvent qu'elles datent de plusieurs jours et ont débuté avant la naissance. Cela est surtout évident chez les enfants qui n'ont vécu que deux ou trois jours.

La cause de cette maladie est complètement inconnue, on ne pourrait à ce sujet émettre que des hypothèses.

Nos connaissances sont également fort obscures sur le diagnostic et le traitement de cette affection qui n'est pas encore sortie, pour ainsi dire, du domaine de l'anatomie pathologique. Plusieurs de ces enfants chez lesquels on la rencontre, présentent d'autres maladies graves, telles que la pneumonie, le muguet, des affections cérébrales; il en résulte que plusieurs symptômes généraux peuvent appartenir également à ces diverses affections. Quant aux symptômes locaux, ils sont les mêmes, en général, que dans toute autre espèce de gastrite. Billard admet que le vomissement des matières brunes ou sanguinolentes qui résultent d'une hémorrhagie capillaire fournie par les ulcérations, est un signe d'une assez grande valeur, mais il manque souvent. On arrivera plus facilement à la détermination du diagnostic lorsqu'en procédant par élimination, on constatera l'absence du muguet ou de toute autre maladie propre à rendre compte des accidents qu'on observe. La pronostic est d'autant plus grave que l'enfant est plus jeune, que l'affaiblissement et le dépérissement sont plus prononcés et que les vomissements sanguinolents sont plus abondants, car l'hémorrhagie peut par elle-même amener la mort.

La thérapeutique de la gastrite folliculeuse de Billard est toute à faire; on ne peut, comme on l'a dit, que la faire rentrer dans celle de la gastrite en général.

Des symptômes de l'inflammation gastro-intestinale considérée en général. — L'étude des symptômes locaux et généraux de l'inflammation gastro-intestinale présente chez l'enfant de nombreuses et sérieuses difficultés, car ce sont surtout que leur valeur diagnostique est très-variable et

souvent équivoque. La plupart d'entre eux appartiennent si fréquemment à des affections gastro-intestinales auxquelles l'inflammation est presque étrangère, que leur intensité, leur forme, leur durée sont la seule base sur laquelle on puisse fonder le diagnostic; et qui ne voit qu'alors les signes différentiels ne reposent plus que sur des nuances symptomatiques?

Si nous prenions pour exemple le vomissement et la diarrhée, il serait facile de démontrer que dans une sorte de cas dans lesquels ces symptômes se manifestent, leur présence ne suffit point pour faire admettre une phlogosie. Il en est de même du sélécrisme, de l'anorexie, de la soif, etc. D'un autre côté, la gastro-entérite s'accompagne plus facilement dans l'enfance que dans l'âge adulte, d'un ensemble de phénomènes généraux et surtout d'accidents du côté du système nerveux qui peuvent faire croire à l'existence d'une fièvre typhoïde ou d'une lésion méningeale.

Malgré ces difficultés nous nous efforcerons, dans un but tout pratique, de déterminer les signes à l'aide desquels le médecin pourra reconnaître qu'il existe une inflammation gastro-intestinale à un degré tel qu'elle exige une médication active, soit comme maladie idiopathique, soit comme élément d'une autre maladie, passé à l'état d'épiphénomène et de complication.

Le premier des symptômes locaux dont nous devons étudier la valeur diagnostique est la douleur. Jusqu'à une époque assez avancée de l'enfance, les réponses des petits malades ne fournissent presque aucun renseignements positifs sur son siège, sa nature et son intensité, et ce n'est que par les actes involontifs qu'elle fait naître que l'on peut soupçonner sa présence. C'est ainsi que si elle est très-vive et qu'elle se traduise sous la forme de coliques, on voit les très-jeunes enfants crier par moments, contracter fortement les muscles de l'abdomen et blâmer les enfants sur le ventre.

Pour être plus sûr encore de l'existence et de la nature de la douleur, il faut l'interroger par la pression de la main.

Chez des enfants indociles cet examen suffit pour faire pousser des cris, et l'on pourrait croire à l'existence de la douleur là où elle est absente. Il faut, pour éviter l'erreur, faire sur des parties du corps qui certainement ne sont point malades, des pressions analogues à celles qu'on faisait sur le ventre, et si l'enfant jette de nouveaux cris, on en conclura que c'est chez lui l'effet d'une irritabilité générale ou de l'indocilité. Il faut aussi que le médecin ait soin de n'appliquer sa main sur l'abdomen que lorsqu'elle a une température convenable. Il faut même tâcher de détourner l'attention du petit malade pendant cette exploration, glisser la main sur son ventre sans qu'il s'en aperçoive, et, pendant qu'on le distrait, on tâche d'apprécier aussi exactement que possible le degré de tension de l'abdomen, en même temps qu'on cherche à produire la douleur par une pression convenablement exercée; si cette douleur se produit, l'enfant ne manquera pas de la manifester soit par l'expression souffrante de sa physionomie, soit par ses cris et ses mouvements. Il est donc essentiel de palper l'abdomen dans un moment de calme. Lorsqu'on a procédé à cet examen, il importe moins que le malade soit calme ou agité pour apprécier les autres phénomènes morbides; car ceux-ci ne peuvent point être simulés par l'indocilité de l'enfant, et c'est en cela qu'ils sont très-importants, parce qu'ils servent à confirmer la réalité de la douleur ou à l'infirmer, suivant qu'ils existent ou n'existent pas. Ces phénomènes sont l'augmentation de chaleur et le météorisme. De ces deux symptômes, le premier surtout ne manque jamais; mais il est difficile à constater quand il existe un état fébrile, parce que, sur l'abdomen comme sur tout le corps, la peau est plus chaude qu'à l'état normal. Toutefois on peut reconnaître que dans cette région la chaleur est plus prononcée qu'ailleurs. Le météorisme se reconnaît aisément par la palpation et la percussion.

Les dérangements fonctionnels de l'estomac et de l'intestin naissent si facilement chez les enfants, même en l'absence d'une véritable phlogose, qu'on est souvent fort

embarrassé pour savoir à quel état morbide ils se rattachent. Leur existence seule ne suffirait jamais pour permettre d'affirmer celle d'une gastro-entérite; mais si à des vomissements et à une diarrhée d'une certaine intensité se joignent les symptômes que nous avons déjà indiqués et ceux que nous indiquerons tout-à-l'heure, ces troubles fonctionnels doivent être pris en grande considération. Quand l'inflammation est très-vive dans l'estomac, cet organe ne supporte pas même les bouillies et les rejette; s'il est seul enflammé, la diarrhée peut manquer; et, au contraire, c'est l'intestin, les vomissements manquant facilement. Quant à la nature des vomissements et des selles, elle est très-variables, et ne fournit aucunes données absolues. Cependant des selles vertes et analogues à de la chienne bichée, annoncent ordinairement une inflammation.

L'anorexie, la soif vive, la rougeur et la sécheresse de la langue nous paraissent indispensables pour affirmer l'existence d'une phlegmasie gastro-intestinale, non pas que ces symptômes l'annoncent dans tous les cas où ils existent; mais, en leur absence, nous serons toujours porté à mettre en doute l'existence d'une véritable gastrite et même d'une entérite.

Enfin l'inflammation gastro-intestinale, à moins qu'elle ne soit fort légère, ne va pas sans phénomènes généraux fébriles. La facilité avec laquelle se développe la fièvre chez les enfants, dans tous les cas où un état morbide est de nature à augmenter l'irritabilité générale, rend l'état fébrile ordinairement très-manifeste aussitôt qu'ils sont atteints de gastro-entérite. Dans la première enfance, Billard prétend que ces symptômes pyrexiques manquent; mais, outre que cet auteur paraît avoir confondu sous le nom de gastro-entérite un grand nombre d'états morbides qui en diffèrent, nous ne pouvons accorder à son assertion l'autorité que son nom semble devoir lui donner. M. Valleix a très-bien démontré que Billard a complètement méconnu la fièvre réactionnelle qui accompagne la pneumonie et le typhus, et il est infiniment probable qu'il a également méconnu celle qui se lie à l'inflammation gastro-intesti-

nale. Pour être de moins longue durée chez les très-jeunes enfants qui, dans toutes les maladies inflammatoires aiguës, tombent rapidement dans le collapsus, cette réaction n'en existe pas moins, et tout bonne esre en l'observation des maladies des nouveau-nés reconnaîtra qu'il n'y a pas sans ce rapport exception à ce qui se passe chez les enfants qui ne sont plus à la mamelle. Il faut convenir, pour être vrai, que l'appareil fébrile est plus souvent incomplet dans le cas qui nous occupe que dans beaucoup d'autres. Ainsi le pouls est généralement fréquent, développé; la peau est sèche et chaude; mais si l'inflammation est très-vive, le pouls devient petit, concentré, abdominal, et la peau se refroidit aux extrémités, pendant que sur l'abdomen elle est brillante.

Dans la gastro-entérite, l'abaissement du diaphragme étant douloureux et devenant par là incomplet, la respiration augmente de fréquence; il existe ainsi parfois de la toux, mais les résultats négatifs de la percussion et de l'auscultation font connaître que ces symptômes sont purement sympathiques.

Vers le système nerveux il se manifeste assez souvent des accidents propres à rendre le diagnostic difficile. Dans ces cas, la maladie peut être confondue avec la fièvre typhoïde ou même avec une maladie idiopathique des centres nerveux. Ces cas sont peut-être moins nombreux que ne l'ont avancé quelques auteurs. Constant en particulier (1). Ce médecin a rapporté quelques faits concluants sous ce rapport, mais ce sont des observations chéolies et qui précisément parce qu'elles figurent dans des revues cliniques comme exemples de cas curieux et extraordinaires, font exception à la généralité des faits. Cette question de diagnostic différentiel reparaitra en différents points de ce volume, notamment quand nous ferons l'histoire de la fièvre typhoïde et de la méningite.

Aucun des symptômes locaux et généraux que nous venons d'énumérer n'a une valeur absolue pour faire recon-

(1) *Gen. méd.* p. 295, année 1855.

naître la gastro-entérite. C'est leur caractère, leur intensité, leur siège plus ou moins précis, l'élimination des autres états morbides capables de simuler l'inflammation sous quelques rapports, qui guideront surtout le praticien dans la solution de ces difficultés, laquelle se repose, ainsi que nous l'avons dit, sur l'appréciation des nuances symptomatiques.

C'est encore parce que Billard a confondu des états pathologiques distincts qu'il a considéré le pronostic de la gastro-entérite, comme très-grave chez les enfants à la mamelle. A l'état simple, cette maladie, pendant toute la durée de l'enfance, est le plus souvent d'une intensité moyenne et facilement curable; mais en tant qu'elle s'allie à d'autres affections, c'est de celles-ci que la gravité du mal dépend principalement.

La médication qu'exige cette maladie dans l'enfance ne diffère point de celle qui convient à un âge plus avancé. Elle doit être antiphlogistique et plus ou moins active, suivant les cas. Il faut savoir se borner assez souvent à une médication expectante, c'est-à-dire à l'atténuation du régime, à l'usage des boissons et des lavements émollients, à l'application des topiques émollients sur l'abdomen. D'autres fois il faut nécessairement recourir à une diète absolue, à des émissions sanguines le plus souvent locales; employer, outre les émollients internes et externes, des antispasmodiques et même des narcotiques pour calmer les vomissements et la diarrhée. Dans quelques cas de gastro-entérite symptomatique, il est souvent indiqué, quoique l'inflammation ait une certaine intensité, de ne pas trop s'y arrêter, et de baser la première et la plus importante des indications thérapeutiques sur l'état morbide primordial dont la phlogose n'est pour ainsi dire que la conséquence.

CHAPITRE IV.

DIACRISIS OU LÉSION DE SÉCRÉTION DE LA BRANCHIE
GASTRO-INTESTINALE.

En prenant pour point de départ les notions que nous fournit la physiologie sur les divers produits de sécrétion qui servent à la digestion, il est aisé de prévoir que leurs altérations doivent produire plusieurs espèces de maladies. Non-seulement le mucus et le suc gastro-intestinal, la bile et le liquide pancréatique peuvent être modifiés dans leur quantité et dans leurs qualités, mais encore les pneumalases et les productions vermineuses peuvent être rationnellement attribuées à une modification morbide des sécrétions gastro-intestinales. Ces maladies qu'à l'exemple d'un auteur moderne nous nommerons *diacrisis*, diffèrent les unes des autres suivant que l'altération porte sur tel ou tel des fluides gastro-intestinaux, mais elles se ressemblent toutes par leur élément constant qui est une lésion de sécrétion. Celle-ci existe souvent associée à d'autres conditions morbides, à un certain degré de phlogose, par exemple; mais, comme dans ces cas complexes elle nous paraît fondamentale et primitive, c'est elle que nous devons considérer comme caractéristique des affections diacritiques que nous allons décrire.

Nous rangerons dans cette classe et nous décrirons successivement: 1^{re} la diacrise muqueuse ou folliculaire, 2^{re} la diacrise acrocente, 3^{re} la diacrise séreuse, 4^{re} la diacrise vésiculaire, 5^{re} la diacrise vermineuse. Les deux premières ont été rapportées par M. Gendrin, à qui nous empruntons cette classification, à un même genre, celui des diacrisis hypercritiques, c'est-à-dire dans lesquelles les produits morbides deviennent plus abondants et plus coagulables, ou au moins contiennent en plus grande proportion les éléments constitutifs auxquels ils doivent leur caractère spécial. Quant à la diacrise bilieuse, nous la renvoyons à l'histoire des maladies du foie.

ARTICLE I.

DIARRHÉE MYQUEUSE OU FOLLICULAIRE.

(*Syn. États sabarraux, diarrhée myqueuse, fièvre myqueuse, etc.*)

Cette maladie est fréquente dans l'enfance. Étudiée en général, elle diffère assez peu à cet âge et aux autres époques de la vie; mais dans l'étude de ses nombreuses formes ou variétés, on reconnaît bientôt qu'elle présente chez les enfants des particularités très-remarquables que nous allons tout de suite indiquer sommairement : 1^o à l'état simple et apyrétique elle a le plus souvent son siège limité à l'intestin ; 2^o qu'elle existe avec ou sans fièvre, elle présente presque toujours une forme essentiellement myqueuse, la forme bilieuse est infiniment plus rare que chez l'adulte; 3^o enfin, la maladie est plus fréquemment aggravée par des complications de différente nature, surtout lorsqu'elle existe sous la forme fébrile.

Les principales différences que nous venons d'assigner à la diarrhée myqueuse dans l'enfance font entrevoir dès à présent les points spéciaux de son histoire sur lesquels nous devons insister. Nous ne saurions en effet en donner une description complète sans sortir des limites d'un traité de pathologie spéciale ; nous ne présenterons donc ici que les développements relatifs à l'influence du jeune âge auxquels la pathologie générale ne descend point ordinairement.

Pour bien comprendre ces développements, il faut se faire une idée exacte de la nature de l'état pathologique qui constitue la diarrhée myqueuse. Cet état est complexe. La lésion élémentaire, essentielle et constante, est la diarrhée des cryptes mucipares gastro-intestinales, c'est-à-dire un dérangement de l'action de ces cryptes, d'où résulte la présence, dans la cavité digestive, d'un mucus trop abon-

dant et altéré, qui devient par là impropre à l'accomplissement de la digestion. La maladie affecte donc spécialement les organes mucipares; mais elle affecte aussi à un certain degré les glandes annexes de l'appareil gastro-intestinal, à cause de la synergie qui existe certainement entre tous les organes sécréteurs qui servent par leurs produits à l'accomplissement des fonctions digestives. La cause prochaine de la diacrise est l'organe pathologique des organes sécréteurs. Cet organe, analogue à celui qui préside à la sécrétion physiologique, se compose: 1° de l'activité circulaire des réseaux capillaires sanguins qui fournissent les matériaux de la sécrétion, 2° l'exaltation de l'action nerveuse indispensable à l'accomplissement de cette fonction. Ainsi la turgescence de l'appareil mucipare et glandulaire gastro-intestinal forme comme le fond de la maladie sur lequel vient s'enter, pour ainsi dire, un degré anormal d'activité circulaire et nerveuse dans les organes affectés. Ces conditions sont le point de départ des phénomènes immédiats des diacrisis muqueuses, c'est-à-dire du trouble des fonctions digestives, tandis que celui-ci est la source des phénomènes médiats et réactionnels. Comme, en définitive, le trouble des fonctions digestives constitue le phénomène dominant de la maladie, on pourrait lui donner le nom de *dyapepsie*, créé par Galien, adopté par M. Gendrin, et que nous emploierons aussi dans le cours de ce chapitre, quoique nous préférions celui de diacrise folliculaire qui a l'avantage de préciser le siège de l'affection.

Nous avons développé assez longuement ailleurs (t. I, de catarhe ou général) les circonstances qui prédisposent les enfants à la turgescence des cryptes mucipares de l'appareil digestif; alors nous avons examiné cette turgescence surtout dans ses rapports avec l'inflammation, et nous avons fait voir que dans les affections catarrhales elle constituait un élément au moins aussi important que la phlogose elle-même. Nous l'avons expliquée par l'activité de la digestion et du travail d'accroissement qui s'opère pendant tout le premier âge avec une grande énergie dans les organes digestifs, conditions nécessairement liées à

une plus grande activité de la circulation capillaire et à une irritabilité plus considérable de la muqueuse digestive. Il n'y a donc entre ces conditions physiologiques et celles qui caractérisent la diarrhée folliculeuse qu'une nuance pour ainsi dire insensible, et c'est ainsi qu'on s'explique la prédisposition des jeunes sujets à cette maladie, aussi bien que la gravité de ses symptômes et la fréquence de ses complications dans le premier âge.

Caractères anatomiques.

On a chez les cadavres de fréquentes occasions d'examiner sur le cadavre les altérations que laisse à sa suite la dyspepsie muqueuse. Cette maladie est quelquefois mortelle par elle-même ; mais plus souvent encore elle coexiste avec d'autres affections graves qui font succomber les malades. Dans d'autres cas très-nombreux, la dyspepsie et les lésions des organes qui en dépendent, sont une conséquence peu importante soit de la plupart des maladies aiguës qui sévissent sur les enfants, soit du traitement employé ; au point de vue pathologique, elles sont alors presque insignifiantes, parce qu'il eût suffi de la guérison de la maladie principale et de la suspension du traitement pour les faire disparaître. Mais les faits de ce genre conservent un grand intérêt pour l'anatomie pathologique, parce qu'ils multiplient pour nous les occasions d'observer les altérations qui caractérisent après la mort la dyspepsie muqueuse.

La lésion des cryptes mucipares est le plus important de ces caractères anatomiques, parce qu'elle doit être regardée comme constante, quoique variable par le degré auquel elle existe et par son siège.

Les follicules gastro-intestinaux sont peu apparents à l'état normal, et c'est peut-être à tort qu'on avance le contraire dans les traités classiques d'anatomie. Nous n'avons presque jamais rencontré leur développement sur le cadavre sans avoir pu établir que pendant la vie il avait existé des causes spontanées (l'état pathologique) ou artificielles (la médication employée) propres à le produire. Cet état

est donc pathologique et dû à la tuméfaction des cryptes muqueux, soit isolés, soit agminés. Les premières se montrent alors sous la forme de grains lenticulaires faisant corps avec la membrane muqueuse, ordinairement plus ou moins saillants à sa surface, quelquefois ne dépassant point son niveau et paraissant situés au-dessous d'elle; leur couleur est d'un blanc mat ou rosé, quelquefois jaunâtre; elles ont un à deux millimètres de diamètre; leur orifice excréteur est souvent très-apparent et forme un point grisâtre ou noirâtre dans leur milieu; dans beaucoup de cas où cet orifice n'est point visible à l'inspection ordinaire, on parvient à le découvrir en pratiquant une pression convenable qui, faisant sourdre une gouttelette de mucus, se laisse plus aucun doute sur le siège de la maladie dans le follicule. Les cryptes de la seconde espèce, c'est-à-dire les plaques dites de Peyer, présentent des altérations semblables; elles sont tuméfiées, prédominantes au-dessus du niveau de la muqueuse; leur coloration est pâle ou rosée; mais il n'est pas toujours facile d'y reconnaître à l'œil ses bords orifices excréteurs; leur forme allongée, ovalaire, quelquefois ronde, plus ou moins circonscrite, aussi bien que leur siège presque exclusif dans l'iléon, surtout près de sa terminaison au cæcum, sont des circonstances bien connues, sur lesquelles il est inutile d'insister.

Tel est l'aspect le plus ordinaire que présente l'appareil crypteux gastro-intestinal. Mais, chez les enfants, les cryptes se présentent souvent dans un état différent, surtout dans le gros intestin. Cet état consiste dans l'élargissement de l'orifice par lequel le follicule verse le mucus dans l'intestin et qui peut acquérir plus d'un millimètre de diamètre. Cet orifice ainsi dilaté, qu'on pourrait au premier abord prendre pour une ulcération, conduit dans une petite cavité qui n'est autre chose que le sac folliculaire lui-même, dont la situation au dessous de la muqueuse, dans le tissu cellulaire sous-jacent, est très-manifeste. Le contour de l'orifice excréteur est formé par la muqueuse amincie, et dans le fond du follicule on aperçoit pres-

que toujours une goutte de mucus tantôt transparent, tantôt opaque. Ce mode d'altération appartient à peu près exclusivement à la diarrhée chronique. On voit qu'il ne consiste plus dans une simple tuméfaction des glandes mucipares comme la première lésion que nous avons décrite, mais dans une dilatation de la cavité du follicule résultant de l'activité anormale de sa sécrétion.

Evidemment ces altérations ne sont point de nature inflammatoire et ne peuvent faire donner à la maladie le nom de gastro-entérite ou de colite, comme l'ont fait la plupart des auteurs dans ces derniers temps et en particulier Villard qui les a attribuées à la gastrite ou à l'entérite folliculeuse. Il faut pourtant reconnaître que cet auteur a bien apprécié les circonstances qui les distinguent de l'inflammation franche, comme on en jugera par les lignes suivantes : « Les altérations que subissent les follicules mucipares des intestins ne sont pas toutes de nature inflammatoire évidente. Ils éprouvent, par exemple, à l'époque de la dentition, un accroît d'énergie vitale, qui, tout en augmentant considérablement leur sécrétion, rend leur volume plus saillant et leur nombre plus considérable, mais qui cependant ne cause pas leur rougeur, leur tuméfaction ou même leur ulcération, ainsi que cela s'observe dans l'inflammation franche. » Et ailleurs : « Je ne considère pas comme inflammation franche ce développement morbide des follicules mucipares ; néanmoins cet état d'excitabilité qui cause leur augmentation de sécrétion est pour ainsi dire un degré intermédiaire entre l'état normal et l'état inflammatoire (1). » Il est donc certain que Billard n'a point confondu ces deux états pathologiques, mais qu'il a eu réellement tort de leur donner le même nom et de les décrire ensemble à propos de la gastro-entérite.

Si l'inflammation est étrangère aux altérations que nous avons examinées jusqu'à présent, il est d'autres cas, peut-être plus nombreux chez les enfants que chez les adultes, quoiqu'ils nous paraissent encore en minorité, dans les-

(1) Pages 414 et 416.

quels on trouve sur le cadavre des traces non équivoques de phlogose dans la muqueuse. Le plus ordinairement elles se consistent que dans de simples rougeurs peu étendues, occupant soit quelques-uns des follicules eux-mêmes, soit la membrane muqueuse dans leurs intervalles. Quelquefois l'injection sanguine forme tout autour des organes multiples des stries rayonnantes d'un rouge vif et dont l'ensemble représente une espèce d'aurole inflammatoire périfolliculaire. Le follicule qui alors semble avoir agi pendant la vie comme un centre d'attraction sur le sang des réseaux capillaires voisins est lui-même souvent pâle et exempt de congestions sanguines. Ces rougeurs hyperémiques annoncent la tendance de l'état diacritique à se transformer en un état phlegmasique ou plutôt à s'en compliquer. Il y a alors un véritable catarrhe; les traces qu'il laisse à sa suite sur le cadavre se présentent sous deux formes principales. Ou bien l'inflammation occupe la membrane muqueuse d'une manière diffuse, y forme des marbrures rouges, pointillées ou striées, avec une injection rouge vermeille ou violâtre des capillaires de cette membrane ou du tissu cellulaire adjacent; la muqueuse, sur ces parties, est tuméfiée et se détache facilement sous l'ongle en une pulpe rougeâtre. Ou bien les follicules sont détruits par une désorganisation ulcéreuse. Celle-ci ne se rencontre presque jamais dans l'estomac et les intestins grêles; les plaques de Peyer elles-mêmes en sont fort rarement le siège; en sorte que l'ulcération de ces plaques reste un phénomène à peu près exclusif à la dathymétrie. C'est dans le colon et dans le rectum que nous avons le plus souvent observé les ulcérations catarrhales, et pour mieux décrire la forme qui leur appartient, nous allons reproduire l'observation d'un cas de ce genre, que nous rédigeâmes avec les pièces anatomiques sous les yeux.

20^e Obs. — Il serait trop long de rapporter ici toutes les circonstances remarquables de ce fait. Nous dirons seulement qu'il est relatif à un enfant de trois ans qui eut une rougeole compliquée de pneumonie et d'une diarrhée qui, dans les derniers jours de la vie, eut une grande intensité.

On trouva à l'autopsie les altérations suivantes dans le tube intestinal. Ce canal offrait dans presque toute son étendue une coloration pâle, une consistance et une épaisseur normales. Toutefois l'intestin grêle présentait, sous la forme d'arborescences très-fines, quelques rougeurs disséminées et éloignées les unes des autres. Dans le colon et dans le cæcum, les follicules étaient développés et très-apparens, sans autre altération. Mais à partir de l'S iliaque jusqu'à un sphincter anal, l'appareil mucipare était gravement affecté. Quelques follicules seulement tuméfiés avaient à leur sommet un orifice bien distinct. Quelques-uns avaient cet orifice très-dilaté et formé par des bords très-minces. D'autres plus avancés étaient ulcérés. Au milieu de nombreuses ulcérations, larges de deux millimètres environ, qui paraissaient avoir détruit toute la muqueuse, on voyait au point un peu saillant, transparent, qui n'était autre chose qu'une gouttière de mucus qui, à la pression, sortait de l'épaisseur du tissu sous-muqueux. Celui-ci, par conséquent, semblait renfermer encore le follicule détruit seulement dans cette portion de sa longueur qui forme un canal à travers la muqueuse et qu'on appelle le goullet. Enfin, beaucoup d'autres follicules étaient si profondément désorganisés, qu'il n'en restait aucunes traces. A leur place existaient des ulcérations dont les plus petites étaient régulièrement arrondies et à bords rouges et épais. Les plus étendues étaient ou arrondies comme les précédentes ou irrégulières, et semblaient, dans ce dernier cas, formées par la jonction de plusieurs ulcérations voisines. Leur fond reposait sur la tunique musculeuse, et la muqueuse leur formait des bords épais, arrondis et rouges. Elles n'avaient aucune ressemblance avec les ulcérations tuberculeuses, car, outre les caractères qui viennent d'être indiqués, on ne trouva point de tubercules dans l'épaisseur des intestins, ni dans le péritoine, ni dans les ganglions mésentériques.

Tous les autres organes de l'abdomen étaient à l'état sain.

Quant aux lésions qui existaient dans le thorax, nous les passons ici sous silence.

La leçon anatomique dont cette observation nous four-

un exemple se rattache évidemment à l'affection diarrhéique des follicules, puisqu'elle existait à tous les degrés, depuis le simple développement de ces organes jusqu'à ce point où l'inflammation s'en empare et les détruit par ulcération. Dans ce cas, le point de départ de l'affection était une diarrhée morbillieuse; il en est souvent ainsi, et nous nous expliquerons plus tard sur le rôle que joue dans la rougeole la diarrhée avec inflammation, c'est-à-dire le catarrhe de l'intestin.

Comme lésions directement dépendantes de la diarrhée folliculeuse gastro-intestinale, mais qui n'ont pas une valeur absolue parce qu'elles peuvent exister dans certaines circonstances de l'état normal, nous devons encore noter l'abondance de la couche de mucois étalée sur la membrane dans les points surtout où les follicules sont très-développés, sa viscosité, son épaisseur, qui peut aller jusqu'à simuler un enduit pseudo-membraneux. Quelquefois l'aspect de ce mucois est tel, qu'on croirait qu'il a été coagulé par un acide; il forme des flocons analogues à ceux qui résultent de l'action d'une forte solution d'alun sur le mucois linéal dans certaines stomatites où il est sécrété en grande quantité.

C'est dans le gros intestin qu'on a le plus d'occasions de constater cet état particulier du mucois. L'observation suivante en est un exemple des plus tranchés.

21^e Obs. — Sur un enfant de trois ans, mort à l'hôpital, nous trouvâmes l'estomac intact; dans les intestins grêles la muqueuse était saine, sauf quelques rougeurs de peu d'importance, mais son appareil folliculaire était affecté; beaucoup de follicules isolés étaient tuméfiés, les plaques de Peyer étaient très-saillantes, gonflées, la plupart pâles, quelques-unes colorées en rouge, toutes sans solution de continuité; l'iléon contenait une dizaine de vers lombrics. Le gros intestin était tapissé de petites plaques grisâtres qui dans le rectum formaient une couche presque continue, mais se séparaient les unes des autres à mesure qu'on remontait vers le cæcum. Au premier abord on aurait dit qu'il s'agissait de granulations de la muqueuse, mais en

réalité c'était une espèce de fausse membrane constituée par du mucus coagulé, sous la forme de petits lambeaux assez adhérents à la muqueuse pour qu'un filet d'eau les détachât difficilement; au-dessus de ces lambeaux on trouvait en très-grand nombre soit de petites ulcérations folliculeuses, soit des follicules à orifices considérablement dilatés, soit enfin des follicules simplement tuméfiés. Dans leurs intervalles, la muqueuse était d'un rouge pâle, épaissie et ramollie. Le tissu cellulaire sous-muqueux était hypertrophié, d'une épaisseur égale à un demi-millimètre environ, et d'un aspect comme fibro-cartilagineux.

Dans ce cas la diarrhée durait depuis près de trois mois; la rougeole en avait été le point de départ et une pneumonie était venue la compliquer pendant le séjour du malade à l'hôpital; les derniers jours avant la mort la diarrhée avait redoublé d'intensité, les selles contenaient en abondance des flocons de mucus concret que les infirmières nous avaient signalés sous le nom de *réclaves de boyaux*.

Outre l'altération spéciale du mucus et les lésions à différents degrés des follicules muqueux, cette observation nous montre encore l'inflammation survenue comme complication de la maladie principale et siégeant soit dans les cryptes, soit dans le tissu propre de la muqueuse. L'hypertrophie de la tunique fibro-celluleuse était en rapport avec l'ancienneté de la maladie.

La présence des vers-lombrics dans la cavité digestive est, chez les enfants, un phénomène très-commun dans les diarrées folliculeuses.

Le ramollissement de la muqueuse gastro-intestinale est plus fréquent que dans aucune autre maladie. Il se rattache à la diarrée que comme phénomène secondaire et probablement consécutif à l'action chimique exercée par les liquides qui séjournent à la surface de l'intestin. Au moindre degré il se reconnaît à la facilité d'endoser avec l'ongle la muqueuse comme on palpe d'un blanc ou d'un jaune grisâtre; au plus haut degré cette membrane est convertie en une couche gélatiniforme si molle, qu'elle ne semble plus être que du mucus étendu sur les tuniques

sous pientes qui peuvent être ramollies et même perforées.

Ces diverses formes de ramollissement nous ont presque toujours paru cadavériques.

Il est fort important de constater ici que les ganglions lymphatiques du mésentère sont toujours sains quand la diacrise folliculeuse a existé sans complication; différence essentielle avec la dothinérité.

Quand la maladie a duré longtemps, l'atrophie du tube intestinal est souvent très-marquée; l'amincissement des tuniques est quelquefois extrême.

Les lésions du foie et de la rate sont nulles ou peu remarquables.

Quant au siège de la maladie dans les différentes parties du tube digestif, on remarque parfois qu'elle occupe non seulement l'estomac et l'intestin, mais aussi la muqueuse sub-diaphragmatique; dans la plupart de ces cas la maladie est grave en raison de son étendue, devient fébrile et prend le nom de fièvre muqueuse. Mais plus souvent encore, chez les enfants, elle se borne à l'intestin, correspond assez bien alors à ce que les auteurs décrivent sous le nom d'embarras intestinal, et comprend ces diarrhées muqueuses, aiguës ou chroniques, que l'on rencontre si souvent dans l'enfance, surtout jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans. Ce n'est pas simplement par l'étendue considérable des lésions folliculeuses que les fièvres muqueuses se distinguent des diacrisis apyrétiques, mais encore par la fréquence, dans les premières, des altérations de nature inflammatoire, qui expliquent en grande partie l'intensité des symptômes locaux et celle des réactions.

REMARQUES.

La diacrise folliculeuse s'observe surtout à partir de l'époque à laquelle commence le travail de la dentition; plus tôt elle est moins fréquente. Cette influence de la dentition a été depuis longtemps admise, mais incomplètement appréciée par les auteurs. Billard a fait remarquer avec raison qu'il y a là peut-être même un rapport de cause à effet

qu'une simple coïncidence. « On dirait que la nature a frôé pour la même époque le développement de toutes les parties de l'appareil digestif, car c'est aussi alors que les glandes salivaires acquièrent un volume plus considérable, et sécrètent la salive en plus grande abondance. Cette coïncidence dans le développement normal des dents, et dans l'accroissement de volume et d'action des follicules, doit expliquer le rapport qui existe entre la dentition et la fréquence de ces déviements sérieux qui surviennent à cette époque chez les enfants; ainsi donc, on peut aisément expliquer cette espèce de sympathie, signalée par les auteurs entre l'apparition des premières dents et les accidents qui arrivent du côté du tube digestif, sans avoir recours à ces sortes d'hypothèses dont on use trop souvent dans la recherche des phénomènes de la vie. Il y a ici coïncidence, ou, si l'on veut, sympathie fonctionnelle et morbide, parce qu'il y a coïncidence de développement (1). »

Cette opinion, quoique très-fondée n'explique pas tout, car il faut faire la part des causes occasionnelles que nous verrons bientôt être assez grande, mais elle rend compte de la susceptibilité du tube digestif à en subir l'impression. D'ailleurs, si, en l'absence de toute cause occasionnelle, la dentition devient laborieuse chez un certain nombre d'enfants, pourquoi le développement des cryptes gastro-intestinales ne pourrait-il pas spontanément s'accompagner d'une hypersecretion inépuisable ou d'un autre état morbide de l'estomac et de l'intestin? L'influence de l'époque de la dentition sur la fréquence de la diarrhée ne saurait donc être mise en doute. Tout récemment M. le professeur Trouessart, dans son excellent mémoire, a porté la démonstration de ce fait jusqu'à l'évidence (2).

Outre le développement qui s'accomplit dans l'appareil digestif d'une manière si active jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans, les autres circonstances qui prédisposent l'enfant à la diacrise folliculaire, sont le tempérament lym-

(1) Page 415.

(2) *Ann. des mal. méd. etc.*, novembre 1881.

phatique exagéré et une constitution faible. Toutes les conditions qui contribuent à déterminer cet état général de l'organisme sont donc des causes éloignées de la maladie. Elles peuvent même suffire pour la produire chez des enfants bien constitués les-qu'elles agissent avec énergie. Les principales sont les habitations et les saisons humides, le dérangement des fonctions de la peau, les maladies antérieures, et, avant tout, une alimentation mal entendue qui se présente si constamment dans l'étiologie de presque toutes les maladies de l'enfance qui siègent dans les voies digestives. Ettmüller avait déjà noté les suites fâcheuses d'une lactation trop substantielle; mais aujourd'hui que nos connaissances en physiologie sont plus avancées sur les nombreuses circonstances qui peuvent troubler les actes de la digestion, nous ne devons pas restreindre l'influence de l'allaitement aux cas dans lesquels le lait est donné en trop grande quantité ou est trop chargé de principes alibiles. Souvent la prédominance du sérum ou rend la digestion plus difficile que celle des matériaux nutritifs, et il est telles modifications du lait peu appréciables par les analyses chimiques, qui nous paraissent de nature à amener la surexcitation des follicules muqueux. En définitive, on peut dire que toute espèce de lait mal appropriée aux dispositions individuelles peut engendrer les diarrées.

La dentition étant très-active au moment où l'on prépare l'enfant au sevrage par une alimentation artificielle de plus en plus copieuse, cette transition n'est pas toujours bien ménagée, et l'on ne tient pas assez compte de l'état encore imparfait du tube digestif qui ne lui permet d'élaborer complètement que certaines substances, assez riches en matériaux alibiles, mais peu stimulantes, et toujours ramenées à l'état liquide. De tous les aliments que l'on donne habituellement aux enfants du premier âge, les substances féculentes, souvent mal cuites, ou assaisonnées avec une trop grande quantité de sucre, sont ceux dont l'usage est le plus nuisible. Combien de parents ont la faiblesse de flatter le goût de leurs jeunes enfants au moyen d'aliments d'une

savours agréables, mais dont les qualités stimulantes ou échauffantes, comme on le dit, sont incontestables, ou bien de procurer la satiété la plus complète lorsqu'il ne faudrait que satisfaire l'appétit !

Chez les enfants qui ne sont plus à la mamelle, les écarts de régime sont aussi extrêmement fréquents, et, quand on s'informe avec soin de la manière dont l'alimentation des jeunes sujets est dirigée, on la trouve si souvent vicieuse qu'on s'étonne de n'en pas voir résulter plus de maladies. Beaucoup d'indigestions ne sont autre chose que des diarrées passagères ; mais quand elles se répètent, elles entraînent à la fin une persistance de l'état pathologique ; de là ces diarrées continuelles ou sans cesse renaissantes, la plupart du temps épyrétiques, mais qui dans d'autres cas s'accompagnent d'accidents généraux et constituent des fièvres muqueuses. Le régime n'est pas seulement pernicieux par la quantité, mais aussi par les qualités des substances ingérées. Ainsi, les viandes glèbes, les légumes avariés, ou d'une élaboration difficile et en réalité peu nutritifs, comme sont les aliments farineux des pauvres, et chez quelques sujets les morilles, les soufs de bruchets, les champignons même non vénéreux, etc., sont des causes non moins réelles de diarrée gastro-intestinale et peut-être encore plus nuisantes chez les enfants que chez les adultes.

Les commotions morales et les passions dont l'influence considérée en général a fixé l'attention de Baillou, Stahl, Stoll, Sprengel, Schaidtmann, etc., exercent rarement leur action chez les enfants. Tous les auteurs ont ainsi remarqué qu'elles ont pour effet ordinaire de donner une forme bilieuse aux affections dyspeptiques fébriles ou non ; or, chez les enfants, la rareté de ces causes rend bien compte de celle de la forme bilieuse. Les excès de travail intellectuel et la masturbation agissent plus communément dans la seconde moitié de l'enfance, et tendent toujours à imprimer à la maladie la forme muqueuse avec ou sans fièvre.

Nous devons signaler aussi les refroidissements produits par des bains de rivière ou l'ingestion de boissons froides,

dans les chaleurs de l'été, surtout lorsque le corps est en sueur, auxquels sont souvent exposés les enfants déjà d'un certain âge.

Nous n'insisterons pas sur l'influence des saisons et des climats; on sait comment elle détermine la forme endémique et épidémique des fièvres muqueuses. Mais ici rien de spécial ne se remarque pour les enfants qui subissent la même loi que les adultes. Dans plusieurs épidémies, en particulier dans celle de Lanneme, en 1755, décrite par Tissot, la maladie affecta de préférence les femmes, les enfants et les vieillards. Dans celle de Göttingue, la maladie qui avait une forme essentiellement muqueuse, fut très-funeuse pour les enfants. Il est inutile de citer un plus grand nombre de faits de ce genre.

On sait qu'à tous les âges les maladies aiguës, particulièrement celles qui sont fébriles, déterminent facilement les diarrées muqueuses. Chez les enfants, ce sont les fièvres éruptives qui jouent le plus souvent ce rôle. Dans ces affections, la suspension des sécrétions gastro-intestinales, effet de la fièvre, existe au début, mais elle est ensuite remplacée par des flux qui ont lieu surtout par l'intestin et que les anciens considéraient comme de véritables crises.

Outre les maladies aiguës, la chlorose et la cachexie scorbutique se compliquent souvent de diarrée gastro-lactéeuse, de même que cette diarrée, surtout quand elle est chronique, peut contribuer puissamment au développement ou à l'aggravation de ces maladies cachectiques.

Symptômes.

Les symptômes des diarrées folliculeuses gastro-intestinales se montrent à des degrés si divers et sous des formes si nombreuses qu'il est impossible de les rassembler dans un seul tableau. Il faut en faire plusieurs groupes susceptibles eux-mêmes de fournir des subdivisions nombreuses. Nous décrirons donc successivement, 1^o les diarrées folli-

cutanées ou fréquemment apyrétiques; 2° les fièvres intermittentes; 3° les épiphénomènes et les complications.

1° *Symptômes des diarrées aqueuses apyrétiques.* — Ces symptômes sont différents suivant que la diarrée folliculeuse ecrupe spécialement l'estomac ou l'intestin ou affecte ces organes en même temps; cette division correspond à celle admise par les auteurs entre l'embarras gastrique, l'embarras intestinal et l'embarras gastro-intestinal.

De ces trois formes déterminées par le siège spécial de la diarrée folliculeuse, la première nous a paru la moins fréquente chez les enfants. Nous n'avons presque jamais observé avant l'âge de huit à dix ans, l'embarras gastrique pur tel qu'il a été décrit par les auteurs; le plus souvent l'intestin donne des signes de souffrance, et il y a embarras gastro-intestinal; enfin, plus souvent encore il y a embarras intestinal simple, c'est-à-dire une diarrhée sanguinolente produite par la diarrée folliculeuse de l'iléon et des gros intestins.

L'intensité des symptômes de ces trois états est très-variables, et quelque soin qu'on apporte à en donner une description exacte, jamais celle-ci ne pourra s'adapter exactement à tous les cas fournis par la pratique. Cet inconvénient se fera d'autant plus sentir ici que nous devons nous borner à une description résumée. Toutefois nous espérons qu'il ne sera pas difficile pour le lecteur d'y faire rentrer toutes les individualités morbides séparées par de simples nuances.

Parmi les symptômes qui sont un résultat direct de la diarrée gastro-intestinale, il en est plusieurs qu'il est très-difficile de constater et d'apprécier chez les enfants très-jeunes, c'est-à-dire, avant l'âge de huit à dix ans. Tels sont : un sentiment de plénitude ou de douleur sourde à l'épigastre et sous les fausses côtes, augmentant après l'ingestion des aliments et même des boissons; des éructations douloureuses ou acides, des nausées, une saveur amère et fade à la bouche, une salive visqueuse, peu abondante. Les autres symptômes plus facilement appréciables sont : des vomissements aqueux ou mucoso-biliaires d'un jaune

verdâtre, l'anorexie et même l'aversion pour les aliments; la langue est large, molle, d'un aspect lanugineux et d'une couleur jaunâtre, blanche ou grisâtre, surtout prononcée à sa base: les papilles sont peu apparentes si ce n'est à sa pointe et sur ses bords où elles sont blafardes et comme détries; souvent la bouche est tapissée de mucosités abondantes qui adhèrent aux dents et aux gencives; l'haleine est fétide et quelquefois comme stercorale; l'épigastre est un peu sensible au toucher; le ventre médiocrement tendu et météorisé; les selles sont tantôt supprimées, tantôt plus fréquentes et formées de matières liquides.

Les symptômes indirects sont les suivants: céphalalgie continue, intense, à exacerbations irrégulières, sus-orbitaire, syncoptale ou temporale, tête pesante, vertiges, sommeil court, agité, troublé par des rêves pénibles; la respiration est anémique, quelquefois le malade a une véritable oppression; sentiment général de courbature surtout dans la région lombaire et dans les membres inférieurs; il y a même des douleurs contuses; les mouvements sont lents, pénibles; le malade est dans un état de faiblesse et de langueur; les yeux sont cernés et excavés, légère teinte ictérique blafarde à la face et aux sclérotiques; la peau est habituellement sèche; le pouls est sans fréquence, mais aussi sans développement, excepté les soirs, alors il devient souvent fébrile. Le matin il y a ordinairement des sueurs ou un état de moiteur qui soulage le malade.

Cette description s'applique spécialement à l'embarras gastrique. Lorsque l'on constate la plupart de ces phénomènes la fièvre s'y joint presque toujours, et il nous paraît certain que la fièvre gastrique survient, chez les enfants, dans beaucoup de cas où l'influence des causes pathogéniques se bornerait, chez les adultes, à produire un embarras gastrique apyrétique.

Dans l'embarras gastro-intestinal de nouveaux symptômes s'ajoutent aux précédents; ce sont des coliques, le météorisme et la tension de l'abdomen dans les régions inférieures qui sont douloureuses à la pression; des selles liquides, aéro-muqueuses, jaunâtres, brunsâtres, fétides.

Dans l'embarras intestinal, ces symptômes existent à un degré très-prononcé, tandis que ceux décrits plus haut se rapportant au trouble fonctionnel de l'estomac, s'effacent pour la plupart. La maladie consiste alors essentiellement dans une diarrhée séro-muqueuse, médiocrement abondante, qui retentit beaucoup moins sur les autres fonctions que l'état saburral de l'estomac, en sorte qu'il existe peu de symptômes généraux et rarement de la fièvre à moins de complications épiphénoméniques.

On sait que les auteurs ont reconnu dans les affections saburrales une forme bilieuse et une forme muqueuse. La première est rare chez les enfants; c'est celle que caractérisent l'amertume de la bouche, l'enduit jaunâtre de la langue, la teinte ictérique de la face, l'appétence des boissons acides, les vomissements bilieux, la tension et la douleur sourde dans les régions occupées par le foie. La forme muqueuse est au contraire très-commune chez les enfants. Ses caractères principaux sont : l'enduit blanc ou grisâtre de la langue, la saveur fade, pâteuse ou acide à la bouche; les nausées sont plus rares et les douleurs épigastriques moins vives que dans la forme bilieuse; rarement les vomissements sont colorés par la bile; ils fournissent ordinairement un liquide muqueux acide ou des aliments mal élaborés. Les selles sont le plus souvent liquides et foncées en grande partie de matières fécales, de viscosité et de mucus; la faiblesse générale est plus grande, le poids est faible et la peau très-sensible à l'action du froid.

La durée et la marche des maladies saburrales apyrétiques sont très-variables ainsi que leur intensité, depuis celles qui revêtent l'apparence des simples indigestions et n'ont qu'une durée éphémère jusqu'à celles qui compromettent d'une manière grave et prolongée les fonctions digestives. Quand elles sont intenses et un peu rapides dans leur invasion, elles deviennent presque constamment fébriles et se transforment alors en quelque-une des fièvres dont il sera bientôt question. Cependant quand la diacrise folliculaire n'occupe que l'intestin, surtout quand elle est bornée au gros intestin, ce qui n'est pas rare, elle suit le

peut souvent une marche apyrétique et chronique, et c'est véritablement sous cette forme qu'elle mérite d'attirer les enfants une attention spéciale. La diarrhée muqueuse ou séro-muqueuse qui en est le principal caractère, a de tout temps fixé l'attention des auteurs qui se sont livrés à l'étude des maladies des enfants. La plupart ont reconnu que cette diarrhée tient essentiellement à une lésion de sécrétion, bien distincte de la diarrhée inflammatoire; aussi l'ont-ils conservée parmi les flux muqueux. Au contraire, l'école physiologique, dans le but de faire rentrer tous les faits dans la théorie de l'inflammation, s'est singulièrement éloignée de la vérité en donnant le nom d'entérite à toutes les diarrhées, même à celles qui guérissent le mieux par les purgatifs, les irritants et les astringents. Combien de fois nous avons vu dans ces affections la crainte exagérée d'un état inflammatoire empêcher l'emploi des évacuans et des astringents, et faire réduire la thérapeutique à une médication émolliente qui n'arrêtait point la maladie, favorisait sa prolongation et même sa terminaison funeste. Dans ces diarrhées saburrales ou muqueuses, les symptômes gastriques sont souvent nuls, l'appétit est conservé, les vomissemens sont rares, le ventre est peu douloureux, l'enfant paraît à peine malade; cependant il a des selles plus nombreuses qu'en état de santé; elles reviennent peu de temps après le repas, se produisent souvent dans la nuit; elles contiennent toujours en quantité appréciable des mucosités mêlées à un liquide séreux; chez les enfants très-jeunes qui se salissent dans le lit on voit le mucus former des flocons glaireux à la surface du linge, tandis que la partie séreuse s'imbibe dans son épaisseur; ces matières sont tantôt pâles, tantôt jaunâtres et verdâtres, suivant la quantité de bile qui s'y trouve mêlée.

Les diarrhées fébriles ou apyrétiques ont généralement une terminaison heureuse quand elles sont combattues par un traitement rationnel. Elles deviennent fort rarement mortelles par elles-mêmes. Si l'on a souvent occasion d'entendre des sujets qui sont morts en étant affectés, c'est évidemment parce qu'il y a eu souvent des complications

ou parce que la maladie a fait place à une fièvre muqueuse.

5° *Symptômes des fièvres muqueuses.* — Les dyspepsies muqueuses qui s'accompagnent de fièvre constituent les fièvres gastriques, muqueuses, bilieuses des auteurs, assés de M. Gendrin. La dénomination de fièvres gastriques suppose à tort que les phénomènes locaux de ces fièvres existent presque exclusivement du côté de l'estomac, car bien souvent la souffrance de l'intestin est au moins égale à celle de l'organe de la chymification. Nous préférons le nom de fièvres muqueuses, tout en tenant compte de la prédominance qui peut se montrer tantôt dans les troubles fonctionnels de l'estomac, tantôt dans ceux de l'intestin. Les fièvres dites bilieuses peuvent aussi être considérées comme n'étant qu'une forme de la fièvre muqueuse due à la prédominance des accidents hépatiques. Cette forme bilieuse est rare dans nos climats, même chez les adultes, et ne s'observe presque jamais dans l'enfance, âge auquel le foie ne nous paraît point doué de cette activité fonctionnelle qui plus tard le prédispose davantage aux maladies. La fièvre muqueuse proprement dite est au contraire fréquente chez les enfants, et c'est elle que nous aurons spécialement en vue dans cette description.

Il y a fièvre muqueuse toutes les fois qu'aux symptômes de la *dyscrisie folliculaire* gastro-intestinale se joignent les phénomènes réactionnels de l'état fébrile. La maladie reste étiologique au fond, mais il s'y est ajouté un élément très-important, la fièvre, susceptible à son tour de donner à l'affection un assez grand nombre de formes, principalement à cause de la variabilité de son type.

Les variétés de la dyspepsie muqueuse par prédominance des phénomènes gastriques, intestinaux, bilieux ou muqueux proprement dits, font aussi de la fièvre muqueuse les fièvres gastriques, intestinales ou mésentériques, bilieuses ou muqueuses proprement dites des auteurs. Nous n'insisterons sur aucune de ces variétés, puisqu'il nous faudrait répéter tout ce que nous avons déjà dit des formes de la dyspepsie muqueuse auxquelles il ne

s'agitait maintenant que de rattacher la circonstance d'un *état fébrile*. C'est de celui-ci que nous devons spécialement nous occuper sans cesser de le considérer dans ses rapports avec l'état dyspeptique, mais en étudiant les modifications nouvelles et complexes qu'il imprime à cet état pathologique.

La fièvre muqueuse, en égard à l'état fébrile, se divise en fièvre muqueuse éphémère, rémittente et continue. Ces trois types se rencontrent dans l'enfance, mais le second seul offre une certaine fréquence. Dans tous, les symptômes dyspeptiques d'une intensité variable commencent la maladie, persistent pendant toute sa durée et quelquefois survivent à la fièvre. Les phénomènes fébriles constituent presque toujours comme une deuxième période, mais leur invasion suit, tantôt de très-près, tantôt de quelques jours ou même à quelques semaines de distance, le début de la dyspepsie. Dans le premier cas, la fièvre est intense, pour ainsi dire, d'emblée; dans le second, elle s'accroît graduellement jusqu'à ce qu'elle ait acquis une forme bien caractérisée. Quand elle est arrivée à ce point, elle est surtout remarquable par la chaleur vive de la peau; le pouls n'est pas ordinairement très-fréquent, mais il est large, mou, facilement dépressible, et quelquefois même difficile à percevoir. Les accidents fébriles, soit à leur invasion, soit pendant leur cours, s'accompagnent toujours d'une augmentation d'intensité des symptômes dyspeptiques directs et indirects.

Quoiqu'on observe quelquefois chez les enfants, comme nous l'avons dit, les formes éphémère et continue de la fièvre muqueuse, la forme rémittente est la seule sur laquelle les auteurs aient insisté comme maladie fréquente de l'enfance; c'est aussi la seule dont nous devons donner ici la description, sinon détaillée, au moins un peu complète. Avant de l'entreprendre, nous devons dire qu'il s'agit ici de la fièvre rémittente muqueuse proprement dite et non point de la fièvre rémittente bilieuse.

La fièvre muqueuse de Pinel ou pâtilieuse de beaucoup d'auteurs a été notée par Stoll comme fréquente chez les enfants, surtout chez ceux d'une mauvaise constitution et

sujets aux vers (Aphor. 376). C'est celle qui a été décrite par Ettmüller sous le nom de fièvre lymphatique. Underwood lui a consacré un chapitre qui prouve qu'il considérait la fièvre rémittente des enfants comme très-digne d'attention, mais il n'a donné aucuns des détails que le sujet comportait. J. Frank l'appelle fièvre gastro-pituitaire et mentionne l'enfance parmi les causes prédisposantes (chap. iv. § xiv). Bufeland qui la décrit sous le nom de fièvre gastrique, dit que de toutes les fièvres c'est celle qu'on rencontre le plus fréquemment chez les enfants (t. II, p. 273, trad. de E. Didier). Butler a donné en 1782 une excellente description de la fièvre rémittente des enfants qu'il avait observée très-souvent dans le Derbyshire (1); c'est l'ouvrage de cet auteur qui a servi de guide à M. Gendrin dans la description qu'il en a donnée et que nous allons reproduire.

Après quelques jours d'un malaise indéterminé qui se reconnaît surtout à l'air abattu et au caractère irrité de l'enfant, la fièvre débute par de la chaleur à la peau; une assez grande fréquence du pouls, une empreinte d'abattement prononcée sur la face, des nausées qui se reconnaissent surtout au tremblement des lèvres, aux mouvements de contraction comme spasmodiques des commissures de la bouche, se manifestent le plus ordinairement et se joignent quelquefois à des vomissements. Cependant la fièvre croît, et l'enfant semble d'autant plus abattu qu'elle est plus vive; il tombe dans une espèce d'assoupissement; il a souvent des mouvements comme spasmodiques; la fièvre persiste d'abord sans rémissions ou exacerbations évidentes. Les symptômes dyspeptiques consistent dans la présence d'une couche saburrale blanchâtre sur la langue, qui est molle et humide, sans chaleur anormale au toucher; l'odeur acide et même fétide de l'haleine, la présence d'un mucus visqueux dans la bouche; des nausées, des vomissements, le refus de l'enfant de téter ou de boire qui indique son dégoût pour tous les aliments; il survient des mouve-

(1) *Traité de la fièvre rémittente des enfants*, p. 46.

ments de régurgitation, quand on fait boire l'enfant de force. Le petit malade a des secousses rares de toux sèche non quinteuse, dont l'état des organes thoraciques ne rend point raison; le ventre est tendu et à demi-mélorisé à la région épigastrique, les intestins sont le siège de borborrygmes très-fréquents; l'enfant rend des salivosités fétides ou des selles muco-so-billieuses, verdâtres.

« Les accidents persistent ainsi ordinairement d'abord pendant deux jours sans rémission évidente; ils diminuent ensuite d'intensité; des évacuations alvines ordinairement verdâtres se produisent deux ou trois fois par jour, la fièvre diminue ensuite ou même s'abaisse, pour recommencer dès le soir ou la nuit suivante. L'enfant commence à recevoir les boissons qu'on lui présente et paraît même souvent les désirer pendant la rémission des accidents fébriles; mais le retour du paroxysme est souvent marqué par le retour des nausées et du dégoût pour les boissons et quelquefois des vomissements. Le plus ordinairement les symptômes saburraux et les phénomènes fébriles vont en diminuant dès le troisième ou le quatrième jour, et la maladie se termine habituellement du sixième au huitième. Les rémissions deviennent d'autant plus longues et plus complètes, que les évacuations saburrales par les vomissements ou les selles s'accomplissent plus facilement, qu'elles soient spontanées ou provoquées par l'art (1). »

Il n'est pas très-rare de voir la fièvre muqueuse rémittente débiter sous une forme continue dont la durée est plus longue que ne l'indique cette description; nous en rapporterons un exemple à propos des épiphénomènes nerveux. D'autres fois, au contraire, la forme continue succède à la forme rémittente.

Bien que le plus souvent la fièvre muqueuse soit une maladie aiguë dont la durée ne dépasse pas quelques jours ou trois ou quatre septénaires, il n'est point rare toutefois de voir la maladie revêtir une marche chronique. C'est surtout chez les enfants au biberon et même jusqu'au mi-

(1) Goudin, ouvrage cité, p. 525 et 526.

lieu de l'endurce, que s'observe la fièvre miquenne hectique qui est à la fois une maladie grave, insidieuse et très-commune à l'occasion du sevrage ou sous l'influence d'un mauvais régime alimentaire. Elle correspond à ce que beaucoup d'auteurs ont appelé atrophie des nourrissons. Celle-ci, en l'absence de fièvre, n'est ordinairement autre chose que la forme chronique de la diarrée folliculaire apyrétique qui, comme nous l'avons vu, est fréquente surtout à l'époque de la dentition, et siège spécialement dans l'intestin. Quand la fièvre s'y joint, il y a alors fièvre miquenne hectique. Cette maladie a fixé l'attention d'Armstrong, de Butler que nous avons déjà cité, d'Underwood, etc. Armstrong a étudié celle qui se lie à la dentition, il la regarde comme très-commune, dit qu'elle commence souvent sous le type continu, que par degrés elle devient rémittente, qu'ensuite elle devient fièvre lente et se termine par une héctisie mortelle. Underwood blâme avec raison Armstrong d'en avoir fait une fièvre particulière à l'époque de la dentition; il la rattache à la fièvre résultant de la saignée gastrique, aggravée par le défaut de soins. Il pense qu'elle provient de la mauvaise qualité du lait ou des aliments, influences également admises par Armstrong et Butler, et ne croit pas qu'il y ait rien d'extraordinaire dans sa nature (1). Il est évident que la fièvre hectique dont parle ici Underwood est la fièvre miquenne chronique ou hectique telle que nous l'entendons.

Les principaux symptômes de cette maladie chez les enfants à la mamelle sont d'abord les dérangements des fonctions digestives. Ainsi l'enfant perd l'appétit et refuse le sein après en avoir eu quelquefois une véritable boelémie pendant plusieurs jours; il a la langue blanchâtre; de temps à autre il vomit, et habituellement il a des selles diarrhéiques peu nombreuses mais abondantes, formées par un mucus bilieux, liquide, d'un jaune ou d'un blanc grisâtre, au milieu duquel on reconnaît des grumeaux de lait coagulé qui ont traversé le tube digestif sans être alté-

(1) *Traité d'Anker de Salle*, p. 315.

rés. Dans la plupart des cas elles suivent de près l'ingestion des aliments liquides, l'haleine a une odeur aigre; le ventre se météorise, mais reste mou et à peu près indolent; les urines sont peu abondantes; la peau est sèche, chaude sur le tronc, froide aux extrémités; la fréquence du pouls varie le plus souvent à certains instants du jour et sans régularité; dans d'autres cas la fièvre est continue; dans la nuit, vers le matin, il y a des sueurs partielles.

La maladie persiste ainsi pendant deux ou trois semaines avec des alternatives d'accroissement et de diminution; la diarrhée devient plus abondante et même écumeuse; des vomissements s'établissent après l'ingestion de presque tous les aliments et des boissons. L'état général s'aggrave en raison des accidents gastro-intestinaux et fébriles; en même temps que l'amaigrissement fait des progrès, une diathèse séreuse s'établit comme effet de l'appauvrissement du sang; l'anasarque survient. Enfin, l'enfant, réduit au marasme et à l'hectisie la plus complète, ne tarde pas à succomber.

Cette maladie que nous venons de décrire chez les enfants à la mamelle se rencontre encore assez souvent jusqu'à l'âge de huit ou dix ans. Outre les symptômes que nous venons d'énumérer, l'âge plus avancé des jeunes malades permet de constater, comme chez les adultes, les douleurs épigastriques, les coliques plus ou moins intenses qui précèdent d'ordinaire les selles diarrhéiques. Celles-ci sont en général moins liquides que chez les nouveau-nés, formées par une matière crémreuse, fétide, d'un gris-jaune et par des débris d'aliments non digérés. Elles renferment assez souvent des vers lombrics que les malades rejettent ainsi quelquefois par le vomissement.

C'est à la fièvre marécageuse hectique que se rapporte, au moins en grande partie, ce qu'a dit Hufeland d'une espèce particulière de fièvre qu'il appelle *scrophuleuse*. Clark et Todd l'ont appelée *fièvre rémittente des enfants* ou l'ont décrite comme une forme particulière de dyspepsie à laquelle ils attribuent une grande influence sur la production de la cachexie scrophuleuse et tuberculeuse. Nous avons

dit ailleurs (t. I) que cette influence nous paraissait avoir été exagérée, mais n'en est pas moins réelle. L'état cachectique dans lequel elle fait tomber les malades touche de près à la cachexie strumense. Celle-ci ne manque point de survenir chez les enfants prédisposés, et, chez beaucoup d'autres, l'écœtisme mqueuse, quand elle n'amène point la mort, laisse au moins à sa suite une prédominance du système lymphatique et un état général de débilité qui impellent une forme spéciale à beaucoup d'affections.

2° *Épiphénomènes et complications.* — Ils sont aussi nombreux et variés qu'importants, et c'est de leur présence que résulte le plus souvent la gravité de certaines diarrées mqueuses. Ils se montrent surtout lorsque ces maladies deviennent fébriles, mais aussi assez souvent dans les simples dyspepsies apyrétiques. Les uns se rapportent aux phénomènes directement dépendants de la diacrise, c'est-à-dire aux symptômes locaux; les autres aux phénomènes indirects, c'est-à-dire aux symptômes réactionnels et sympathiques.

Un des phénomènes les plus fréquents chez les enfants dans les diverses formes de la maladie, ce sont les vomissements trop intenses. Quand ils sont très-répétés, ils doivent attirer l'attention du praticien. Il faut se garder d'y voir toujours l'effet d'une inflammation gastrique, car chez les enfants le vomissement se produit facilement et souvent en l'absence d'une véritable phlogose. L'irritabilité de l'estomac est chez eux assez vive pour produire facilement des troubles fonctionnels considérables, sans être exagérée à un haut degré et tout en restant à celui qui accompagne nécessairement la turgescence diacritique des follicules de la muqueuse supérieure du tube gastro-intestinal. Cependant il faut surveiller attentivement l'état du malade et se tenir en garde contre l'inflammation aussitôt que la rougeur et la sécheresse de la langue, l'intensité de la soif et de la douleur épigastrique se joindront aux vomissements et dévoileront la présence réelle de cette complication.

Une inflammation plus ou moins intense peut aussi se

développer dans les intestins inférieurs, remplacer la simple turgescence sanguine des follicules et de la muqueuse, et constituer par son intensité un épiphénomène fort important de la diarrée. Quand il en est ainsi, les douleurs abdominales plus vives et continues, le météorisme et la tension du ventre, la chaleur de cette région, l'intensité de la saif, la rougeur et la sécheresse de la langue et surtout l'augmentation des selles ne permettent plus au praticien de rester inactif; alors l'inflammation n'est plus pour ainsi dire un simple élément accessoire de la maladie, elle devient prédominante, il faut la combattre.

La prédominance de l'inflammation dans les diarrées constitue un des dangers immédiats de ces *acuties*, surtout lorsqu'elles existent sous la forme fébrile, et devient la source la plus ordinaire de leur transformation en ces fièvres ardentes que les auteurs ont appelées *comas*. Toutefois cela n'arrive point d'une manière spéciale aux enfants. Plus souvent, chez eux, l'inflammation reste une complication locale qui, survenant dans les cas de diarrée affectant principalement les intestins inférieurs, détermine alors des symptômes dysentériques toujours graves. D'ailleurs, s'ils ne sont immédiatement l'objet d'une médication particulière appropriée à leur nature.

On trouve encore à mentionner, parmi les épiphénomènes liés aux symptômes directs de la maladie, les stomatites et les angines érythémateuses et aphthueuses, les parotides, l'intensité des coliques et celle de la douleur épigastrique qui se change en cardialgie et ne dépend point d'une complication inflammatoire, et enfin la présence des vers. Ce dernier accident se présente surtout dans les cas où la maladie offre une longue durée et une marche chronique; il fixera de nouveau notre attention dans un article spécial.

Les épiphénomènes et les complications qui se rattachent aux symptômes de réaction et aux autres dérangements fonctionnels résultant des diarrées, sont très-communs chez les enfants. Chez eux, comme chez les adultes, l'état ataxique et adynamique peut se produire jusqu'à

un haut degré et donner à la maladie une physionomie nouvelle, c'est-à-dire celle des fièvres ataxiques et adynamiques. C'est alors que le diagnostic offre de grandes difficultés pour distinguer cette forme de la fièvre muqueuse des fièvres typhoïdes auxquelles il ne reste plus guères, comme phénomènes caractéristiques, que l'éruption rosée fœticulaire et peut-être le catarrhe bronchique, et qui d'ailleurs sont plus fréquentes chez les enfants qu'on ne l'avait généralement pensé jusqu'à ces dernières années.

Très-souvent les jeunes sujets sont en proie à cette toux dite gastrique dont l'état de la poitrine ne rend point compte. C'est cette toux dont Rosen parle si longuement et qu'il attribue, comme beaucoup d'autres auteurs, aux crudités acides qui se développent dans l'estomac sous l'influence d'un mauvais régime. La description qu'il donne de la maladie montre de la manière la plus évidente que ce n'est autre chose qu'un état saburral des premières voies. Mais Rosen qui n'avait pas encore à sa disposition nos moyens de diagnostic dans les maladies de poitrine, s'est trompé en disant que la toux la plus fréquente dans le premier âge est celle dont la cause réside dans l'estomac (1).

On observe aussi quelquefois de véritables phlegmasies laryngées, bronchiques, pulmonaires, sur lesquelles l'état gastro-intestinal a certainement une influence directe, puisque le traitement qui alors guérit le mieux les malades, est celui qui s'adresse à cet état, comme l'a si bien établi Stoll et comme l'ont admis depuis tous les bons praticiens. Nous n'insisterons sur aucune de ces complications parce que nous ne pourrions rien dire qui fût spécial à l'enfance et parce que ces accidents sont plus fréquents dans un âge plus avancé.

Nous ne ferons que mentionner ici les éruptions herpétiques des lèvres, miliaires ou furéculémeuses, les sueurs abondantes, etc. Tous ces épiphénomènes, comme on le voit, sont quelquefois critiques, mais souvent ils ne modifient pas sensiblement la marche de la maladie principale.

(1) *Ulp. 1000.*

Un accident plus fréquent chez les enfants, surtout dans les dyspepsies et les fièvres muqueuses chroniques, ou dans la convalescence de ces maladies à l'état aigu, est l'anasarque. L'œdème se déclare d'abord aux paupières et aux extrémités des membres, puis gagne tout le corps; le plus souvent il ne paraît que lorsque l'enfant est déjà dans le marasme et au plus haut degré de la fièvre muqueuse, mais quelquefois il s'annonce plus tôt ou bien dans des cas peu intenses. Cet accident atteint surtout ceux qui sont très-jeunes et ils en meurent très-souvent. M. Gendrin considère cet œdème chez les nouveau-nés comme une des formes de l'endurcissement du tissu cellulaire auquel ils sont si souvent exposés. Il faut rapprocher de l'anasarque les collections liquides qui se forment dans les mêmes circonstances dans les cavités sereuses du péritoine, des plèvres, du péricarde et de l'arachnoïde, qui surviennent en général à une période avancée de la maladie, qu'on ne constate souvent qu'à l'ouverture du cadavre parce qu'elles sont ordinairement peu considérables. Cependant l'épanchement qui se fait dans l'arachnoïde n'est probablement pas étranger aux accidents encéphaliques dont nous allons parler.

Ce sont surtout les *épiphénomènes cérébraux* qui chez les enfants constituent un des accidents les plus remarquables par leur fréquence et leur gravité. Ils revêtent plusieurs formes; tantôt le délire, tantôt les symptômes comateux où des mouvements convulsifs prédominent; plus souvent encore ils se combinent et se succèdent dans un ordre tel que leur ensemble simule plus ou moins la méningite. Toutefois nous pensons, d'après l'ensemble de nos recherches, qu'ils reconnaissent rarement pour cause prochaine une inflammation intracranienne; que dans d'autres circonstances, surtout lorsqu'une fièvre muqueuse lente et chronique a amené l'affaiblissement général, la diathèse sereuse, l'anasarque, ils peuvent se lier à un épanchement séreux des ventricules ou de la grande cavité de l'arachnoïde, et constituer alors une véritable hydrocéphale, maladie dans laquelle l'inflammation n'a que la

moindre part à la production des phénomènes. Le seul cas où l'irritation hydrocéphalique ou phlegmasique nous paraît être assez commune, est celui où il existe une dentition laborieuse capable de déterminer une véritable congestion sanguine active vers toute la tête, et cette coïncidence d'une dentition laborieuse avec les diacrisis gastro-intestinales n'est point rare, comme on le sait. Mais les cas sont encore plus nombreux dans lesquels les accidents encéphaliques sont de nature purement nerveuse, ne peuvent être attribués à aucune inflammation ni à aucune hydroisie active, et ne laissent à leur suite aucunes traces dans les centres nerveux quand on les examine après la mort.

Quoi qu'il en soit de la nature de ces accidents, ce sont eux qui dans beaucoup de cas rapportés par les auteurs, ont fait donner à la maladie le nom de *fièvre cérébrale* : ce sont eux que dans ces derniers temps on a presque toujours considérés comme appartenant à une inflammation hydrocéphalique, opinion souvent erronée, mais qui explique cette autre opinion si généralement répandue depuis la doctrine physiologique, à savoir : que l'inflammation mésentéro-encéphalique dépend très-souvent de celle de l'estomac. Dans la plupart des cas sur lesquels cette opinion a été basée, il n'y avait ni inflammation de l'estomac ni inflammation de l'encéphale ou des méninges. Telle est du moins la manière de voir que nous ont suggérée l'étude attentive des faits pendant la vie et les recherches nécroscopiques.

On sait en effet que les affections intestinales avec ou sans fièvre s'accompagnent presque constamment de céphalalgie, de vertiges, d'affaiblissement de l'intelligence, d'insomnie, d'agitation, etc. Ces phénomènes prennent facilement chez les enfants une intensité plus grande; le délire et des phénomènes convulsifs s'y ajoutent souvent. Ceux-ci peuvent se lier à des hoquets, à des grincements de dents, à des soubresauts de tendons, ou strabisme; mais quelquefois ce sont de véritables convulsions. Dans la plupart des cas il est difficile et cependant très-important de

reconnaître la dépendance plus ou moins absolue de ces accidents par rapport à l'état gastro-intestinal, car les conséquences de l'opinion qu'on se forme sur ce point sont d'une importance majeure pour le traitement. Celui-ci pourra être en effet presque inutile s'il est essentiellement dirigé contre un état cérébral supposé inflammatoire et idiopathique, alors que cet état est étranger à une inflammation franche et qu'il est symptomatique. Le traitement sera également funeste si, cette inflammation existant réellement, on attribue à une simple sympathie les résultats de son développement et qu'on se borne à combattre l'état gastro-intestinal qui en a été moins la cause que l'occasion. Les anciens à cet égard s'écartaient beaucoup moins que nous de la vérité en donnant à des cas de ce genre le nom de fièvres cérébrales, parce qu'ils ne perdaient jamais de vue l'état général de l'économie au milieu duquel survenaient les accidents cérébraux, tandis que pour nous, quand le mot de méningite ou d'hydrocéphalite est prononcé, nous ne voyons plus que l'inflammation à combattre dans les méninges et le cerveau. Il n'est pas douteux que ces deux manières de voir ne soient fausses quand elles sont exclusives; mais il est bien certain que la première s'applique à un plus grand nombre de faits que la seconde.

Il est une circonstance fort importante à signaler dans les cas dont nous parlons, et que l'observation suivante, intéressante d'ailleurs à plus d'un titre, va montrer dans tout son jour.

21^e cas. — *Fièvre cérébrale résultante, à paroxysmes gastriques.* — Louise de St-P., âgée de sept mois et demi, d'une constitution délicate, a le teint pâle, la tête assez forte et bien conformée, les cheveux d'un blond châtain; son tempérament un peu lymphatique est éminemment nerveux; elle partage cette dernière disposition avec un frère qui a eu lors de sa première dentition des mouvements nerveux assez multipliés, et qui, postérieurement à la maladie, sujet de cette observation, a éprouvé une affection cérébrale très-aiguë, avec convulsions très-fortes,

congestion sanguine des téguments du crâne, et fièvre; son frère aîné a succombé en 1821 à une hydrocéphale aiguë.

« Au mois d'avril 1815, cette enfant dont la dentition n'était pas encore commencée, et qui jusqu'alors avait joui d'une bonne santé, fut prise de dérangement dans les fonctions digestives : son appétit diminua, la langue était légèrement blanchâtre, sans rougeur sur ses bords; les selles furent fréquentes, les matières évacuées d'un vert jaunâtre; la chaleur de la peau et la fréquence du pouls peu augmentées; il y avait des alternatives de somnolence et de morosité dans la journée; la nuit était moins calme qu'à l'ordinaire (diminution des aliments, boue d'orge gommée, quelques centigrammes de magnésie, pédiluvres).

« Le 14 avril, après cinq jours, pendant lesquels la petite malade avait paru mieux par instants, les déjections ayant eu lieu sans coliques et d'une manière plus régulière, avec un changement favorable dans leur couleur, j'observai (sous l'influence d'une température orageuse) une augmentation marquée de la fièvre et de la somnolence; le pouls battait cent vingt à cent trente fois par minute; la respiration était fréquente, gênée et avec une élévation plus marquée des côtes pendant l'inspiration; le ventre était en même temps un peu tendu, principalement vers l'épigastre; quelques mouvements convulsifs du globe de l'œil se faisaient remarquer (diète, un demi-lacch blanc, pédiluve sinapisé).

« Dans l'après-midi du même jour, après une consultation avec M. Lavélan, trois saignées sont pratiquées à la partie inférieure du sternum : le sang coula abondamment par les pigères, et le malade éprouva une défaillance assez forte pour inquiéter sa famille; l'effusion du sang est arrêtée, mais les pulsations de l'artère radiale restent longtemps faibles; le froid des extrémités et l'assoupissement continuent (cataplasmes sinapisés aux pieds, pommade de Goudret aux jambes et à la nuque). Vers le soir, retour de la chaleur générale; le pouls reprend de la force; nuit agitée, fièvre intense; le malade paraît éprouver de la

douleur sur les points qui ont été le siège des applications de pommade.

« 15 avril, à sept heures du matin. La fièvre a diminué; le pouls conserve sa fréquence, l'assoupissement est toujours le même; on observe des mouvements convulsifs du globe de l'œil et des lèvres; les paupières sont à demi fermées, le front est chaud, les joues peu colorées, le ventre tendu, les urines ont coulé; il n'y a eu qu'une selle verdâtre et peu abondante depuis hier (continuation des sinapismes aux pieds, lotions d'eau froide acidulée sur le front, deux sangsues au cou).

« Une seule sangsue tire du sang, et quoique l'écoulement soit peu abondant, il suffit pour amener une nouvelle défaillance dans la matinée. (Application de pommade de Gendret derrière les oreilles et au côté gauche de la poitrine.) Le pouls reste très-faible et les extrémités froides jusqu'à deux heures; dans la soirée la fièvre augmente; la somnolence et les mouvements convulsifs de la face sont à peu près les mêmes; la pupille se dilate sensiblement, le ventre se météorise de plus en plus, la nuit est plus tranquille que la précédente. La pommade ammoniacale a produit sur tous les points un effet vésicant très-intense, les pieds commencent à rougir.

« 16 avril, à six heures du matin. La fièvre a baissé, le pouls très-faible donne cent quatorze pulsations par minute, l'assoupissement est moins profond, la délirance est très-grande, le ventre est très-météorisé, la respiration fort gênée; il n'y a pas eu de selle, l'urine a coulé, la langue est sans rougeur; on commence à sentir un froid léger au nez et aux mains, avec pâleur de la face.

« En comparant cet état avec la rémission de la veille, nous jugâmes, M. Laroche et moi, que la maladie avait un caractère rémittent et pernicieux, et que, d'après les progrès qu'elle avait faits, il n'était pas douteux qu'elle n'eût bientôt une terminaison funeste, si l'on ne parvenait à prévenir de nouveaux accès; en conséquence de ce diagnostic, auquel avait pu seule nous conduire une observation de tous les moments et dont on sentira toute la

difficulté chez un malade d'un âge si tendre, nous nous hâtons de prescrire sept centigrammes de sulfate de quinine dans quinze grammes de miel, à donner dans la matinée avant le retour de la chaleur; des frictions de teinture alcoolique de quinquina seront faites d'heure en heure sur le ventre, les sinapismes réappliqués aux pieds.

« Le froid des extrémités se dissipe vers dix heures; le sulfate de quinine a bien passé, la chaleur qui remplace le froid est modérée; l'assoupissement, les mouvements convulsifs du globe oculaire augmentent d'intensité vers midi; le pouls est faible et très-fréquent (cent vingt à cent trente pulsations par minute); le météorisme ne fait pas de progrès; un lavement entraîne quelques matières stercorales d'un vert foncé; le front n'est chaud que dans le milieu du jour; vers le soir, trouvant le paroxysme apaisé, nous donnons une nouvelle dose de sulfate de quinine associée à dix centigrammes de mercure doux; de manière à ce que la petite malade prenne le tiers de la dose le soir, et le reste le lendemain de bonne heure.

« 17 avril au matin. Nuit assez calme, le pouls est moins fréquent que la veille (cent pulsations), chaleur douce et générale; les paupières sont entr'ouvertes et le globe de l'œil tranquille; l'assoupissement a cessé, le météorisme existe encore, une dernière portion du mélange prescrit hier a été rejetée par le vomissement, la langue est blanche à sa base, les vésicatoires sont en pleine suppuration et d'une bonne couleur; (continuation du sulfate de quinine et du calomel, à la même dose, pendant la rémission, ainsi que des frictions avec la teinture de quinquina; eau de poulet, les mêmes boissons sont prescrites).

« Un froid très-léger du nez et des mains se montre à huit heures et demie du matin; il dure peu de temps; la malade n'a d'assoupissement que vers midi; les autres symptômes nerveux diminuent d'intensité. Plusieurs selles liquides, d'un jaune foncé, ont lieu; le météorisme est réduit de moitié, et dans l'après-midi la petite malade réveillée est calme, et prend avec avidité son bouillon de poulet et ses boissons.

« La nuit fut encore meilleure que la dernière, et ainsi m'étendre plus longtemps sur une maladie dont la terminaison est prévue, je dirai que la persistance dans le traitement employé amena au bout de trois jours la cessation des accès qui avaient diminué graduellement, et conduisit la malade à une convalescence qu'aucun accident n'a entravée, et qui a été suivie de l'éruption de plusieurs dents incisives.

« On voit dans cette observation une maladie essentiellement grave, presque continue à son début, au ave des rémissions si courtes qu'il a fallu une étude de plusieurs jours pour les reconnaître; l'irritation des membranes du cerveau avec tendance à l'hydrocéphale aiguë, maladie si commune à l'époque de la dentition, me paraît évidente, et sous ce rapport le traitement employé au début était nécessaire; mais indépendamment du danger des émissions sanguines répétées à l'âge de la malade, il est certain qu'elles n'auraient pas sauvé ses jours. Je regarde donc comme un bonheur pour elle que les rémissions soient devenues assez marquées et assez longues pour permettre d'employer le quinquina avec quelque espoir de succès; il me paraît prouvé que dans ce cas particulier, ce remède a été très-utile (1). »

Ce cas a été appelé fièvre cérébrale par l'auteur qui le rapporte. Pour nous c'est un exemple de fièvre continue, d'abord continue, puis rémittente, dans laquelle les épiphénomènes cérébraux ont acquis une grande violence et font admettre une inflammation hydrocéphalique. Nous pensons que c'est peut-être à tort qu'on a porté ce diagnostic; car, en étudiant les effets du traitement, on voit (et c'est peut-être le point le plus intéressant de cette observation) les émissions sanguines posées jusqu'à produire plusieurs fois la syncope, n'empêcher ni la persistance ni même l'aggravation de tous les accidents cérébraux, jusqu'au moment où la rémission étant plus prononcée, la

(1) Cette observation a été publiée par M. Lemastrier, dans les *Arch. gén. de méd.*; année 1855, t. II, première série.

médication antipériodique a été employée. Elle a suffi pour ôter immédiatement à l'affection son caractère ataxique et persévérant et pour faciliter le déclin de la fièvre magueuse, qui a été aussi favorisée par l'emploi des purgatifs. Il y avait donc ici un élément pathologique plus essentiel et primordial par rapport aux épiphénomènes cérébraux.

Dans ces fièvres magueuses dites cérébrales, le type rémittent qui existait dans l'observation précédente est propre à jeter un grand jour sur la nature de l'affection. Son existence doit en effet nous détourner de considérer trop souvent les accidents cérébraux comme dus à une inflammation isopathique. Il faut s'attacher avec le plus grand soin à constater cette forme rémittente qu'il est souvent difficile de bien reconnaître chez les très-jeunes enfants, et à déterminer si cette fièvre cérébrale rémittente ne se lie pas à des symptômes de diérèse gastro-intestinale; car alors neuf fois sur dix ceux-ci sont le point de départ de la fièvre et réclament un traitement approprié, en même temps que la fièvre rémittente exige la médication antipériodique, parce que les symptômes encéphaliques qui accompagnent les paroxysmes peuvent déterminer la mort si l'on n'en prévient le retour.

Raumer a donné une description intéressante de la fièvre rémittente qu'il observa à Lunel en 1781, et qui affecta un grand nombre d'enfants. Cette fièvre qui était selon toute apparence une fièvre magueuse, fut fort grave, car elle fit périr le tiers des sujets qui en furent atteints. Elle revêtit souvent la forme des fièvres ardentes, et plus souvent encore les épiphénomènes cérébraux, surtout les convulsions, s'associèrent soit à cette forme, soit aux autres formes de la fièvre magueuse. Le type rémittent était en général très-prononcé (1).

(1) Voir le chapitre intitulé *Fièvres pueriles*, du *Traité des maladies de l'enfance*, de cet auteur. On ne peut pas s'empêcher sans réserve que la maladie décrite par Raumer ait été une variété de la fièvre magueuse; car on pourrait sans nous faire illusion, admettre qu'on fut sous fièvre typhoïde.

Tout ce qui précède suffit pour montrer comment les accidents cérébraux les plus graves peuvent dépendre d'un mauvais état des voies digestives, et fait pressentir ainsi les immenses avantages qu'il y a pour la pratique à bien diagnostiquer cette connexion. C'est ce qui n'a point échappé à un grand praticien dont nous aimons souvent à citer le nom : « Dans les affections qui, chez les enfants, paraissent avoir leur siège dans le cerveau ou la poitrine, je ne puis trop recommander au médecin de porter son attention sur les voies gastriques comme source de la maladie. J'ai vu des enfants rester pendant quelques jours dans un état soporeux, auxquels on avait administré vainement tous les antiphlogistiques, guérir tout-à-coup à la suite d'un vomitif : on conçoit que dans ce cas la réplétion de l'estomac était l'unique cause de l'affection cérébrale (1). »

Nous avons assez insisté sur les principales particularités de l'histoire des diarrées méquemes gastro-intestinales pour ne pas discuter le diagnostic et le pronostic de ces maladies. L'une et l'autre sont susceptibles de varier suivant un si grand nombre de circonstances qu'elles ne sauraient être indiquées d'une manière générale, et qu'il faut laisser au praticien le soin de les formuler dans tous les cas, suivant leur nature.

Traitement.

Nous ferons ici les mêmes divisions qui nous ont servi dans la description des symptômes et des formes nombreuses de la diarrée méqueme gastro-intestinale.

1° *Traitement des diarrées méquemes opyréiques.* — Tous les moyens de traitement qui contiennent dans ces maladies peuvent être rapportés à deux médications principales, savoir : la médication expectante et la médication évacuante. Les antiphlogistiques, les toniques et les antispasmodiques peuvent être utiles et même nécessaires,

(1) Bichat, *Manuel de méd. prat.*, t. II, p. 374.

mais ils sont en général d'un usage accessoire et secondaire.

La médication expectante convient et peut suffire dans les cas les plus légers. On doit même reconnaître que chez les enfants elle est peut-être d'un emploi plus général que chez les adultes, parce qu'il ne faut ici, comme dans beaucoup d'autres circonstances, agir avec énergie que lorsque les indications sont positives et pressantes. Cette médication se composant d'un certain nombre de moyens peu actifs, c'est par leur ensemble et leur combinaison qu'elle peut devenir efficace aussi bien que par leur administration exacte et minutieuse. La réalisation de ces conditions dépend en premier lieu de l'art du médecin et ensuite de la docilité du malade et de l'intelligence de ceux qui l'entourent.

La médication expectante comprend d'abord la soustraction ou l'atténuation des causes qui ont déterminé la dyspepsie muqueuse et qui peuvent l'entretenir. Ici on doit porter son attention sur tous les points qui ont trait à l'étiologie de la maladie et surtout, parmi les causes hygiéniques, sur l'alimentation qui, comme nous l'avons démontré, joue certainement le plus grand rôle chez les enfants à la mamelle, aussi bien que chez ceux d'un à quinze ans. Dans quelques cas un changement de nourrice, un régime mieux dirigé, suffiront, au grand étonnement des parents et du médecin lui-même, pour ramener la santé chez des enfants atteints depuis longtemps de dyspepsie muqueuse qui résistaient à d'autres médications plus actives. Nous avons aussi noté l'influence de l'humidité dont il faudra autant que possible préserver les petits malades. Quant aux causes morales, elles sont peu fréquentes; cependant il faut leur attribuer ce que quelques auteurs ont dit de la jalousie et de la triestesie chez les enfants; ces sentiments exagérés arrêtent quelquefois le dépérissement par suite de troubles digestifs qui se rapportent à la dyspepsie muqueuse. Le médecin et les parents devront donc s'appliquer à en supprimer la cause. La dyspepsie muqueuse résulte aussi de certaines maladies, entre autres

de la dentition, des fièvres éruptives, etc. On ne peut contraindre l'enfant au travail de la dentition; mais toutes les fois que cet acte de développement devient pathologique, il faut modérer et combattre ses effets par un traitement approprié à la nature des cas, comme nous l'avons exposé ailleurs. Quant aux fièvres éruptives, leur traitement bien entendu prévient ou arrête toujours la diarrhée folliculaire qu'elles produisent surtout dans le gros intestin sous la forme de diarrhée.

La seconde indication que doit remplir la médication expectante est la prescription d'un régime convenable. Il peut suffire quelquefois, comme nous l'avons dit, de remplacer un mauvais régime par un régime ordinaire conforme aux lois de l'hygiène applicables à l'état de santé. Mais le plus souvent il faut un régime particulier, très-variable d'ailleurs, suivant les cas, depuis la diète absolue jusqu'au mode d'alimentation qui constitue un régime tonique et fortifiant. Il nous est impossible de descendre ici dans tous les détails que comporterait ce sujet; mais il sera facile de faire à l'enfance l'application de la pratique généralement suivie aux autres âges dans les dyspepsies moqueuses apyrétiqes. La diète absolue convient très-rarement dans les cas qui n'exigent que la médication expectante; on permet au moins quelques bouillons légers, et aux enfants au biberon le lait maternel ou le lait de vache en quantité modérée et coupé avec une tisane délayante. Le plus souvent la maladie n'exige que des aliments moins abondants et bien choisis. C'est ainsi que généralement les substances grasses, huileuses, les féculs et même le laitage pour les sujets qui n'appartiennent plus à la première enfance, sont peu convenables. Si l'anorexie est très-prononcée, il faut se borner à donner des bouillons préparés par décoction de viandes de jeunes animaux ou par infusion de viandes d'animaux adultes, comme le bouillon de poule ou de bœuf maigre; on les aromatise et on les acidule avec des légumes frais. Si la maladie est peu intense ou en voie de diminution, on permet les légumes frais cuits, les fruits cuits, les viandes blanches, grillées

et rôties. Dans les dyspepsies à tendance vers l'état chronique, il ne faut pas proscrire les viandes noires grillées et rôties de bœuf et de mouton. Souvent elles sont préférables à des aliments peu sapides et féculents.

Quant aux boissons, l'eau pure, l'eau vineuse et l'hydrogène peuvent suffire; mais le plus souvent il faut les remplacer par des tisanes. Celles-ci doivent être délayantes ou acidulées. Les tisanes essentiellement émollientes et mucilagineuses ne conviennent point. L'eau de gomme est la plus nuisible qu'utile. Les eaux alcalines gazeuses de Seltz, de Saint-Alban, etc., sont souvent avantageuses.

Il faut aussi quelquefois modifier la température des aliments et des boissons et les donner frais ou même à la glace. Toutefois cette modification, ainsi que l'usage des tisanes acidulées, trouvent moins souvent leur application chez les enfants que chez les adultes. En effet ces moyens réussissent surtout dans l'embarras gastrique bilieux. Or, nous savons que cette forme de dyspepsie est rare chez les enfants, et qu'à l'état apyrétique la diérèse fébrileuse est le plus souvent chez eux limitée aux intestins et se traduit sous la forme de diarrhée. Cette considération est de nature à exiger un régime en général moins tenu, et l'usage plus fréquent des boissons gommeuses et astringentes, telles que la décoction de riz, de pépins de coing, etc.

Le médecin doit recommander les vêtements propres à favoriser la diaphorèse qui est toujours utile dans les maladies acutales, et à prévenir les refroidissements que les malades éprouvent facilement, même au milieu d'une température moyenne. C'est alors que l'usage de la flanelle est fort utile.

Les bains sont en général inutiles et même nuisibles. Cependant à l'état chronique nous ne pensons pas que la maladie les contre-indique, pourvu toutefois qu'ils soient rendus toniques et excitants par des substances aromatiques, par le sulfure de potasse ou le chlorure de sodium. Dans ces cas on se trouve bien du vin chaud en bains ou en fomentations chez les très-jeunes enfants.

La médication évacuante trouve son emploi dans les dyspepsies saburrales toutes les fois que leur intensité ou leur durée déjà ancienne ne permet pas de compter sur la médication expectante pour en obtenir la cure complète. A plus forte raison devient-elle nécessaire quand la maladie est en progrès et qu'on voit s'accroître tous les accidents qui dépendent soit de l'influence topique des saburres et des troubles qui en résultent dans l'élaboration digestive, soit de la tarpeuse diacritique des follicules mucipares. Bien appliquée, on peut dire que cette médication est héroïque; mais son administration est plus difficile qu'on ne pense et suppose surtout la connaissance des contre-indications qui doivent la faire rejeter ou différer.

Les contre-indications les plus fréquentes dans l'enfance viennent de ce qu'à cet âge le tube digestif est plus irritable, plus riche en vaisseaux sanguins et dès-lors plus susceptible de s'enflammer par l'action des éméto-cathartiques; il faut donc y recourir avec réserve et s'en tenir pendant longtemps à l'expectation. Si, après les avoir employés, on est obligé d'y revenir, il faut toujours le faire à de plus grands intervalles. En un mot, les évacuants des premières voies ne conviennent, surtout chez les enfants, que lorsque les signes de phlogose gastro-intestinale sont nuls, ou qu'ils ont diminué ou disparu par une médication délayante ou antiphlogistique.

En l'absence de cette contre-indication, les évacuants peuvent être prescrits avec hardiesse, et si l'on observe de près leurs effets, afin de les modérer dès qu'ils sont un peu violents, on n'a que fort rarement lieu de regretter de s'en être servi. Mais ici se présente la question de savoir à quel genre d'évacuants il faut donner la préférence.

Les vomitifs et les purgatifs trouvent leur emploi spécial dans une foule de circonstances; administrés dans celles qui leur conviennent respectivement, ils sont d'une efficacité souvent admirable.

Nous savons que les embarras gastriques revêtent presque constamment chez les enfants la forme muqueuse, et

que la forme bilieuse est au contraire très-rare. Il en résulte que l'action des évacuans ne doit pas être aussi énergique, aussi profonde qu'il le faut en général dans les embarras bilieux des adultes. En outre, chez les enfants, les vomissemens se produisent si facilement que c'est une nouvelle raison de préférer les vomitifs doux. Enfin nous avons vu que la muqueuse digestive est plus irritable; par conséquent les vomitifs ne doivent être ni trop actifs, ni répétés trop souvent.

Le vomitif qu'il faut mettre en première ligne est l'ipécacuanha en poudre; chez les enfans très-jeunes on le donne en sirop en y ajoutant une petite quantité d'émétique, parce que sans cette précaution l'effet vomitif pourrait manquer. Les pastilles d'ipécacuanha prises en assez grand nombre réussissent chez beaucoup de jeunes sujets. L'amertume de la poudre est quelquefois un obstacle insurmontable à son administration; quoiqu'on l'associe à des conserves sucrées, à du miel ou à un sirop quelconque agréable au goût, il peut arriver que l'enfant refuse de l'avaler. Il faut alors recourir à une potion ordinaire contenant cinq centigrammes de terre stibiée. L'insipidité de ce sel permet de donner à l'enfant une cuillerée à café de quart d'heure en quart d'heure jusqu'à ce que des vomissemens assez abondans aient eu lieu. Pour les faciliter, on fait boire de l'eau ou une tisane délayante en grande quantité; mais ici encore l'indocilité des malades rend souvent difficile la bonne administration du vomitif. Chez les enfans délicats ou très-jeunes, Hufeland conseille de faire prendre du thé de camomille en abondance et une cuillerée à café d'oxymel scillitique; suivant lui ces moyens provoquent ordinairement des vomissemens assez copieux, mais il n'est pas toujours aisé de faire avaler l'infusion de camomille à cause de son amertume. L'indication du vomitif ayant été remplie, il faut pendant un ou deux jours s'en tenir à la médication expectante, observer attentivement les effets du vomitif, et n'y revenir une seconde ou une troisième fois qu'autant qu'il n'a point causé d'inflammation et qu'il est de nouveau évidemment indiqué.

Lorsque la dyspepsie muqueuse présente la forme de l'embarras gastro-intestinal, il est encore utile de recourir en premier lieu au vomitif une ou deux fois. Mais on ne tarde pas de lui faire succéder quelques purgatifs parmi lesquels le séné, la rhubarbe, la casse, le tamarin, les sels neutres, la crème de tartre, etc., méritent la préférence.

Hufeland insiste avec raison sur la nécessité d'employer quelquefois un traitement préparatoire avant d'en venir aux vomitifs. Suivant lui, dans les dyspepsies muqueuses très-prononcées, l'exsudat muqueux étendu sur la membrane digestive étant très-abondant et très-adhérent, doit être dissous avant qu'il soit possible d'agir sur les membranes de l'estomac et de l'intestin, et, afin de réveiller la sensibilité, tous les moyens doivent être fortement stimulants. Avant d'employer les évacuans qui alors resteraient souvent sans effet, Hufeland veut donc qu'on ait d'abord recours à des remèdes très-dissolvans, irritants, incisifs, tels que le sel ammoniac, le sulfate de potasse, le nitre, le savon, le soufre doré d'antimoine, le kermès minéral, la racine de boucage, d'arum, de *séneca*, de scille, la gomme ammoniacque, l'assa fetida. Après cette élaboration préalable on donne un vomitif (le tartre stibié) et un purgatif (sels associés aux feuilles de séné, à la racine de jalap, à l'aloès).

La médication évacuante est d'une application moins générale dans les diarrées muqueuses qui laissent l'estomac et les intestins supérieurs à peu près intacts et siègent presque uniquement dans les gros intestins, c'est-à-dire dans les diarrées muqueuses proprement dites des enfans. Pour peu cependant qu'il y ait lieu de croire à un état sahnral de l'estomac, il faudra employer l'ipécacuanha. Le vomitif rendant à la digestion gastrique toute son énergie, les résidus qui arrivent dans le gros intestin n'ont plus aucune action irritante sur cet organe, la sécrétion anormale de ses follicules n'a plus lieu, son irritabilité contractile n'est plus surexcitée, les matières peuvent y séjourner, se dépouiller par l'absorption de leurs parties liquides, et c'est ainsi que la diarrhée disparaît. Si la

digestion gastrique paraît facile et complète, les purgatifs qui modifient spécialement l'état de la muqueuse intestinale pourront réussir et arrêter la diarrhée, mais il faut être prudent dans leur emploi. Agissant sur une plus grande étendue et pendant plus longtemps que les émétiques dont la plus grande partie est rejetée par le vomissement, les purgatifs peuvent plus souvent, dans le cas qui nous occupe, dépasser les limites de leur action, déterminer des superpurgations, et une inflammation véritable de la muqueuse intestinale. Il faut par conséquent ne les mettre en usage en général que chez les sujets débiles, d'une constitution malle et dans les conditions les plus opposées à un état de phlogose des premières voies. Il faut de plus choisir des purgatifs doux et surtout ceux qui, ayant une propriété tonique, sont les moins capables de transformer une diarrhée muqueuse en une diarrhée séreuse et colligative. C'est sous ce rapport que les sirops de rhubarbe, de fleurs de pêcher, de chicorée, etc., sont les médicaments les plus convenables chez les petits enfants; chez ceux d'un âge plus avancé, la rhubarbe en poudre, brisée en décoction, les dissolutions de siagobie, etc., peuvent être prescrits plus hardiment.

Il faut se garder de croire que les états muqueux gastriques et intestinaux réclament toujours une médication aussi active que l'est en général la médication évacuante. Bien souvent, en effet, il suffit de neutraliser d'une manière toute chimique les qualités viciées des produits de sécrétion qui séjournent dans le tube intestinal, ou bien de modifier directement l'état des follicules muqueux et de la muqueuse par des moyens logiques, pour arrêter soit les vomissements, soit la diarrhée, qui dépendent de la turgescence diacritique des follicules. C'est de la première manière qu'agissent les absorbants, que les anciens ont tant préconisés dans ce qu'ils ont appelé les salures acides, et à la seconde se rapportent les astringents.

Nous reviendrons ailleurs sur les qualités acides que prennent chez les enfants les produits sécrétés par la muqueuse digestive. Disons seulement ici que l'indication de

les combattre nous paraît fréquente dans les diarrées muqueuses gastriques et intestinales, et l'on doit être d'autant plus porté à faire usage des absorbants et des alcalins, avant d'en venir aux évacuants, que les premiers, s'ils sont inefficaces et insuffisants, ne sont au moins jamais dangereux. Tout au plus peuvent-ils, comme Baumes le prétend, surtout quand on se sert des absorbants terreux, augmenter la viscosité des mucosités saburrales et rendre leur évacuation plus difficile; mais s'ils ont ainsi l'inconvénient d'augmenter l'état saburral, ils rendent plus précise et plus évidente l'indication de recourir à la médication évacuante. Nous reviendrons ailleurs sur le mode d'administration des absorbants et sur la préférence que méritent tels ou tels médicaments de cette classe.

Les astringents conviennent très-souvent dans la diarrhée qui dépend de la diarrhée folliculaire des gros intestins. Dans cette maladie, la chymification et la chylofication s'accomplissant d'une manière satisfaisante, ce qu'indiquent la lenteur de l'amaigrissement et l'absence de symptômes graves, il serait inutile et même dangereux de porter des moyens perturbateurs sur l'estomac et les intestins grêles. Il faut alors donner par la bouche des médicaments qui n'aient point cet effet et borneront leur action à resserrer les orifices des follicules mucipares, à modifier leur vitalité, en même temps qu'ils diminueront l'irritabilité et augmenteront la tonicité de la muqueuse des intestins inférieurs. Ces médicaments seront des astringents et des toniques, surtout le sous-nitrate de bismuth, l'extract de cascarille, la racine de colombo, le cachou, le café de glands, la muscade, le macis, etc. Nous avons souvent employé avec succès les préparations d'airelle myrtille avant même qu'elles eussent été préconisées par le docteur Reiss (1), qui a prouvé par des observations concluantes que ce moyen est un des meilleurs astringents anti-diarrhéiques. L'airelle peut être donnée sous la forme de triniture alcoolique, d'extract ou de sirop. C'est

(1) *Ann. méd. de Paris*, 1845, p. 248.

ce dernier que nous avons le plus souvent mis en usage, ainsi qu'une gelée analogue à la gelée de groseilles, et qui se prépare dans beaucoup de ménages dans les environs du Mont-Pila où l'airelle croît en abondance. Le sirop se donne à la dose d'une à cinq ou six cuillerées par jour, l'extrait à celle de 0,20 à 1 gramme en 3 ou 5 pilules, et la teinture à celle de 2 à 10 grammes en plusieurs fois. A l'aide des lavements on porte directement sur la muqueuse du gros intestin le nitrate d'argent dissous dans l'eau distillée, qui a une action presque spécifique dans toutes les maladies des muqueuses, dont l'élément essentiel consiste dans une lésion des follicules mucipares. M. Trouseau emploie aussi ce médicament en potion par la bouche. D'autres astringents énergiques, et en particulier les opiacés, ne conviennent que si la maladie est ancienne, a résisté aux autres moyens, et s'est déjà transformée en une forme de diarrhée dont nous parlerons plus tard sous le nom de diarrhée séreuse et colligative, transformation d'ailleurs fréquente et généralement fâcheuse.

La diarrhée muqueuse qui se lie à la dentition, a été considérée par beaucoup d'auteurs qui se sont dirigés à cet égard d'après le dire de Sydenham et quelques passages d'Hippocrate, comme devant être respectée. M. Trouseau, après une discussion approfondie (1), a démontré que ce principe était un préjugé dangereux. Cette opinion est aussi la nôtre. Nous pensons, comme cet habile praticien, que « si l'on ne peut contester qu'une diarrhée très-moderée semble modérer la fièvre ainsi que la fluxion des gencives, cette diarrhée, quand elle dure plus de quatre ou cinq jours, ou qu'elle devienne un peu trop vite, demande une attention très-sérieuse et doit être combattue par les moyens les plus actifs. » On ne peut craindre d'arrêter cette diarrhée par les astringents que lorsqu'il existe quelque autre maladie, comme un catarrhe pulmonaire, une esquiluche, etc., parce qu'alors, en effet, la supercrétion intestinale étant subitement supprimée, il en peut

(1) *Ann. des mal. vén. et des. s. novembre 1841.*

résulter un surcroît d'intensité dans la maladie coïncidente. Mais quand aucune contre-indication de cette nature n'existe, et quand la diarrhée se rattache uniquement à la existence d'une dentition laborieuse, il faut l'arrêter ou au moins la diminuer, surtout si elle affaiblit et fait dépérir le malade, si elle tend à devenir stérile et colliquative. Sa persistance ne fait qu'entretenir une plus grande disposition à des dérangements plus graves des fonctions digestives qui ont tant d'influence sur le développement des convulsions. « Car, contrairement à l'opinion vulgairement accréditée, dit encore M. Trouessart, les convulsions de dents surviennent plus souvent chez les enfants atteints de diarrhée que chez ceux qui ne l'éprouvent pas. »

Telles sont les médications actives qu'on doit opposer aux différentes formes des diarrées muqueuses apyrétiques. Ajoutons seulement qu'à ces médications locales il faut, lorsque la maladie tend vers l'état chronique ou que cet état est confirmé, joindre quelques-uns des moyens qui rentrent directement dans la médication tonique, afin de s'opposer à l'état cachectique qui résulte des dyspepsies prolongées. C'est alors qu'on retire de grands avantages des préparations de quinquina, des amers, des bains toniques, des frictions sèches et aromatiques et de l'insolation.

7° Traitement des diarrées muqueuses fébriles. Ce serait une erreur de croire que, dans les fièvres muqueuses, il soit nécessaire de changer les bases de la thérapeutique que nous avons vue convenir aux diarrées muqueuses apyrétiques. Les modifications résultent seulement de ce que l'élément fébrile fournit des indications spéciales, et de ce que, sous cette forme, la dyspepsie donne lieu plus souvent à des épiphénomènes auxquels il faut aussi porter remède avant d'attaquer la maladie essentielle. Cette seconde source d'indications nous occupera à part dans un instant. Supposons d'abord que nous avons affaire à une fièvre muqueuse exempte de complications.

La présence de la fièvre, loin d'exclure la médication

évacuante, en motive positivement l'emploi toutes les fois que l'état saburral étant très-prononcé, il est permis de lui attribuer en grande partie l'apparition des phénomènes fébriles; pourvu cependant que la phlogose gastro-intestinale, qui dans les fièvres muqueuses existe toujours à un plus haut degré que dans les diarrées apyrétiques, paraisse ne jouer qu'un rôle secondaire dans la production de la fièvre. S'il en est autrement, c'est-à-dire, si la phlogose existe à un degré notable, comme cela arrive ordinairement dans la forme continue de ces fièvres, il est plus prudent de modérer est même d'abord l'élément inflammatoire avant de recourir aux évacuants, de peur que ceux-ci ne l'augmentent et ne la transforment en une complication fâcheuse. En l'absence de cette contre-indication, on après y avoir pourvu, les symptômes saburaux sont attaqués par la médication évacuante avec une énergie proportionnée à celle des accidents et avec toutes les précautions qu'exige la prudence.

L'état fébrile peut par son intensité, mais surtout par son type, devenir la source de plusieurs indications importantes.

En l'absence de tout épiphénomène inflammatoire, l'état fébrile, dans les formes aiguës de la fièvre muqueuse, est rarement assez intense pour exiger l'emploi des saignées générales, qui doit être chez les enfants encore plus réservé que chez les adultes. Cette réserve s'appliquera surtout aux cas dans lesquels la fièvre dure depuis quelque temps, parce qu'à une époque un peu avancée de la maladie, la crase du sang a été déjà profondément altérée et qu'une simple et légère saignée peut précipiter la chute des forces. La saignée ne peut convenir qu'au début, alors que le système circulatoire est dans un état de plénitude et de surexcitation, et que la turgescence vasculaire de la muqueuse digestive peut facilement arriver au degré de la phlogose. Si l'emploi modéré de la saignée ne remplit pas complètement le but qu'en se propose, on peut employer les lotions et les affusions froides, comme beaucoup de praticiens antérieurs à notre époque le faisaient dans le traitement

des fièvres graves, et comme le pratiquent aussi quelques médecins de nos jours. Les lotions et les affusions froides agissent en calmant directement du calorique à l'organisme et sont un antiphlogistique général des plus puissants. M. Gendrin les préconise hautement. Mais il est bien d'observer que les fièvres muqueuses qui nécessitent le plus leur usage ainsi que celui des saignées, sont les fièvres continues, dites *arabes* par les auteurs, lesquelles sont plus rares chez les enfants que chez les adultes; par conséquent, ces deux médications ne trouvent pas très-souvent leur emploi, du moins en tant qu'il serait motivé exclusivement par l'intensité de l'état fébrile.

La fièvre fournit une indication spéciale, celle du quinquina, lorsqu'elle a un type rémittent ou intermittent. Cependant cette indication, dans les fièvres simples sans épiphénomènes et sans caractère ataxique et pernicieux, vient toujours après celle des évacuants, et c'est parce qu'on méconnaît trop souvent l'urgence de ceux-ci, qu'on trouve tant de mécomptes dans la pratique lorsqu'on administre les fébrifuges. Quelquefois l'état saburral est assez peu apparent dans l'apyrexie des fièvres qui tendent vers l'intermittence complète, pour rester inaperçu. Dans ces cas-là le quinquina donné d'emblée ne produit souvent aucun effet avantageux, et cet échec doit être pour le praticien une forte raison de croire que l'indication principale lui a échappé. Alors reportant de nouveau son attention sur l'ensemble et la marche des symptômes, il est rare qu'il ne constate pas quelques-uns des signes de l'état saburral. En conséquence, et lors même que l'existence de l'état saburral serait équivoque, il doit renoncer au quinquina, prescrire les évacuants, et ne revenir à l'usage du Péron qu'autant que l'état fébrile rémittent ou intermittent persisterait après la disparition des symptômes saburaux. On voit par là que l'indication des antipériodiques est le plus souvent subsidiaire par rapport à celle des évacuants dans les fièvres muqueuses simples.

Il n'en sera plus de même dans celle de ces fièvres que

des épiphénomènes graves ou le caractère ataxique et pernicieux peuvent rendre promptement funestes et qui offrent le type rémittent ou intermittent. Alors on donnera sans aucun retard les préparations de quinquina, sauf à remplir en même temps ou plus tard les indications tirées de l'état saburral.

Dans la forme muqueuse ou hecticque de la fièvre muqueuse, l'état fébrile ne fournit l'indication spéciale des antipériodiques que lorsqu'il est rémittent, et toujours subsidiairement à l'emploi de la médication évacuante. Toutefois celle-ci, lorsque l'état d'hecticisme est très-avancé, doit elle-même être précédée de moyens toniques, et c'est plutôt à ce titre que comme fébrifuge que le quinquina peut alors être prescrit d'emblée. Aussitôt que les toniques ont rendu à l'organisme la puissance de réaction qu'exige la médication évacuante, celle-ci employée avec toutes les précautions convenables et dans une juste mesure, associée encore aux toniques, à des astringents, à un régime aussi fortifiant que possible, est le véritable pivot sur lequel repose la thérapeutique de ces cas en général fort graves.

Un médecin allemand, le docteur Weisse, dit s'être bien trouvé de l'emploi de la viande crue dans le cas de fièvre hecticque symptomatique de la diarrhée chronique. Il avait traité, depuis plusieurs mois, un enfant âgé d'un an, amaigri comme un squelette, pour une diarrhée colliquative. Un jour la mère de cet enfant ayant demandé au médecin s'il consentait à ce qu'on donnât de la viande crue au petit malade, M. Weisse se rappela que ce moyen avait été conseillé par le docteur Habersang, et consentit à cet essai, se réservant de le suspendre si la diarrhée augmentait. Le lendemain, M. Weisse fut fort étonné en voyant l'enfant mâcher avec avidité un morceau de viande toute saignante. Mais comme il remarqua ensuite des restes non digérés de la viande dans les selles, il ordonna de donner à l'enfant, trois fois par jour, une bonne cuillerée à soupe de viande crue hachée en très-petits morceaux, ce qui fut bien digéré. Au bout de quelques semaines l'enfant qu'on

avait cru perdu, fut complètement rétabli (1). Ce fait est fort curieux; nous n'hésiterions pas dans un cas analogue à répéter la tentative qui a si bien réussi au praticien allemand.

3^e *Traitement des diarrées fébriles compliquées.* — Les épiphénomènes qui doivent fixer notre attention, comme plus fréquents et plus graves chez les enfants, sont : l'intensité des vomissements et de la diarrhée, l'inflammation existant à un haut degré sur la muqueuse gastro-intestinale, l'état adynamique et ataxique, l'anasarque et les accidents cérébraux. Quant aux inflammations buccopharyngiennes aphthieuses ou érythémateuses, aux catarrhes laryngiens et bronchiques, aux pneumonies, etc., la plupart exigent rarement des moyens très-actifs. Il est très-important pour celles qui, comme les pneumonies, sont cependant des maladies graves, de ne pas méconnaître leur dépendance de l'état saburral, et de combattre celui-ci en premier lieu. On sait assez, par exemple, combien cette indication est positive dans ces pneumonies et pleurésies que Stoll appelait fausses ou bilieuses; mais cet exemple que nous citons comme le plus tranché et le mieux connu, est bien plus rare chez les enfants que chez les adultes.

Quelle que soit l'intensité des vomissements, lorsqu'ils existent sans autres signes de phlogose gastrique, tels que la rougeur vive et la sécheresse de la langue, une soif ardente, une douleur épigastrique très-vive, etc., ils ne contre-indiquent pas pour cela l'emploi des évacuants, car c'est au contraire le cas d'appliquer l'axiome : *Vomitu vomitu caratur*. Cependant, si l'état saburral attaqué par le vomitif a diminué ou disparu et que les vomissements soient très-internes, il faut les attribuer à un excès d'irritabilité de l'estomac et les combattre par des antispasmodiques en tisane, en potion, en poudre, par un vésicatoire à l'épigastre, et quelquefois par des boissons à la glace. C'est surtout dans les formes fébriles et aiguës de la maladie que ce dernier moyen peut être convenable.

(1) *Ann. des hosp.*, 1841, p. 28.

Ce que nous disons des vomissements s'applique à la diarrhée. Est-elle indépendante d'une phlogose intestinale interne, elle ne contre-indique nullement les évacuans, et si elle ne diminue ou ne disparaît pas par leur emploi, il est rare du moins que ceux-ci l'augmentent. Toutefois il faut observer que si la diarrhée devient abondante et séreuse, et si elle prend le caractère colloïdal il ne faut point attendre l'effet des évacuans, mais il faut avant de les employer, modérer la diarrhée par des astringents, des toniques et des sédatifs. Cette circonstance se rencontre assez souvent dans le cas où la diérèse folliculaire intestinale est déjà ancienne soit sous la forme apyrétique, soit sous la forme hectique de la fièvre muqueuse.

La phlogose gastro-intestinale que l'on doit admettre comme existant à un très-haut degré dans la plupart des cas, peut devenir plus intense, et rendre nécessaires les antiphlogistiques. Toutes les fois donc que la gastrite ou la gastro-entérite paraît évidente ou que les symptômes dysentériques sont bien prononcés, les émissions sanguines locales ou même générales, les topiques émolliens, la diète et l'ensemble du régime antiphlogistique seront parfaitement motivés. Les cas les plus embarrassants sont ceux dans lesquels les symptômes inflammatoires sont peu prononcés. Le praticien ne saurait apporter trop d'attention à constater tous les phénomènes qui le mettront à même de juger à quel degré la structure de la muqueuse digestive est compromise par l'inflammation, avant de se décider sur la préférence à donner aux antiphlogistiques ou aux évacuans. C'est dans ces cas difficiles que se distinguent les praticiens habiles.

On sait avec combien les états ataxique et adynamique, quelles que soient en général les affections qui s'en compliquent, prennent d'importance au point de vue thérapeutique. Toutes les fois que ces états s'annoncent d'une manière grave dans les fièvres muqueuses, à moins qu'on n'ait de fortes raisons pour penser qu'ils disparaîtront par la cessation de l'état initial, ils réclament par eux-mêmes et presque toujours sans délai les divers moyens soit toniques,

soit antispasmodiques ou stimulants diffusibles, que l'on met en usage contre les complications de cette nature.

Lorsque les accidents ataxiques se montrent avec le type rémittent ou intermittent, et surtout s'ils sont pernicioeux, le quinquina est positivement indiqué et doit être administré illico. Ce cas est celui où l'état ataxique est toujours le plus facilement enlevé; nous en avons rapporté un exemple.

L'anasarque qui, chez les enfants, est assez fréquente dans la convalescence des fièvres muqueuses aiguës et dans les farines chroniques, soit de ces fièvres, soit des diarrhées muqueuses, réclame les excitants et les résolutifs appliqués à la surface de la peau, le nitre et les autres diurétiques dans l'intérieur. Mais ce qui est surtout nécessaire, c'est l'emploi des médicaments et d'un régime toniques; ces moyens sont les plus propres à rendre à la digestion toute son énergie et à favoriser la reconstitution des principes du sang dont la viciation, toujours inséparable des formes intenses et chroniques de la maladie dyspeptique, est la véritable cause des collections aqueuses qui se ferment dans le tissu cellulaire et dans les cavités séreuses.

Nous avons insisté ailleurs sur la fréquence des accidents cérébraux chez les enfants. Ici la conduite à suivre est toujours analogue à celle qui convient dans le traitement des autres épiphénomènes des fièvres muqueuses; c'est-à-dire que plus la connexion entre les accidents cérébraux et l'état gastro-intestinal est évidente, plus les premiers paraissent complètement dépendants du second, plus il faut attaquer celui-ci avec énergie par les moyens qui sont le mieux appropriés à ses diverses formes et à ses différents degrés d'intensité. Alors même que la liaison dont nous parlons est moins manifeste, il y a toujours nécessité de remplir cette indication primordiale et essentielle. Quand on y a satisfait, et que cependant les symptômes cérébraux persistent, il faut alors diriger contre eux un traitement plus ou moins actif et variable suivant leur nature. Nous ne saurions trop répéter que dans des cas de

ce genre il est plus rare qu'on ne le pense communément d'avoir affaire à une véritable inflammation cérébrale; par conséquent il faut être prudent dans l'emploi des antiphlogistiques et bien étudier leurs effets, afin de s'arrêter à temps s'ils ne sont pas satisfaisants; car on peut dire qu'en général, dans ces cas-là, l'insuccès de cette médication prouve l'absence d'une phlogose franche des organes encéphaliques. Il faudra donc se retrancher souvent sur les antispasmodiques et sur les révulsifs. Les vésicatoires en particulier sont utiles lors même qu'il y a quelque incertitude dans le diagnostic. Lorsque les épiphénomènes cérébraux ont une forme rémittente, ils réclament impérieusement l'emploi du quinquina, comme tonique et antipériodique.

Telles sont les indications les plus essentielles que nous avons cru devoir résumer. Nous nous sommes abstenu de beaucoup de détails qu'on retrouvera dans les traités généraux de pathologie. Il importait cependant de fixer l'attention sur des états morbides fréquents chez les enfants et d'autant plus importants que, depuis ces dernières années, leur véritable nature nous paraît avoir été mal connue de ceux qui ont exagéré les comme ailleurs l'influence de l'inflammation. Quiconque a étudié les travaux des anciens, sait ce qu'ils renferment de précieux pour la pratique dans ces maladies et combien, sous ce rapport, les données fournies par la doctrine physiologique leur sont inférieures. Suivant d' aussi près que possible l'exemple que nous a donné M. Gendrin dans son traité de médecine pratique, nous nous sommes efforcé de rentrer dans une voie presque abandonnée. Nous croyons avoir ainsi, en ce qui concerne la pathologie de l'enfance, rétabli sur ses véritables bases la thérapeutique des nombreux états pathologiques qui nous ont occupé dans ce chapitre. C'est surtout dans les résultats de notre observation et dans ceux fournis par la pratique des auteurs que nous avons cherché nos preuves, bien persuadé de la vérité de cette proposition si généralement applicable d'Hippocrate : *Naturum morborum curatiora situlanti.*

ARTICLE II.

DANCISI ACRSCENTE.

De tous les auteurs qui ont attribué un certain nombre de phénomènes morbides à la présence d'un excès de sécrétion acide dans les premières voies, aucun n'a plus contribué que Harris à étendre et à exagérer cette influence. Rosen en parle aussi dans plusieurs occasions, et ne manifeste aucun doute sur la réalité de cet état des voies digestives. Il en est de même d'Underwood, de Rames et de beaucoup d'autres. Tous ces auteurs méritent le reproche de n'avoir pas démontré assez clairement la vérité de leur opinion et de lui avoir laissé un caractère hypothétique. De plus, quelques-uns d'entre eux sont tombés dans une erreur grossière lorsqu'ils ont considéré la coagulation du lait dans l'estomac comme un signe de l'acrescence morbide. On sait aujourd'hui, et J.-L. Petit l'avait depuis longtemps démontré, que la coagulation du caséum est le phénomène indispensable par lequel commence la chymification du lait. Il faut cependant reconnaître qu'il y a quelque chose de vrai dans les opinions anciennes, et tout en faisant la part de l'erreur et de l'hypothèse, on doit se garder de les rejeter.

La physiologie d'abord nous conduit à admettre chez les enfants une très-grande disposition à l'acrescence des humeurs gastro-intestinales, soit par l'abondance de celles qui sont acides à l'état normal, soit par l'insuffisance de celles qui sont naturellement alcalines et destinées à neutraliser les premières. Cette double condition est admise par les physiologistes modernes, comme on en jugera par le passage suivant de Burdach : « Le lait tourne à l'aigre par son mélange avec le suc gastrique, et celui que l'enfant vomit au bout d'une demi-heure ou d'une heure est en grande partie coagulé. Suivant Scholber, c'est principalement la matière caséuse qui se caillé, le suc étant

moins coagulable. La bile qui se mêle au caillot se convertit en un chyle liquide, dont s'emparent les vaisseaux lymphatiques. Cependant la bile n'est point encore assez puissante pour maîtriser entièrement l'acidification opérée par le suc gastrique et intestinal; les vents qui sortent par le bas ont une odeur, non point putride, mais de lait aigre; cette odeur est aussi celle des excréments jaunâtres, surtout quand ils ont séjourné quelques heures dans les intestins, et ces matières paraissent contenir de la matière caéuse non encore décomposée; car les chiens et les chats non seulement lèchent leurs pétiis après chaque évacuation, mais encore mangent très-volontiers les excréments qu'ils rendent (1). » Suivant Schmidtman les enfants à la mamelle ne sont si fortement prédisposés à la cardio-entéralgie aiguë ou chronique que parce que la sécrétion hépatique ne fournit chez eux qu'une bile décolorée, aqueuse, presque tout-à-fait privée d'alcalinité et de principe amer. Il paraît donc démontré que chez les enfants la sécrétion des liquides acides l'emporte sur celle des liquides alcalins.

La pathologie ne fournit pas autant de preuves qu'on pourrait le croire, et plusieurs de celles données par les auteurs sont complètement insignifiantes. Voyons, par exemple, ce que dit Baumes : « Si la transpiration et l'haleine frappent l'odorat d'une odeur acide et les yeux d'une vapeur subtile, sèche; si les déjections sentent l'aigre, sont vertes ou verdissent promptement sur les linges, et si, mêlées avec des alcalis ou avec des terreux, elles font effervescence; s'il y a des rots acides et des vomissements d'une matière de même qualité; si les hypocondres sont un peu proéminents; si le visage est décoloré, surtout aux lèvres et aux caroncules lacrymales; si la peau est gâtée par des éruptions dont l'odeur est acido-fétide; si l'abattement est considérable; si la situation verticale donne plus de tranquillité que l'horizontale; si la faim est irrégulière, la toux sèche, la rougeur et la pâleur des joues exces-

(1) *Traité de physiologie*, t. III, p. 545.

voies; si les aigres des tranchées anéantissent, etc., d'ailleurs nous que les convulsions ne soient l'effet d'un acide qui, en se développant plus ou moins fortement dans les premières voies, borne son action à stimuler les membranes et les nerfs trop sensibles de l'estomac et des intestins; ou bien en communiquant à la lymphe son acrimoine particulière, répand une âcreté dans tout le corps et porte un irritant dans toutes les parties (1). — La plupart des aigres qui viennent d'être énumérés nous semblent d'une valeur fort équivoque pour prouver l'existence des acides dans les premières voies, et les autres auteurs que nous pourrions citer n'en ont point donné de plus certains.

Cependant la thérapeutique semble donner gain de cause aux théories anciennes. On voit, en effet, que dans certains états morbides, mal déterminés par les modernes et que les anciens disaient consister dans des salures acides, rien ne réussit mieux que les absorbants, c'est-à-dire des substances à base alcaline qui se combinent facilement avec les acides. Ce qui prouve que les absorbants n'agissent, pour ainsi dire, que par leur combinaison avec les acides gastriques liquides ou gazeux, c'est qu'ils n'ont point la plupart aucune autre propriété évidente et qu'ils sont inertes dans d'autres états morbides dans lesquels rien ne fait supposer l'existence des acides. La pratique fournit de nombreuses occasions de vérifier ce fait.

Nous croyons donc à la nécessité de revenir aujourd'hui à une opinion ancienne, abandonnée à tort par l'école physiologique, et d'admettre comme un état pathologique particulier l'acescence des produits de la sécrétion gastro-intestinale.

Nous avons vu comment la physiologie explique la prédisposition de l'enfance à cette maladie. On peut ajouter avec Baumes qu'une des causes est la qualité des aliments dont se nourrissent les enfants et dont l'acidification est très-facile. Ainsi le lait, qui chez les très-jeunes enfants existe presque constamment en certaine quantité dans l'es-

(1) *Traité des vomissements*, p. 137.

tome à cause de la multiplicité des repas, se coagule facilement par l'action des sucs gastriques, et devenu acide lui-même il contribue à la coagulation du nouveau lait qui arrive dans l'estomac ; de telle sorte que ce viscère, mis sans cesse en action, est continuellement soumis à l'action topique que les liquides acides exercent sur sa membrane muqueuse. « Les enfants à la mamelle, dit Rœsen, n'ont ordinairement que des crudités acides, parce qu'ils ne vivent que de lait. Il se trouve aussi des crudités acides chez les enfants plus grands, lorsqu'ils prennent surtout beaucoup de laitage, de la bière nouvelle, du vin de temps en temps, des fruits non mûrs ou trop mûrs, des groseilles, des cerises, du vinaigre ou du jus de citron dans leurs aliments (1). »

Une des causes les plus ordinaires, chez les enfants à la mamelle, est la succion habituelle d'un lait mal élaboré, comme celui des nourrices épuisées par de pénibles travaux, ou mal nourries, ou comme celui des mères qui s'interrompent pas, pendant qu'elles sont nourrices, leurs habitudes de dissipation, de plaisirs fatigants, de régime trop stimulant et souvent en même temps peu réparateur. La maladie se produit aussi fréquemment chez les enfants allaités par des femmes qui s'abandonnent à leurs passions et surtout à la colère.

Les autres causes de l'acrescence gastrique nous sont peu connues. Baumes admet que la faiblesse de la constitution, et en particulier celle des organes digestifs, favorise la dégénération particulière des substances alimentaires. On remarque en effet que la maladie est assez fréquente chez des sujets rachitiques, anémiques et chlorotiques. Il est bien probable aussi que le régime a une grande part à sa production. D'ailleurs elle n'est point aussi souvent que le pensaient les anciens complètement indépendante de toute autre affection gastro-intestinale. Le plus ordinairement elle coïncide avec la diarrhée folliculaire. C'est là une des dif-

(1) *Idem*, *op. cit.*, pag. 221.

férences essentielles qu'elle présente chez les enfants et chez les adultes; car, chez ceux-ci, elle est susceptible d'exister pendant longtemps à l'état simple, et comme cause prochaine des dyspepsies gastralgiques si communes pendant la jeunesse et à l'âge moyen.

Les symptômes qui annoncent la prédominance des acides dans les premières voies, sont toujours des dérangements de la digestion. Les principaux sont : la cardialgie, les coliques, les vomissements et les selles diarrhéiques exhalaant une odeur aigre et acide, faisant effervescence avec les carbonates, un appétit souvent très-prononcé et parfois même une faim dévorante, presque jamais de soif; la langue est rouge, les dents sales, couvertes de tartre; ordinairement il y a du météorisme, l'haleine et les gaz rendus, soit par le haut, soit par le bas, ont une odeur acide. Tous ces symptômes augmentent après l'ingestion de matières végétales, qui ont la propriété de s'acidifier, surtout après celle du lait; au contraire, une nourriture animale procure du soulagement.

Chez un certain nombre d'enfants, la diacrise accidentelle gastro-intestinale s'étend aux organes qui versent dans la bouche le produit de leur sécrétion. Les liquides ont alors des qualités irritantes qui se reconnaissent à leur action sur le mamelon des nourrices. « C'est à cette circonstance qu'il faut attribuer, dit M. Goudrin, les gerçures de la base du mamelon, et les aphthes de sa surface qui disparaissent habituellement dès que les symptômes de cardialgie cessent chez le nourrisson; ils commencent avec la maladie, qui provoque l'altération de la sécrétion intra-buccale et ils cessent avec elle. L'action irritante des liquides déposés dans la bouche de l'enfant se montre même souvent dans ces cas sur le mamelon de la nourrice, avant de se reconnaître sur la muqueuse buccale de l'enfant. Toutefois il arrive rarement que la maladie parvienne à une certaine intensité, et se prolonge pendant quelques jours, sans que la muqueuse buccale de l'enfant devienne aussi le siège d'une phlogose caractérisée par un certain degré d'injection, une chaleur locale, la présence de

papilles gonflées disséminées sur la langue, et enfin la production de petites érosions aphthieuses (1). »

La coïncidence d'un état saberral imprime aux symptômes de la diacrise acéscence des modifications pour l'appréciation desquelles il suffit de se reporter à ce que nous avons dit des différentes formes de la diacrise folliculeuse gastro-intestinale. Ils peuvent également coïncider avec une plégu-masie gastro-intestinale, et dans ce cas comme dans l'autre, il est essentiel de ne pas méconnaître l'existence de la maladie qui s'associe à la diacrise acéscence, car le traitement n'est pas identique dans tous ces cas. Chez les enfants très-jeunes quelques-uns des symptômes indiqués sont d'une appréciation vague et obscure, mais ceux qui ont passé l'âge de sept à huit ans rendent assez bien compte de leurs sensations pour qu'on reconnaisse les principaux caractères de ces lésions de sensibilité qui ont reçu le nom générique de gastralgies, et qui, suivant M. Gendrin, se lient constamment, même chez l'adulte, à l'acéscence des liquides gastro-intestinaux. Il est bien probable qu'à un âge plus tendre, des modifications analogues de sensibilité existent aussi, et on peut comprendre par là l'influence qu'elles exercent sur la production de certains accidents graves tels que l'éclampsie. On sait en effet que les coliques qui se lient à l'acéscence gastro-intestinale, revêtent une grande intensité qui leur a valu le nom de *branchées*. Mais ce qu'il y a de distinctif entre ces affections chez l'adulte et chez l'enfant, c'est que chez le premier elles siègent essentiellement dans l'estomac et rendent les troubles gastriques, dans le cours ou dans l'intervalle des digestions, beaucoup plus prononcés que ceux qui appartiennent à l'intestin; chez l'enfant, au contraire, outre qu'elles ont le plus souvent une forme aiguë, les signes de douleur et les autres dérangements fonctionnels annoncent que l'estomac et l'intestin sont également compromis. C'est ainsi que la diarrhée en est un effet bien plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte. Tandis qu'à un âge avancé, la bile plus active

(1) *Traité phé. de méd. par. — 1. 10. p. 241.*

suffit à diminuer ou même à faire disparaître l'acidité des matières chymifiées; il semble que dans le premier âge elle soit moins puissante et laisse subsister l'acrescence dans toute l'étendue des voies gastro-intestinales.

M. Gendrin insiste avec raison sur les caractères des douleurs intestinales qui sont un des symptômes les plus prononcés et les plus graves des cardio-entéralgies aiguës si dangereuses dans le premier âge par la violence des accidents convulsifs qu'elles provoquent. Mais on ne peut s'assurer de leur présence que par les symptômes fournis par l'attitude, le faciès, par les mouvements des malades, et par les troubles de la digestion. Lorsque l'on voit l'enfant s'agiter et exécuter des mouvements de torsion du corps, la face pâlir et se crispier, les yeux s'excaver, les lèvres troubler et se tirer en dehors ou se contracter, le ventre se tendre ou présenter des alternatives de tension ou de mollesse, ou s'il se produit à la surface de l'abdomen comme des bosselures qui se déplacent, si en même temps on entend des borborygmes, si surtout l'enfant a des nausées et même des vomissements, s'il rend fréquemment des flatuosités, et par intervalles des selles liquides et bilieuses ou muqueuses peu abondantes, on ne peut douter que les cris qu'il pousse ne soient l'expression des douleurs qu'il éprouve dans l'abdomen (1).

Les symptômes que nous avons indiqués ne donnent pas au diagnostic toute la certitude désirable; c'est surtout par exclusion que par l'observation directe qu'on peut arriver à un résultat satisfaisant. Ainsi on admettra la diarrhée acrescente idiopathique si les symptômes ne peuvent être attribués à aucun autre état morbide. On présumera, au contraire, que cette diarrhée existe avec une autre affection, soit sévère, soit inflammatoire, lorsque outre les symptômes de l'une ou de l'autre de ces affections, on constatera quelques-uns de ceux qui annoncent les qualités acides des matières vomies ou excrétées par l'anus. Enfin, ce qui doit, suivant nous, jeter le plus de clarté sur le

(1) *Revue médicale*, 1862, t. III, p. 111.

diagnostic, c'est le résultat de l'emploi des alcalis et des absorbants. Ces substances n'étant presque jamais nuisibles, il ne faut pas craindre de les essayer pour peu qu'on soupçonne la diarrhée acrescente, et si leur usage réussit on est en droit de conclure que la présence des acides dans les premières voies était la cause prochaine de tous les accidents.

Ainsi que l'indique Hufeland, le traitement est double, c'est-à-dire palliatif et radical. Le premier consiste à faire disparaître les acides par des absorbants et des alcalis. « Ils remplissent si sûrement l'indication, dit Baumes (1), qu'on n'a pas hésité à regarder ces remèdes comme les calmants de l'enfance. » Cependant plusieurs circonstances font varier leur administration, et c'est ici que les ouvrages de Rosen, d'Underwood, de Baumes surtout et d'Hufeland, renferment des indications précieuses pour la pratique.

Si la diarrhée acrescente paraît idiopathique, les substances dont l'effet se borne à neutraliser les acides conviennent parfaitement; mais il ne faut pas négliger de faire un choix parmi ces médicaments. Il en est qui, en se combinant avec les acides, fournissent un dégagement de gaz acide carbonique; tels sont les carbonates de chaux (craye, yeux d'écrevisse, écailles de divers testacés, corail), de magnésie, de potasse et de soude. Or, ce dégagement de gaz peut avoir des inconvénients lorsqu'il existe déjà un certain degré de pneumonie, et il faut associer à ces poudres des carminatifs, ou bien leur préférer la magnésie calcinée, l'oxyde de zinc, le sous-nitrate de bismuth et les dissolutions très-étendues d'ammoniaque, de chaux et de sous-carbonate de potasse ou de soude. C'est à la classe des absorbants qu'appartient la poudre de guttère, autrefois si renommée dans le cas de convulsions dues à des acides gastriques en excès. Les absorbants que nous venons d'indiquer, et surtout les absorbants terreux, réussissent très-bien pour arrêter les vomissements et encore mieux la diarrhée, en détruisant la cause excitante de leur production. Leur mélange avec les acides les neutralise, et de

(1) Œuvre citée, pag. 160.

plus forme un sel séléniteux qui, par sa stipticité, constipe et raffermie les fibres trop lâches (Baumes).

Nous avons souvent employé avec avantage la potion suivante formulée par Hufeland : yeux d'écrevisses, un ou deux grammes, eau de fenouil, sirop de rhubarbe, de chaque trente grammes. (Bien remuer et donner une cuillerée à café toutes les heures.) Cette dose convient à de très-jeunes enfants. Elle peut être doublée ou triplée pour ceux de deux à quinze ans. Hufeland préconise aussi la poudre suivante : magnésie carbon., trente grammes; rac. de rhubarbe, huit grammes; rac. de valériane, deux grammes; obso-sacchar. de fenouil, quintogrammes; mêles, faites une poudre S. A. Donner une à deux fois par jour sur la pointe d'un couteau.

Chez les enfants à la mamelle, Rosen veut que la nourrice fasse un usage prolongé des absorbants, afin de modifier la composition du lait et de diminuer sa tendance à l'acidification dans l'estomac du nourrisson.

La médication absorbante est souvent avantageuse et rarement nuisible; cependant il ne faut pas la continuer trop longtemps lorsqu'elle paraît inefficace.

Lorsque l'acrescence des liquides dans les premières voies coexiste avec la diacrise folliculaire, les absorbants deviennent moins sûrs et quelquefois tout-à-fait insuffisants. Il faut alors les faire précéder de la médication évacuante ou bien les remplacer par des médicaments doués d'une propriété dissolvante. Nos docteurs désignaient cet état morbide sous le nom de glaires acides; ils disaient que lorsque les acides ont pour base un foyer glaireux, ils acquièrent une fixité beaucoup plus grande et réclament des médicaments plus actifs que de simples absorbants. On voit que dans cette manière d'interpréter les faits, il n'y a que les mots à changer, et qu'il reste une indication thérapeutique tout-à-fait rationnelle. On comblera donc dans ces cas là les vomitifs et les purgatifs avec les remèdes dissolvants, irritants, incisifs, que nous avons énumérés à la page 70. Parmi ces médicaments, le savon mérite en général la préférence. Il faut aussi employer les

médicaments qui ont de l'analogie avec la bile, la bile de bœuf, le quassia, l'absinthe, l'aloë. La bile de bœuf est surtout très-avantageuse, et c'est à tort qu'elle est généralement abandonnée de nos jours. « Sans doute, disent MM. Trépoont et Pidoux, elle agit en rendant à la digestion des sucs biliaires qui ne sont pas sécrétés en assez grande abondance ou qui le sont d'une manière vicieuse (1). »

Lorsque l'acescence gastro-intestinale coïncide avec un état de phlegmasie, les antiphlogistiques peuvent devenir nécessaires. Si l'on présume que la présence des acides n'est point étrangère à la production de l'inflammation, il faut administrer simultanément les absorbants qui n'ont en général aucun inconvénient et qui feront quelquefois disparaître les symptômes inflammatoires avec plus de sûreté et de promptitude que ne le feraient les antiphlogistiques.

Le traitement de la diarrhée acescente ne se borne pas à l'emploi des moyens palliatifs, mais il faut tâcher de modifier soit l'ensemble de la constitution, soit l'état des voies digestives, d'une manière assez profonde et assez durable pour que la disposition à l'acescence disparaisse. Quelle que soit la difficulté d'expliquer comment la faiblesse générale et locale peut favoriser l'acidité des produits de sécrétion, l'expérience est là pour nous prouver le fait. Elle nous impose dans la pratique la nécessité de soumettre les malades à un régime fortifiant, à l'usage d'une nourriture animale, des vins amers et généreux; à un exercice musculaire qui favorise le développement de tous les organes, à l'emploi, en un mot, de tout ce qui constitue une bonne hygiène. De plus, il faut agir directement sur le tube digestif par des amers, des toniques et des préparations martiales. Un emploi sage et prudent des purgatifs ou des émétiques, dans le but d'activer la sécrétion de la bile, nous paraît très-rationnel et propre à rendre de véritables services.

(1) *Traité de thérapeutique*, t. 1, p. 269. 2^e édit.

ARTICLE IV.

DIARRHÉE SÉRÉUSE.

Cette espèce de diarrhée se rapporte aux diarrhées séreuses et colligatives. Quoiqu'elle se rencontre assez fréquemment dans l'enfance, elle ne mérite pas une description spéciale. Elle se rattache toujours à un autre état pathologique, le plus souvent général, surtout à l'affection tuberculeuse. Cette diarrhée n'est point celle qui résulte d'une sécrétion purulente dans le cas d'ulcérations tuberculeuses de l'intestin, mais elle est essentiellement constituée par un liquide très-ténu, d'aspect séreux, un peu modifié seulement par la présence de la bile ou d'autres matières intestinales. Elle est due à une exagération de la perspiration muqueuse semblable à celle de la perspiration cutanée qui produit les selles colligatives. Ainsi définie, la diarrhée séreuse n'offre rien de spécial chez les enfants. Mais on observe aussi des selles diarrhéiques de nature séreuse en l'absence de la cachexie tuberculeuse et au milieu de circonstances qui permettent de l'expliquer par une lésion de l'innervation. C'est à cette cause que nous avons déjà rapporté certaines diarrhées qui paraissent l'effet immédiat des douleurs de la dentition, ou des causes morales qui ont, chez les enfants aussi bien que chez les adultes, une action bien réelle. Déjà Rosen avait parfaitement apprécié cette influence; car il dit que cette diarrhée vient quelquefois d'un souci, d'une peur, d'un mécontentement ou d'un sentiment de jalousie. Tout ce qu'avance ce célèbre médecin dans les deux pages qu'il a consacrées à sa troisième espèce de diarrhée, est marqué au coin d'une saine observation et pourrait être répété textuellement à quelques expressions près qui seules ont vieilli. Cette espèce de diarrhée, comme il le dit très-bien, est différente des autres en ce qu'elle n'est accompagnée ni de douleurs, ni de tranchées. On n'aperçoit aucune

marqué de purulence, ni même aucun signe de crudité. Les sujets qui en sont pris sont faibles, pâles, abattus. Elle s'épaissit très-aisément les enfants, parce qu'elle est ordinairement abondante; aussi faut-il l'arrêter le plus tôt possible. Nous ajouterons comme correctif à ce que nous venons d'emprunter à Rosen, que la diarrhée séreuse existe rarement isolée; souvent elle s'ajoute ou succède à la diarrhée sanguineuse, ou bien elle se montre avec les symptômes de la diarrhée acutecale, etc.; mais, dans tous les cas elle fournit une indication thérapeutique spéciale.

Le régime devra être aussi tonique que le permettront les circonstances. Rosen recommande les aliments secs, pour boisson la décoction de cannelle ou d'écorce d'orange et l'usage des toniques martiaux. M. Rosenthal (1), recommande d'une manière générale la noix muscade, à la dose de 0,10 à 0,20, seule ou convenablement associée à d'autres médicaments appropriés, comme calmante et anodine, dans les troubles de la digestion qui sont si fréquents chez les enfants; il a presque toujours vu l'usage de ce moyen couronné d'un entier succès. Nous pensons qu'elle convient principalement, dans les cas dont il est question dans cet article. Nous nous sommes bien trouvé aussi en cas pareil de frictions faites sur le ventre avec le mélange suivant dont Hufeland donne la formule: onguent d'albâtre, huile de muscade, de chaque quinze grammes; huile de menthe crépée, six gouttes; laudanum de Sydenham, un à deux grammes. Si les toniques ne suffisent pas, il faut recourir à des astringents tels que le cachou, l'extrait de cascarrille, de ratanhia, et surtout le diasconium ou le laudanum, à moins que les opiacés ne soient contre-indiqués. Hufeland vante les bains chauds surtout stiles lorsque la contractilité péristaltique de l'intestin est surexcitée par suite d'une irritabilité générale ou locale, ce qu'annoncent l'extrême fréquence des selles et des symptômes de tension.

(1) *Gaz. de Méd.*, 1851, t. 20, pag. 509.

ARTICLE IV.

DIARRHÉE FLATULENTE OU VENTRIÈRE.

Les pneumatoses sont aussi rarement chez les enfants que chez les adultes des maladies idiopathiques. Celles qui se lient à certaines névroses, par exemple à l'hystérie et à l'hypochondrie, ne se rencontrent point dans l'enfance, si ce n'est aux approches de la puberté. Parmi les affections convulsives auxquelles les enfants sont sujets, l'éclampsie, pendant le cours des accès, s'accompagne assez fréquemment d'un météorisme abdominal, de même nature que celui qui se produit dans les névroses que nous avons nommées les premières.

En l'absence de ces maladies nerveuses, les pneumatoses sont presque constamment liées à quelque autre affection gastro-intestinale dont elles ne sont qu'un symptôme; c'est ainsi que dans les gastro-entérites, dans les diarrhées folliculeuses ou acutes, dans les affections vermineuses, dans la dothiéntérie, dans la péritonite, etc., le météorisme n'est qu'un symptôme d'une valeur plus ou moins importante. Cependant, quand il existe à un haut degré, il mérite une attention spéciale, parce qu'il peut amener par lui-même des effets fâcheux.

Enfin, dans certains cas, on voit un météorisme considérable se développer et persister pendant plusieurs jours de suite, sans qu'on puisse constater aucun autre état morbide des voies digestives.

La pneumatose gastro-intestinale a toujours plus d'inconvénients chez les enfants que chez les adultes, et bien que très-souvent il suffise d'en combattre la cause, elle exige aussi quelquefois des moyens thérapeutiques spéciaux. Il semble que dans l'enfance la contractilité des tuniques intestinales soit facilement vaincue par la force expansive des gaz, et ne se recouvre pas naturellement, malgré la disparition de l'état morbide primitif. Le méteo-

riété abdominale a surtout des dangers en présence d'une maladie de poitrine qui soit à l'étendue de la respiration et à l'activité de l'hématose. Le diaphragme refoulé par les regains digestifs distendus s'abaisse difficilement, et l'asphyxie est d'autant plus à craindre que la respiration costale est plus insuffisante par suite de telle ou telle condition morbide. Ainsi, chez des sujets rachitiques, dont le thorax est déformé et rétréci suivant ses diamètres antéro-postérieur et transversal, la respiration étant habituellement diaphragmatique devient très-difficile et très-incomplète aussitôt que le météorisme abdominal survient à un certain degré. Cette circonstance nous a paru la cause principale de la mort d'un certain nombre de sujets, et nous ne la croyons pas très-rare; car les enfants rachitiques sont très-sujets aux pneumatoses gastro-intestinales.

Ces remarques nous conduisent à conseiller dans les cas de ce genre l'usage des toniques et des carminatifs. Ces moyens peuvent être contre-indiqués par l'affection qui produit le météorisme, par une phlegmasie, par exemple; mais dans une foule de cas il doivent être employés tantôt seuls, tantôt combinés avec les diverses médications que réclament les diarrhées muqueuses, acides, et sécrètes, les affections vermineuses, etc. L'emploi extérieur des carminatifs et des toniques n'est pas en général très-efficace, mais comme il n'est jamais nuisible, on peut y recourir dans la plupart des cas. L'absorption cutanée étant plus active dans les commencements de la vie, ces moyens agissent quelquefois d'une manière fort sensible.

Les enfants à la mamelle sont au moins aussi sujets aux vents qu'à un âge plus avancé, et il est très-probable qu'il faut attribuer à cette incommodité, non pas dans tous les cas, mais dans quelques-uns, ces tranchées qui paraissent si douloureuses. On a dit que certains aliments pris par la nourrice, tels que les pois, les navets, les choux, avaient cet effet spécial; mais peut-être est-ce moins une propriété particulière de ces aliments que leur digestion incomplète qui donne au lait les qualités qui engendrent les vents dans le tube digestif de l'enfant. Quoiqu'il en soit, on doit

toujours surveiller de près le régime de la nutrition. Pour favoriser l'émission des gaz qui tourmentent le malade, on fait de petites frictions sur l'abdomen que l'on expose à l'action douce d'un feu qui jette une flamme vive. Les frictions peuvent être sèches ou faites avec un peu d'eau-de-vie chaude; on donne à l'intérieur quelques cuillerées d'une infusion d'anis ou de cannelle.

ARTICLE V.

DIVERSE DE AFFECTIONS VERMINEUSE.

On peut considérer les affections vermineuses de l'appareil digestif comme le résultat d'une lésion de sécrétion. S'il n'en est pas ainsi dans tous les cas, du moins cette lésion existe très-fréquemment et agit comme une des conditions les plus favorables. Nous laisserons de côté la question de savoir si les vers sont dus à des germes introduits du dehors dans nos organes ou à une génération spontanée; ce problème, d'une solution d'ailleurs très-difficile, est du domaine de la pathologie générale. Enfin, nous croyons devoir n'indiquer que très-sommairement les caractères des diverses espèces de vers qu'on rencontre dans le canal digestif de l'homme.

Ces espèces sont au nombre de quatre, savoir l'ascaride lambricoïde ou lombric, l'ascaride vermiculaire ou oxyure, le trichocéphale et le ténia. Le lombric, analogue pour la forme et le volume au lombric terrestre, est formé d'un corps cylindrique, allongé, aminci à ses extrémités et sillonné sur les côtés. La queue est plus volumineuse que la tête qui est surmontée de trois valvules. La longueur de ce ver est le plus souvent de quinze à vingt centimètres, elle peut aller jusqu'à trente et même plus; son diamètre est d'environ quatre à six millimètres. Sa couleur est d'un rose plus ou moins foncé quand il est vivant; mort, il est d'un blanc jaunâtre, pâle et blafard. L'oxyure, appartenant aussi au genre ascaride, est beaucoup plus petit que le lombric; il ne dépasse pas

huit à dix millimètres de longueur et un de diamètre; sa forme est cylindrique; la tête obtuse est entourée d'une vésicule transparente, la queue est très-déliée, terminée en spirale chez le mâle, droite chez la femelle. Le trichocéphale, comme son nom l'indique, a la que le volume d'un cheveu du côté de la tête; le reste de son corps se renfle et se termine en spirale chez le mâle, tandis que chez la femelle la queue est droite. Sa longueur est en général de trois à quatre centimètres, son diamètre dans la partie la plus volumineuse approche de celui d'une épingle de moyenne grosseur. Le ténia, bien différent des trois premières espèces, aplati, comme son nom l'indique, est formé par une suite de segments attachés ensemble par une espèce d'articulation, dont la longueur et la largeur variables, mais n'excédant presque jamais deux centimètres, ont fait admettre les variétés de *ténia large* et de *ténia à anneaux courts*. Ce ver est blanc, demi-transparent ou légèrement opaque, suivant son épaisseur; sa longueur est souvent de plusieurs mètres. Du côté de la queue les articulations sont fréquemment chargées d'œufs. La tête, très-petite, presque invisible à l'œil nu, de forme tuberculeuse, supporte une bouche armée de quatre crochets. Le ténia renferme plusieurs variétés qu'il est inutile d'indiquer ici.

De ces quatre espèces, les trois premières sont bien plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes; la quatrième, au contraire, est plus rare. Sur un ensemble de deux cent six cas de ténia, rassemblés et observés par M. Waurach, vingt-deux ou le dixième environ appartenaient à des sujets de moins de quinze ans, dont le plus jeune avait trois ans et demi (1).

Les lombrics se trouvent dans les intestins grêles, plus rarement dans le gros intestin, dans l'estomac et les organes sous-diaphragmatiques. Le trichocéphale et l'oxyure appartiennent au contraire au gros intestin; mais tandis que le premier se rencontre dans toute sa longueur, surtout dans le voisinage du cœcum et même dans la fin de

(1) *Cronica médicale*, 1841, pag. 635.

l'iléon, le second siège principalement dans le rectum et même très-souvent à l'extérieur de cet intestin, c'est-à-dire dans les plis de la muqueuse anale. M. Treussart, qui admet la rareté des ascarides à Paris, dit qu'il n'en est pas de même des oxyures vermiculaires qui s'y observent peut-être aussi souvent que partout ailleurs.

Causes.

L'enfance n'est point également disposée aux vers à toutes les époques de sa durée. On en a rencontré quelquefois pendant le cours de l'allaitement et même chez des enfants nés depuis très-peu de jours. Ces observations sont pour la plupart relatives à des vers lombrics; mais on a aussi vu des cas de ténia à une époque très-rapprochée de la naissance. « En 1839, M. Müller fut appelé auprès d'un nourrisson de cinq jours pour une légère constipation; après l'emploi de la rhubarbe, de la manne et de quelques grains de sel, on trouva dans les excréments un ténia d'un pied et demi de longueur. Il est évident que le ver a déjà existé pendant la vie fœtale. Ce fait répandra donc à plusieurs hypothèses erronées sur la génération du ténia (1). » On lit dans Van Swieten le passage suivant : « *Phases observationes fatuum vermes in intestinis habitum, davis in utero matris adhuc lactant, collegit egregius medicus, P. de Boyer*; cujus disertatio legi meretur quam maxime (2). » Quoi qu'il en soit, lorsque l'allaitement est achevé, l'affection vermineuse devient très-fréquente jusqu'à l'âge de huit à dix ans.

Peut-on admettre que l'enfance ait une influence directe sur la fréquence de cette maladie? Nous ne le pensons point. Il n'y a là qu'un rapport médiat ou indirect qui s'explique simplement par ce fait bien reconnu, savoir, que les causes qui à tous les âges déterminent ou favorisent

(1) *Gar. med.* 1837, p. 437. *Observation tirée d'un journal allemand.*

(2) *Comment. de aple.*, t. II, p. 432.

l'helminthiasis exercent plus souvent leur action dans l'enfance qu'à un âge plus avancé. Cependant il existerait un rapport plus direct suivant certains auteurs et en particulier suivant Hufeland : « La première des causes, dit-il, qui favorisent la production des vers, est l'enfance, à cause de la vie végétative qui est alors prédominante, et c'est aussi pour cette raison que le canal intestinal, siège de cette vie végétative, y est le plus disposé. » Cette explication n'est point satisfaisante; car la vie végétative comprend des actes plus nombreux et plus complexes que ceux qui constituent la digestion, et dès-lors elle n'a point pour siège le canal intestinal. Il eût été plus juste de dire que les fonctions digestives étant plus actives dans l'enfance, éprouvent plus aisément des troubles favorables à la production des maladies vermineuses. Cette perturbation nuisant soit à l'absorption, soit à la sécrétion des matières que renferme le tube digestif, celles-ci deviennent plus plastiques et s'organisent pour former des animaux parasites, si l'on veut admettre la théorie des générations spontanées. Suivant une autre théorie, les produits sécrétés favorisent seulement l'éclosion et le développement des germes venus du dehors, ainsi que la multiplication de ces animaux, bientôt devenus aptes à se reproduire. C'est ainsi que l'entendait Boerhaave lorsqu'il comparait les saburres à un nid dans lequel les œufs vermineux peuvent très-facilement éclore : « *Nidum est potius intestinalis, et gastrice, in qua hærent, feculentæ, pariter ægulentæque. Hinc rari in adultis, et in his modis terpidis, et leucophlegmaticis* (1). » C'est donc, en définitive, à une altération des qualités normales des liquides intestinaux qu'il faut attribuer l'helminthiasis, et cette altération paraît moins résulter d'une faiblesse de l'absorption que d'une lésion du sécrétion. C'est par là que les affections vermineuses se rattachent aux diacrisies.

En effet, tous les auteurs sont parfaitement d'accord pour reconnaître l'influence de ce que nous appelons maintenant état maigreux, saburral, diacrise muqueuse,

(1) Boerhaavi Aphorismi, p. 51, quæst. 3, aphor. 1261 et 1562.

acrescente, etc., et que les auteurs des siècles derniers appelaient salures glaireuses, acides des premières voies, accumulation de mucosités, flux muqueux, etc.; et dans l'immense majorité des cas, les vers en dépendent d'une manière évidente. Tantôt ils n'en constituent que des épiphénomènes, tantôt ils semblent former à eux seuls tout l'état morbide, parce que celui qui les a engendrés a pu disparaître ou diminuer beaucoup. Or, comme nous nous sommes longuement étendu sur les diarrées muqueuses et acrescentes, nous n'avons pas besoin d'y revenir et d'insister sur l'histoire de leurs causes puisqu'elles n'agissent que d'une manière médiate sur la diarrée vermineuse. Nous répéterons seulement que parmi ces causes il faut surtout mentionner la prédominance du tempérament lymphatique, les climats et les habitations humides, le défaut d'insolation, une aération insuffisante et surtout une mauvaise alimentation. C'est la réunion de toutes ces circonstances qui rend les enfants des classes pauvres si sujets à l'affection vermineuse qui est en quelque sorte endémique chez eux. Parmi les substances dont l'usage trop habituel est le plus nuisible, il faut mentionner les farineux, les fruits verts et aqueux, les légumes, le cidre, le lait fermenté, le fromage, le beurre, et par dessus tout les aliments de mauvaise qualité. Il est encore certain que des repas trop copieux, ou trop multipliés et irrégulièrement distribués, peuvent contribuer à la formation des vers.

Il y a entre les diverses localités d'un même pays de grandes différences sous le rapport de la fréquence de l'affection vermineuse. C'est ainsi qu'elle est extrêmement rare à Paris. « Depuis seize ans, dit M. Trouseau, nous n'avons pas rencontré un seul enfant de Paris qui présentât quelques accidents vermineux; jamais ou presque jamais un enfant né et élevé à Paris ne rend des vers, tandis que c'est le contraire en province. L'on doit donc admettre ici l'existence de quelques conditions occultes tout-à-fait indépendantes de l'alimentation, car les riches comme les pauvres y sont sujets à des conditions qui favorisent le dé-

veloppement des vers intestinaux. Il faut donc dire que si on ne s'occupe pas à Paris des accidents vermineux, c'est que la cause qui les produit n'y existe pas. L'on trouve bien dans nos hôpitaux quelques petits enfants qui rendent des vers, mais ce sont des enfants nés en province qui n'habitent la capitale que depuis quelque temps seulement (1). »

On voit quelquefois les affections vermineuses régner d'une manière épidémique; presque toujours elles ne vont alors qu'à l'épiphéasomène des fièvres muqueuses. C'est ce qui fut remarqué dans l'épidémie de Goettingue par Roderer et Wagler, et dans celle que Van-der-Bouc a observée dans la Gueldre, de 1760 à 1763.

Symptômes.

Pour bien interpréter les symptômes nombreux et variables de l'helminthiasis, il faut les diviser en plusieurs ordres. Les uns dépendent de l'état saburral qui précède, accompagne ou suit le développement des vers; d'autres sont des effets plus directs de leur présence, et en deviennent souvent des signes pathognomoniques; enfin les autres se rapportent aux dérangements épiphéasoméniques qui surviennent dans divers organes et qu'on ne peut le plus souvent expliquer que par des connexions sympathiques.

Les détails dans lesquels nous sommes entré sur la symptomatologie des diatrises muqueuse et acrocente nous disposent d'y revenir. Rappelons-en seulement quelques caractères, tels que le dégoût, l'insappétence ou l'appétit vorace et souvent l'alternation de ces deux états; les hoquets, la salivation, l'haleine fétide, les nausées, les renvois de gaz d'une odeur aigre, particulière et caractéristique, les vomissements séro-muqueux, souvent très-acides; les bechorygies, les coliques occupant ordinairement la région ombilicale; tantôt de la constipation, tan-

(1) Gaz. des Hôp. 1848, p. 62.

tôt de la diarrhée formée par des selles glaireuses, muqueuses, l'empâtement du ventre, le météorisme, etc.

Ces symptômes, pris ensemble ou isolément, ne fournissent pas des indices positifs de la présence des vers. Il en est d'autres qu'on peut, comme les précédents, appeler locaux, et qui ont une plus grande valeur, ce sont les évacuations et les coliques vermineuses. La présence des vers dans les déjections alvines ou dans la matière des vomissements est un symptôme très-important, quoiqu'il ne puisse pas être considéré comme pathognomonique, puisqu'il peut bien se faire que le tube digestif n'en renferme plus au moment où l'on en trouve dans les produits excrétés. Mais si les troubles digestifs persistent malgré les excrétions vermineuses, il est infiniment probable qu'il en existe encore. Dans tous les cas, il faut examiner avec soin les matières que les enfants peuvent rendre par la bouche ou par l'anus.

Les coliques vermineuses retiennent une physionomie qu'on ne retrouve pour ainsi dire dans aucune autre maladie. Elles sont bien différentes de ces douleurs sourdes et obscures, rarement exorbitantes, qui dépendent d'un état saburral ou acrescent. Leur invasion est brusque, inattendue; leur intensité toujours vive et parfois excessive, n'est point en rapport avec les autres symptômes, elles se dissipent aussi vite qu'elles sont venues et se reproduisent d'une manière fort irrégulière. L'âge peu avancé des malades empêche quelquefois d'apprécier exactement tous ces caractères; cependant une exploration attentive peut les faire présumer. Dans un âge moins tendre, les petits malades expriment assez bien que ces coliques sont d'une nature toute particulière; ils les comparent à la sensation d'une piqure ou d'une morsure à l'intérieur du ventre. Quelques-uns poussent des cris, se roulent et se tordent dans leur lit; manifestent, en un mot, tous les signes d'une violente douleur qui rappelle au médecin celle des entéralgies saturnines. Nous n'hésitons point à rapporter, dans la plupart des cas, les accidents nerveux qui accompagnent parfois les affections vermineuses à l'in-

tensité de la souffrance et à son retentissement sur le système nerveux central. On comprend très-bien qu'une seule de ces coliques suffise, surtout chez les enfants plus jeunes dont l'irritabilité est si vive, pour produire immédiatement une *tétanos* des plus graves.

Les symptômes qu'on peut appeler généraux résultent de l'influence que les vers et l'état morbide gastro-intestinal exercent sur l'ensemble de l'économie. Ainsi les troubles de la digestion expliquent suffisamment ceux de la nutrition qu'annoncent la pâleur et la bouffissure du visage, la mollesse des chairs, l'amaigrissement et l'affaiblissement des forces. Du côté de la respiration on observe parfois une petite toux sèche, très-fatigante et une oppression irrégulière; ce sont des épiphénomènes que nous connaissons déjà comme propres aux affections dyspeptiques, et que les auteurs ont avec tant de raison appelés toux et dyspnée gastriques. Les sympathies qui en déterminent l'apparition sont plus vivement éveillées par les vers que par un simple état morveux ou acrescent. Il en est de même des sympathies qui unissent le tube gastro-intestinal aux centres nerveux et aux organes sensibles par l'intermédiaire du nerf triplanchique. Ainsi entre une céphalalgie très-variable, des vertiges, la tristesse, l'abattement, l'agitation, l'insomnie, la réaction des affections vermineuses sur les centres nerveux s'annonce plus particulièrement par la dilatation de la pupille, le prurit des ailes du nez, les bourdonnements d'oreilles, les grincements de dents, les horripilations, des spasmes divers et une mobilité nerveuse voisine des maladies convulsives. Enfin la fièvre elle-même peut survenir, et ici nous distinguons ce cas de ceux dans lesquels il y a préalablement fièvre muqueuse. La présence des vers peut développer la fièvre, soit par la continuité et la gravité des troubles digestifs, soit par l'intensité et la fréquente reproduction des coliques. C'est cette espèce de fièvre que plusieurs auteurs ont appelée fièvre vermineuse.

Tous les phénomènes que nous venons de décrire peuvent se changer en accidents plus graves. La complication

la plus directement dépendante de la présence des helminthes dans le canal digestif est l'inflammation de sa tunique muqueuse. Celle-ci ne résulte pas seulement de la suractivité circulatoire inséparable de la dyspepsie muqueuse, mais aussi de l'action topique des vers qui, dans certains cas, est très-irritante, à en juger par les coliques si douloureuses qu'elle occasionne. Plus ces douleurs sont intenses, répétées, ou même continues, plus la pléiade sait facilement et ajoute tous ses effets locaux et généraux à ceux de la maladie primitive.

La perforation de l'intestin et la péritonite qui en est la conséquence presque constante, ne sont plus attribuées par la plupart des médecins modernes à la morsure ou à la piqûre de l'intestin par les entozoaires, ainsi que l'admettaient les anciens. La coïncidence de ces accidents avec la présence des vers dans l'intestin ou dans la cavité du péritoine, n'est pas très-rare chez les enfants. Nous en avons déjà recueilli quelques exemples, et dans tous il a été facile d'expliquer la perforation autrement que par la morsure des helminthes. Si cette morsure en était la cause, les ulcérations auraient des caractères particuliers; dans les cas où la péritonite entraîne la mort en très-peu de temps, elles paraîtraient toujours très-récents. Dans tous les cas que nous avons vus, elles s'étaient formées chroniquement et dépendaient des tubercules ramollis et en voie d'élimination.

Cependant quelques médecins de nos jours pensent encore sur ce point comme les anciens, et ne partagent point l'opinion que nous venons de soutenir. Un savant distingué, trop tôt enlevé à la science, Mondière, de Loudun, qui, dans un travail publié en 1838 (1), a étudié de nouveau cette question, pense que les vers sont capables de perforer le tube intestinal par l'action de vrille de leur extrémité pointue, action qui écarte simplement les fibres de l'organe sans les déchirer. « Pour juger, dit-il, combien peut

(1) Dans le journal de médecine *l'Expérience*, voir un extrait dans la *Gazette médicale*, p. 339, 1838.

être grande la force de ces petits animaux, et pour bien saisir le mécanisme que nous cherchons à dévoiler, essayez exactement la surface d'un limbric de terre d'une grosseur assez considérable et encore tout plein de vie ; tenez-le enfermé dans votre main : alors, bien que cette partie soit maintenant exactement fermée, vous sentirez le ver imprimer à sa tête de petits mouvements comme ceux d'une ville, et bientôt vous verrez apparaître au dehors son extrémité antérieure, fortement contractée et ayant la forme d'une pointe acérée et résistante. C'est par un mécanisme semblable, selon nous, et en écartant leurs fibres, que les vers ascarides se font un passage à travers les parois intestinales. On conçoit par là comment des observateurs ont pu trouver dans la cavité abdominale, ou voir en sortir des vers, sans découvrir la plus petite perforation dans toute l'étendue des intestins. En effet, les fibres intestinales, s'étant qu'écartées, doivent revenir sur elles-mêmes en vertu de leur élasticité propre et de leur contractilité, et effacer ainsi les petites ouvertures qui ont donné passage aux vers. »

Mondière a encore appuyé son opinion sur des observations tirées de sa pratique ou des auteurs, dans lesquelles des vers s'étaient pratiqué une issue en dehors au travers d'un abcès dont le pus ne contenait pas de matières fécales, et n'exhalait nullement l'odeur propre aux abcès stercoraux. On est obligé, suivant lui, d'admettre que le ver étant sorti du canal intestinal, les fibres momentanément écartées sont revenues sur elles-mêmes et ont empêché l'épanchement stercoral, ou bien que le ver, après avoir perforé la membrane muqueuse, a rampé entre les deux tuniques et fini par traverser la lame péritonéale dans un point fort éloigné de celui où il avait entamé la membrane muqueuse. Cette seconde hypothèse a paru vérifiée par un fait observé par M. Charcley (1) chez un enfant de neuf ans, qui succomba à une hémorrhagie, résultat de la perforation d'une artériole, que ce médecin attribua à des

(1) *Bronch. des franc. de la Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, 1^{re} séance 1852.

lombrics. » On trouva dans le duodénum une petite ulcération de deux lignes d'étendue, au niveau de laquelle la membrane muqueuse et le tissu sous-jacent paraissaient avoir été détruits par écartement. Dans cet espace étroit, et comme érodé, M. Charcley aperçut une petite artériole blanche, d'un tissu résistant; elle était complètement divisée en travers, et son orifice était béant. »

L'expérience invoquée par Mondière nous paraît mal appliquée, et la conséquence qu'il en a tirée, fautive. En effet, le lombric terrestre a des fibres musculaires bien plus développées que le lombric humain, et dès-lors les contractions qui peuvent chez l'un faire pénétrer son extrémité céphalique à travers le sol résistant, sont trop faibles chez l'autre pour produire un effet analogue. Ensuite, le lombric empoisonné dans la main, quoiqu'il y rencontre une grande résistance, ne pique et n'entame jamais la surface de la peau, il ne peut que s'insinuer dans des espaces clos par des parties simplement contiguës, et cependant il trouve de tout côté un point d'appui solide qui favorise ses mouvements. Dans l'intestin, le lombric peut librement se déplacer par en haut ou par en bas, en suivant le trajet du canal largement ouvert dans ces deux sens; il manque de point d'appui pour se manœuvrer avec force; et son extrémité antérieure doit glisser à la surface de la muqueuse, comme celle du lombric terrestre glisse sur l'épiderme de la main. Nous ne pouvons croire que le passage des vers puisse avoir lieu par un simple écartement des fibres des parois intestinales. Si cela pouvait à la rigueur avoir lieu pour les fibres de la tunique musculaire, évidemment une ouverture capable d'admettre un ver de cinq à six millim. d'épaisseur entraînerait de toute nécessité la déchirure des fibres des tuniques muqueuse, cellulaire et séreuse; dès-lors la déchirure ne pourrait guérir et disparaître que par cicatrisation. Les faits cités par l'auteur à l'appui de son hypothèse sont susceptibles d'une interprétation plus raisonnable connue de tout le monde. Disons seulement que beaucoup de ces prétendus cas de perforation vermineuse se rapportent aux perforations de l'appendice vermiforme

du cœcum dont l'histoire est restée très-obscur jusqu'à ces derniers temps. La cicatrisation de ces perforations et de celles qui siègent dans d'autres parties de l'intestin, peut ne laisser que des traces fort légères et faciles à méconnaître, si l'examen cadavérique n'est pas fait avec tout le soin nécessaire et à une époque peu éloignée de celle où la perforation s'est opérée.

Nous n'admettons pas non plus sans réserve la double conséquence tirée de l'observation de M. Charcley. Pour expliquer le décollement de la muqueuse et l'érosion de l'artère, il n'est pas indispensable d'admettre l'action directe et mécanique du lombric ; ces deux effets ont été observés en l'absence des vers. C'est ainsi que nous avons vu un enfant succomber aux suites d'une ulcération duodénale placée près du pylore et ayant détruit un rameau de l'artère gastro-épiploïque droite. Le décollement de la muqueuse se voit dans beaucoup d'ulcérations douloureuses, tuberculeuses ou autres.

Quel que soit le mécanisme par lequel les vers traversent les voies digestives, on en voit quelquefois s'échapper au dehors par les voies urinaires; d'autres fois ils forment sur un point des parois abdominales, le plus souvent vers le flanc ou l'aîne du côté droit, une tumeur qui peut causer de nombreuses erreurs de diagnostic, mais qui ordinairement présente les caractères d'un abcès plus ou moins aigu. Avant de s'ouvrir au dehors, la tumeur est chez quelques malades le siège d'une sensation particulière. Les uns y éprouvent une espèce de frémissement, y sentent quelques mouvements obscurs et des picotements; mais beaucoup d'autres n'éprouvent rien de semblable, et ce n'est qu'à l'ouverture de l'abcès qu'on reconnaît sa cause et sa nature par l'issue d'un plus ou moins grand nombre de vers. Tantôt cette ouverture devient une fistule stercorale, tantôt elle se cicatrise facilement, sans doute parce que la perforation de l'intestin s'est fermée avant l'ouverture de la tumeur.

La présence des vers peut développer des accidents sympathiques de toute espèce. Il n'est presque aucune des ma-

ladies que comprend le cadre nosologique que l'on n'ait vue produite et entretenue par cette cause. Mais il ne faut point s'exagérer la fréquence des cas de ce genre et croire avec quelques auteurs que les vers sont la cause de la plupart des maladies qui affligent le jeune âge. Les affections les plus ordinaires sur lesquelles l'helminthiasis exerce son influence, sont de simples troubles fonctionnels plus ou moins violents, sans lésion de structure permanente et reconnaissable après la mort; et c'est surtout vers le système nerveux qu'on les voit survenir. Ainsi on voit chez certains enfants la surdité, l'amaurose, des anomalies de la vue et des autres sens, se montrer sous l'influence des vers et se dissiper avec eux. Il en est de même des affections convulsives, de la chorée, de la catalepie, de l'épilepsie elle-même, du trismus et d'autres maladies analogues. Baumes a cité les principaux faits de ce genre racontés par les auteurs; plusieurs de ces observations sont peu détaillées et trop vagues pour être concluantes, mais quelques-unes sont plus positives, et la pratique en fournit assez fréquemment de semblables pour qu'en doive y ajouter foi.

Beaucoup d'auteurs attribuent la production de ces accidents nerveux au passage des helminthes dans des organes autres que ceux où ils ont habituellement leur siège, de l'intestin par exemple dans l'estomac. Quoique cette explication ait été combattue par M. Cruveilhier, elle nous paraît assez fondée, à en juger du moins par un certain nombre de faits dont nous avons été témoin. Sans doute le déplacement des vers n'a pas toujours de fâcheux effets, de même que leur présence longtemps prolongée dans leur siège habituel peut être innocente. Mais nous avons vu aussi des troubles graves ne se déclarer qu'au moment probable de leur migration vers les voies digestives supérieures et cesser lors de leur expulsion par le vomissement. D'ailleurs, dans beaucoup d'autres cas, nous pensons que les coliques vermineuses sont l'origine de ces perturbations. Quand on a occasion d'apprécier leur violence chez les enfants d'un certain âge ou chez des adultes,

on conçoit facilement que chez les très-jeunes enfants le système nerveux en éprouve une atteinte profonde. M. Trousseau pense aussi que les convulsions ne sont pas déterminées par l'action directe des vers sur la muqueuse intestinale, mais bien par les accidents gastriques auxquels peut donner lieu la présence des vers dans le tube digestif.

On a vu aussi quelquefois l'introduction des vers intestinaux dans l'intérieur du foie par le canal cholédoque, donner lieu à des convulsions. Ainsi M. Guersent a observé dans un cas quelques coliques bientôt suivies de convulsions. La mort ayant eu lieu, on trouva à l'ouverture du cadavre, un ver engagé dans l'ouverture cholédoque. L'éclampsie vermineuse ne saurait donc être mise en doute. Il est bon de faire observer qu'elle ne se rencontre guères que vers le milieu de l'enfance comme l'affection vermineuse qui la produit, tandis que l'éclampsie idiopathique ou dépendant d'une autre cause se montre chez les plus jeunes enfants. Cette considération n'est point à négliger pour diagnostiquer la nature du mal et lui opposer les moyens les plus convenables. D'ailleurs les troubles nerveux ne se manifestent pas toujours sous la forme d'éclampsie. Très-souvent ils revêtent l'apparence de la méningite, la simulent et méritent le nom de pseudo-méningite, ensemble de symptômes que nous étudierons plus complètement quand nous discuterons le diagnostic de la méningite.

On a admis que les vers pouvaient causer des phlegmasies, même dans des organes très-éloignés de ceux où abondent les entozoaires ; ainsi on a rapporté des exemples de pneumonie, de pleurésie vermineuse, etc. Nous pensons que ces exemples sont en réalité très-rares, et que plusieurs de ceux qu'on a publiés ont été mal interprétés. Néanmoins nous n'imitons pas les auteurs modernes qui rejettent complètement cette manière de voir. Nous avons parlé à propos de la dyspepsie muqueuse des phlegmasies épiphénoméniques qui se manifestent quelquefois sous son influence, et nous avons franchement admis, entre autres, la pneumonie bilieuse, telle que Stoll l'entendait. Or, comme la maladie vermineuse est presque toujours liée à l'existence

d'un état saburral et diarréique des premières voies, comme souvent elle n'en est en quelque sorte que le plus haut degré, il nous paraît très-rational de considérer comme des épiphénomènes de l'helminthiasis certaines phlegmasies qui se développent pendant qu'elle existe.

On a vu les entozoaires primitivement logés dans l'intestin ou dans l'estomac remonter le long de l'œsophage et s'engager dans les fosses nasales ou dans les voies respiratoires, où leur entrée est devenue rapidement funeste. M. Crèveilhier pense que dans tous les exemples de ce genre fournis par les auteurs, le passage des vers d'un lieu dans un autre n'avait eu lieu qu'après la mort. Nous ne saurions partager cette opinion qui nous paraît trop exclusive et positivement démentie par des faits. C'est ainsi que M. Arrossolin a vu une jeune fille de huit ans, jouissant de la meilleure santé, qui fut prise tout-à-coup et sans cause connue d'une toux qui, en peu d'instants, devint très-forte et continua d'augmenter en s'accompagnant de suffocation, malgré tout ce qu'on put faire pour la calmer. Cet état d'angoisse dura depuis deux heures, et déjà les convulsions commençoient à s'y joindre, lorsqu'à la suite de grands efforts, la petite malade rendit un strongle vivant. Aussitôt la toux cessa complètement (1). M. Blandin, étant interne à l'hôpital des Enfants, recueillit l'observation d'un enfant qui fut étouffé par un énorme ver lombric qui s'était insinué dans la trachée et la bronche droite. M. Tossé (2) a vu un enfant de neuf ans qui fut pris subitement d'une oppression excessive, de cris aigus, de douleur à la partie supérieure de la poitrine, et chez lequel une exploration attentive ne donna que des signes négatifs. Au bout de 12 à 15 heures il mourut. À l'autopsie on trouva un lombric engagé dans le larynx, dont il bouchait la cavité. Il y avait d'autres vers dans l'intestin grêle; les autres organes n'offraient pas d'altération.

L'intensité des troubles locaux et généraux que les vers

(1) *Ann. Chir.*, 1839, t. 5, p. 34.

(2) *Ann. Chir.*, t. 11, p. 252, 1839.

peuvent produire sont extrêmement variables suivant les sujets. Il est des enfants qui évacuent souvent et en grand nombre, des vers lombrics sans paraître malades. On ne peut se rendre compte de ces différences que par le degré également très-variable de l'irritabilité individuelle.

On peut voir d'après ce qui précède combien le diagnostic des affections vermineuses offre de difficultés. Si l'examen des excréments digestives est négatif, si rien ne révèle l'existence des coliques vermineuses, on devra tenir compte de la dilatation de la pupille, de la démangeaison du nez, de l'odeur aigre de l'haleine et des sueurs, de la pâleur du teint et des irrégularités de la digestion; mais ces signes, même par leur réunion, n'ont qu'une valeur secondaire.

Il n'y a aucune différence tranchée entre les symptômes produits par les lombrics, le trichocéphale et le ténia, et si l'on ne trouve aucun vers dans les matières des selles ou des vomissements, la distinction entre ces trois espèces est impossible. On se souviendra seulement que dans l'enfance le ténia est plus rare. Quant à l'ascaride vermiculaire, comme il siège dans le gros intestin et même quelquefois dans les plis de l'extrémité inférieure du rectum, sa présence est plus facile à constater. Il cause de vives démangeaisons à l'anus, qui augmentent le soir et la nuit par la chaleur du lit; ces démangeaisons deviennent parfois assez violentes pour simuler un état névralgique. « M. Cruveilhier rapporte avoir donné des soins à un enfant de neuf à dix ans qui était réveillé toutes les nuits à la même heure par des douleurs intolérables à la région de l'anus; ce malheureux enfant poussait des cris, se compriment le fondement et se traînait dans l'appartement. M. Cruveilhier, croyant d'abord, à cause du caractère périodique de ces douleurs, à une fièvre intermittente, administra le sulfate de quinine, mais sans effet; ayant examiné l'anus, il trouva au fond des plis plusieurs de ces petits animaux qui s'agitaient avec beaucoup de vivacité. Un peu d'onguent mercurel posé sur l'anus pendant plusieurs jours fit dis-

paraître ces animaux et enlève la douleur (1). — Les érections qu'on s'étonne de voir chez de très-jeunes enfants, ne tiennent souvent qu'à l'irritation du rectum produite par les oxyures. Ces vers existent d'ailleurs ordinairement en très-grand nombre dans les matières fécales, et le diagnostic est alors très-facile.

Le diagnostic de la pénétration des helminthes dans les voies aériennes est difficile, car les accidents qui en résultent peuvent être confondus avec ceux déterminés par des corps étrangers venus du dehors, par l'ordène de la glotte, le croup, la laryngite striduleuse. Un examen attentif des symptômes, les commémoratifs surtout, pourront en général faire éviter l'erreur.

Les cas où le praticien est le plus exposé à se tromper, sont ceux dans lesquels les vers s'accompagnent d'accidents sympathiques, sans que des signes directs annoncent leur présence dans le tube alimentaire. Il existe dans les annales de la science un grand nombre d'exemples de ce genre, dans lesquels on n'est arrivé à supposer l'existence des vers que par l'insuccès des moyens dirigés d'abord contre les accidents sympathiques. On ne peut à cet égard faire qu'une seule recommandation au praticien, c'est d'avoir toujours présente à l'esprit, dans les maladies de l'enfance, la possibilité d'une affection vermineuse comme cause d'un trouble quelconque de la santé, de même qu'au début des affections fébriles en général, il faut toujours songer qu'il s'agit peut-être d'une fièvre éruptive, et diriger, en conséquence, soit l'examen des symptômes et des commémoratifs, soit l'usage des moyens thérapeutiques.

Le pronostic est toujours subordonné à la nature des causes plus ou moins aisées à détruire, à l'intensité des symptômes locaux et généraux, à chaque espèce de vers (le ténia est le plus rebelle aux moyens de traitement), et enfin à la gravité des complications. Mais, en général, quand la maladie n'est pas méconnue, une thérapeutique rationnelle conjure tous les dangers.

(1) *Rec. des Méd. de Ind.*, 201, 1801.

Traitement.

La première indication est de faire périr et d'expulser les helminthes, la seconde est de combattre leurs causes locales et générales. Les médicaments anthelminthiques sont pour la plupart à la fois vermifuges et purgatifs, mais il arrive aussi assez souvent qu'ils n'aient que l'une ou l'autre de ces deux propriétés.

Une particularité importante à connaître en pratique, c'est que l'emploi des vernifuges en applications sur la peau peut suffire pour assurer la guérison. Chez les enfants dont le système absorbant cutané est très-actif, ces médicaments, soit en baïns, soit en frictions sur le bas-ventre, sont préférables, lorsqu'une pléguasie de la muqueuse digestive contre-indique leur emploi à l'intérieur. Cette méthode est fort ancienne; renouvelée et appuyée sur des expériences faites il y a quelques années en Italie par Chiarenti, et en France par Alibert, à la Salpêtrière, elle ne doit pas être négligée par les praticiens.

Voici la composition du liniment de Beera, qui s'emploie en frictions sur la région ombilicale : sel de boeuf, savon amygdalin, 4 grammes de chaque. Mêlez et ajoutez; huile de tanaïse, 125 grammes. — Antoine Dubois conseillait le liniment suivant : huile de noix rance, 100 gram., 3 gousses d'ail broyées; alcool camphré, 60 gr.; baume de Fioravanti, 30 gr.; ammoniacque liquide, 4 gr. (Faire le mélange dans un mortier de marbre, et ajouter l'ammoniacque à la fin.) On peut mettre aussi en usage des cataplasmes de sommets de tanaïse, d'absinthe et de mousse de Corse, en ayant le soin de faire bacher menu ces substances ou de les lier avec un peu de farine de lin, ou les arrose avec de l'huile saturée de camphre ou avec quelques gouttes d'huile essentielle de soufre. Enfin quelques praticiens ont obtenu des succès chez de très-jeunes enfants en les faisant placer dans un bain préparé avec l'infusion de mousse de Corse.

Lorsque les anthelminthiques peuvent être donnés par

la bouche, le choix à faire parmi ces médicaments n'est pas indifférent; il doit varier suivant qu'il existe telle ou telle espèce de vers et suivant les conditions spéciales de l'appareil digestif. Contre les lombrices et les trichocéphales on emploie de préférence la mousse de Corse ou *Achillea millefolium*, le *symplocaria*, la tanaisie, la cévadille, la coralline de Corse, l'ail, le calomel, etc. La plupart de ces substances ayant une saveur amère et nauséabonde, il est presque indispensable de la masquer; car sans cette précaution on ne pourrait ordinairement triompher de la répugnance des petits malades. C'est dans ce but qu'on prépare des sirops, des gelées, des tablettes, des pastilles, des chocolats, etc., auxquels on incorpore les vermifuges que nous avons indiqués. Les formules connues ou secrètes de ces divers remèdes sont en nombre infini; un des plus généralement employés, à Lyon surtout, est le sirop de Macors. Quoique la plupart soient assez fidèles, l'usage des anthelminthiques, sous la forme moins agréable de poudres, d'infusions et de décoctions, est préférable quand les enfants ne refusent pas de les avaler. Trop souvent peut-être les pharmaciens se servent pour leurs préparations officinales de formules qui ne sont pas identiques ou qu'ils tiennent à laisser inconnues, et, pour être plus sûr des doses qu'il veut prescrire, le médecin doit formuler lui-même. S'il n'existe aucuns signes d'inflammation des premières voies, et, à plus forte raison, si ceux de l'état saburral sont très-prononcés, il faut employer les anthelminthiques à dose assez élevée pour amener quelques selles, ou choisir parmi ces médicaments ceux dont l'action purgative est plus constante, comme est le calomel, par exemple. La mousse de Corse, qui est l'anthelminthique le plus généralement préféré contre les ascarides, se donne en infusion, à la dose de 2 à 15 grammes, suivant l'âge, pour 100 à 150 grammes d'eau bouillante. On étalcore cette infusion avec du sirop simple ou un sirop aromatique, et l'on y ajoute, comme nous l'avons vu faire avec grand avantage par M. Jadelot, de 5 à 15 grammes de sirop d'éther. Par ce moyen on prévient plus sûrement le vomissement

qui suit quelquefois l'ingestion de la mousse de Corse. On peut aussi, pour diminuer la répugnance que ce médicament inspire à quelques enfants, le faire infuser dans un bol de lait bouillant.

M. Trommea administre souvent les anthelmintiques suivants : il donne d'abord une pastille de 5 centigrammes de calomel ; une heure après le petit malade prend une infusion de 4 grammes de mousse de Corse, sur laquelle on jette 120 grammes de lait bouillant. On attend une heure, après laquelle l'enfant prend une autre pastille de calomel. Il est nécessaire de recourir une seconde et même une troisième fois à ce remède.

L'oxyure résidant habituellement dans le gros intestin, il n'est pas nécessaire de donner les vermifuges par la voie de l'estomac. Il vaut mieux se servir de lavements avec la décoction d'ail, ou avec l'eau froide, l'eau salée, l'eau vinaigrée, des décoctions amères ; on y ajoute de l'huile d'olives ou de ricin, et encore mieux de l'huile euphyreumatique de Chabert à une dose proportionnée à l'âge de l'enfant. Il est cependant utile d'aider l'action de ces lavements par quelques doses de calomel par la bouche. Lorsqu'on rencontre des oxyures dans les plis de l'anus, il faut pratiquer sur cette région des onctions avec l'onguent mercuriel et en introduire une petite quantité dans le rectum avec le doigt, ou avec une mèche qu'on laisse à demeure et qu'on renouvelle au besoin.

Les anthelmintiques les plus efficaces contre le ténia sont l'écorce de racine de grenadier, la racine de fougère mâle, la térébenthine et l'arsenic ; mais le premier et les deux derniers offrent des inconvénients qui doivent en général les faire rejeter, surtout chez les enfants. Ainsi la décoction de racine de grenadier est d'un saveur très-désagréable, et il faut en boire une grande quantité ; la térébenthine inspire à juste titre une extrême répugnance et peut causer des accidents quand elle est prise à haute dose ; enfin l'emploi de l'arsenic n'est jamais sans danger lorsque son administration est confiée à des personnes inattentives ou ignorantes. La racine de fougère mâle mé-

rite la préférence, d'abord parce qu'elle est au moins aussi efficace que les autres médicaments, et ensuite parce qu'elle fournit un extrait éthéré qui, sous un très-petit volume, a autant d'action qu'une masse considérable de poudre ou de décoction. C'est à cette préparation que M. Trousseau donne hautement la préférence. La dose étreit de 5 à 6 grammes chez l'adulte, elle sera de 1 à 5 grammes chez les enfants, suivant l'âge, et voici comment on l'administre. Le petit malade est mis à la diète, on lui donne le matin, à jeun, de 1 à 5 grammes d'extrait éthéré de fougère dans du pain à chanter, dans du sirop ou dans de l'eau sucrée; une heure après, de 10 à 40 grammes de sirop d'éther en une seule fois; et, une demi-heure plus tard, 20 à 60 grammes d'huile de ricin, ou un mélange de calomel et de poudre de jalap, à la dose, le premier, de 25 centigr. à 1 gram., et la seconde, de 50 centigr. à 2 gram. Ces médicaments purgatifs peuvent être suspendus dans un boch blanc ou dans du sirop.

Quelles que soient les complications de l'affection vermineuse, lorsqu'elles sont récentes, et n'ont encore produit aucune altération profonde dans les organes, il est rare que l'expulsion des vers ne les fasse pas disparaître d'une manière aussi prompte que complète. Aussi le plus souvent ne fournissent-elles aucune indication particulière. Toutefois, lorsqu'elles paraissent menacer prochainement la vie par leur persistance ou leur gravité, elles exigent une médication active et appropriée à la nature des cas. Si l'on soupçonne que ces accidents dépendent de la présence des vers dans l'estomac, il faut se hâter de provoquer leur expulsion par le vomissement à l'aide du tartre stibié ou de l'ipéacacanha.

Il ne suffit pas de détruire les vers et d'annihiler leurs effets funestes, si l'on ne fait disparaître les conditions locales ou générales favorables à leur développement. Nous avons dit que très-souvent les entozoaires proviennent d'un état saburral des premières voies. Tant qu'il persiste, les vers ont une grande tendance à se reproduire, et entretiennent à leur tour les phénomènes saburraux. La

réunion de ces deux états morbides nuisant nécessairement et presque toujours d'une manière grave à la perfection des digestions, il en résulte à la longue une véritable cachexie, ou boëllie vermineuse qui peut faire succomber le malade. Il faut donc modifier soit l'état des voies digestives, soit celui de tout l'organisme, par des médications évacuantes, toniques, ou autres dont nous avons plus longuement indiqué l'emploi dans le traitement des diacrisis muqueuses et acéescentes. C'est à une bonne hygiène qu'il faut surtout avoir recours pour rendre à tous les organes la tonicité et l'énergie fonctionnelle qui leur manquent.

On parvient, dit Hufeland, à prévenir la reproduction des vers en fortifiant le canal intestinal par une nourriture tonique, animale, l'usage modéré du vin, beaucoup d'exercice physique, principalement par des préparations ferrugineuses; par exemple, tous les matins, pendant longtemps, une petite quantité d'eau de Pyrmont ou le fer alcoolisé. Il est très-salutaire de faire prendre aux enfants pendant plusieurs mois, en choisissant chaque fois l'époque du déclin de la lune, du semen-contra, et ensuite une dose de racine de jalap.

Nous terminerons en disant que les anciens médecins et quelques-uns de nos jours qui prétendent aussi s'appuyer sur l'expérience, ont recommandé d'entreprendre la cure des vers, surtout du ténia, pendant la lune décroissante ou la nouvelle lune. Rosen a beaucoup insisté sur ce précepte, et M. Wawruch, professeur de clinique à Vienne, affirme, d'après les résultats d'une pratique étendue, qu'il est sage de s'y conformer. Cette conduite paraît peu importante aux pathologistes et aux praticiens français; car la plupart n'en tiennent aucun compte.

CHAPITRE V.

RAMOLLISSMENT DE LA MUQUEUSE GASTRO-INTESTINALE.

On a décrit comme une maladie spéciale le ramollissement de la muqueuse gastro-intestinale et suivant ses divers aspects on a distingué un ramollissement gélatiniforme et un ramollissement blanc. Nous ne pouvons partager cette manière de voir. Le ramollissement est pour nous une simple lésion de tissu, le plus souvent produite après la mort, et qui dans les cas où elle commence pendant la vie, ne se montre jamais que comme la conséquence d'un état morbide antérieur.

M. Cruveilhier a fait l'histoire du ramollissement gélatiniforme chez le nouveau-né, et Billard a donné plusieurs observations qui au premier abord semblent venir à l'appui des idées du professeur de Paris. Malgré ces autorités nous persistons dans notre opinion. On n'a qu'à lire les faits racontés par Billard et l'on verra dans tous l'existence du muguet précéder les symptômes du ramollissement; dans aucun celui-ci ne s'annonce d'emblée chez un sujet bien portant. D'après ces remarques et les résultats de nos propres recherches, il nous semble démontré que ce ramollissement est l'effet tantôt d'une inflammation, tantôt de l'action toute chimique des liquides gastro-intestinaux, action qui peut commencer avant la mort, mais qui s'exerce surtout dans l'intervalle de la mort au moment de l'autopsie.

Lorsque le ramollissement de l'estomac commence pendant la vie et offre une marche rapide et grave, il n'est pas impossible de diagnostiquer cette complication. On remarque une altération profonde et brusque des traits du visage, les yeux sont caves, les joues creuses, le machonnement continué, la langue pâle, le palais sec et très-pen humide, les selles liquides et verdâtres comme une solution de sulfate de fer (Trousseau); l'enfant vomit tout ce qu'on

lui fait prendre, même l'eau sucrée ; le ventre ballonné d'abord, s'affaisse ; puis il survient une émaciation si rapide qu'on reconnaîtrait à peine l'enfant quelques heures après l'avoir vu. En présence de ces symptômes le pronostic est toujours mortel. Les désordres de la muqueuse gastrique sont irréparables, et la chlorification devenant impossible la mort arrive inévitablement.

Le ramollissement blanc nous paraît aussi être sinon constamment cadavérique, au moins toujours consécutif à une autre maladie. Ainsi on l'observe à la suite des phlegmasies chroniques, et surtout à la suite des diacrisés muqueuses et acciéntes chroniques. On sait, en effet, que dans ces maladies les propriétés des liquides gastro-intestinaux sont plus ou moins modifiées, et que, dans certains cas, leur action émolliente sur la muqueuse digestive est incontestable. C'est dans ces maladies, en particulier dans la fièvre muqueuse hectique, qu'on voit au ramollissement se joindre une atrophie considérable du tube digestif. Ses parois sont excessivement pâles et décolorées, les quatre tuniques sont réduites à des couches plus minces qu'une feuille de papier ; la muqueuse macérée par le contact des liquides intestinaux, cède au frottement sans former les plus petits lambeaux, et tombe en débris comme si elle n'était autre chose qu'une coque de mucos.

Nous pensons qu'en définitive, jusqu'à production de nouveaux faits, l'histoire des ramollissements de la muqueuse digestive doit être reléguée dans les traités d'anatomie pathologique pour tous les développements qu'elle comporte. Il suffit de la mentionner, comme nous le faisons, dans notre cadre nosologique.

CHAPITRE VI.

FIÈVRE TYPHOÏDE.

C'est seulement depuis quelques années que la fréquence de la fièvre typhoïde dans l'enfance a cessé d'être mécon-

me. Il est difficile de s'expliquer comment la pathologie infantile est restée sur ce point en arrière de la pathologie générale. D'une part, les auteurs modernes dont les travaux ont le plus avancé l'état de nos connaissances sur la dothinentérie, ayant recueilli leurs observations dans des hôpitaux d'adultes, ont laissé les sujets du premier âge en dehors de leurs recherches. D'autre part, les symptômes de la fièvre typhoïde ayant de l'analogie avec ceux de la méningite, ces deux maladies ont été l'objet de nombreuses méprises, surtout dans les cas de guérison. Il est même arrivé dans quelques-uns où la mort a eu lieu, que l'erreur a été portée jusqu'à méconnaître les traces de la dothinentérie. Des faits de ce genre se rencontrent dans beaucoup de monographies sur les affections cérébrales, et en particulier dans celles de M. Charpentier, de M. Senn, de Genève, sur la *méningite aiguë des enfants*, dans le traité des *maladies de l'encéphale* d'Abercrombie. M. Ruff, lui-même, si familier avec l'étude des maladies de l'enfance, a peut-être encouru un reproche semblable, en publiant dans un journal de médecine (1), une observation qui porte le titre de *méningite suivie de guérison*, bien qu'elle ressemble plus à une fièvre typhoïde qu'à une maladie des méninges. « La diarrhée, le météorisme, la présence du catarrhe pulmonaire, la lenteur de la convalescence, les récidives de la diarrhée auraient dû lui faire porter un autre diagnostic. La première des observations qu'il appelle *affections cérébrales soupçonnées*, offre un exemple de la même erreur. » (Taupin.)

Cependant des investigations exactes et approfondies ne devaient pas tarder à éclairer cette question importante. Dès l'année 1834, le docteur H. Bell écrivit dans sa thèse que la fièvre typhoïde n'est point rare dans l'enfance, et M. Gendron, alors interne à l'hôpital des Enfants, fournissait à M. de Larroque huit observations recueillies dans cet hôpital, que ce médecin inséra dans un travail présenté à l'Académie des Sciences. Dans les revues cliniques pu-

(1) *Archives*, janvier 1855.

liées par Constant, dans la *Gazette Médicale*, pour les années 1833, 34, 35 et 36, on voit plusieurs observations de dysentérie dont le diagnostic avait été positivement porté, et qui prouvent que l'attention était déjà dirigée sur cette maladie. Voici comment M. Littré s'exprimait en 1835 : « Quant aux âges inférieurs, les données ne sont pas encore très-positives ; cependant on en a assez pour savoir que la maladie, encore assez commune vers douze ou treize ans, devient rare au-dessous de dix ans, je crois néanmoins l'avoir observée sur un enfant de vingt-deux mois (1). »

En 1837, M. Bocqueref rassembla dix-huit cas de fièvre typhoïde, dans l'espace de six mois, dans une seule division de l'hôpital des Enfants, et en fit mention dans un mémoire publié en 1839 (2). C'est vers la fin de cette dernière année que parurent les recherches remarquables de M. Tulpin (3), basées sur un ensemble de cent vingt-un cas. Nous devons ensuite mentionner la thèse inaugurale de M. Gilliet et les mémoires publiés collectivement par ce médecin et M. Barthez dans les journaux de médecine. Le docteur Audigane a inséré dans la *Gazette médicale* (4) des observations qui ne manquent pas d'une certaine portée, et tout récemment M. Bricheteau a communiqué à l'Académie de médecine une observation de fièvre typhoïde chez un enfant très-jeune dont nous reparlerons bientôt. Enfin on lit avec intérêt les remarques dont cette maladie a été l'objet de la part de M. Stërber, dans un *revue clinique* (5).

Ce court résumé historique nous prouve que la fièvre typhoïde n'a été véritablement connue chez les enfants que dans ces derniers temps. Nous ne voulons point conclure de là que les auteurs antérieurs à notre époque n'aient ja-

(1) *Ibid.* en 25 vol., art. Dysentérie.

(2) *Ibid.*, août 1839.

(3) *Ann. des em. méd. chir.*, ser. et déb., 1839, et juiv., 1840.

(4) *Ann.* 1841.

(5) *La clinique des maladies des enfants*, de la Faculté de Strasbourg, t. 1, 1841.

mais observé cette maladie dans l'enfance, mais ils l'ont prise le plus souvent pour des affections cérébrales ou pour de simples fièvres muqueuses ou inflammatoires. De là vient qu'ils ont considéré comme rares à cet âge les fièvres qu'ils appelaient malignes, putrides, surmenées, adynamiques, ataxiques, etc., qui, comme on l'a prouvé, rentrent en très-grande partie dans le domaine de la fièvre typhoïde. Cependant Hamilton a donné une description étendue du typhus chez les enfants, et Underwood lui a aussi consacré quelques pages. Mais les descriptions de ces deux auteurs sont fort insuffisantes.

On se fera une idée assez exacte de la fréquence de cette maladie dans l'enfance au moyen des données suivantes qui, sans reposer sur des calculs rigoureux, sont au moins approximatives et suffisantes pour résoudre cette question. Dans l'hôpital des Enfants-malades de Paris, les deux divisions du service des maladies aiguës admettent annuellement quinze cents malades environ; nous évaluons à soixante ou quatre-vingts le nombre des cas de fièvre typhoïde fournis par ce mouvement annuel; c'est-à-dire à un vingtième environ, et nous croyons être plutôt au-dessous qu'au-dessus de la vérité en donnant ce chiffre. Sur un relevé de quatre cent douze malades admis du 1^{er} avril au 1^{er} octobre 1838 dans les salles St-Jean et St-Thomas qui ensemble ne renferment que quarante-cinq lits, nous avons compté vingt-quatre cas de fièvre typhoïde dont plus de vingt n'ont présenté aucune obscurité dans le diagnostic. Dans le cours de trois semestres d'hiver, M. Taupin a rassemblé près de cent observations dans un seul service, c'est-à-dire sur un mouvement qui a été probablement de quatre cents malades à peu près pour chaque semestre, ce qui donnerait, comme on le voit, une proportion encore plus forte que la nôtre. Le mémoire de M. Becquerel dont nous avons déjà parlé, renferme l'analyse de dix-huit faits rassemblés en six mois sur un mouvement de quatre cents malades environ. De 1837 à 1840, c'est-à-dire en trois ans, la Clinique des Maladies des Enfants de Strasbourg a compté vingt-six cas de fièvre typhoïde sur un mouvement

de trois cents malades (1), ce qui donne un cas de fièvre typhoïde sur deux cent malades.

Après avoir établi la grande fréquence de la fièvre typhoïde dans l'enfance, il reste à savoir si elle mérite encore notre attention à un autre titre, c'est-à-dire si elle diffère à cet âge par sa marche, ses symptômes, son pronostic, son diagnostic, ses causes et son traitement. Disons à l'avance que ses différences sont peu essentielles et ses caractères presque en tout les mêmes que dans l'âge adulte. Aussi est-ce principalement parce que la connaissance de cette maladie, chez les jeunes sujets, n'est pas encore très-répandue et, pour ainsi dire, vulgarisée, que nous croyons devoir en donner ici une description à peu près complète.

Anatomie pathologique.

Les lésions anatomiques qu'on rencontre chez les enfants et chez les adultes morts de fièvre typhoïde sont à peu près les mêmes. Les unes sont presque constantes et véritablement caractéristiques, les autres peuvent exister ou manquer, suivant les degrés et les complications de la maladie. Les premières siègent dans les follicules intestinaux et dans les ganglions mésentériques. Elles sont à la fièvre typhoïde ce que les pustules sont à la variole.

Les altérations folliculaires se présentent successivement dans le cours de la maladie à l'état d'éruption, d'ulcération et de cicatrisation. Elles sont à peu près identiques dans les glandes de Brunner et dans les plaques de Peyer. Dans le premier cas, elles se rencontrent dans les différents points du petit et du gros intestin; dans le second, elles sont bornées à l'intestin grêle, occupent son bord libre, et sont de plus en plus prononcées à mesure qu'on s'approche du cæcum. La lésion est rarement limitée aux follicules aguinés, plus rarement encore aux follicules isolés; dans la plupart des cas les uns et les autres sont simultanément affectés.

[1] Staber, ouvrage cité.

Dans la période d'éruption, qui paraît s'étendre jusqu'au dixième jour environ, la lésion de l'appareil folliculaire adonné revêt deux formes qui ordinairement sont réunies chez le même sujet, et qu'on a désignées sous le nom de plaques molles ou réticulées et de plaques dures ou gaufrées. L'aspect des plaques molles est celui qui s'éloigne le moins de l'état normal. En effet elles se présentent comme une espèce de réseau membraneux composé d'un grand nombre de petites mailles laissant entre elles des intervalles déprimés. Le tissu muqueux qui forme le réseau est toujours rampli, et l'est quelquefois à un degré tel qu'il cède à la moindre traction. Ainsi, développement exagéré et ramollissement, voilà ce qui caractérise les plaques molles ou réticulées qui sont bien plus fréquentes dans l'enfance que les plaques dures.

Celles-ci sont en général très-saillantes et font relief par leurs bords au-dessus de la muqueuse; elles résistent au toucher. Si, après une incision perpendiculaire, on examine les bords de la section, on distingue d'abord la muqueuse qui paraît encore saine, au-dessous d'elle une couche épaisse d'un à deux ou trois millimètres, formée d'une matière blanche ou jaunâtre, homogène, ferme, cassante, à coupe lisse et brillante; cette couche enlevée laisse voir la tunique collueuse, la musculuse et enfin la séreuse. Telles sont les plaques dures ou gaufrées qui se distinguent des premières par la présence d'une substance étrangère déposée au-dessous de la muqueuse.

Des altérations analogues se trouvent dans les follicules isolés. Tantôt ils sont dans un simple état de turgescence, tantôt leur cavité paraît remplie par une matière semblable à celle des plaques gaufrées.

La couleur de la muqueuse au niveau des lésions dothinentériques est très-variable, quelquefois tout-à-fait pâle, d'autres fois d'un rouge très-vif, et souvent avec des nuances intermédiaires.

Dans la deuxième période, l'ulcération, qui n'est pas une terminaison nécessaire, mais seulement très-fréquente, de l'engorgement des follicules, s'établit de deux manières

res : 1^o elle commence par la membrane muqueuse qui recouvre les follicules altérés, et s'étend peu à peu en largeur et en profondeur. Quelquefois plusieurs ulcérations se forment simultanément sur la surface d'une plaque, et en se réunissant déterminent un large ulcère ; c'est ce qui a lieu dans les plaques réticulées. 2^o La matière sous-muqueuse des plaques dures se ramollit ou est frappée de gangrène ; elle est éliminée par suppuration, et entraîne avec elle la totalité ou une partie de la muqueuse. Les débris des plaques gangrénées, lorsqu'ils sont colorés par la bile, ont reçu le nom d'eschares jaunes. La matière déposée dans les follicules isolés ressemble souvent à un véritable bourbille dont l'élimination laisse une solution de continuité. Les ulcérations sont généralement ovalaires, allongées au niveau des plaques et arrondies au niveau des follicules isolés. Leur étendue varie ainsi que leur profondeur, le fond pouvant être constitué par la couche celluleuse sous-muqueuse, par la musculeuse, ou même par la séreuse. Enfin dans des cas plus rares, il y a perforation de toutes les tuniques, et si des adhérences ne se sont point préalablement établies, on trouve les matières intestinales épandues dans le péritoine. Les bords de l'ulcère sont tantôt minces, taillés à pic, tantôt épais, arrondis, granuleux, bien organisés ; tantôt adhérents, tantôt décollés ; le fond lui-même, quelle que soit la tunique qui le forme, est lisse, uni, ou granuleux et inégal.

On a dit que chez les enfants la période d'ulcération commence plus tard que chez les adultes. Les observations qui ont conduit M. Taupin et MM. Rillet et Barthex à énoncer cette proposition se sont peut-être pas assez nombreuses pour en démontrer l'exactitude. Car nous citerons plus loin deux cas de perforation survenue aux onzième et treizième jours, qui démentent l'opinion de ces médecins. Nous admettrions plus volontiers avec eux que la cicatrisation marche plus rapidement dans l'enfance qu'aux autres âges.

La période de cicatrisation qui commence environ du quinzième au vingtième jour, s'annonce par le rapproche-

ment et l'effacement des bords de l'ulcération, par l'élévation de son fond qui se remplit de bourgeons très-fins. Quand la cicatrice est plus avancée et terminée, la muqueuse semble à peine avoir été interrompue; cependant à la place des ulcères elle est plus lisse, sans villosités, légèrement déprimée, souvent colorée en rouge foncé; plus tard elle paraît quelquefois plus blanche que dans les parties voisines, et enfin au bout d'un certain temps, c'est à peine si l'on peut reconnaître dans l'intestin les plus légères traces des ulcérations qui ont existé.

Telles sont les lésions anatomiques qui ont fait donner à la maladie le nom de *dothinentérie*; elles présentent une grande analogie avec les éruptions des fièvres éruptives, et surtout avec la variole; car dans toutes ces maladies l'éruption n'est pas toujours en rapport avec l'intensité de la fièvre et des autres accidents. Ceux-ci peuvent être très-violents alors même qu'un petit nombre de follicules isolés ou agglomérés sont malades, absolument comme certaines varièles qui, quoique discrètes, sont très-graves. Enfin, nous pensons avec beaucoup d'auteurs que l'exanthème intestinal peut même complètement manquer dans de véritables fièvres typhoïdes, qui alors sont semblables à ces cas de fièvres varioliques *sine variolis*, de fièvres scarlatineuses et morbillieuses *sine erupitione*. Ainsi la *dothinentérie* serait le caractère anatomique essentiel et fondamental, mais non indispensable, du typhus sporadique. Il est encore une autre restriction à faire, surtout en ce qui concerne les enfants. Les lésions que nous avons décrites, quand elles sont bien caractérisées, appartiennent sans contredit d'une manière exclusive à la fièvre typhoïde; mais dans quelques cas elles sont moins prononcées, on ne trouve point ou presque point d'ulcérations; toutes les plaques malades offrent l'aspect réticulé et point l'aspect gaufré avec matière sous la muqueuse. Dans cet état il est très-difficile de décider par l'inspection cadavérique seule si la lésion dépend d'une fièvre typhoïde; car nous avons déjà dit que les diarrées folliculaires de l'intestin offrent sous ce rapport quelques analogies. Il en est de même de

la scarlatine dans certaines circonstances. Or, c'est en comparant avec soin les symptômes observés pendant la vie avec les lésions trouvées sur le cadavre, et en tenant compte de l'époque à laquelle la mort a eu lieu, qu'on arrivera à déterminer la nature de l'affection. Si, par exemple, un sujet a succombé à une fièvre typhoïde du deuxième ou vingtième jour, on trouvera probablement des ulcérations qui manqueraient s'il y avait fièvre muqueuse ou scarlatine. Mais, il faut bien l'avouer, la distinction n'est pas toujours sans difficulté.

Avec la plupart des pathologistes, nous pensons que les fièvres bilieuses et muqueuses sont différentes du typhus, et cependant nous reconnaissons que dans certains cas il est excessivement difficile, soit pendant la vie, soit même après la mort, d'affirmer sans hésitation qu'on a eu affaire à l'une ou à l'autre de ces deux espèces d'affections. C'est à tort, suivant nous, que la plupart des travaux modernes dont la fièvre typhoïde a été l'objet, ont fait entrer dans son domaine un grand nombre de fièvres ou d'affections qui n'ont avec elle que quelques analogies.

Les ganglions mésentériques présentent des altérations aussi constantes que celles des follicules, et qui diffèrent également suivant les périodes de la maladie. Au début ils sont tuméfiés, colorés en rouge, quelquefois pâles, mais déjà un peu ramollis et flasques. Plus tard le ramollissement est plus évident et dû à une infiltration de matière purulente, blanchâtre ou grisâtre, intimement combinée avec le tissu ganglionnaire. Avec les progrès du mal, cette infiltration devient de plus en plus liquide, mais il est cependant fort rare qu'elle ait tous les caractères d'un véritable abcès. Malgré l'état fort avancé de cette lésion, il est probable que les ganglions peuvent se résoudre et guérir, car ils ne s'ulcèrent et ne crévent jamais ou que fort rarement dans la cavité du péritoine. Généralement les altérations ganglionnaires et celles des follicules se correspondent par leur siège et par le degré auquel elles sont parvenues. Mais il faut dire que dans des cas exceptionnels on voit du pus dans des ganglions qui reçoivent les vaisseaux

lymphatiques provenant de plaques non ulcérées, de même qu'à des ulcérations folliculeuses très-avancées peuvent correspondre des ganglions simplement tuméfiés.

La lésion des ganglions a une grande valeur, car elle paraît exclusive à la dothinérité et manquer dans les fièvres muqueuses, même dans celles de forme grave, qui, sous d'autres rapports, ressemblent tant aux fièvres typhoïdes.

Certaines lésions qui ne sont point aussi pathogénomiques que les précédentes sont encore très-importantes par leur fréquence, ce sont le gonflement de la rate et l'état catarrhal des bronches. Pris à part, ces deux états morbides seraient insignifiants; mais, réunis aux lésions intestinales et ganglionnaires, ils doivent être pris en considération. Le gonflement de la rate s'accompagne ordinairement de ramollissement et d'une coloration très-foncée. Quant au catarrhe bronchique, il se reconnaît ici comme ailleurs aux rougeurs de la muqueuse, à l'aspect puriforme du mucus étendu à sa surface. Dans beaucoup de cas il est d'autant plus prononcé qu'on s'approche davantage des dernières ramifications aériennes, qui alors offrent un certain degré de dilatation.

Nous arrivons enfin aux lésions qui n'ont plus dans la fièvre typhoïde qu'une valeur accessoire ou variable, soit parce qu'elles peuvent manquer et constituent simplement des complications, soit parce que si elles existent, elles n'ont rien de caractéristique ni dans leur siège ni dans leur aspect.

Nous parlerons d'abord de la manqueuse digestive considérée indépendamment de l'état folliculaire. Ce n'est souvent qu'autour des follicules engorgés ou ulcérés qu'elle présente des rougeurs circonscrites et d'autres indices d'un travail inflammatoire plutôt réparateur que désorganisateur. Lorsqu'on rencontre une véritable inflammation diffuse, on est en droit de dire que la dothinérité n'est plus simple, mais compliquée d'une entérite ou d'une gastrite. La gastro-entérite ainsi comprise est loin d'être fréquente. Ce n'est peut-être que dans la première période

de la maladie, époque à laquelle la mort arrive très-rarement, que toute l'étendue de la muqueuse digestive est le siège d'une phlogose générale qui alors n'est encore qu'érythémateuse. Si de ce degré elle passe à celui d'inflammation suppurative ou ulcéreuse, elle devient une véritable complication. C'est de cette manière que se produisent dans quelques cas des ulcérations ordinairement superficielles et peu nombreuses dans le pharynx, l'œsophage et l'estomac, ou des ramollissements de la muqueuse de ces organes. Il est bon de noter que ces complications paraissent moins fréquentes chez les enfants que chez les adultes. Le foie est quelquefois plus volumineux et ramolli; généralement il est sain ou seulement congestionné. Les organes génito-urinaires sont intacts. Enfin le péritoine n'est atteint d'une manière notable que dans les cas de perforation, et présente alors toutes les traces d'une inflammation sur-aiguë.

L'élément catarrhal ou bronchique devient aussi la source de complications qui laissent leurs traces sur le cadavre. C'est ainsi qu'on observe quelquefois des ulcérations à l'entrée ou dans la cavité même du larynx. Dans le poumon on trouve des lésions inflammatoires qui varient beaucoup depuis un simple engorgement jusqu'à l'état d'hépatisation rouge ou grise. Ces pneumonies, considérées au point de vue anatomique, se distinguent des pneumonies franches ordinaires par certains caractères qui les rapprochent des pneumonies lobulaires, tels que la présence de l'élément bronchique ou catarrhal, l'aspect quelquefois disséminé de l'engorgement ou de l'hépatisation, l'absence de limites bien tranchées entre les parties malades et les parties saines dans les cas même où la phlogose paraît de forme lobulaire, etc. Si la forme lobulaire n'est pas aussi prononcée que dans les pneumonies morbilieuses, par exemple, c'est que l'élément bronchique n'en est pas la seule cause prochaine, il s'y joint l'hypostasie sanguine qui agit sur toutes les parties déclives du corps et paraît en des effets les plus essentiellement liés à la nature même de la fièvre typhoïde; cette hypostasie dans le poumon donne une forme diffuse à son inflammation.

C'est dans le système nerveux qu'on trouve le moins de lésions propres à rendre raison des symptômes. Cependant l'existence d'un élément encéphalique dans la fièvre typhoïde est aussi incontestable que celle d'un élément intestinal et d'un élément bronchique. Ici, comme dans beaucoup d'autres maladies, l'anatomie pathologique est inhabile à reconnaître les désordres matériels qui se lient aux dérangements des fonctions nerveuses. En effet, les centres nerveux se présentent le plus souvent dans un état complètement normal; ou bien on n'y constate qu'un peu de piqueté sanguin, ou un ramollissement léger; les méninges sont rarement injectées, la sérosité sous-arachnoïdienne est quelquefois un peu abondante et légèrement opaque ainsi que l'arachnoïde. Il est très-rare que ces lésions arrivent à ce degré qui annonce une véritable inflammation intracranienne. Nous n'ignorons point qu'il existe des observations très-authentiques de méningo-encéphalite développée dans le cours de la fièvre typhoïde; mais des cas de ce genre sont excessivement rares, et dans l'immense majorité des cas, l'état de l'encéphale sur le cadavre ne peut nullement donner la mesure des troubles du sentiment, du mouvement et de l'intelligence qui ont existé pendant la vie.

Les lésions de l'appareil circulatoire ne sont ni constantes ni caractéristiques. Le cœur présente quelquefois un ramollissement notable, et sa membrane interne, ainsi que celle des gros vaisseaux, s'imbibent facilement du sang qu'ils contiennent. Le sang lui-même est souvent noir et diffusible ou formé de caillots petits et sans consistance. Les recherches de MM. Andral et Gavarret ont démontré que la composition du sang est changée par la diminution de la fibrine et du sérum. Ce seul caractère suffirait pour différencier radicalement la fièvre typhoïde des maladies franchement inflammatoires.

CHASSE.

Toutes les époques de l'enfance ne sont pas également disposées à la fièvre typhoïde. Il est prouvé, en effet, que la maladie est très-rare avant l'âge de trois ou quatre ans. Sur près de quarante faits, le malade le plus jeune que nous ayons observé avait déjà trois ans. Sur cent vingt-un cas, M. Tassin n'en a vu que trois chez des enfants de trois ans et un seul sur un enfant de deux ans. Dans le premier mémoire de MM. Billiet et Barthez (1), on trouve un enfant de vingt-deux mois, et deux de deux ans. Dans ces trois cas l'autopsie n'a laissé aucun doute sur la nature de la maladie. M. Laitré a vu aussi la fièvre typhoïde chez un enfant de vingt-deux mois, qui a guéri. Le 26 octobre 1841, M. Bricheteau a montré à l'Académie de médecine les traces de la fièvre typhoïde sur l'intestin d'un enfant à la mamelle, âgé de dix mois. Après avoir indiqué les faits que nous venons de citer nous-même, ce médecin a terminé sa communication par la note suivante : « Le fait que je présente à l'Académie est plus curieux et plus remarquable encore que ceux dont je viens de parler, en ce que l'enfant atteint de dothinentérie était beaucoup plus jeune et que de plus, ce qui est digne de remarque, les lésions caractéristiques de la maladie étaient exemptes de complication. Par conséquent, la maladie a été, chez ce sujet, simple, unique; c'est une raison de croire que la dothinentérie est une affection *sic generis*, comparable à la variole, par exemple, comme l'ont d'ailleurs prétendu plusieurs médecins.

« Pendant une absence momentanée de mon collègue, M. Trouseau, j'observai dans une des salles de nourrices un enfant à la mamelle, de dix mois environ, qui avait depuis longtemps déjà, au dire de sa mère, une diarrhée opiniâtre. Lorsque je l'examinai il y avait de la stupeur, une grande difficulté de respirer, de l'anxiété; le pouls

(1) Arch. gén. de méd., octobre 1840.

était misérable, la peau sèche et chaude. Je lui fis appliquer un vésicatoire sur la partie antérieure de la poitrine; il mourut le lendemain 19 octobre. A l'ouverture du corps, on trouva les quatre caeciques à peu près de l'intestin, à partir du cæcum, parsemés à l'intérieur de plaques de Peyer dont plusieurs avaient jusqu'à quatre centimètres de long. Parmi ces plaques, il y en avait de saillantes, de gonflées; d'autres présentaient des ulcérations de diverses grandeurs. Plusieurs follicules de Brunner étaient également ulcérés. La membrane muqueuse était blanchâtre et parfaitement saine; les ganglions mésentériques étaient tuméfiés et endurcis; les autres viscères abdominaux et ceux de la poitrine n'offraient aucune altération (1). »

Cette observation laisse quelque chose à désirer dans les détails. Le cerveau était-il sain? les lésions intestinales n'étaient-elles point chroniques, puisque les ganglions n'étaient point ramollis? depuis quand durait la maladie? y a-t-il eu des taches rosées lentéculaires? Cependant l'opinion de M. Bricheteau nous paraît fondée et son autorité digne de foi.

L'entérite folliculeuse, telle que Billard l'a décrite chez les enfants à la mamelle, se rapproche beaucoup plus des diarrhées que de la fièvre typhoïde, comme le montre sa quarante-huitième observation. Il est cependant possible que la suivante soit un exemple de fièvre typhoïde, car les glandes de Brunner étaient ulcérées et les plaques l'éussent été sans doute si le malade fût mort trois ou quatre jours plus tard. D'autre part, les symptômes avaient été fort différents de ceux qui accompagnent la simple éruption diarrhéique des follicules. Mais cette observation est relative à un enfant qui était âgé déjà de treize mois, et, sous ce rapport, elle serait moins remarquable que celle de M. Bricheteau.

Bien on a prétendu que la dolébrité pouvait prendre naissance dans le sein de la mère et que des enfants nouveau-nés en pouvaient présenter des traces non équi-

(1) *Annuaire français*, du 28 octobre 1841.

voques. On ne refusera point d'admettre a priori la possibilité de ce fait, si l'on se rappelle qu'il y a de forts nombreux exemples d'enfants venus au monde le corps semé de pustules varioliques, et provenant tantôt de mères affectées de variole au moment des couches, tantôt de mères parfaitement saines. Mais les faits qu'on a cités en faveur des dothinentéries congénitales sont encore peu nombreux. Au mois de novembre 1831, le docteur Mauroni écrivait à l'Académie de médecine qu'il avait trouvé les altérations des follicules caractéristiques de la fièvre typhoïde sur le cadavre d'un enfant né à sept mois de gestation, et mort vingt ou trente minutes après sa naissance. Plusieurs médecins assistaient à l'autopsie et avaient pu vérifier le fait avec lui. On peut aussi consulter sur ce sujet une notice du docteur Charrelly insérée dans les *Archives de Médecine* (1). Elle est relative à deux cas de dothinentérie, observés sur deux enfants morts, l'un au huitième, et l'autre au quinzième jour de vie. Chez le premier, il y avait des ulcérations folliculeuses nombreuses et assez avancées pour que l'auteur ait dû considérer le début de la maladie comme antérieur de plusieurs jours à celui de la naissance. Quant au second, les follicules n'étaient point encore ulcérés et le début paraissait postérieur à la naissance. D'ailleurs, dans ce second cas le muguet existait, et nous sommes porté à penser qu'il n'y avait point là réellement une dothinentérie; car, dans le muguet, l'inflammation occupe quelquefois les follicules sans que pour cela l'affection change de nature. Enfin ce qui doit nous porter à penser que la dothinentérie est très-rare chez le nouveau-né, c'est que M. Valleix paraît n'en avoir recueilli aucune observation dans le cours de ses recherches à l'hôpital des Enfants-trouvés.

D'un à quinze ans la maladie va en augmentant de fréquence en suivant une progression assez régulière. Voici les résultats statistiques que fournissent dans leur ensemble

(1) Septembre 1830.

les faits observés par MM. Taupin, Audigane, Stæber, Baillet et Barthès, et par nous-même.

Sur trois cent onze cas on en trouve :

De 2 à 3 ans.	4		De 2 à 3 ans.	23
— 3 à 4 —	6			
— 4 à 5 —	15		De 5 à 8.	56
			De 8 à 11.	78
			De 11 à 14.	100
			De 14 à 15.	54
			Total.	311

En somme, la maladie augmente de fréquence avec les progrès de l'âge, mais on remarque que les deux périodes moyennes de l'enfance, celles de cinq à huit ans et de huit à onze ans offrent peu de différence entre elles.

La fièvre typhoïde chez l'enfant comme chez l'adulte, paraît un peu plus fréquente chez les garçons que chez les filles. La différence est plus marquée chez les malades qu'on observe à l'hôpital que chez ceux de la pratique particulière. Tiendrait-elle, comme le pense M. Taupin, à ce que les filles sont en général mieux traitées par la famille que les garçons, et à ce que leurs maladies, par cela même moins graves, les conduiraient moins souvent à l'hôpital ? S'il en était ainsi, la différence ne serait qu'apparente. Des données exactes nous manquent pour résoudre cette question d'ailleurs peu importante.

Les diverses espèces de tempérament et de constitution sont indifféremment disposées à la fièvre typhoïde.

L'influence des saisons est sans doute très-grande, mais excessivement variable. Dans telle année c'est le printemps, dans telle autre l'hiver ou l'été qui fournit le plus de cas de fièvre typhoïde. Il n'y a sous ce rapport rien de spécial à l'enfance.

L'étude de la maladie à cet âge porte à penser que l'influence de l'acclimatement et de quelques autres causes hygiéniques n'est pas très-sensible et qu'elle a été proba-

blement engendrée par quelques molécules en ce qui concerne les adultes. Nous ne voulons pas nier que ces causes n'agissent quelquefois comme prédisposantes ou occasionnelles, mais elles sont rarement efficientes. Nos recherches, confirmatives en cela de celles de M. Taupin, nous ont donné des résultats généralement négatifs, sur l'action des affections morales tristes, d'une alimentation vicieuse, des vêtements insuffisants, de la malpropreté, des professions, du refroidissement, de la dentition, de la masturbation, des vers, des suppressions de flux et des maladies de toute espèce. Toutes ces circonstances n'ont pas plus de part à la production de la dothinentérie qu'à celle de la variole et des autres fièvres éruptives. Cependant il est certain que tout ce qui tend à déteriorer la constitution, à appauvrir le sang, à affaiblir les facultés digestives, peut rendre la maladie plus grave.

L'enfance ne fournit pas plus que les autres âges des faits propres à résoudre la question de la contagion. On sait que dans certaines localités, dans les villages et les petites villes par exemple, les faits semblent donner gain de cause aux contagionistes, tandis que dans les grandes villes et surtout dans les hôpitaux, les faits militent en faveur de l'opinion contraire. Nous n'entrerons pas dans ce débat. Nous dirons seulement que chez les cent vingt-un malades observés par M. Taupin, la contagion n'a paru probable que dans cinq ou six cas; qu'elle ne l'a été dans aucun des dix-sept faits observés dans la petite ville d'Anceis sur les bords de la Loire, par M. Auliganne, qui se prononce formellement contre l'opinion contagioniste.

Quant à nous, dans le cours du semestre d'été de 1833 qui nous fournit vingt-quatre cas de fièvre typhoïde, dans une division de l'hôpital des Enfants-malades de Paris, nous avons vu deux malades admis dans la salle Saint-Jean, l'un pour une affection vermineuse, l'autre pour une varicelle, en sortir parfaitement guéris, et rentrer peu de jours après, atteints de fièvre typhoïde. Pendant leur premier séjour, la salle renfermait plusieurs enfants affectés de cette maladie qui étaient couchés dans des lits placés

teul près d'eux. Nous avouerons en passant que nous sommes très-porté à admettre que dans certains cas la maladie soit véritablement par contagion; mais, à coup sûr, cette propriété contagieuse n'est point aussi prononcée que pour les autres fièvres éruptives, et son action n'est point indispensable au développement de l'affection typhoïde.

Symptômes.

Au lieu de décrire par la méthode analytique et avec beaucoup de détails, tous les symptômes de la maladie, comme il conviendrait de le faire dans un traité ordinaire de pathologie, nous nous conformerons à notre plan général, en nous bornant à donner un tableau aussi complet que possible de la fièvre typhoïde dans l'enfance, de sa marche, de sa durée et de sa terminaison; nous insisterons seulement un peu sur les phénomènes les plus importants, sur quelques complications et enfin sur les difficultés de diagnostic.

La maladie s'annonce au début par des prodromes qui ressemblent à ceux des maladies aiguës en général et qui très-souvent offrent la plus grande analogie avec ceux des fièvres éruptives. Les plus remarquables sont : un sentiment de courbature et de lassitude spontanée, des alternatives de frisson et de chaleur, un malaise général, des douleurs vagues, de l'inaptitude au travail physique et intellectuel, de l'insomnie ou de l'agitation pendant le sommeil, de la douleur ou de la pesanteur de tête, de l'anorexie, de la soif, un peu de mal de gorge, quelques dérangements des fonctions digestives, etc. Dans plus de la moitié des cas, chez les enfants, les prodromes durent environ une semaine de jours, mais souvent aussi ils durent beaucoup moins et l'invasion est presque soudaine.

Lorsque tous ces symptômes se produisent davantage, qu'il y a un état fébrile continu marqué surtout par la chaleur permanente de la peau, le malade entre définitivement dans la première période; la maladie est déclarée, elle existe, mais elle n'est encore qu'en voie d'accroissement.

Cette première période correspond à la période d'éruption des fièvres éruptives, surtout à celle de la variole dont elle ne diffère qu'en ce que la fièvre ne tombe point à ce moment. Elle est caractérisée par l'anorexie et la soif de plus en plus prononcées, le mal de gorge, quelquefois des vomissements, l'apparition de la diarrhée, les douleurs abdominales, l'état pâteux de la bouche, la rougeur ou l'aspect saburral de la langue. L'état fébrile est plus ou moins intense, à type continu, quelquefois rémittent. La céphalalgie est plus pénible, sans être très-violente; le malade a des vertiges dès qu'il veut s'asseoir ou se tenir debout; il ne dort pas la nuit, mais éprouve des rêveries et des hallucinations; la face est vultueuse et commence à revêtir un aspect de stupeur et à perdre son expression physiologique. Les mouvements et les réponses offrent déjà une lenteur remarquable. Fréquemment il survient des épistaxis. À mesure que la maladie marche, tous ces symptômes augmentent, la diarrhée persiste, le météorisme abdominal commence à se manifester, le gargaraillement est encore rare; le pouls est développé et fréquent, la peau chaude, brûlante, sèche, très-rarement humectée par la sueur, qui, si elle existe, est passagère. Quelquefois l'éruption rosée lentriculaire paraît dès cette période ainsi que le délire; la toux et les râles annoncent le catarrhe bronchique; l'urine, peu abondante, est d'un rouge foncé. La mort est très-rare pendant cette période qui dure environ un septénaire.

Dans la seconde période, dite d'état, la céphalalgie disparaît ou n'est plus accrue par les malades. Mais tous les autres accidents qui dépendent de l'élément nerveux augmentent d'intensité. C'est ainsi qu'à un état général de prostration et d'adynamie, s'ajoutent la stupeur profonde du faciès, l'assoupissement alternant avec le délire et diminuant, le premier pendant le jour, le second pendant la nuit; les sens deviennent obtus, l'ouïe est dure ou même abolie; l'articulation des sons est difficile, les forces musculaires sont épuisées, le malade reste constamment couché sur le dos, la vessie elle-même se paralyse, il y a

des soulèvements de tendons, des mouvements convulsifs, de la carphologie, quelquefois le délire est bruyant, il y a des cris, de l'agitation, en un mot de l'ataxie qui alterne avec l'adynamie et l'assoupissement. Au milieu de tous ces accidents la diarrhée continue, les selles plus ou moins abondantes deviennent souvent involontaires et imperçues, la bouche se sèche ainsi que la langue et les lèvres, et toutes ces parties se couvrent de fuliginosités. La déglutition peut aussi être gênée, soit par une dysphagie nerveuse, soit par une inflammation de la gorge et de l'épiglotte; le malade boit avec une certaine avidité; l'abdomen toujours chaud se météorise, la douleur y est obscure, le gargouillement y est plus évident, surtout dans la région cœcale. La toux et la dyspnée deviennent parfois considérables, bien que les signes physiques n'annoncent qu'un état catarrhal des bronches; le pouls reste fréquent, mais commence à perdre de sa force et de son développement, la peau est toujours sèche et chaude. C'est au commencement de cette période qu'apparaissent les taches rosées lenticaulaires; un peu plus tard se montrent les sudamina, quelquefois les pétéchies et les végétures bleuâtres de la peau. Enfin c'est alors qu'on voit aussi se former déjà quelques eschares au sacrum et sur les points du corps qui sont déclives et soumis à un certain degré de compression.

La troisième période diffère suivant que la maladie doit avoir une terminaison heureuse ou malheureuse; dans ce dernier cas l'assoupissement se change en coma, les soulèvements de tendons deviennent continus, toutes les fonctions intellectuelles s'anéantissent, les sens sont presque éteints; le pouls devient faible, petit, misérable et d'une fréquence extrême, la peau perd sa chaleur et reste aride ou se couvre de sueurs froides et visqueuses; il y a souvent incontinence complète des matières fécales et incontinence d'urine par regorgement, les eschares s'agrandissent, le marasme arrive, le faciès devient hippocratique, enfin la respiration s'embarrasse par défaut d'innervation dans le système locomoteur de la poitrine, elle devient stertoreuse et le malade succombe.

La tendance de la maladie vers une terminaison heureuse s'annonce par la diminution de tous les symptômes, qui est ordinairement lente et graduelle et qui n'est un peu prompte que lorsqu'il survient des phénomènes critiques. Le coma et l'assoupissement se dissipent, la face reprend un peu d'expression, le regard s'anime, l'ouïe devient moins dure, on voit que l'exercice des sens se rétablit le premier; bientôt le malade recouvre la parole, et s'il rend ses idées avec lenteur, on reconnaît qu'au moins il ne déraisonne plus; les forces musculaires se rétablissent moins vite, mais cette faiblesse n'est plus semblable à l'adynamie primitive, elle paraît résulter simplement d'un épuisement et non d'une perturbation de l'innervation. La fièvre fléchit, la peau devient fraîche et humide; la respiration est naturelle et la toux disparaît; enfin la langue et la bouche s'humectent, le météorisme et la chaleur de l'abdomen se dissipent en même temps que les selles redeviennent volontaires diminuent d'abondance, de fécondité et se suspendent enfin. Bientôt le retour de l'appétit annonce que la convalescence est décidée. Mais elle n'est pas toujours franche, et souvent elle est arrêtée par de nouveaux accidents. Les indigestions par imprudence sont très-communes lorsque l'appétit revient rapidement; elles ramènent la diarrhée qui quelquefois ne cède plus à aucun moyen et fait périr le malade. D'autres individus ne peuvent manger même modérément sans être repris de diarrhée ou de fièvre, et sont obligés de faire diète encore pendant quelque temps. Chez d'autres malades, au contraire, la prolongation de la diète retarde la convalescence. On observe assez souvent l'œdème des membres inférieurs, phénomène peu important et fréquent dans beaucoup d'autres maladies. Quelquefois, malgré la disparition de tous les autres symptômes, il survient une espèce de manie ou de dérangement des facultés intellectuelles, mais ces accidents cèdent ordinairement à mesure que les forces se rétablissent. Enfin la chute des cheveux est très-fréquente pendant la convalescence.

Quelquefois, comme nous l'avons dit, l'amélioration

coïncide avec l'apparition de quelques symptômes nouveaux que pour cela on considère comme critiques. Ainsi la diarrhée paraît telle dans certains cas rares d'ailleurs, où la constipation est maintenue pendant les deux premières périodes; des sueurs abondantes, des pollutions, l'éolorrhée, des paralysies, des abcès, etc., coïncident assez souvent avec le déclin de la maladie, et les anciens n'hésitaient pas à les regarder comme de véritables crises.

Il est évident que le tableau que nous avons tracé ne s'applique pas à tous les faits, mais principalement à ceux dans lesquels la maladie offre une certaine intensité sans cesser toutefois d'être simple. D'une part, il est des cas de dithinenterie légère dans lesquels l'exanthème intestinal étant peu étendu, les troubles digestifs sont peu intenses et les symptômes généraux à peine apparents. Alors on ne constate guère que quelques-uns des prodromes et des symptômes de la première période, et une fois l'éruption achevée dans l'intestin, soit que les plaques s'altèrent ou non, leur guérison se fait sans entretenir des troubles notables dans l'économie. Les exemples de ce genre sont mis hors de doute par un accident terrible qui arrive quelquefois, nous voulons parler de la perforation suivie de péritonite sur-aiguë. L'autopsie fait reconnaître l'existence réelle d'une dithinenterie dont le diagnostic a pu être douteux pendant la vie. Nous en citerons plus loin deux exemples remarquables. D'autre part, on comprend que les complications très-nombreuses dont la fièvre typhoïde s'accompagne souvent, impriment à sa marche d'importantes modifications que nous serons connaître après avoir étudié ce que les principaux symptômes offrent de spécial chez les enfants.

Du côté de l'appareil digestif, il y a une gêne de la déglutition plus grande, avec saux convulsives et rejet des liquides par les narines; cette dysphagie est d'ordinaire purement nerveuse et ne se montre que dans les cas graves. Les vomissements sont bien plus fréquents au début chez l'enfant que chez l'adulte; ils se sont montrés dans la proportion de plus d'un tiers des cas à M. Taupin (45 sur 134);

M. Audiganne les a trouvés chez cinq malades sur dix-sept, et nous-même les avons constatés chez dix malades sur vingt-quatre. La diarrhée est à peu près constante dans le cours de l'affection; mais au début elle est plus souvent remplacée par de la constipation chez l'enfant que chez l'adulte. Cela arrive dans la proportion d'un quart des cas en général, d'après les observations de MM. Taupin, Audiganne et d'après les nôtres. Plus souvent aussi qu'aux autres âges, la diarrhée se suspend et reparait à plusieurs reprises dans le cours de la maladie. Rarement elle est presque continuelle comme chez quelques adultes. Elle est ordinairement formée par des matières fétides, tantôt jaunes, tantôt brunes, tantôt verdâtres; enfin, dans les cas les plus graves, les selles sont involontaires (dans un cinquième ou un sixième des cas). Le degré de l'impuissance où est le malade de retenir ses excréments est utile à apprécier, parce qu'il donne la mesure de l'état de ses forces et de ses facultés cérébrales (Taupin). Très-rarement les selles sont sanguinolentes. Généralement chez les enfants le météorisme, les douleurs abdominales, surtout au début, le gargouillement et le gonflement de la rate sont très-prononcés et ne manquent presque jamais.

La rétention d'urine est peu commune chez eux, ou si l'urine s'accumule dans la vessie, elle ne le fait presque jamais en très-grande quantité, et s'écoule bientôt par regorgement. Aussi le cathétérisme est-il très-rarement nécessaire.

Le catarrhe bronchique et tous les symptômes qui s'y rattachent manquent très-rarement; quelques cas légers semblent seuls s'y soustraire. La toux, la dyspnée et les mêmes râles que chez l'adulte le caractérisent; mais l'expectoration est plus rare, et c'est aux signes physiques qu'il faut accorder le plus de valeur; car la toux et surtout la dyspnée peuvent se montrer à certaines périodes de la maladie, sans qu'il y ait un état catarrhal notable. Ces phénomènes, comme beaucoup d'autres, peuvent résulter d'un simple trouble de l'innervation. Le catarrhe bronchique n'a manqué que quatre fois sur cent vingt-un faits ob-

servés par M. Taspin, et trois fois sur vingt-quatre cas observés par nous.

Il n'y a pas de grandes différences entre l'état fébrile chez les enfants et chez les adultes. Il y en a peut-être davantage par rapport aux symptômes provenant des centres nerveux. La céphalalgie est à peu près constante, aussi bien que les vertiges, la somnolence, le délire, etc., dans tous les cas d'une certaine intensité. Mais nous avons remarqué toutefois, ainsi que l'avait déjà fait M. Billiet, que l'assoupissement n'est pas d'ordinaire aussi profond qu'il le paraît. C'est une somnolence dont on tire plus facilement les enfants que les adultes. Il y a souvent des secousses dans les tendons, d'autres fois des convulsions toniques dans diverses parties; plus rarement de la carphologie, des grincements de dents et des emblemmements. L'adynamie est chez beaucoup de malades plus apparente que réelle, ou du moins, dès que la convalescence survient, les forces se relèvent plus rapidement. En somme, « il est digne de remarque, comme le dit avec raison M. Stieher, qu'à un âge où le système nerveux est si impressionnable, où non seulement les maladies graves, mais quelquefois de simples indispositions s'accompagnent de mouvements convulsifs, les symptômes nerveux de l'affection typhoïde soient moins intéressés que chez l'adulte (1). »

Un symptôme beaucoup plus rare chez les enfants que chez les adultes, c'est l'épistaxis. M. Taspin ne l'a vue que six fois au début ou dans le cours de la maladie. Peut-être a-t-elle été quelquefois méconnue, faute de renseignements certains sur l'état des malades antérieurement à leur entrée à l'hôpital, car M. Audigant l'a constatée dix fois sur dix-sept malades, et nous-même l'avons rencontrée chez huit malades sur vingt-quatre.

Presque constamment on rencontre chez les enfants l'éruption de taches roses lenticulaires et de subaiguës en grand nombre. Dans certains cas, les taches lenticulaires n'existent que dans la région dorsale ou sur les membres,

(1) *Ouvrage cité*, p. 9.

et, si l'examen du malade n'est pas bien complet ou ne se fait pas tous les jours, on peut croire à tort à l'absence de ce symptôme qui est un des plus importants comme signe de la maladie. Nous pensons que cette particularité a induit en erreur les médecins qui ont avancé que les taches rosées étaient plus rares chez les enfants. Quelques éruptions anormales, soit érythémateuses ou vésiculeuses, soit hémorrhagiques, ne nous ont point paru plus communes que chez les adultes.

Si, avec M. Chomel, on admet, dans la fièvre typhoïde, les formes inflammatoire, bilieuse, muqueuse, nerveuse, adynamique, on sera conduit à dire que, chez l'enfant, la forme bilieuse est très-rare, et les formes inflammatoire et muqueuse plus fréquentes que les autres. La division anatomique admise par M. Laitré, si elle n'est pas préférable au fond, est au moins d'une application plus facile. Ainsi, avec ce médecin, on peut admettre les formes abdominale, thoracique et cérébrale, suivant que les symptômes prédominants proviennent des organes de l'abdomen, de la poitrine ou de la tête. Or, chez les enfants, ces trois formes, en tant qu'exclusives, sont très-rares; le plus souvent les organes des trois cavités splanchniques paraissent affectés à peu près au même degré, et la forme la plus fréquente est une forme mixte ou triplaseuchique par suite d'une espèce d'équilibre entre les trois principaux éléments de la maladie. Ainsi dans l'enfance la dathysentérie se présente souvent sous son type le plus complet.

Complications.

Nous arrivons enfin à l'histoire des complications. Elles sont plus rares dans l'enfance. Plusieurs n'ont que fort peu de connexions avec la fièvre typhoïde et se rencontrent de préférence dans les hôpitaux, parce que les malades y sont, pendant leur convalescence, plus exposés à éprouver des rechutes, ou de nouvelles maladies qui alors sont plutôt de simples coïncidences que de véritables complications. Les seules dont nous devons parler ici sont les hémorrhagies

intestinales, un excès d'inflammation du tube digestif, la perforation de l'intestin suivie de péritonite, la pneumonie, les eschares, l'érysipèle et les abcès.

Les hémorrhagies intestinales sont excessivement rares chez les enfants. Sur près de deux cents faits que nous avons compulsés, l'hémorrhagie a été remarquée dans un seul.

L'excès d'inflammation gastro-intestinale nous a paru au contraire plus fréquent chez les enfants que chez les adultes. Il se révèle par la fréquence des vomissements, l'intensité des douleurs épigastriques ou abdominales, le météorisme, la tension et la chaleur de l'abdomen, qui existent alors à un degré très-prononcé. Cet excès de phlogose est important à considérer en pratique.

M. Forget, de Strasbourg, en additionnant les faits observés par MM. Bretonneau, Chenuel, Montault et par lui-même, établit que la perforation intestinale se montre une fois sur dix cas de mort. Or on ne peut pas encore décider si cet accident offre une fréquence différente dans l'enfance. Sur vingt-un décès fournis par cent vingt-un malades, M. Taupin l'a rencontré deux fois, tandis que sur une série de vingt-quatre malades, dont trois ont succombé, nous l'avons vu deux fois. Mais en cela le hasard nous a servi d'une manière particulière. Quelques faits de perforation chez les enfants ont été vus par d'autres auteurs; mais comme on n'a point indiqué le nombre des cas de mort qui ont fourni ces exemples, il est impossible d'en tirer parti. Ainsi la question de la fréquence relative des perforations dothintériques dans l'enfance et aux autres âges reste indécise. Quant aux symptômes et à la marche de cette complication, les deux cas que nous avons observés ont offert la plus grande analogie. Des deux malades, l'un avait quatorze ans, l'autre n'en avait que cinq; c'est l'histoire de ce dernier que nous allons donner.

22^e Cas. — *Symptômes d'une dothiencérie très-légère chez un enfant de cinq ans non acclimaté; invasion d'une péritonite*

sar-signé vers le onzième jour ; mort le lendemain. — L'enfant, âgé de cinq ans et demi, né à Orléans, arrivé à Paris depuis six semaines, est admis à l'hôpital des Enfants le 19 août 1838.

Les parents racontent que cet enfant couchait dans une chambre habitée en même temps par quatre autres personnes. Il y a dix jours qu'il commença à éprouver de la céphalalgie, du malaise, quelques épistaxis, un peu de fièvre et de la diarrhée. Ces accidents n'ont point cependant forcé l'enfant de rester au lit; après quelques jours, la chaleur de la poitrine semblait aller en augmentant et la diarrhée persistait; il y avait à peu près tous les jours trois ou quatre selles. C'est depuis hier qu'a eu lieu une aggravation inattendue qui s'est manifestée par des coliques graduellement et non par tout-à-coup très-intenses. Le ventre est devenu ballonné, excessivement douloureux, les selles plus nombreuses; le malade a vomé et a été repris d'épistaxis; une fièvre très-intense s'est établie.

L'état dans lequel nous trouvons cet enfant à six heures du soir, peu après son entrée, est excessivement grave, car il a tous les symptômes d'une péritonite sur-aiguë; déjà les membres sont couverts d'une sueur froide, pouls très-fréquent et très-petit, respiration très-accelérée, vomissements, douleur excessive et météorisme de l'abdomen, etc.

On prescrit des sinapismes multipliés sur les membres, huit sangsues sur l'abdomen, dont on modérera l'écoulement suivant son effet sur la circulation et l'état général des forces; opium à haute dose (une cuillerée à café de sirop d'opium toutes les heures) jusqu'à production du narcotisme.

La mort arrive la nuit suivante, à cinq heures du matin.

Ouverture du cadavre (30 heures après la mort.) — *Péritonite générale récente, perforation de l'intestin grêle dans le voisinage du cœcum, glandes de Brunner tuméfiées, plaques de Peyer gonflées et ulcérées en petit nombre. Gonflement des ganglions mésentériques et de la rate, etc.* — A l'ouverture de l'abdomen, issue de gaz et de pus; péritonite générale. Fausses membranes à la surface du péritoine, unissant les

meux intestinales; les uns sont en voie d'organisation, les autres molles et semblables à un pus très-épais. Accumulation de pus entre les circonvolutions. Réseau capillaire sanguin très-développé au dessous de la séreuse. Épanchement abondant dans le petit bassin, d'un liquide purulent, fœfo-brun et coloré en jaune. L'air insufflé par le diodésum sort d'une anse du petit intestin, plongée dans le bassin et distante de quinze à vingt centimètres du cœcum, par une perforation arrondie, large de deux millimètres, et entourée par une fausse membrane en forme de bordure. L'intestin contient beaucoup de gaz et un liquide abondant, jaune clair, sans mélange de matières solides. La muqueuse gastrique est saine ainsi que celle des intestins, mais les glandes de Brunner sont très-développées sous la forme de petites saillies arrondies, pâles, noires et déprimées au centre; aucune d'elles ne paraît ulcérée. À partir d'un mètre environ au dessus du cœcum et en descendant, les glandes de Peyer présentent un développement de plus en plus marqué, un bel aspect réticulé, avec des points noirâtres au centre de chaque saillie partielle. Elles sont en général peu injectées, peu ramollies et, en somme, peu malades. Mais l'une d'elles qui correspond à la perforation présente une ulcération ovale déjà en voie de cicatrisation, comme l'indiquent ses bords épais, arrondis et rapprochés par leur franchement parallèle à la longueur de l'intestin. Le fond de l'ulcère est formé par la tunique musculeuse, et dans son milieu se voit la perforation arrondie, coupée à pic, déjà indiquée. Dans le voisinage trois autres plaques sont ulcérées; à leur niveau la muqueuse est détruite dans presque toute son épaisseur. Aucune plaques ne présentent l'aspect des plaques dures. Rien à noter dans le gros intestin.

Trois ou quatre ganglions mésentériques sont tuméfiés, totalement ramollis et de couleur grisâtre. La rate est plus volumineuse qu'à l'état normal; son parenchyme de couleur noirâtre tombe en débris à la moindre pression.

Rien de remarquable dans la poitrine ni dans la tête.

Le second cas que nous avons observé ne diffère du pré-

cèdent qu'en ce que les prodromes et les symptômes de la première période avaient été assez prononcés pour décider l'entrée du malade à l'hôpital. Après deux ou trois jours d'une médication expectante, il allait mieux, n'avait plus de fièvre, mangeait et ne gardait plus le lit. C'est le treizième jour que survint la perforation. La péritonite ne débuta pas très-brusquement, mais les accidents s'accroissaient peu à peu, et enfin la mort arriva au bout de quarante-huit heures. Des altérations presque en tout semblables à celles de l'observation précédente furent remarquées sur le cadavre.

Ces deux faits prouvent : 1^o que chez les enfants comme chez les adultes, il existe des dothiéntéries fort légères sans ou presque sans symptômes généraux analogues à ces variétés discrètes qui sont à peine fébriles ; 2^o que la perforation intestinale survient aussi bien et peut-être de préférence dans ces cas peu graves ; 3^o que la péritonite qui en résulte n'est pas toujours foudroyante dans son invasion, ce qui peut tenir à ce que l'épanchement se fait en petite quantité et seulement dans l'excavation du bassin. Enfin l'inspection cadavérique nous a laissé croire que c'est à la rupture des adhérences formées sur le point correspondant à l'ulcération, et non à l'absence de ces adhérences, qu'il fallait attribuer l'ouverture de l'intestin dans le péritoine ; et peut-être l'accident se rattachait-il jusqu'à un certain point à ce que le travail phlogémasique, inséparable des ulcérations dothiéntériques, n'avait pas été assez intense pour créer des obstacles à l'épanchement intestinal par la formation d'adhérences bien organisées.

La pneumonie n'est pas une complication très-rare chez les enfants. Elle résulte à la fois de l'exagération ou de la transformation de l'élément catarrhal et de l'hypostase sanguine dans les parties déclives du poumon. Aussi a-t-elle la forme lobaire et lobulaire simultanément ou isolément, suivant que l'une ou l'autre de ces deux causes prédomine. D'après les résultats de notre observation, la pneumonie s'arrête le plus souvent au premier degré, c'est-à-dire à l'engorgement ; car sur vingt-quatre faits, nous n'avons

constatés les signes positifs de l'hépatisation qu'une seule fois. Cependant M. Taupin paraît l'avoir observée dans un système des cas entiers. Il y a de très-grandes différences dans la fréquence de la pneumonie entre certaines années et certaines saisons, de sorte qu'on ne peut pas conclure d'une catégorie de faits à une autre catégorie rassemblée dans des lieux et à des époques qui ne sont pas les mêmes.

Les érysipèles, les eschares, les abcès, les parotides, sont des complications qui n'offrent rien de spécial aux enfants, si ce n'est qu'elles sont peut-être plus rares que chez les adultes, surtout les eschares.

Il faut en dire autant d'une foule d'autres maladies qui sont plutôt des coïncidences que des complications de la fièvre typhoïde, et qui ne sont modifiées d'une manière spéciale dans leur marche qu'en ce qu'elles surprennent l'économie déjà affaiblie par une maladie antérieure, et qu'elles en deviennent nécessairement plus graves. Il suffit de citer ici comme assez fréquentes chez les enfants, surtout à l'hôpital, les fièvres éruptives, rougeole, scarlatine, varicelle. Plus rarement on observe le croup, la méningite, etc.

Diagnostic.

Le diagnostic de la fièvre typhoïde présente chez les enfants les mêmes difficultés que chez les adultes, et il faut bien reconnaître que ces difficultés sont grandes dans quelques cas. Le praticien est plus rarement embarrassé dans les fièvres typhoïdes bien complètes et de forme mixte. Nous entendons par là celles dans lesquelles l'élément abdominal, l'élément bronchique ou catarrhal et l'élément cérébral révèlent leur présence simultanée par des symptômes bien tranchés, et dans lesquelles les éruptions cutanées, la fièvre, les épistaxis et autres dérangements vers les organes des sens ne font pas défaut. Mais on conçoit que la prédominance ou la manifestation presque exclusive de l'un ou de l'autre de ces éléments, puisse faire croire à l'existence d'autres maladies, telles que la gastro-entérite,

le catarrhe ou l'inflammation des bronches et du poulmon, la méningite, etc. C'est surtout au début que les fièvres typhoïdes peuvent être confondues avec quelqu'une de ces affections, mais plus tard elles ne peuvent guères l'être, lorsqu'elles sont intenses, qu'avec les fièvres bilieuses ou miasmiques graves ou avec la méningite. Si au contraire elles sont légères pendant toute leur durée, et que l'affection se réduise à n'être qu'une dothinentérie, c'est-à-dire une entérite folliculaire peu étendue, on comprend qu'il est bien aisé de la confondre avec certaines formes d'entérite ou de diarrhée. Dans certains cas malheureusement encore trop fréquents, l'invasion plus ou moins subite d'une périlonte très-aiguë qu'on ne peut attribuer qu'à une perforation spontanée, vient fournir au praticien les éléments d'un diagnostic plus sûr et plus précis, mais presque toujours inutile.

Nous ne pouvons point nous étendre longuement sur l'examen de toutes les questions qui soulèvent le diagnostic différentiel de la fièvre typhoïde. Ces détails appartiennent à son histoire en général et se trouvent infiniment mieux décrits que nous ne pourrions le faire ici, dans les excellents ouvrages de M^l. Louis, Andral, Chamel, Bouillaud, Forget, etc. Le seul point qui mérite à notre avis un examen spécial chez les enfants, c'est l'étude des caractères distinctifs de la méningite et de la fièvre typhoïde. Ces deux maladies offrent une fréquence presque égale dans l'enfance; il faut même avouer que beaucoup de praticiens sont plus disposés à admettre la méningite que la fièvre typhoïde lorsqu'il y a obscurité dans le diagnostic. Nous avons déjà dans notre historique insisté sur cette cause d'erreur qui a si souvent fait confondre ces deux maladies par les auteurs antérieurs à notre époque. Il est donc important de fixer l'attention des praticiens sur ce point qui offre d'autant plus de difficultés que les enfants sont plus jeunes. Nous avons eu occasion d'observer un cas de fièvre typhoïde dont le diagnostic présentait assez d'obscurité due à la prédominance des accidents cérébraux, pour que l'habile praticien qui soignait cet enfant ait cru devoir

admettre une méningite et diriger le traitement suivant cette manière de voir. Comme il s'agit d'un cas remarquable par l'âge de l'enfant, nous allons en reproduire l'observation que nous devons à M. le docteur J. Bomet, alors interne à la Charité de Lyon, qui avait eu l'obligeance de nous montrer le petit malade peu de temps avant sa mort et qui nous rendit témoin de l'ouverture du cadavre.

23^e ans. — *Enfant de trois ans; chute sur la tête qui coïncide avec l'apparition de quelques symptômes généraux d'abord peu graves; accidents intestinaux et cérébraux de plus en plus intenses, mouvements convulsifs, coma, etc.; diarrhée persistante. Calomel et vésicatoires. Mort le vingtième jour.* — Le nommé Bertrand, âgé de trois ans, bien constitué, demeurant à Lyon, est admis le 10 novembre 1831 dans la salle des enfants malades de l'hospice de la Charité.

Cet enfant est malade depuis une huitaine de jours, à la suite d'une chute sur la tête d'ailleurs peu violente, il a eu du malaise et un peu de tristesse. Depuis trois jours seulement il a gardé le lit et présenté comme symptômes principaux, de l'anorexie, de la soif, de la diarrhée, une chaleur sèche de la peau, des cris aigus et fréquents, de l'insomnie et de l'agitation, quelques mouvements convulsifs dans les yeux et dans les membres et de la céphalalgie indiquée par les cris et par l'action de porter la main à la tête. Un médecin qui a vu le malade en ville a admis une méningite, et a prescrit deux vésicatoires aux calases et le calomel à l'intérieur.

Le jour de l'entrée du malade on constate de l'assoupissement et de la stupeur; la conjonctive est injectée; pupilles normales; face colorée; peau chaude, pouls fréquent; ventre tendu et douloureux à la pression; langue rouge et sèche, soif, etc. — Calomel; vésicatoire sur le sommet de la tête.

Jusqu'au 27 novembre, jour de la mort, la diarrhée persiste, le ventre reste constamment tendu et douloureux, la langue rouge et sèche; les lèvres deviennent blâgneuses vers les derniers jours; le pouls présente d'un jour à l'autre et même plusieurs fois dans la même journée une

fréquence variable, mais toujours plus grande qu'à l'état normal. D'un autre côté, il y a eu des accidents cérébraux fort graves. Du huitième au douzième jour de la maladie, l'agitation, le délire, les cris, quelques mouvements convulsifs dans les membres alternent avec l'assoupissement et le coma; le mâchonnement est presque continu. Du douzième au seizième jour l'adynamie et le coma se prononcent davantage, cris et mouvements convulsifs très-rare; la vue et l'ouïe semblent abolies; la respiration devient plus fréquente, mais on n'ausculte pas; il y a peu de toux; la faiblesse est extrême et l'amaigrissement très-prononcé; les cornées transparentes s'obscurcissent, et un écoulement abondant de mucons et de larmes excorïe la joue. Les jours suivants l'agitation reparaît; il survient des contractures et des secousses convulsives dans les membres supérieurs principalement; mâchonnements; cris plaintifs; faiblesse et maigreur extrêmes; enfin état comateux; mort le vingtième jour de la maladie.

Ouverture du cadavre. — 58 heures après la mort. — Cadavre émacié au dernier point.

Cerveau. — Les lésions de l'encéphale se bornent à un peu d'épanchement séreux-gélatiniforme sous l'arachnoïde et à une injection médiocre de la substance encéphalique formant un piqueté sanguin peu serré à la surface de chaque tranche du cerveau. Point d'épanchement notable dans les ventricules; absence de traces d'inflammation et de granulations dans les méninges. La consistance des centres nerveux est tout-à-fait normale.

Abdomen. — L'estomac est sain, ainsi que la partie supérieure de l'intestin grêle. Dans l'iléon les plaques de Peyer deviennent plus rouges, plus saillantes, et en se rapprochant du cœcum, on voit plus distinctement leur surface érodée, parsemée de points blancs irréguliers qui paraissent être des ulcérations encore peu avancées. Plus bas les ulcérations deviennent plus évidentes; surtout dans les plaques voisines du cœcum; elles représentent de petits godets disséminés à la surface de chaque plaque dont elles affectent une plus ou moins grande étendue.

due. Leur pourtour est formé par un bourrelet de la muqueuse qui est au contraire complètement détruite au fond de chaque petite cavité.

Dans le gros intestin on ne trouve qu'un développement un peu anormal des follicules et quelques rougeurs disséminées.

Quelques-uns des ganglions mésentériques, ceux surtout qui correspondent aux points les plus altérés de l'intestin, sont rouges, tuméfiés et ramollis. Rate ramollie et tuméfiée.

Thorax. Engorgement pulmonaire très-étendu, surtout en arrière, renfermant déjà quelques noyaux d'hépatisation disséminés.

Cette observation nous montre une fièvre typhoïde qui n'a été reconnue qu'après l'examen nécroscopique. Les symptômes ataxiques, par leur intensité et la circonstance d'une chute antérieure sur la tête, ont fait admettre l'existence d'une méningite. Cependant la diarrhée, l'état de la langue, la tension douloureuse de l'abdomen, étaient en faveur de la fièvre typhoïde; l'absence des vomissements et de la constipation devait écarter l'idée d'une méningite, au moins comme maladie simple.

Voici le tableau des signes différentiels entre les méningites et les fièvres typhoïdes, tracé par M. Guersant avec une exactitude qui le rend applicable à l'immense majorité des cas.

« Dans les méningites : 1° chaleur de la peau presque naturelle, excepté à la tête; 2° point d'éruption cutanée, excepté dans la méningite épidémique; 3° céphalalgie avec élancements, coloration instantanée de la face et expression de douleur; 4° séch. muq., langue humide; 5° vomissements presque constants, éloignés et prolongés pendant plusieurs jours de suite; 6° douleurs abdominales à la pression presque toujours nulles; 7° constipation opiniâtre et prolongée; point de gargouillement; 8° pouls souvent lent, irrégulier, inégal, intermittent; 9° respiration inégale, irrégulière, suspirieuse; 10° rigidité et contraction des membres pectoraux, alternant avec leur relaxation dans la deuxième période.

« Dans les fièvres typhoïdes : 1° Peau sèche et brûlante ; 2° éruption de taches rosées lenticulaires après le cinquième jour ; 3° céphalalgie continue sans coloration instantanée de la face, faciès exprimant l'abattement et la stupeur ; 4° soit plus ou moins vive, langue paisseuse ou sèche ; 5° vomissements rares, un ou deux au début, au plus, ou après plusieurs jours de maladie ; 6° douleurs abdominales à la pression, presque constantes, vers la région iléo-cœcale ; 7° constipation alternant avec la diarrhée, gargouillement intestinal ; 8° pouls constamment régulier et plus ou moins fréquent ; 9° respiration régulière plus ou moins fréquente ; 10° résolution complète de tous les membres, à toutes les périodes de la maladie (1). »

Quelques cas bien réels, mais peu nombreux, nous le répétons, échappent à l'application des moyens de diagnostic que nous venons de reproduire ; et, comme le dit M. Forget, quelques chances d'erreur se représenteront encore à l'esprit des praticiens (2).

L'état pathologique le plus difficile à distinguer de la fièvre typhoïde, dans des cas heureusement fort rares, est la forme aiguë, fébrile et vraiment typhoïde que revêt quelquefois la tuberculisation. Que celle-ci soit locale et bornée aux viscères abdominaux, qu'elle soit générale et compromette ainsi les fonctions des organes des trois cavités splanchniques, on possède aujourd'hui des exemples qui prouvent combien dans l'un et dans l'autre cas le praticien est exposé à se méprendre. On trouve sur ce point une observation très-remarquable dans l'ouvrage de MM. Billiet et Barthès, et ces auteurs ont eu raison de consacrer quelques pages à cette question épineuse. Il faut avouer que de leur discussion il ne ressort aucun moyen sûr et précis d'éviter l'erreur, mais il est bon d'avoir au moins signalé un écueil et inspiré au praticien une réserve dont il éprouvera plus d'une fois les avantages.

(1) *Dict. de Méd.* 2^e éd. Art. *Typhoïd.*

(2) *Ouvrage cité*, page 327.

France.

La gravité de la fièvre typhoïde dans l'enfance semble moindre qu'aux autres époques de la vie. On sait que chez les adultes la mortalité varie d'un quart à un dixième, comme l'ont démontré les travaux de MM. Chomel, Louis, Raoult, de Larroque, Pédaguel, etc. En prenant la moyenne de ces rapports, on trouve qu'elle est à peu près la même chez les enfants. En effet, en réunissant les faits observés par MM. Taupin, Audigant, Berquerel, Stieber et ceux d'une même série que nous avons recueillis à l'hôpital, nous comptons, sur deux cent six sujets atteints de fièvre typhoïde, trente morts, c'est-à-dire un septième, résultat déjà satisfaisant. Mais il y a des remarques très-importantes à faire sur ce point. Parmi les trente enfants comptés comme morts, il y en a environ un tiers qui ont succombé à des maladies complètement étrangères à la fièvre typhoïde. Chez les adultes, c'est cette maladie qui, soit à l'état simple par son intensité, soit par suite de complications, c'est-à-dire de quelques affections qui ont une certaine connexion avec elle, devient la cause véritable de la mort; tandis que chez les enfants qui passent dans l'hôpital le temps de leur convalescence, il se développe souvent des maladies qui n'ont aucun rapport pathologique avec la fièvre typhoïde et qui peuvent devenir mortelles. Ceci s'applique surtout aux fièvres éruptives et à quelques autres maladies dont la cause réside dans les conditions hygiéniques propres aux hôpitaux d'enfants. C'est ainsi que sur les vingt-un morts de M. Taupin, huit ont succombé à une autre maladie, après la guérison ou dans la convalescence de la dothinérité, en sorte qu'en retranchant ces huit sujets, on n'aurait plus qu'une mortalité de treize sur cent vingt-un. Les mêmes remarques sont applicables aux faits recueillis par MM. Rilliet et Barthé qui, sur cent onze malades, en ont eu vingt-neuf morts. Sur vingt-quatre malades observés par nous dont trois ont succombé, l'un de ceux-ci paraissait en voie de

guérison, lorsqu'il tomba de son lit sur le carreau, une plaie grave du sourcil détermina un érysipèle phlegmoneux du cuir chevelu rapidement funeste. L'autopsie confirma la probabilité de la guérison dans ce cas, si un accident traumatique ne fût venu s'ajouter à la fièvre typhoïde. Les deux autres sujets ayant succombé à des perforations d'adhérents, réduiraient le chiffre de la mortalité à un dixième pour notre catégorie. Sur les vingt-six malades observés par M. Stæber, un seul a succombé, « et encore, dit ce médecin, n'est-ce point pendant l'existence des symptômes typhoïdes, mais au bout de six semaines, par l'effet de l'épuisement résultant de la suppuration abondante qui suivit la chute d'eschares gangréneuses très-étendues (1). » Enfin ce qui doit surtout nous faire considérer le pronostic comme moins fâcheux chez les enfants, c'est que sur les dix-sept malades observés par M. Amigonne dans sa pratique particulière, aucun n'a péri.

Quoi qu'il en soit, et en portant à un dixième environ le chiffre de la mortalité chez les enfants, on voit que la fièvre typhoïde est encore assez grave pour que le praticien doive être très-réservé dans son pronostic. « Les enfants peuvent succomber à l'intensité des symptômes pulmonaires, abdominaux ou cérébraux, à l'abondante suppuration qui suit la chute des eschares, aux maladies intercurrentes qui viennent les surprendre affaiblis, aux affections tuberculeuses dont la fièvre typhoïde a hâté le développement ou la marche, à la perforation intestinale qui survient inopinément pendant la convalescence des cas graves, ou dans des cas en apparence très-légers. Aussi doit-on être toujours fort réservé en portant le pronostic, et se rappeler que les lésions anatomiques ne sont presque jamais en rapport avec les phénomènes généraux. Toutefois il ne faut jamais désespérer, car dans aucune autre maladie les enfants ne sortent d'un état aussi grave pour revenir aussi promptement à la santé (2). »

(1) Œuvre cité, page 11.

(2) Traité, même cité.

Traitement.

La nature intime de la fièvre typhoïde nous étant à peu près complètement inconnue, nous devons, d'après l'ensemble de ses caractères symptomatiques et anatomiques, la considérer comme essentiellement complexe, c'est-à-dire décomposable en plusieurs éléments pathologiques. Or, le traitement doit être aussi complexe, c'est-à-dire embrasser toutes les indications que peuvent réclamer respectivement les éléments dont la maladie se compose. Si l'on se rappelle ensuite que chacun d'eux est susceptible par sa prédominance ou sa transformation d'amener de véritables accidents, c'est-à-dire des épiphénomènes ou complications, on pressentira combien d'indications nouvelles pourront surgir de ce côté. Il faut donc distinguer le traitement de la fièvre typhoïde suivant qu'elle est simple ou compliquée, sans oublier d'ailleurs d'y apporter les modifications qu'exigent chaque degré de la maladie, chacune de ses formes, de ses périodes et chacune des circonstances étiologiques, individuelles ou générales, au milieu desquelles elle s'est déclarée.

Nous ne pensons pas que le praticien doive se proposer d'arrêter *ex abrupto* et de faire avorter la fièvre typhoïde, parce que ce but nous semble impossible à atteindre. Il en est ici ce qu'il en est de la variole. On ne jugulera jamais cette maladie, et tout ce qu'on pourra faire par un traitement énergique, ce sera d'abréger un peu sa durée, de diminuer son intensité, d'enlever à la rigueur tous les accidents réactionnels et de réduire l'affection à une simple et légère phlegmie pustuleuse de la peau. De même, dans la fièvre typhoïde, on pourra supprimer en très-grande partie les accidents dépendants de l'élément cérébral, de l'élément thoracique, éteindre même le mouvement fébrile et tout ramener à une véritable dothinérité. Mais cette inflammation pustuleuse et ulcéreuse de l'intestin, on ne l'empêchera point de suivre son cours, et ce sera beaucoup que d'avoir abrégé sa durée. Telle est la

manière dont nous concevons le traitement de la fièvre typhoïde, et s'il ne nous était interdit de nous écarter du point de vue spécial auquel nous sommes placé, nous arriverions facilement à démontrer qu'elle est la seule raisonnable et la seule en rapport avec les faits bien observés et bien interprétés. En conséquence la guérison immédiate et instantanée étant à peu près impossible, le praticien doit borner ses prétentions à amender, à simplifier, à régulariser le plus possible tous les actes pathologiques qu'embrasse la maladie dans son ensemble. Cette tâche, déjà grande et difficile à remplir, ne saurait l'être sans l'emploi sagement combiné de plusieurs médications.

Vaici comment nous résumons les indications du traitement : 1^{re} contenir l'élément abdominal, c'est-à-dire le travail dothinentérique proprement dit dans certaines limites d'intensité, par conséquent combattre et enlever l'inflammation gastro-intestinale qui s'y ajoute souvent, sans pour cela détruire complètement l'activité nécessaire à la résolution et à la cicatrisation de l'appareil folliculaire affecté ; de plus, agir directement sur cet appareil et sur le reste de la muqueuse par des moyens en quelque sorte topiques propres à modifier les sécrétions gastro-intestinales et à empêcher le contact des follicules malades avec des matières nuisibles. A cette double indication répondent les antiphlogistiques et les purgatifs.

2^{re} Prévenir les accidents que peut engendrer l'élément bronchique, la pneumonie principalement, en diminuant l'inflammation catarrhale si elle est trop intense, et en s'opposant à l'hypostase sanguine qui favorise si puissamment l'engorgement et l'hépatisation du poumon. C'est ici qu'on trouvera encore l'emploi de la médication antiphlogistique, mais plus souvent celui de la médication révulsive et de quelques moyens accessoires.

3^{re} Surveiller l'élément cérébral, le considérer comme essentiellement nerveux dans beaucoup de cas ; mais ne pas oublier qu'il peut s'y joindre un certain degré d'hypérémie qui exigera l'emploi des émissions sanguines et des révulsifs.

4° Tenir le plus grand compte de l'élément fébrile, de son type et de l'état dynamique pour respecter ou modifier l'un et l'autre, suivant l'exigence des cas, par des sédatifs, par des antipériodiques, ou par des excitants et des toniques.

5° Enfin remplir toutes les indications relatives, soit à l'âge, au tempérament et autres conditions individuelles des sujets, soit aux caractères particulières que revêt la maladie dans certains cas, tels que le caractère épidémique, etc.

Le traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants ne nous paraît point différer essentiellement de celui qu'elle réclame chez les adultes. Les mêmes médications s'appliquant aux mêmes circonstances, et de l'analogie des symptômes et de la marche de l'affection on peut conclure à celle de la thérapeutique. Il n'y a ici que de légères différences que nous allons rapidement indiquer.

La médication antiphlogistique nous paraît plus souvent nécessaire chez les enfants, en tant surtout qu'elle s'adresse à l'élément abdominal, parce que chez eux la lésion dothinentérique s'accompagne plus facilement d'un état général de turgescence sanguine ou même de phlogose de la muqueuse gastro-intestinale. Il est peu de malades chez lesquels les émissions sanguines locales à l'anus ou sur l'abdomen, ne soient parfaitement motivées par cette circonstance. L'ouverture de la veine n'est préférable aux saignées que lorsque l'état fébrile est très-intense. Générales ou locales, les saignées peuvent encore être dirigées contre les congestions qui se lient à une trop grande violence de l'élément bronchique ou cérébral. Bien que leur emploi exige toujours, suivant nous, une sage réserve, nous pensons que chez les enfants elles dépassent plus rarement le but qu'elles doivent atteindre, et nous avons remarqué que presque jamais elles n'ont, comme chez l'adulte, l'inconvénient d'amener rapidement et d'augmenter la prostration. Par elles l'état fébrile et les phlogoses locales sont plus régulièrement amendés, sans faire place à de graves perturbations. La médication antiphlogistique

que nous avons vue unie avec une grande habileté par M. Julelet, non d'une manière exclusive, mais combinée avec beaucoup d'autres moyens, nous a paru réellement d'un grand secours, et nous ne pouvons partager l'opinion de M. Tainin, qui n'en approuve l'usage que dans un très-petit nombre de cas.

Les purgatifs comportent une application aussi générale chez les enfants que chez les adultes. Sans doute il est beaucoup de cas chez les uns et chez les autres, dans lesquels ils peuvent s'employer et réussir comme médication exclusive. Mais il en est un plus grand nombre encore où il est utile de débiter par la médication antiplogistique, et en lisant un grand nombre d'observations fournies par divers auteurs, il nous a semblé que le succès des purgatifs s'était démenti surtout dans les cas où leur emploi n'avait pas été précédé de quelques émissions sanguines modérées. Ce n'est pas que pour nous les purgatifs salins (car ce sont ceux qu'on préfère) aient des qualités très-irritantes, et l'on peut à la rigueur croire, suivant la théorie de M. de Larroque, qu'en faisant évacuer les matières intestinales et en modifiant les sécrétions, ils enlèvent la principale cause de l'inflammation. Mais nous nous défions toujours des théories et des explications exclusives, et nous aimons mieux puiser nos règles de conduite dans l'impression que nous a laissée l'observation d'un grand nombre de faits. Les précautions que nous venons d'indiquer étant prises, nous n'hésitons pas à prescrire les purgatifs dans une large mesure. Il ne faut point voir une contre-indication dans la diarrhée, car les purgatifs la diminuent et l'arrêtent même quelquefois, et alors même que son abondance ne diminue point, la nature des selles est modifiée. Ils sont encore plus positivement indiqués lorsqu'il y a constipation, méléscisme, et c'est dans ces cas qu'il convient de leur joindre les laxatifs en lavements, tels que le séné, le sulfate de soude, le miel mercuriel, etc. Le plus employé des purgatifs par le haut est l'eau de Sedlitz à la dose de deux à quatre verres par jour. En général les enfants la boivent sans trop de difficulté, et quand il en est

autrement, on la remplace par l'eau magnésienne saturée qui est moins désagréable. Quand les enfants ont trop de répugnance pour ces médicaments, on leur donne l'huile de ricin dans une potion convenablement édulcorée. Le calomel, le séné et quelques autres purgatifs sont généralement moins employés, quoiqu'ils puissent l'être avec autant d'avantages.

Les vomitifs conviennent dans quelques formes de la maladie et surtout au début. Quand, par exemple, la langue est sale, qu'il y a un goût amer ou pôleux à la bouche, des nausées, des vomissements moqueux ou bilieux, en un mot, quand il y a les signes d'un état sabreux, il faut faire précéder l'emploi des purgatifs par un vomitif, et l'on préfère généralement alors l'ipécacuanha au tartre stibé.

La médication évulsive est souvent d'une grande utilité. Les rubéfiants et les ventouses sèches rendent quelques services, mais c'est sur les vésicatoires qu'on doit le plus compter. On les réactive pour la seconde et surtout pour la troisième période. Leur action est double, c'est-à-dire, tout à la fois évulsive et excitante. La première est avantageuse quand il y a indication de s'opposer à un travail de coagulation ou d'inflammation locale comme il peut en survenir dans les organes du thorax ou de la tête, et surtout lorsque la médication antiphlogistique est contre-indiquée ou insuffisante. L'action stimulante est, à son tour, très-favorable quand la prostration est profonde; presque toujours elle diminue l'adynamie et rend la convalescence plus prompte et plus facile. Dans des circonstances opposées, les vésicatoires sont plus nuisibles qu'utiles. Quand le malade est en proie à une grande agitation, au délire, et à d'autres symptômes d'excitation, ils exaspèrent quelquefois les accidents. Si l'on a principalement en vue une action stimulante, il est évidemment peu avantageux d'entretenir la suppuration, parce que dès le deuxième ou le troisième jour la stimulation devient faible ou bien une inflammation ulcéreuse ou gangréneuse s'empare de la plaie. Cet inconvénient qui arrive très-communément dans la fièvre typhoïde est toujours grave; et, pour

l'éviter, il vaut mieux renouveler les applications épispastiques.

Ce que nous venons de dire des vésicatoires nous amène à parler des médications stimulante et tonique dont il est impossible de se passer dans la plupart des fièvres typhoïdes. Mais il faut auparavant dire quelques mots de la médication sédative qui s'adresse aussi à l'élément nerveux et dynamique.

L'indication des sédatifs ne se présente généralement que dans la première et la seconde période, dans les cas où les troubles dus à l'excitation du système nerveux et de l'appareil circulatoire sont intenses. Nous avons déjà dit que les saignées générales ou locales ont, entre autres effets, celui de diminuer l'état fébrile et les accidents qui paraissent dépendre d'un certain degré de congestion encéphalique (céphalalgie, délire, agitation, etc.) Mais leur emploi devant être limité pour ménager les forces dont l'organisme a besoin dans la suite, on peut aider leur action ou même les remplacer par un des plus puissants modificateurs de l'économie, nous voulons parler du froid. La méthode des affusions froides, trop peu en crédit de nos jours malgré les succès que M. Récamier et Gendrin disent lui devoir journellement, cette méthode, disons nous, en enlevant directement du calorique, opère une sédation immédiate des forces vitales, sans les détruire dans leur source, comme le feraient les saignées trop abondantes. Elle retarde, pour ainsi dire la réaction, la ménage et lui permet de se prolonger pendant les dernières périodes de la maladie, époque à laquelle elle fait si souvent défaut. D'ailleurs, en diminuant l'intensité de la réaction générale, elle favorise et rend plus franche une réaction locale vers la peau; et, c'est ainsi qu'il s'établit plus parfaitement ces sueurs critiques qui ont une si grande influence sur la guérison. On a vu et encore comme utiles dans la fièvre typhoïde certains médicaments sédatifs ou contre-stimulants, tels que l'émétique à dose rasorienne. Cette méthode n'a point été expérimentée en France sur une assez vaste échelle pour qu'on puisse être fixé sur son efficacité.

Il arrive un moment où la réaction générale non-seulement ne doit plus être diminuée, mais où elle doit être soutenue et même augmentée; c'est dans la seconde et la troisième période. S'agit-il seulement de la maintenir à un certain degré, on emploie les toniques, surtout le vin et le quinquina. Mais si la réaction est tout-à-fait languissante, il faut prescrire les stimulants, tels que l'angélique, la camomille, la camelle, l'aralea, le camphre, l'éther, le musc, etc., et comme la plupart de ces stimulants ont une action peu durable, il faut leur associer les toniques pour la soutenir et la prolonger. Plus la forme de la maladie est franchement adynamique, plus les stimulants et les toniques ont des avantages certains. La forme ataxique est plus difficile à combattre avec succès, et les règles de la conduite à tenir ne sont pas aussi certaines. Voici comment M. Littré les résume : « Si le délire s'accompagne d'une grande agitation, si les forces et le pouls se maintiennent, on peut, même au quatorzième ou au vingtième jour, recourir de nouveau à la méthode antiphlogistique, à la saignée générale, aux applications de sangsues derrière les oreilles, et de glace sur le front; si, au contraire, la forme ataxique se combine avec la forme adynamique, il faut, quoique le pronostic soit nécessairement aggravé, s'en tenir au traitement tonique, qui, parfois, enlève en même temps l'ataxie et l'adynamie; si, enfin, au milieu des symptômes ataxiques, on ne remarque la prédominance ni de l'excitation ni de la débilité, il faut se borner à une thérapeutique expectante. La majeure partie des praticiens usent dans ce cas de résineux appliqués aux mollets et aux cuisses (1). »

Nous avons parlé du quinquina comme tonique. Ce médicament peut encore rendre de grands services comme antipériodique dans les cas où la fièvre typhoïde revêt une forme rémittente. On sait que ce type se rencontre de plus en plus fréquemment, à mesure qu'on se rapproche des régions équatoriales, et nous avons déjà eu occasion de remarquer qu'à Lyon cette forme des fièvres graves est

(1) *Dict. de méd.* 2^e édit. t. I, p. 474.

plus commune qu'à Paris. Aussi l'emploi du sulfate de quinine est-il plus général dans la pratique des médecins lyonnais, et nous avons eu plus d'une fois à nous louer de ses effets. Quant à considérer ce médicament comme la base du traitement de toutes les dothinémiées, nous ne saurions partager cette manière de voir. L'engouement dont il a été un instant l'objet dans quelques cliniques de Paris est déjà tombé, et tout ce qui est venu à notre connaissance sur les résultats de cette méthode, ne nous fait point regretter le discrédit dont elle semble atteinte aujourd'hui.

Telles sont les diverses médications actives qui, combinées ou employées d'une manière plus ou moins exclusive, méritent le plus de confiance. On en a préconisé quelques autres dont la manière d'agir moins connue ne peut pas les faire rapporter aux précédentes; mais la plupart ont été abandonnées peu de temps après avoir été essayées. Tel est, par exemple, l'emploi de l'eau de Selz et des chlorures. Ceux-ci en particulier ne sont généralement aujourd'hui employés que comme moyens accessoires hygiéniques.

Mais toutes les fièvres typhoïdes n'exigent pas un traitement énergique. Il en est un certain nombre que l'on peut sans aucun danger abandonner, pour ainsi dire, à elles-mêmes, ou plutôt soumettre à la médication expectante. Ce sont celles d'une intensité légère ou médiocre, exemptes de complications et dans lesquelles aucun élément ne se démontre inquiétant par sa prédominance; celles surtout dans lesquelles les caractères d'une maladie franchement réactive, s'annoncent par la coordination, l'équilibre de tous les actes pathologiques et leur tendance vers une solution critique au moyen des divers émonctoires de l'organisme.

Les soins hygiéniques ont toujours une grande importance. On évitera l'encombrement des malades en les plaçant dans des chambres assez vastes, en renouvelant souvent l'air qu'ils respirent et en le purifiant par les chlorures alcalins, en entretenant autour d'eux une douce température, et enfin en les tenant dans la plus grande propreté. La conta-

lescence demande de grandes précautions. Les enfants en particulier recouvrant promptement l'appétit et ne sachant pas y résister, sont exposés à des indigestions quelquefois très-funestes. L'alimentation exige donc une surveillance assidue. Le changement d'air, le transport à la campagne favorisent le rétablissement des malades dont la convalescence est lente et difficile.

Le traitement des complications n'offre absolument rien de spécial chez les enfants. La pneumonie qui en est une des principales et des plus fréquentes réclame les antiphlogistiques (saignées générales et surtout locales) quand elle se déclare dès les premières périodes; mais plus tard on la combat principalement par les antimoniaux, les diaphorétiques, et surtout par les vésicatoires *fero delenti*. Une précaution très-importante pour prévenir ou pour guérir la pneumonie, consiste à faire coucher les malades sur les deux côtés alternativement et à éviter autant que possible le décubitus dorsal prolongé qui favorise l'hypostase d'une manière si fâcheuse.

Quant à la perforation intestinale et à la péritonite suraiguë qui en résulte, un seul moyen, l'opium à très-haute dose, suivant la méthode de MM. Graves et Stocken de Dublin, offre quelques chances de succès. Cette méthode sur laquelle M. Pétrequin un des premiers a appelé l'attention, a été expérimentée en France dans un assez grand nombre de cas. Employée dès les premiers instants qui suivent la perforation, elle peut enrayer la péritonite, mais trop souvent elle est complètement inutile. Aux hémorragies intestinales on oppose des révésifs et surtout les réfrigérants. Les eschares demandent des pansements simples ou toniques, suivant la nature des cas.

CHAPITRE VII.

INVAGINATION DES INTÉSTINS.

L'invagination des intestins étudiée sur le cadavre est commune chez les enfants, et l'est d'autant plus qu'ils sont plus jeunes. Mais il est infiniment probable qu'elle ne s'opère que dans les derniers instants de la vie, peut-être même après la cessation de la vie animale. C'est du moins ce que tendent à prouver les expériences de Lobstein, qui a vu chez des animaux dont l'abdomen était ouvert, les intussusceptions se former sous l'influence des cris provoqués par la douleur, et comme un des phénomènes de l'agonie. Les enfants à l'ouverture desquels nous en avons le plus souvent observé, avaient succombé à des affections cérébrales. Nous n'avons point eu l'occasion de constater par nous-même quels symptômes l'invagination peut développer lorsqu'elle a lieu pendant la vie. Billard en parle aussi de manière à faire douter qu'il ait jamais été témoin des accidents graves qui en résultent. M. Mitchell, qui dit en avoir observé plusieurs cas (1), se demande si leur fréquence plus grande chez les enfants, ne tiendrait pas à la flaccidité plus prononcée des intestins et aux cris violents si habituels à cet âge.

Le diagnostic du volvulus est en général très-obscur, la constipation opiniâtre, et, quand la maladie se prolonge, des selles sanguinolentes, la tuméfaction progressive du ventre, les vomissements des boissons, puis des matières intestinales et stercorales, une agitation continuelle, la décomposition profonde des traits, la pâleur, le refroidissement, la fréquence et la petitesse du pouls, des douleurs excessives dans l'abdomen, etc., tels sont les symptômes que l'on constate dans la plupart des cas, mais plusieurs d'entre eux peuvent manquer ou appartenir à d'autres ma-

(1) *The Journal of Gas. med. de Paris*, année 1858, p. 517.

Indies. Dans l'état actuel de la science, il y a sur l'affection qui nous occupe une grande lacune, tant sous le rapport du diagnostic que sous celui du traitement. Cependant un fait remarquable communiqué par le docteur Clarke en 1838, à la Société médicale de Westminster, y provoqua une discussion intéressante que nous croyons devoir reproduire, ainsi que l'observation qui en fut l'occasion.

24^e Obs. — *Symptômes d'étranglement interne; diagnostic douteux; on présume une indigestion, puis une hémorrhagie intestinale; succès des purgatifs; mort. — Invagination de la fa de l'iléum et du caecum dans le colon descendant. — Un enfant âgé de onze mois et trois semaines est saisi, le 13 février 1838, à neuf ou dix heures du matin, d'agitation violente, et jette les hauts cris pendant trois ou quatre heures. Dans l'après-midi on lui scarifie les goncives et on lui donne des poudres de calomel et d'antimoine.*

Le lendemain M. Clarke est appelé; il trouve que l'enfant avait passé une nuit fort agitée, et qu'il n'avait pas eu d'évacuations alvines. En examinant les langes, il voit du sang, et la mère lui dit qu'il en a rendu beaucoup toute la nuit par le rectum; de sorte qu'il a fallu le changer cinq à six fois. La physionomie de l'enfant est extraordinairement abaissée comme s'il avait le choléra. Pouls vite et faible, pâleur, agitation; l'enfant se lève par les souffrances qu'il éprouve; l'abdomen n'est ni distendu ni douloureux, ou du moins il ne l'est que peu au toucher. Aussitôt après avoir été, il vomit; la peau est froide. M. Clarke ne sait d'abord à quoi attribuer ces symptômes; comme cependant il venait d'entendre qu'on soupçonnait qu'une bonne avait donné du gâleur à l'enfant, il prescrit trois grains de calomel à répéter s'ils ne procurent pas de garde-robe, et une potion composée de rhubarbe et d'eau de cinnamon. Le calomel est rejeté avec le lait de la mère. On donne un lavement d'huile de ricin qui paraît soulager; mais l'enfant n'évacue que du sang et du mucus. Flanelles chaudes aux pieds et sur le ventre.

Le lendemain 15, les symptômes empirent; vomissements plus prononcés, agitation plus grande, pouls fré-

forme; l'abdomen est un peu ballonné, l'écoslement muco-sanguinolent continue, l'urine passe librement.

On appelle M. Streeter en consultation. Ce praticien soupçonne une intus-susception, mais il s'arrête de préférence à l'idée d'une hémorrhagie intestinale; il prescrit des lavements de térébenthine, une nourriture légère d'arrow-root et un peu de vin, et si la faiblesse augmente, quelques gouttes d'éther. L'enfant cependant n'a pu rien prendre, et il est mort dans la nuit du 15, soixante-deux heures après l'attaque, dans un état prononcé d'empâtement.

Nécropsie trente-six heures après. On ouvre l'abdomen, on trouve une exsudation légère de fluide séro-sanguinolent dans le péritoine; les intestins ne sont pas à leur place naturelle; ils forment une grosse masse appliquée à l'épave du côté gauche, résultant principalement du colon descendant. L'examen fait voir que cet intestin en renferme un autre dans son intérieur. L'intus-susception commence à quatre pouces environ de la fin de l'iléum dans le caecum. La portion invaginée avait passé dans le colon descendant conjointement au caecum et à tout le colon ascendant et transverse, et descendait jusqu'à la portion sigmoïde. Aucune inflammation n'existe; l'intestin invaginé est noir et couvert de mucus; le reste du canal contient de la matière liquide; l'estomac est dilaté et offre un bel exemple de l'action émolliente destructive et perforante des sucs gastriques. Les organes de la poitrine sont sains. Le cerveau n'a point été examiné. La pièce pathologique a été présentée à la société médicale de Westminster.

Cette observation est non-seulement intéressante par la gravité des désordres constatés à l'ouverture du corps, mais encore par l'abondance de l'hémorrhagie qui, réunie à l'absence apparente de douleur, a rendu le diagnostic équivoque et tardif. Il importe aussi de remarquer les cris et l'agitation qui ont annoncé le début des accidents et qui peut-être en ont été la véritable cause.

Suivant M. Clarke, on ne peut méconnaître l'invagination lorsqu'il y a réunion de ces deux circonstances,

avoir : 1^o présence d'une tumeur dans la région iliaque gauche ; 2^o prolapsus par le rectum de la portion invaginée. Il faut aussi tenir un grand compte de l'hémorrhagie anale et de la possibilité d'atteindre avec le doigt l'intestin qui, sans faire saillie au dehors, est descendu près de l'anus. Dans l'observation précédente il n'y avait pas de tumeur abdominale ; mais chez un autre petit malade observé trois mois auparavant, la tumeur était très-manifeste. Pendant les six ou sept premiers jours il n'y avait eu d'autre symptôme principal que des vomissements ; puis l'hémorrhagie anale s'était déclarée, l'enfant avait rendu des masses de sang noir fétide et avait enfin succombé. M. Clarke admet deux espèces d'invagination, l'une aiguë, l'autre chronique ; la première arrive subitement et est presque toujours mortelle ; la seconde se déclare lentement et peut guérir par la séparation et la chute de la portion invaginée.

M. Johnson croit que dans la plupart des cas les signes ne sont pas assez positifs pour faire présumer la nature de la maladie. La tumeur abdominale peut dépendre d'autres causes que de l'invagination : une hernie ventrale, une collection de matières fécales, un polypion de vers peuvent la produire. Ce médecin ajoute qu'après le travail d'adhésion des deux séreuses invaginées, la nature ne ménage pas toujours une voie pour le passage des matières ; tantôt il existe un petit espace par où les fèces s'évacuent, tantôt, au contraire, il y a obstruction complète. C'est là du moins ce qui résulte des faits publiés jusqu'à ce jour (1).

Le pronostic du valvulus est très-fâcheux. Quel que soit le traitement mis en usage la guérison s'obtient très-difficilement. Suivant H. Langstaffe, l'insusception la plus dangereuse est celle qui a lieu par l'invagination de la fin de l'intestin grêle dans le cæcum, comme dans le cas rapporté par M. Clarke et dans un autre non moins remarquable recueilli par le docteur H. Cunningham.

(1) L'observation de M. Clarke et la discussion de la société médicale de Westminster ont été publiées dans le journal anglais *The Lancet*, et résumées dans la *Gaz. med.*, année 1825, p. 2.

« Un très-bel enfant, âgé de six mois, est saisi, à la suite d'un léger dévoiement, de symptômes d'étranglement; il crie, donne des signes de souffrance extrême, vomit et est constipé; les cris se renouvellent par accès. A l'examen, M. Cunningham trouve une tumeur profonde dans la région iliaque gauche; il diagnostique une invagination intestinale et prescrit les remèdes suivants: 1° lavements huileux; 2° bain tiède prolongé jusqu'à syncope; 3° sangsues sur la tumeur. Les symptômes sont continués; les vomissements sont devenus stercoraux; l'enfant a rendu du sang par le rectum le troisième jour, et il a succombé. A l'autopsie, on a trouvé le cæcum et l'iléum invaginés dans le rectum dans la longueur de six pouces. La portion invaginée était noire. Le reste du canal intestinal était enflammé et distendu par la matière fécale et des gaz (1).

Le traitement du *volvulus* n'est encore établi que sur des bases bien incertaines. Car il est tels moyens, les purgatifs, par exemple, qui préconisés par les uns sont blâmés et rejetés par les autres. Suivant M. Johnson, la maladie présente deux dangers: 1° l'obstruction et la distension de la portion intestinale supérieure; 2° l'inflammation des parties invaginant, invaginées et voisines. Il faut donc d'abord prévenir l'inflammation à l'aide d'évacuations sanguines locales répétées, et la diète. Ce dernier moyen prévient aussi la collection de matières fécales; mais il faut, en attendant, soutenir les forces de la constitution à l'aide de lavements nourrissants, et mettre ainsi l'organisme dans les conditions d'établir les adhérences nécessaires, et de séparer la partie mortifiée. M. Johnson pense que les purgatifs que l'on croit propres à débrouiller l'intestin sont nuisibles dix-neuf fois sur vingt, et leur préfère les lavements répétés d'eau chaude.

M. Hardwicke admet aussi que ni les lavements, ni les autres remèdes ne peuvent désengager l'intestin, et qu'il n'y a de guérison possible que par l'adhérence des deux

(1) *Gaz. méd.*, 1836, pag. 777, l'extrait de *The London med. Gaz.*

séreuses intestinales qui viennent en contact, et l'évacuation de la partie invaginée.

Enfin M. Mitchell que nous avons déjà cité, ayant tout essayé sans succès, a eu recours au procédé suivant. Il a introduit dans le rectum aussi haut que possible, une canule de gomme élastique, qu'il a adaptée au bec d'un soufflet de cheminée, puis il a poussé de l'air en quantité; la distension ayant déployé les anses intestinales, a fait, comme par enchantement, disparaître les symptômes de l'étranglement; des garde-robes se sont manifestées et l'enfant a guéri.

Nous pensons que ce moyen, bien qu'il n'ait encore été employé qu'une fois, doit être positivement conseillé à cause de l'inutilité ordinaire des autres modes de traitement et parce qu'il a l'analogie en sa faveur. En effet, l'insufflation d'un poquet intestinal, quelque embrouillé qu'il soit, le démonte facilement sur le cadavre. Sur le vivant elle doit également réussir, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas déjà des adhérences. Un moyen analogue qui paraît aussi avoir réussi dans un cas très-grave, chez un sujet de vingt-deux ans, entre les mains du docteur Bonati (1), consiste dans l'emploi des injections d'eau par le rectum poussées en grande quantité et avec beaucoup de force à l'aide d'une grosse seringue ou d'un instrument *ad hoc* que le médecin italien appelle *hydroculle* (espèce de pompe aspirante et foulante à jet continu). Le mercure coulant a été souvent employé et a quelquefois réussi.

(1) *Gas. med.*, 1835, p. 7.

SECTION III.

MALADIES DES ANNEXES DE L'APPAREIL DIGESTIF.

CHAPITRE I.

MALADIES DES GLANDES ANNEXES A L'APPAREIL DIGESTIF.

ARTICLE I.

MALADIES DES GLANDES SALIVAIRES.

Ces organes ne sont dans l'enfance le siège d'aucunes maladies qui méritent de notre part une description. La glande sous-mandibulaire seule pourrait attirer notre attention, si elle n'était du domaine de la pathologie chirurgicale, et par là en dehors du cadre dans lequel nous devons nous renfermer. Les glandes salivaires jouissent cependant d'une activité fonctionnelle assez grande dans les commencements de la vie, par exemple, aux approches et pendant le cours des deux dentitions; mais il est fort rare de voir cette activité se changer en un état pathologique. Les phlegmasies et les abcès des parotides qui s'observent parfois sous l'influence de la fièvre typhoïde, paraissent encore plus rares chez l'enfant que chez l'adulte. Les autres fièvres éruptives n'agissent ainsi que fort rarement de cette manière dans le jeune âge. Quant à la maladie connue sous le nom d'oreillons, et qui paraît occuper plutôt le tissu cellulaire qui entoure la parotide, que cette glande elle-même, cette affection est plus commune vers la fin de l'enfance et dans la jeunesse qu'aux autres époques de la vie. Toutefois on n'a pas très-souvent occasion de l'observer, et jusqu'à ce

jour nous n'en avons vu que deux cas. Comme elle n'est jamais grave par elle-même, et qu'elle ne présente rien de spécial chez les sujets du premier âge, nous nous bornons à ces simples indications.

ARTICLE II.

MALADIES DE FOIE.

A l'état physiologique, cette glande est loin de jouer dans la digestion un rôle aussi actif dans le premier âge qu'aux autres périodes de l'existence. Nous avons déjà eu occasion de dire que l'accomplissement souvent incomplet de la chylification paraît tenir à ce que la bile est moins alcaline, moins chargée de ces principes amers, résineux et salins, qui contribuent incontestablement à opérer le départ des globules chyleux. De cette inactivité il ne serait pas absurde de conclure *a priori* que le foie dans l'enfance est rarement le siège de maladies importantes, mais il est plus logique de consulter à cet égard les résultats de l'expérience. Or, celle-ci nous apprend que les lésions de circulation et de sécrétion des organes biliaires non-seulement n'offrent aucune forme spéciale, mais encore sont moins fréquentes qu'aux autres âges. Parmi les lésions de nutrition, nous ne trouvons que les tubercules qui demandent une mention particulière.

— Tout ce qui concerne les *hypérémies* du foie chez les enfants se rapproche singulièrement de ce que nous avons dit des *hypérémies* gastro-intestinales chez le nouveau-né, ou bien se rapporte à des maladies de l'organe central de la circulation dont elles ne sont qu'un effet symptomatique, et qui d'ailleurs, comme on le sait, ne sont pas communes avant l'âge de dix à douze ans. L'*hépatite* est également très-rare et ne doit point nous occuper.

— On a jusqu'à ces derniers temps attribué l'*ictère* des nouveau-nés à une maladie de foie, mais des recherches récentes ont démontré que cette opinion n'est rien moins

que fondée, et nous croyons devoir renvoyer ce que nous aurons à dire de cet ictere à une autre partie de cet ouvrage. La jaunisse qui dépend de l'hépatite ou des calculs biliaires est nécessairement comme ces affections presque étrangère au premier âge. Quant à l'ictère spasmodique, bien que les secousses mystères qui chez les adultes en sont les causes ordinaires, exercent souvent chez les enfants des perturbations graves, celles-ci ont rarement lieu du côté de la sécrétion biliaire; on peut donc dire déjà, d'après tout ce qui précède, que l'irritabilité pathologique du foie est véritablement proportionnée à son activité fonctionnelle.

— Le flux bilieux, rare dans nos climats, se rencontre moins dans l'enfance que plus tard. Cependant on en observe parfois des exemples, et nous avons pu déjà en réunir quelques-uns. Le plus souvent ce flux n'est qu'un épiphénomène de certaines phtisiques ou diacrisis gastro-intestinales, qui s'annonce par la présence d'une grande quantité de bile dans les matières des vomissements ou des selles. Toutefois cette participation du foie à l'affection gastro-intestinale, d'où résulte la forme bilieuse dans les embarras et fièvres gastriques, est bien plus ordinaire dans la jeunesse et dans l'âge mûr. Dans d'autres cas, la diacrise bilieuse est pour ainsi dire idiopathique, et, suivant beaucoup d'auteurs, c'est elle qui constitue le choléra sporadique. Ce flux attaque quelquefois les jeunes sujets, surtout pendant les saisons chaudes et sous l'influence des mêmes causes que chez les adultes. Il ne convient donc pas que nous en fassions ici la description. La plupart des observations rapportées sur ce sujet et les faits dont nous avons été témoin établissent qu'à part peut-être une marche plus prompte et une plus grande gravité, le choléra sporadique n'offre dans le premier âge aucune particularité importante. Nous pensons qu'il en est à peu près de même du choléra asiatique ou épidémique.

Il existe aux Etats-Unis une maladie que les médecins de ce pays considèrent comme une sorte de choléra, et qui s'est surtout chez les enfants. D'après la description que Billard a empruntée à l'ouvrage du docteur Devergie et

d'après quelques notes traduites des journaux américains dans les journaux de médecine français, on voit, en effet, que cette maladie présente de grandes analogies avec notre choléra sporadique. — Elle débute de plusieurs manières différentes, quelquefois sous forme d'une simple diarrhée, sans nausées, douleurs, ni fièvre; ce n'est qu'après quelques jours qu'apparaissent les premiers vomissements; c'est alors aussi que commence la fièvre, qui s'accompagne de douleur à la pression sur l'abdomen, d'altération des traits, de petitesse du pouls, de pâleur des téguments avec froid aux extrémités, congestion à la tête et surtout aux yeux. Pendant ce temps la langue est d'un blanc sale, la peau du front tendue et comme adhérente sur l'os, le nez pointu et effilé et les lèvres pâles et amincies. L'enfant reste très-abattu, bien que remuant cependant très-souvent; plus tard la soif est insatiable, les vomissements sont continuels; il ne peut rien garder sur l'estomac. Dans les cas les plus graves, tous ces symptômes marchent avec rapidité; bientôt les spasmes s'étendent à toute l'économie, et la mort ne tarde pas à arriver.

— Dans beaucoup, dans le plus grand nombre des cas peut-être, le choléra se développe chez les enfants sans avoir été précédé de diarrhée; le petit malade est pris tout-à-coup, au milieu d'une belle santé apparente, de vomissements et d'un dévoiement très-violent, qui, malgré le traitement le mieux combiné et le plus actif, amène la mort dans l'espace de deux ou trois jours, et même quelquefois de vingt-quatre heures. Il arrive aussi assez souvent que le vomissement, qu'il ait commencé subitement ou qu'il soit venu lentement, peu importe, cesse au bout de quelques jours, tandis que le dévoiement continue pendant plusieurs semaines et épuise le petit malade ou cède au traitement employé (1). —

Suivant Denees et Billard, on trouve sur le cadavre une congestion cérébrale et presque toujours des lésions dans

(1) Remarques sur le choléra des enfants, par le docteur Harvey Lindley, de Washington; *Ann. méd. de Paris*, année 1832, p. 714.

l'intestin et l'estomac, telles que des taches d'un rouge livide, l'épaississement de la muqueuse, le foie volumineux et gorgé de sang, la vésicule biliaire remplie de bile d'un vert foncé, le gros intestin et les autres organes de l'abdomen sont ordinairement sains. D'après ces lésions et les symptômes observés pendant la vie, Billard n'hésite point à voir dans cette maladie une gastro-entérite violente. Nous ne saurions partager cette manière de voir. Sans doute une gastro-entérite violente peut donner lieu à la plupart des symptômes du choléra sporadique; mais dans beaucoup de cas on ne trouve sur le cadavre aucunes ou presque aucunes lésions de la muqueuse intestinale propres à expliquer ces vomissements et ces déjections alvines si intenses, cette prostration extrême, ce faciès pathognomonique, ce refroidissement de la peau, en un mot ce collapsus profond qui caractérise la maladie dans les cas où elle est exempte de complications; car ce sont les faits de ce genre qu'il faut de préférence consulter pour étudier sa nature. Nous n'oserions pas affirmer que le choléra consiste véritablement et toujours dans un flux bilieux, mais les faits que nous avons eus sous les yeux nous permettent d'affirmer qu'il consiste encore bien moins dans une gastro-entérite, et nous nous rangerions plus volontiers à l'avis du docteur Deswées, qui dit en parlant de la diarrhée: « Dans la diarrhée bilieuse, les matières du dévoiement sont vertes ou d'un jaune intense, et les intestins sont irrités par cet afflux de bile vicieuse ou non. Cette maladie règne fréquemment chez les enfants, dans nos climats, durant l'été ou à l'approche de cette saison. Chacun connaît en effet l'influence de la chaleur sur les fonctions du foie; il est d'observation générale que, dans un temps chaud, les évacuations chez les adultes, se font avec plus de rapidité; souvent même les matières fécales sont teintes de bile; l'urine présente aussi cette couleur, et lorsque cette maladie survient chez les enfants, nous l'appelons le mal d'été (1). »

(1) Billard, page 450.

Le professeur Trousseau (1) ne partage pas les idées que nous venons de reproduire sur la nature du choléra des enfants. Il appelle cette maladie *entérite cholériforme*, c'est-à-dire qu'il regarde la phlegmasie intestinale comme le point de départ de tous les accidents. Nous pensons que si cet habile praticien ne s'était pas appuyé uniquement sur les faits qu'il a observés, il aurait pu être moins exclusif. Heu! hé! en effet des observations de jeunes enfants qui ont succombé à la maladie en question, et chez lesquels les lésions intestinales étaient au moins insuffisantes pour expliquer les symptômes observés avant la mort. Nous possédons, quant à nous, un fait de ce genre qui, au point de vue de la symptomatologie, offre un type des plus complets de l'affection cholériforme et dans lequel les altérations de la muqueuse gastro-intestinale étaient peu importantes.

Quel qu'il en soit, comme une discussion plus longue serait ici déplacée, contentons-nous de dire que le traitement ne diffère point suivant les âges, et que l'indication des antispasmodiques, des stimulants et des toniques, et quelquefois des évacuants perturbateurs, se présente bien plus souvent que celle des débilitants et des antiphlogistiques. Les petits malades que nous avons vus périr ont succombé plutôt par défaut de réaction générale ou locale que par la violence de la fièvre et des symptômes inflammatoires. Aussi nous comprenons très-bien pourquoi les médecins américains emploient et préconisent le vomitif, puis le calé en infusions très-concentrées, le calomel, et après l'emploi de ces moyens, les lavements avec une dose de laudanum proportionnée à l'âge des malades. Des ces conseils aussi la rhubarbe, les poudres absorbantes, les vésicatoires aux membres, les frictions sèches avec la laine. Nous pensons que ces derniers moyens et en général tous ceux qui tendent à ramener l'expansion vitale vers la peau sont les plus avantageux. Le régime tonique est aussi préconisé par les Américains comme moyen prophylactique du choléra

(1) *Ann. de Med.*, 1^{re} année 1854.

« qui, suivant eux, est dans leurs contrées un fléau non moins redoutable que la phthisie. »

Il faut avouer avec M. Trouseau que le traitement est le plus souvent inefficace. Suivant ce professeur, l'opium serait funeste, et les astringents ne réussissent presque jamais. La diète, les émollients, les bains sont des moyens utiles, mais peu héroïques; ce n'est en quelque sorte que de l'expectation. L'emploi de la poudre d'ipécacuanha dès le début des accidents paraît mieux réussir; on la donne dans du sirop à la dose de 25 à 40 centigrammes en quatre ou cinq fois, à dix minutes d'intervalle; puis, cinq ou six heures plus tard, on donne un lavement avec 160 gram. d'eau distillée et 5 centigr. de nitrate d'argent cristallisé. Au besoin on répète ce lavement deux fois en 24 heures. Si la diarrhée s'arrête, on donne 5 à 10 grammes de sel de seignette (tartrate de potasse et de soude), et on supprime les lavements de nitrate d'argent. C'est par ces moyens que M. Trouseau dit être parvenu à sauver quelques malades.

— Nous n'aurions plus à ajouter ici que ce qui est relatif aux tubercules du foie, mais nous en parlerons dans le chapitre que nous consacrerons à l'étude des maladies tuberculeuses de l'abdomen.

ARTICLE III.

MALADIES DE LA RATE ET DU PANCRÉAS.

La rate et le pancréas n'offrent aucune maladie qui réclame une place spéciale dans un traité de pathologie infantile. Les congestions spléniques s'observent chez le nouveau-né dans les mêmes circonstances que les hyperémies hépatiques et gastro-intestinales, et n'offrent rien de particulier. Billard a cité un exemple de rupture de la rate par suite d'un semblable état pathologique. Nous verrons ailleurs ce qu'il y a à dire des tubercules de cet organe. Quant au pancréas, nous ne l'avons trouvé altéré qu'une

seule fois dans le cours de nos recherches, et c'était une lésion tuberculeuse qui n'avait été nullement soupçonnée pendant la vie. Nous en reparlerons bientôt.

ARTICLE IV.

MALADIES DU PÉRITONÉE.

La plupart des maladies de la séreuse abdominale que l'on rencontre aux autres âges sont rares dans l'enfance. La péritonite aiguë et chronique et l'ascite nous paraissent les seules qui exigent de notre part, non pas une description complète, mais une indication résumée des faits fournis par l'observation.

— En dehors des péritonites puerpérales et de celles qui sont consécutives aux lésions traumatiques ou aux perforations du tube intestinal, l'inflammation aiguë du péritoine est rare à toutes les époques de la vie. Nous ne pouvons dire d'une manière certaine si elle l'est plus ou moins dans l'enfance qu'aux âges suivants. Jusqu'à présent nos recherches qui ont porté plus spécialement sur les sujets d'un à quinze ans, ne nous ont fourni que six cas de péritonite aiguë véritablement idiopathique; sur ce nombre quatre sujets ont succombé et l'examen du cadavre n'a laissé aucun doute sur la nature de l'affection. Ces six sujets étaient tous âgés de plus de dix ans, et leur maladie offrit à peu près la même marche que chez l'adulte. Chez deux elle fut très-aiguë, la mort prompte; chez un autre, d'abord très-aiguë, elle passa à l'état chronique et entraîna la mort après trois à quatre semaines; chez le quatrième malade elle fut sub-aiguë et pour ainsi dire latente; son existence ne fut reconnue d'une manière certaine qu'à l'examen du cadavre. Enfin chez les deux derniers la péritonite parut limitée à une partie du péritoine et céda aux antiphlogistiques. En résumé, par l'âge des enfants et l'ensemble des symptômes, la maladie n'a rien offert de bien distinctif.

La péritonite aiguë spontanée s'observe aussi chez les nouveau-nés. Billard l'a vue plusieurs fois et en a raconté un cas en détail dans son ouvrage : « La tension du ventre, qui s'élève en pointe vers l'ombilic, l'agitation, la douleur indiquée par la face grimaçante et les cris sans cesse répétés de l'enfant, les vomissements, les éruptions, la constipation, enfin l'affaiblissement général, la petitesse du pouls, le marasme et la décomposition des traits, tel est l'ensemble des caractères et des symptômes de la péritonite, qui, du reste, exige de la part du médecin l'attention la plus grande et le tact le plus fin pour être distinguée des phlegmasies du tube intestinal, avec lesquelles elle peut se compliquer et se confondre (1). »

Cette dernière remarque est d'autant plus fondée que nous avons eu occasion de la vérifier, même dans le cas de perforations dothinentériques ou tuberculeuses. Nous avons cité, p. 142, un fait de ce genre dans lequel la péritonite n'eut pas dès le premier jour cette violence qui la caractérise d'ordinaire quand elle succède à un épanchement intestinal; chez deux autres sujets, la péritonite produite par une perforation tuberculeuse de l'appendice iléo-cæcal, retint pendant deux ou trois jours l'apparence d'une simple entérite aiguë, les douleurs très-vives, les vomissements, le météorisme, la dyspnée, l'altération du faciès, la petitesse du pouls, ne se manifestèrent que plus tard. Aussi le diagnostic fut-il tardif, mais ce fut moins erreur de notre part qu'insuffisance des caractères sémiologiques.

La dyspnée qui résulte du météorisme et de ce que le diaphragme est gêné dans ses mouvements d'abaissement, pourrait quelquefois faire croire à une maladie de poitrine. Mais les renseignements complètement négatifs fournis par la percussion et l'auscultation, joints aux autres symptômes, permettent rarement de commettre cette méprise. Enfin, les douleurs de la péritonite étant constantes et très-vives, la réunion de ces deux caractères les fera distinguer de celles qui, appartenant à d'autres maladies, sont

(1) Ouvrage cité, page 495.

constantes mais peu vives, ou très-vives mais rémittentes.

Dans un Mémoire publié en mai et juin 1847 (1), M. Duparcque a fait connaître des observations très-intéressantes de péritonite chez les enfants qui corroborent les nôtres et prouvant qu'on aurait tort de ne pas croire à l'existence de la péritonite essentielle chez les jeunes sujets. Le travail de ce médecin distingué présente un autre intérêt plus spécial, c'est qu'il repose sur des cas tous observés chez des enfants du sexe féminin. L'auteur en rapporte cinq exemples, bien qu'il eût pu en citer davantage, mais il n'a choisi que les faits les plus complets. Il en résultait que c'est de huit à onze ans, après la seconde dentition et bien avant la puberté, que la péritonite aiguë se montrerait chez les jeunes filles. La maladie est toujours survenue au milieu d'une parfaite santé. Études assidues dans des classes renfermant beaucoup d'enfants, récréations et exercices actifs en plein air, telles étaient les conditions hygiéniques où se trouvaient toutes ces jeunes filles, ce qui pourrait faire attribuer la maladie soit à des suppressions de transpiration, soit à des secousses violentes. « Toutefois, ajoute l'auteur, force est d'admettre non-seulement une certaine prédisposition produite par l'âge, mais encore une prédisposition particulière individuelle, puisque sur une réunion d'un nombre plus ou moins considérable de jeunes sujets placés dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes influences, un très-petit nombre a été frappé de cette maladie. »

D'après la description que M. Duparcque donne des symptômes de la péritonite chez les jeunes filles, on voit qu'elle ne diffère pas notablement de la péritonite des adultes. Ce médecin lui a trouvé la plus grande analogie avec celle qui suit l'accouchement sous les rapports de l'intensité, de la violence des symptômes et de leur marche. Enfin le pronostic a été très-grave puisque sur cinq malades trois ont succombé.

(1) *Annales d'obstétrique, Gynécologie, des femmes et des enfants.*

Les antiphlogistiques forment la base ordinaire du traitement de la péritonite des enfants, mais ils ne peuvent réussir qu'à la condition d'être généralement employés avec vigueur et surtout avec promptitude dès le début. L'association des frictions mercurielles nous a paru efficace dans des cas très-graves ; ce n'est pas que cette médication ait eu un succès complet, mais elle a prolongé la vie des malades en faisant passer l'affection à l'état chronique, quoique chez l'un des deux elle fût de la plus grave espèce, c'est-à-dire consécutive à une perforation intestinale. Dans ces cas de perforation, les opiacés à très-haute dose offrent seuls quelques chances de succès, ainsi que nous l'avons dit en traitant des perforations d'ecthymatériques. Cette médication a même été appliquée à la cure de la péritonite aiguë tout-à-fait spontanée par les médecins anglais.

Il existe chez le nouveau-né quelques causes spéciales de péritonite ; c'est d'abord l'oblitération congénitale du rectum. On comprend qu'alors c'est la cause qu'il faut surtout combattre et que le traitement simplement dirigé contre la péritonite ne peut point réussir. Une cause analogue qui peut se rencontrer à toutes les époques de l'enfance, c'est l'intus-susception du canal intestinal. Nous avons fait voir ailleurs quels accidents engendrent cette maladie, et que, parmi eux, la péritonite est nécessairement un phénomène très-secondaire par rapport au traitement.

La plébite ombilicale qu'on observe chez un certain nombre d'enfants nouveaux-nés est aussi une cause spéciale de péritonite au commencement de la vie, de même qu'elle est aussi le point de départ des érysipèles graves que nous verrons ailleurs être assez communs à cette époque de l'existence. Nous dirons dès à présent que cette origine commune rend très-bien compte de la coïncidence fréquente de l'érysipèle avec la péritonite. Ces deux maladies se développent parce que le travail d'élimination qui doit amener la chute du cordon ombilical et qui est de nature inflammatoire, prend une trop grande intensité et se propage soit à la peau environnante soit au péritoine qui engaine les vaisseaux ombilicaux. D'ailleurs, il faut re-

connaître avec M. Treusseau (1) que cette propagation rare dans les temps ordinaires le devient moins dans des circonstances exceptionnelles probablement semblables à celles qui déterminent les épidémies de fièvres puerpérales; car c'est surtout pendant ces épidémies qu'on observe la plébite ombilicale. Underwood avait déjà remarqué que l'érésipèle des nouveau-nés sévissait le plus souvent durant les épidémies de fièvre puerpérale, et que l'on trouvait dans le péritoine des enfants les mêmes désordres que chez les femmes qui succombaient. Le traitement qui convient dans le cas particulier que nous venons d'examiner est le même que dans les cas ordinaires. Seulement il est bon de veiller à ce que la chute du cordon ombilical ne soit suivie d'aucune inflammation. En prévenant le développement de celle-ci, et en la combattant lorsqu'elle a pris naissance on supprimera la cause qui a le plus d'influence sur la production de la péritonite des nouveau-nés.

Nous ne dirons rien ici de la péritonite chronique. Cette maladie étant presque constamment de nature tuberculeuse, son histoire doit être renvoyée à celle de la phthisie entéro-mésentérique.

— *L'ascite* n'est point rare dans le premier âge; mais, comme aux autres époques de la vie, elle est presque toujours symptomatique. Tantôt elle résulte d'une gêne au cours du sang dans les parties centrales de la circulation, tantôt du développement des tubercules dans différentes parties de l'abdomen ou du médiastin, et alors elle est produite soit par la compression des vaisseaux, soit par une modification apportée par la présence des tubercules aux actes d'exhalation et d'absorption de la séreuse abdominale; tantôt elle est consécutive aux fièvres éruptives, surtout à la scarlatine, et n'est qu'un fragment, pour ainsi dire, de l'hydropisie générale qui survient dans ces cas-là. Tout ce qui se rapporte à ces différentes espèces d'ascite ne saurait être placé ici sans nuire aux connexions naturelles des faits, et doit être renvoyé à l'histoire des affections qui

(1) *Ann. des Anp.*, 1844, v, 55.

donnent naissance à l'hydro-péritonite. Quant à l'ascite essentielle, nous ne connaissons points de faits qui puissent nous conduire à en parler d'une manière particulière en ce qui concerne les enfants.

— Nous rapprocherons des maladies du péritoine ces exemples de *péritonéum sans-péritonéum* qui n'ont été bien connus et bien décrits que dans ces derniers temps, surtout depuis les recherches de Dupuytren sur les abcès de la fosse iliaque droite. Cette maladie, qui a été décrite par les médecins allemands sous le nom de *perityphlitis* (1), et sur laquelle M. Griseolle a publié récemment un mémoire extrêmement complet, est à peu près étrangère à l'enfance, à en juger du moins par les recherches des observateurs que nous venons de nommer. Aussi n'en aurions-nous pas dit un mot si nous n'arions eu occasion d'en observer un exemple très-bien caractérisé sur un enfant de treize ans qui, placé comme apprenti chez un doreur sur bois, avait eu déjà plusieurs attaques de constipation dues sans doute aux préparations de plomb qui s'employaient dans cette profession. La guérison fut complète et assez rapide, grâce à l'usage combiné des émissions sanguines locales, des topiques émollients, des laxatifs par la bouche et en lavements et des bains généraux.

SECTION V.

MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES.

La plupart des affections génito-urinaires sont étrangères à l'enfance. Il est peu d'organes qui, étudiés sur le cadavre, soient aussi souvent dans un état parfait d'intégrité que les reins, l'urètre, les testicules, l'utérus et ses annexes, le vagin et les glandes mammaires. Les études

(1) *Dissertation inaugurale sur la perityphlitis*, par G. Wilsow, *Ann. méd.*, p. 548, 1858.

cliniques fournissent des résultats analogues. On arrive ainsi à reconnaître que les seules maladies de l'appareil urinaire dont il convient de parler sont : l'affection calculaire, les tubercules des reins, le catarrhe vésical et l'incontinence d'urine. Quant à l'appareil génital, nous ne voyons que la leucorrhée des petites filles et la gangrène de la vulve qui méritent une mention particulière.

Nous nous occuperons dans notre dernière section des tubercules de l'appareil génito-urinaire. Quant à l'affection calculaire, comme elle rentre dans le domaine de la chirurgie, nous croyons devoir la passer sous silence.

CHAPITRE I.

MALADIES DES VOIES URINAIRES.

ARTICLE I.

CATARRHE VÉSICAL.

Le catarrhe vésical est moins rare dans l'enfance qu'on ne le pense communément, même en l'absence d'une pierre dans la vessie. Nous avons exposé ailleurs les conditions spéciales au jeune âge qui prédisposent le tissu muqueux aux inflammations catarrhales. Rien qu'elles soient peu prononcées dans la muqueuse urinaire, elles y conservent cependant encore une certaine puissance, et c'est par elles qu'on peut concevoir la production du catarrhe vésical par d'autres causes très-simples, telles que la paresse de la vessie et la stagnation de l'urine qui en est la conséquence. Cette maladie se voit principalement chez les sujets d'un tempérament lymphatique, d'une constitution faible, chez les scrophuleux et les rachitiques. Souvent aussi elle est provoquée, entretenue, exaspérée par l'irritation du rectum et surtout par la présence des vers. Elle est sedi-

nairement chronique, et sous cette forme il est facile de la méconnaître, parce que les enfants font peu attention à l'aspect des urines qu'ils rendent, et que les autres symptômes sont obscurs. En effet, comme le dit M. Civiale, « elle cause moins de douleur qu'aux autres époques de la vie, le passage des mucosités à travers l'urètre occasionne des caissements moins vives. Quelquefois la phlegmasie persiste pendant plusieurs années sans que l'urine devienne puriforme (1). » Cependant il arrive la plupart du temps que le catarrhe présente des exaspérations qui mettent le praticien sur la voie ; il y a de la dysurie, les urines sont lactescentes et par le repos laissent précipiter des mucosités plus ou moins opaques. Rarement la maladie offre une marche franchement aiguë, et dans beaucoup de cas elle coïncide avec l'incontinence d'urine.

Le traitement est semblable à celui qui convient dans un âge plus avancé, c'est-à-dire qu'on emploie les antiphlogistiques, les révulsifs, les balsamiques, les excitants et les sédatifs, suivant l'exigence des cas particuliers et en tenant compte de la cause principale du mal. « Chez certains enfants, dit M. Civiale, au début de la maladie, il suffit de passer quelques bougies molles dans l'urètre, et de faire des injections simples dans la vessie pour voir disparaître de l'urine les mucosités qu'elle contenait, et l'excrétion de ce liquide reprend son cours régulier. Mais on est rarement appelé dès le principe, et quand l'affection dure déjà depuis un certain laps de temps, comme c'est le cas le plus ordinaire, on trouve le canal excessivement irritable. De là naissent des difficultés pour le traitement. L'introduction des premières bougies et des premières sondes est fort douloureuse, et détermine parfois une réaction qui exaspère la phlegmasie. Il faut alors procéder à ces introductions avec la plus grande réserve, si l'on ne veut pas être obligé d'interrompre le traitement, et par conséquent d'en prolonger beaucoup la durée (2). »

(1) *Traité prat. sur les mal. des org. génit. m.,* t. IV, p. 322.

(2) *Œuvres compl. Méd.*

ARTICLE II.

INCONTINENCE D'URINE.

Il faut ranger dans deux catégories les sujets affectés d'incontinence d'urine. Chez les uns elle est continuelle, chez les autres elle est intermittente et n'a lieu que la nuit. La première n'est jamais qu'un effet de diverses affections qui ne doivent point nous occuper et qui pour la plupart se rencontrent rarement dans l'enfance. C'est de l'incontinence nocturne seule qu'il s'agira dans le cours de cet article.

Disons d'abord qu'elle n'est pas toujours une maladie mais quelquefois un simple défaut. J.-L. Petit a distingué les enfants qui pissent au lit en trois espèces : « La première est de ceux qui sont pareille à se lever pour pisser aux premiers avertissements ; la seconde espèce est de ceux qui dorment si profondément que la sensation qui précède l'envie d'uriner n'est point assez forte pour les éveiller ; il n'y a pour ainsi dire que le col de la vessie qui se soulève, et qui, accoutumé d'obéir à cette sensation, s'ouvre machinalement, et laisse passer les urines sans que l'âme en soit avertie. La troisième espèce est de ceux qui rêvent pisser dans un pot de chambre, contre un mur ou autres lieux ; ils sentent qu'ils ont envie d'uriner et ils pissent effectivement. Ceux-là ne sont pas en grand nombre, ou du moins il ne leur arrive pas souvent de faire de pareils rêves (1). »

L'incontinence de la première et de la troisième espèce ne se rattache à aucune condition pathologique de l'appareil urinaire, et son traitement consiste tout entier dans l'emploi des moyens moraux. Ceux-ci doivent rarement être rigoureux et sévères. Il faut se contenter d'imposer des privations à l'enfant, ou de piquer son amour-propre

(1) J.-L. Petit, *Ouvrages complètes*, édit. de Vigot, P. 795.

en le réprimandant devant des personnes étrangères. La fustigation est un moyen dont beaucoup de parents abusent et qui offre parfois trop de véritables dangers pour que le médecin n'en blâme pas énergiquement l'usage. « On ne saurait, dit M. Lagneau, recommander trop de circonspection dans l'emploi, préconisé par différents auteurs, de moyens propres à frapper vivement l'imagination de l'enfant en lui occasionnant une grande frayeur, comme celle qu'il éprouve quand on lui fait écraser une souris vivante dans la main, lorsqu'il entend inopinément une violente détonation, ou qu'on le force à assister aux derniers instants d'un moribond. Il pourrait en résulter dans nombre de cas des épilépsies, des chorées, ou toute autre affection convulsive plus ou moins difficile à guérir (1). »

C'est à la seconde espèce de J.-L. Petit que se rapporte l'incontinence d'urine réellement pathologique que nous devons étudier avec quelques détails.

Il est facile de concevoir comment l'enfance prédispose si puissamment à l'énurésie nocturne. A cet âge le système musculaire de la vie organique jouit d'une contractilité plus prononcée; tous les réservoirs qui en sont pourvus se vident plus souvent; de simples contractions physiologiques prennent parfois le caractère spasmodique, comme on le voit dans certains cas de vomissement. Or, la vessie a une tunique charnue dont la contraction est au moins en partie sous l'influence du système nerveux ganglionnaire et dès-lors soustraite à l'empire de la volonté. Pendant l'état de veille, les effets de cette contraction sont empêchés, soit par la simple force tonique des muscles constricteurs de l'orifice vésical de l'urètre, soit par leur contraction volontaire; mais le sommeil qui abolit toute contractilité volontaire, n'a aucun effet de ce genre sur la contractilité organique sensible. Peut-être même il serait facile de démontrer que celle-ci augmente pendant le sommeil. Quoi qu'il en soit, la suppression de la volonté

(1) *Dict. de méd.*, 2^{me} édit., t. vii, p. 250.

achève de détruire l'équilibre de deux puissants antagonistes en faveur de celle qui prédomine naturellement sur l'autre dans le premier âge.

Remarquons d'ailleurs que le sommeil abolit plus complètement les fonctions des sens et de l'intellect que celles de l'instinct, que par conséquent plusieurs de ces dernières s'accomplissent pendant le sommeil; que chez l'enfant elles sont plus actives et comportent beaucoup d'actes qui chez l'adulte sont complètement volontaires et délibérés; que dès-lors l'expulsion des urines qui à un certain âge est réglée, avancée ou retardée, suivant le caprice individuel, pour ainsi dire, est presque entièrement instinctive dans le premier âge et par conséquent bien plus étroitement enchaînée à la sensation qui la précède, lors même que celle-ci serait rendue plus sourde et plus obscure par le sommeil.

Telles sont les conditions physiologiques prédisposantes de l'incontinence d'urine qui sont en rapport direct avec l'âge. On conçoit que chez certains sujets elles soient tellement prononcées, qu'en l'absence de toute autre circonstance elles deviennent déterminantes. Mais dans la plupart des cas il s'y joint d'autres influences qui agissent dans le même sens. C'est ainsi que peut s'interpréter celle d'une constitution faible, d'un tempérament lymphatique, de l'hérédité et d'une disposition scrophuleuse, rachitique. Quant aux causes occasionnelles, il est facile de prévoir que l'ingestion de boissons abondantes ou l'oubli de faire uriner les enfants avant de les coucher, que les fatigues de la journée dont l'effet est de rendre le sommeil plus pesant, doivent singulièrement favoriser l'émission inaperçue des urines. Enfin la chaleur du lit paraît avoir une grande influence chez certains enfants qui pissent au lit dans leur premier sommeil, avant même que la vessie soit distendue par une grande quantité de liquide.

Suivant la remarque très-juste du docteur Delcor, de Verviers (1), une circonstance qui contribue ensuite à

(1) *Gaz. du Dép. Ebls.*, p. 207.

entretenir cette maladie, c'est l'habitude que contracte bientôt la vessie de se vider vers certaines heures et sous l'influence des mêmes causes, telles que la chaleur du lit, le coucher en sésualien, etc. On sait, en effet, que la répétition fréquente du même acte dispose à son renouvellement par les causes les plus légères : toutes nos fonctions organiques, comme la digestion, les excrétions, sont soumises aux lois de l'habitude. Cette dernière cause explique en partie la ténacité de l'énurésie nocturne qui se prolonge souvent jusqu'en l'âge adulte malgré toutes les médications.

La plupart des auteurs, surtout depuis Desault, ont admis le mécanisme et les causes que nous venons d'assigner à l'énurésie nocturne. Dans ces derniers temps, M. Civiale a essayé de renverser cette opinion. Ce chirurgien dit avoir observé l'incontinence chez des sujets dont la vessie paracause était continuellement distendue par une certaine quantité d'urine, et il pense que dans ces cas l'évacuation nocturne est due à un véritable regorgement analogue à celui qui arrive dans toute rétention en général. S'il en était ainsi, l'incontinence ne serait que symptomatique. Mais à coup sûr les faits sensibles à ceux dont parle M. Civiale ne sont pas les plus nombreux, et dans la plupart des cas la vessie n'est pas distendue par l'urine dans l'intervalle des évacuations. D'ailleurs, en supposant que ce relâchement par atonie fût aussi fréquent qu'on le dit, il faudrait toujours expliquer comment il se fait que l'incontinence ait lieu la nuit et non dans un état de veille, et l'on arriverait à reconnaître en dernière analyse que les raisons physiologiques que nous avons exposées n'en trouvent pas moins leur application. Quoi qu'il en soit, les cas cités par M. Civiale ont une importance réelle en pratique, puisque ce n'est plus une simple incontinence qu'il faudra combattre, mais bien au contraire la rétention qui en est le point de départ. Il devient par là indispensable, toutes les fois qu'on aura lieu de soupçonner cet état morbide, et en général dans tous les cas d'incontinence, d'explorer attentivement la région hypogastrique, afin de s'assurer si la ves-

sie n'est point habituellement distendue, et, au besoin de pratiquer le cathétérisme pour rendre le diagnostic plus certain.

Le traitement de l'énurésie nocturne est général et local. Le premier, a pour but de remédier à la faiblesse de la constitution, à la prédominance du tempérament lymphatique et parfois à d'autres états pathologiques, tels que les scrophales, le rachitisme, etc. C'est dans un sage emploi des moyens de l'hygiène et de la matière médicale qu'il faudra chercher les ressources propres à cet objet. Ainsi un régime tonique et analeptique, l'exercice, l'insolation, le bon air devront précéder ou accompagner l'administration des amers, des ferrugineux, des bains généraux, simples et alors froids, ou composés, c'est-à-dire des bains sulfureux, salins, alcalins et iodés. Dans certains cas on aura à remplir toutes les indications que présentent les scrophales et le rachitisme.

Par les moyens locaux on se propose de modifier la sensibilité et la contractilité de la vessie. C'est ainsi qu'agissent les douches froides, dirigées sur les pubis, les aines et le périnée; les immersions courtes, mais répétées, dans l'eau très-froide, préconisées par Dupuytren; les ventouses et les vésicatoires dans le voisinage de la vessie, la présence d'une sonde dans l'urètre, et l'usage interne des préparations de noix vomique ou de cantharides. Ces deux derniers agents doivent être maniés avec prudence; il faut toujours commencer par des doses très-faibles, et ne les augmenter qu'après qu'on a pu juger quelle est la susceptibilité individuelle. Avec ces précautions on en retire généralement de grands avantages, et s'il en est résulté quelquefois des accidents, c'est plutôt l'impéritie ou la témérité des expérimentateurs qu'il faut accuser, que la médication elle-même.

M. Delcor que nous avons cité plus haut a retiré le plus grand succès de l'emploi du nitrate de potasse à haute dose (1 à 2 grammes par jour suivant l'âge) déjà conseillé par le docteur Young, de Chester. Le médecin de Yverriers n'indique pas en détail le mode d'administration qu'il a suivi, mais

il a probablement donné ce médicament en poudre de trois en trois heures comme M. Young. Sur 13 cas il en a guéri 11 par le nitre. Les 2 autres malades, après l'insuccès de ce moyen, furent soumis à l'emploi de l'acide benzoïque (2 pilules par jour contenant chacune : acide benz. 0,20) et furent guéris. M. Chabrely, de Bordeaux, a également réussi à l'aide des balsamiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Comme chez un très-grand nombre d'enfants l'incontinence guérit spontanément vers l'âge de cinq à six ans, il ne faut pas avant cet âge tourmenter les enfants par des médications trop actives pour les débarrasser de ce qui après tout n'est qu'une incommodité peu grave. On voit aussi chez les jeunes filles l'écurésie disparaître par l'établissement des menstrues, après avoir persisté pendant toute l'enfance et résisté à tous les moyens ordinaires. Enfin l'excitation produite par le coït a quelquefois le même résultat dans les deux sexes.

CHAPITRE II.

MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX.

Avant d'être apte aux fonctions sexuelles, l'appareil génital de la petite fille est rarement affecté. Cependant il l'est un peu plus souvent que celui du petit garçon. Cette différence paraît s'expliquer par l'étendue de la muqueuse génitale externe, qui rend plus faciles et plus graves les effets de certaines causes dont l'action sur cette membrane est analogue à celle qu'elles exercent sur d'autres portions du système muqueux, également placées à l'origine des cavités intérieures. C'est à cette cause organique prédisposante qu'il faut rapporter la leucorrhée qui, sans être très-fréquente dans l'enfance, l'est beaucoup plus que le catarrhe urétral chez le petit garçon. D'un autre côté, les fonctions spéciales et plus actives dont les organes génitaux et mam-

mères sont chargés dans le sexe féminin, rendent compte jusqu'à un certain point de cette précocité anormale de la sécrétion lactéuse et de la menstruation qu'on observe chez quelques petites filles, et même de certains faits de métrorrhagie irrégulière et pathologique cités par les auteurs. On a vu des cas de ce genre à toutes les époques de l'enfance et même quelques jours seulement après la naissance. « Le 22 juillet 1833, une jeune fille très-bien portante accoucha d'une fille qui était forte. Cette enfant ne présenta rien de particulier pendant les trois premiers jours, si ce n'est qu'elle était remuante pendant la nuit. Alors on remarqua une légère perte de sang qui se faisait goutte à goutte par les parties génitales. Le troisième jour l'écoulement avait diminué et le sang était devenu plus aqueux; le quatrième il s'écoula quelques gouttes de sang pur, après quoi cet écoulement cessa entièrement. Le liquide avait l'aspect du sang de la menstruation. Cinq jours après cet écoulement les mamelles se tuméfièrent sans être enflammées, l'enfant continua à bien se porter et les nuits devinrent plus tranquilles (1). » Ce fait et d'autres analogues prouvent qu'à une époque fort éloignée de la puberté l'appareil génital est susceptible d'éprouver la turgescence hémorrhagique, et que l'hypérémie peut même s'étendre aux mamelles. Il est d'autres cas dans lesquels la métrorrhagie se lie à un état pathologique véritable, par exemple à un ramollissement fongueux du col de la matrice ou à l'existence d'un polype de l'utérus. C'est ainsi que dans le journal de Desault on trouve l'observation d'une fille qui avant d'être pubère eut plusieurs attaques d'hémorrhagies utérines dont la cause fut longtemps méconnue. Desault reconnut enfin qu'il y avait un polype de l'utérus et en fit la ligature avec succès.

La tuméfaction des mamelles dont nous avons parlé tout-à-l'heure s'observe chez les nouveau-nés non-seulement sur les petites filles, mais encore sur les petits garçons. Quelquefois ce gonflement est accompagné d'une

(1) Observ. par le doct. Camus, *Gas. méd.*, 1835, p. 218.

grande dardeté. Il cesse spontanément par le suintement d'un liquide séreux plus ou moins lactescent dont il faut favoriser la sortie par la succion ou par la pression. Lorsque ce moyen est insuffisant, il faut appliquer des cataplasmes émollients ou frictionner la partie avec de l'axonge.

Nous nous hâtons d'arriver à l'histoire de la leucorrhée que nous ferons suivre de quelques mots sur la gangrène de la vulve.

ARTICLE II.

CATARRHE VULVAIRE DE L'ENFANCE.

Morgagni avait déjà parlé des fleurs blanches dans le premier âge. Il cite deux petites filles, l'une de neuf ans, l'autre de sept, qui perdaient un liquide semblable à du petit lait clarifié, avec sensation de chaleur et de prurit. Vers la fin du siècle dernier quelques auteurs observèrent des faits semblables, et les traités de médecine légale en citent plusieurs exemples. On a donc lieu de s'étonner que la plupart des traités sur les maladies des enfants ne fassent pas même mention de cette maladie. Nous devons au docteur Schoenfeld un mémoire très-complet qui constitue presque une monographie et auquel nous ferons des emprunts fréquents dans le cours de ce chapitre (1).

La leucorrhée s'observe à toutes les époques de l'enfance. Elle se rencontre même chez les filles nouveau-nées, et alors il n'est pas toujours facile de reconnaître quelle en est la cause. Il est bien probable qu'elle tient le plus souvent à l'impression de l'air et au nouveau contact qu'éprouvent toutes les surfaces tégumentaires. Mais il est aussi des cas dans lesquels son début paraît antérieur à la sortie du sein de la mère. On voit quelques petites filles apporter en naissant un gonflement considérable avec rou-

(1) Voir les *Annales d'anatomie et de gynécologie*, publiées à Bruxelles par MM. H. Gausse et Schenck, années des 1^{re} et 15 juillet 1859.

geur vive de toutes les parties externes de la génération qui s'accompagne bientôt d'écoulement leucorrhéique. Nous avons vu tout récemment deux cas de ce genre chez deux petites filles jumelles, dont l'une surtout présentait au plus haut degré cette affection, sans que rien dans les circonstances de l'accouchement ni du côté de la mère pût en dévoiler la cause. Des émollients et des résolutifs ont suffi pour arrêter la guérison. Dans la plupart des cas néanmoins la leucorrhée des filles nouveau-nées ne s'accompagne point de gonflement inflammatoire intense, et consiste dans une affection simplement catarrhale de la muqueuse vulvaire analogue à la blennorrhée ocullo-palpébrale qui s'observe aussi très-souvent dans les mêmes circonstances.

Un peu plus tard, jusqu'à la puberté, l'étiologie du catarrhe vulvaire est la même que pour la plupart des autres catarrhes. Ainsi il faut mettre en première ligne le tempérament lymphatique. « E. E. . . . », fille unique d'une mère éminemment lymphatique et affectée de leucorrhée chronique depuis l'âge de treize ans, était d'un teint pâle, avait des chairs flasques et des membres grêles, le moindre exercice lui procurait une agitation qui se prolongeait plus ou moins longtemps. Son éducation physique fut de nature à la rendre encore plus délicate. A l'âge de sept ans, il lui survint un léger gonflement aux parties génitales externes avec rougeur aux grandes lèvres et prurit. Elle eut de l'agitation et du malaise. Cet état dura neuf à dix jours, après quoi il s'écoula par les organes sexuels une muco-sité séreuse, d'abord peu copieuse, mais ensuite plus abondante, se renouvelant plusieurs fois par jour et sous forme d'accès. Je devois regarder cette affection, sinon comme héréditaire, du moins comme due à un état de faiblesse de l'organisme en général, avec prédominance du système lymphatique, condition fâcheuse qu'une éducation physique débilitante avait aggravée. Après l'emploi d'un régime doux et d'une médication émolliente pendant la courte période de la congestion, j'eus recours aux modifications toniques et à un régime fortifiant : je fis prendre des bains gélatinoux (à 25°), et je réusis à

modérer de beaucoup cette sécrétion abondante qui menaçait d'épuiser la petite malade. Un an plus tard elle eut une recrudescence, à la suite de laquelle les voies digestives furent malades et l'enfant succomba. Dans une autre famille j'ai observé la leucorrhée héréditaire chez deux filles, dont l'une était âgée de sept ans et demi et l'autre de cinq ans; mais ces affections, quoiqu'elles d'une longue durée, furent moins intenses; les petites malades se rétablirent (1). »

Ramel fils a rapporté dans l'ancien *Journal de Médecine* (2) l'observation de deux jeunes sœurs atteintes de fleurs blanches héréditaires depuis l'âge le plus tendre. « Je connais dans ce pays, dit-il, deux jeunes personnes qui ont eu cet écoulement à l'âge le plus tendre; à six ou sept mois, on a aperçu chez elles cet écoulement qui a été quelquefois aussi abondant que chez les femmes pubères. L'aînée de ces deux sœurs a actuellement huit à neuf ans, et la cadette six et demi. Cet écoulement vient par intervalles et disparaît pour reparaitre après un temps très-court. Il est quelquefois modéré, d'autres fois très-abondant, et ne garde aucune régularité dans son apparition. La mère de ces deux jeunes personnes est sujette depuis longtemps à des fleurs blanches si abondantes que le parquet de ses appartements en est quelquefois arrosé malgré ses langes. »

Seamer et Dalme, cités par M. Schoenfeld, avaient fait des observations du même genre.

La faiblesse de la constitution, un régime débilitant et mauvais, les habitations humides, malsaines et froides, certaines saisons, le printemps et l'automne, sont des causes communes à toutes les maladies catarrhales et par conséquent aussi à la leucorrhée qui devient quelquefois assez fréquente lorsque ces affections règnent épidémiquement.

Nous devons encore mentionner comme causes plus ou

(1) Schoenfeld, mémoire cité.

(2) Tome xix, 1785.

moins actives le travail pathologique de la dentition, dont l'influence a été confirmée par les observations de Capuron, Siebold, Boérin et Dagès, la suppression d'une autre affection catarrhale, les refroidissements généraux ou locaux, la présence des vers dans l'intestin, la constipation, un calcul urinaire et les fièvres éruptives qui parfois gœtent leur action sur la muqueuse vulvaire comme sur la conjonctive, la pituitaire, etc.

La leucorrhée peut tenir à des causes d'irritation directe, telles que la malpropreté, les frottements, le viol et, par dessus tout, la masturbation qui peut elle-même dépendre de diverses conditions physiologiques ou pathologiques, et être à son tour gœtée par la leucorrhée à cause du prurit qui l'accompagne. M. le docteur Martin jeune, ancien chirurgien en chef de la Charité de Lyon, a inséré dans ses mémoires plusieurs observations très-intéressantes sur les effets funestes de la clitoromanie. Cet habile praticien insiste avec raison sur la nécessité de s'assurer, toutes les fois qu'on est appelé à donner des soins à de jeunes filles affectées de leucorrhée, si cette maladie ne dépend point de l'onanisme.

Enfin dans certains cas la blennorrhée vulvo-vaginale est symptomatique de la syphilis. L'infection n'a pas toujours lieu par le viol, mais aussi quelquefois au moyen du linge, des vêtements, par des atouchements involontaires, etc. M. Schoenfeld en a vu plusieurs exemples chez des enfants qui couchaient dans le lit de leurs parents atteints de syphilis. D'ailleurs nous ne faisons que mentionner cette cause; car la leucorrhée due au virus syphilitique ou blennorrhagique n'est point celle que nous avons spécialement en vue.

Les symptômes ne sont en général faciles à apprécier. Dans la première période l'écoulement est peu abondant, quelquefois même la muqueuse est sèche pendant plusieurs jours. L'enfant éprouve une chaleur incommode, du prurit en de la cuisson aux parties génitales externes, y porte la main ou accuse par ses réponses le genre et le siège de la souffrance qu'il ressent. En examinant la vulve,

on trouve ordinairement un gonflement aux grandes et aux petites lèvres, la muqueuse est rouge, injectée, chaude. Le passage des urines augmente la douleur. Le plus souvent les symptômes restent locaux; cependant il n'est pas rare de voir un peu de fièvre et des troubles digestifs, surtout quand la cause de la maladie a pu agir en même temps sur plusieurs organes. Dans la seconde période l'écoulement devient plus prononcé. Quelquefois il est abondant dès la première, et les symptômes de phlegmasie sont alors moins tranchés. Le liquide sécrété est en mucus d'abord ténu, demi-transparent, puis épais, opaque, puriforme, blanchâtre. Grand sur le point et le vert, et formant sur le linge des taches grises ou d'un gris noirâtre. Quelquefois son contact irrite, enflamme, excorie et ulcère la peau des grandes lèvres, du périnée et des régions voisines, qui deviennent d'un rouge foncé. La démangeaison est parfois très-vive et insupportable. Mais en général les signes d'inflammation sont d'autant moins violents dans cette seconde période qu'ils l'ont été davantage dans la première, et vice versa. Enfin le flux muqueux diminue graduellement, perd toutes ses qualités irritantes, la phlogose disparaît, et la maladie guérit ou passe à l'état chronique.

Le diagnostic de la leucorrhée n'offrirait aucune difficulté s'il se bornait toujours à affirmer ou à nier l'existence de cette maladie, ou même à la distinguer de quelque autre affection. Mais lorsqu'on est appelé à prononcer sur la nature de cet écoulement et des causes qui l'ont déterminé, c'est alors que des difficultés sérieuses et parfois même insolubles peuvent se présenter au praticien. Nous avons vu que le catarrhe vulvo-vaginal des petites filles reconnaît deux origines distinctes : tantôt il dépend d'une ou plusieurs causes internes, telles que la faiblesse de la constitution, le tempérament lymphatique, la diathèse scrophuleuse; tantôt il est le résultat de causes externes et d'une action mécanique directe sur les organes génitaux, telle que la masturbation et les tentatives d'une copulation précoce; dans ce dernier cas l'écoulement peut être de

tare blennorrhagique ou syphilitique. Il résulte de cette double origine que parfois l'on a beaucoup de peine à décider au premier abord quelle est la nature de l'écoulement.

En effet les commémoratifs sont souvent insuffisants, ou même de nature à faire tomber dans une erreur complète un médecin crédule et sans défiance. On a plus d'une fois affaire à des parents immoraux qui ayant des petites filles atteintes d'une leucorrhée indépendante de tout rapprochement impur dirigent des accusations infamies contre des personnes à qui ils espèrent extorquer des dommages-intérêts en les menaçant d'un procès scandaleux. Le médecin doit donc être sur ses gardes et ne se rendre qu'à l'inséance, surtout s'il s'agit d'affirmer par certificat qu'il y a eu tentative de viol ou de rapprochement sexuel. S'il est vrai que souvent il n'existe dans les phénomènes locaux aucun signe indiquant d'une manière positive si la maladie résulte d'une cause interne ou externe, il faut aussi avouer que parfois l'état local fournit des présomptions d'une grande valeur. Si, par exemple, on constate aux organes génitaux des ecchymoses, des déchirures, éraillures ou excoriations, un enfoncement ou une dilatation de la vulve, enfin s'il y a déchirure de la membrane hymen et chute de l'urètre, comme l'a observé quelquefois M. Guersant fils, il est infiniment probable qu'il y a eu tentative d'introduction de corps étranger soit par un viol, soit par la masturbation avec le doigt ou avec un corps étranger. Le viol ne devient certain que lorsqu'il y a des signes d'affection syphilitique.

Si, au contraire, en l'absence de toute espèce de traces d'une violence locale, on constate l'ensemble des causes générales que nous avons indiquées, c'est-à-dire, les caractères d'une constitution faible, scrophuleuse, d'une disposition aux flux muqueux, ou la coïncidence d'une épidémie de maladies catarrhales, on devra conclure au développement de la leucorrhée sans cause externe. Enfin la thérapeutique fournit ordinairement des données très-exactes sur la nature de l'écoulement. Si celui-ci dépend d'une cause constitutionnelle, les moyens locaux ne suffisent pas le plus souvent pour procurer la guérison, tandis que si la

cause est extirpée les moyens locaux font disparaître le mal.

La durée est ordinairement de trois à quatre semaines. Elle est moindre si l'affection ne résulte que d'une cause directe, simple et facile à enlever ; mais dans les cas opposés elle dure souvent jusqu'à deux ou trois mois. M. Schenck a vu quelquefois les glandes inguinales engorgées. Il a vu aussi la maladie s'exalter au degré de phlogose grave, envahir tout l'appareil génital externe, gagner en profondeur, amener des symptômes généraux et la mort. Toutefois ce résultat est rare et la maladie guérit le plus souvent. Mais ce qui rend toujours son pronostic sérieux, c'est qu'en dépit de tous les modes de traitement elle suit son cours ordinaire et annonce soit une irritabilité vive et précoce des organes génitaux, soit une disposition générale aux affections catarrhales qui est toujours fâcheuse. E. de Siebold, dans son ouvrage sur les maladies des jeunes filles, dit que « si les fleurs blanches se montrent avant l'époque de la menstruation, elles ne cèdent parfois à aucune médication, mais elles se perdent vers la puberté avec le commencement des menstrues, si toutefois elles n'ont pas exercé une influence funeste sur la fonction menstruelle et si les parties génitales ne sont point devenues le siège de lésions profondes. »

Les indications thérapeutiques dans la leucorrhée sont les mêmes que dans les affections catarrhales en général. Les unes locales sont motivées par le degré d'intensité de la phlogose et par la sécrétion catarrhale, les autres générales se rapportent à la constitution, au tempérament et aux maladies dont la leucorrhée peut dépendre.

Les antiphlogistiques énergiques nous paraissent rarement nécessaires. Il ne faut les mettre en usage que lorsque le gonflement inflammatoire est très-prononcé, très-douloureux et s'accompagne de phénomènes fébriles. Dans ces cas seulement on pourra prescrire l'application des sangsues aux aines et quelquefois même une saignée générale. Le plus souvent on doit se borner à des topiques émollients, à des lotions mucilagineuses fréquemment répétées, à des bains entiers tièdes, à de grands soins de pro-

prété. Lorsque l'inflammation est très-faible, il faut généralement rejeter les émollients.

Les astringents et les irritants substitutifs nous paraissent d'une opportunité plus générale que les antiphlogistiques. Lorsqu'on est appelé dès les premiers instants, on peut souvent reconnaître que la sécrétion catarrhale existe déjà sans qu'il y ait encore les symptômes d'une inflammation évidente. C'est dans ces cas que les astringents et les irritants donnés au début pourront faire avorter la maladie. Quelques jours plus tard, au contraire, l'inflammation qui paraît alors consécutive au flux muqueux s'étant développée, la méthode abortive n'a que des chances médiocres de succès. A plus forte raison est-elle contre-indiquée dans tous les cas où, soit au début, soit un peu plus tard, la phlogose est glèbe et vive. Elle restera au contraire d'autant plus utile que l'élément catarrhal sera prédominant. Sous ces différents rapports la leucorrhée nous paraît tout-à-fait identique par les indications à la blennorrhée ordinaire, et c'est en se guidant sur les données analogues qu'on sera conduit à prescrire des lotions avec des solutions d'acétate de plomb, de sulfate de zinc, de nitrate d'argent, à doses simplement astringentes et résolutives, ou bien même parfois à doses cathérétiques. Dans l'intervalle des lotions qui sont faites au moins trois ou quatre fois par jour, on appliquera à la surface de la vulve des plumasseaux enduits de cérat de saturne et des compresses imbibées d'eau végétalo-minérale de Goudard, d'eau vinaigrée, de chlorure de soude affaibli, de décoction de sureau ou de persil, etc. M. Schoenfeld dit avoir obtenu des succès avec le copahu, donné à l'intérieur; mais ce médicament même en pilules est fort difficile à faire prendre aux enfants, qui ne gardent que très-difficilement aussi les lavements dans lesquels on pourrait le suspendre.

Quelques auteurs pensent qu'on doit craindre de répéter la maladie par des astringents trop énergiques; cette crainte peut être fondée dans certains cas, mais elle ne l'est point d'une manière absolue; car on ne doit pas plus redouter en général de faire avorter une leucorrhée qu'une ophthalmie catarrhale. Mais il faut pour être à l'abri de

tout inconvénient examiner s'il n'existe pas quelque autre affection catarrhale susceptible de s'aggraver par la suppression du flux vulvaire. Cette réserve est surtout nécessaire quand la maladie se montre comme une fraction d'une diathèse catarrhale, ainsi qu'on le voit chez certains sujets débilités, lymphatiques, ou sous l'influence des fièvres catarrhales épidémiques. Lorsque la maladie est toute locale et sans complication, la prudence commande seulement, comme précaution d'une importance secondaire, l'usage de quelques purgatifs ou l'application d'un vésicatoire au bras ou à la cuisse, qu'on fera supprimer pendant plusieurs jours.

Dans certains cas la leucorrhée se complique d'altérations de la muqueuse qui d'abord superficielles peuvent s'agrandir, creuser en profondeur et devenir graves. C'est alors qu'il ne faudra pas hésiter dans la plupart des cas à modifier énergiquement la vitalité de la muqueuse et à changer les qualités du produit qu'elle sécrète, par la caustérisation avec le nitrate d'argent fondu ou le nitrate acide de mercure. Cette indication se présente surtout dans le cas où la maladie est symptomatique d'une fièvre éruptive; la phlegmasie catarrhale est alors d'une nature toute spécifique, et quand elle n'est point surveillée ou combattue à propos, elle peut devenir l'écigle de ces gangrènes vulvaires dont nous parlerons dans un instant.

L'existence des diverses causes pathologiques que nous avons mentionnées, entre autres la constipation, les vers, la pierre dans la vessie, la syphilis, etc., réclameront des moyens spéciaux de traitement qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer ici. On préviendra la masturbation par une surveillance infatigable, par des distractions morales, par des corrections plus ou moins rigoureuses, par des applications froides à la nuque, et au besoin par la correction au moyen de bandages convenablement disposés, de gants de toile métallique et de grillages également métalliques assujettis au devant des parties génitales.

Enfin dans beaucoup de cas la constitution faible et lymphatique des sujets réclame l'emploi des amers, des toni-

ques martiaux, d'un exercice et d'un régime fortifiant, etc. On mettra également l'hygiène en rapport avec les conditions extérieures au milieu desquelles se trouveront les malades. L'usage de la flanelle sur tout le corps est indispensable pour prévenir l'action de l'humidité.

ARTICLE II.

GANGRÈNE DE LA VULVE.

La gangrène spontanée de la vulve ne diffère de celle de la bouche que par son siège, et tout ce que nous avons dit de la nature de celle-ci, de ses symptômes et de son traitement, trouverait ici parfaitement son application.

Savages avait déjà reconnu que la vulve chez les petites filles est exposée à cette espèce de gangrène spontanée qu'il appelle *secretis infantilis*. Gardien a fait mention dans son ouvrage des travaux d'Inard et de M. Baron sur cette maladie, et, comme eux, la rapproche avec raison des gangrènes buccales. Mais presque tous les traités de pathologie infantile ont omis d'en parler. Billard l'avait complètement passée sous silence. Dans les dernières éditions de l'ouvrage de ce médecin, M. Olivier a ajouté une note précieuse par quelques remarques générales et par une observation très-intéressante. Nous avons nous-même vu dernièrement un cas du même genre.

Bien que dans certains cas la gangrène vulvaire puisse résulter d'une irritation directe, de la masturbation, par exemple, comme l'a dit M. Gardien, cependant elle dépend presque exclusivement de cette inflammation spécifique qui occupe la plupart des muqueuses voisines de l'extérieur sous l'influence des exanthèmes fébriles. Ce catarrhe vulvaire est souvent méconnu dans l'origine, mais il est arrivé rarement qu'on ne l'ait point constaté quelque temps avant l'invasion de la gangrène. On trouve alors la muqueuse vulvaire ulcérée, et, ici comme à la bouche, nous pensons qu'une phlogose ulcéreuse précède toujours la gangrène noire. Si cette ulcération n'est point convenu-

blement modifiée, on voit survenir ordinairement avec une grande rapidité un gonflement considérable des grandes lèvres, dont la surface devient luisante et d'un rouge un peu sombre. La surface de l'ulcère et de la muqueuse voisine devient noire, tombe en saie putride, sécrète en abondance un liquide fétide et ichoreux qui se répand sur les parties voisines, corrode à son tour et semble véritablement devenir le véhicule de la gangrène. Dans le cas dont nous avons été témoin, avant que la gangrène eût dépassé la surface interne des grandes lèvres, on voyait déjà vers l'anus et les aines la peau baignée par l'ichor gangréneux, rougir, s'ulcérer et se couvrir d'eschares. Les progrès du mal sont généralement rapides, détruisent graduellement les grandes et petites lèvres, le clitoris, le vagin, l'urètre, et la mort n'arrive qu'après une désorganisation effrayante. M. Ollivier, d'Angers, pense que si la mort est en général moins prompte que dans les gangrènes locales, c'est que dans celles-ci l'air inspiré se charge de miasmes délétères et agit comme un poison sur le sang qui circule dans les poumons. Mais il est aussi des cas où la mort a lieu deux ou trois jours seulement après l'invasion de la gangrène et avant qu'elle n'ait déterminé des désordres profonds, ainsi que nous l'avons vu. C'est qu'effectivement la maladie n'est pas toute locale; le plus ordinairement les symptômes généraux ne sont point de simples phénomènes de réaction, mais le résultat d'une infection primitive des fluides ou d'une lésion dynamique dont la nature spécifique de la gangrène est la preuve la plus certaine.

Le traitement à employer dès le début de la gangrène et dans le cas d'ulcérations antérieures qui peuvent la faire craindre, est une cautérisation plus ou moins énergique qui est également nécessaire pendant tout le cours de la maladie tant que ses ravages ne sont point encore irrémédiables. Il peut convenir quelquefois d'employer les antiphlogistiques locaux, mais plus généralement il faut agir à l'intérieur par des toniques et des antiseptiques. En résumé, la conduite à tenir est la même que dans la gangrène de la bouche.

SECTION V.

TUBERCULES DE L'ABDOMEN.

Les nombreux organes de la cavité abdominale peuvent tous être le siège de l'affection tuberculeuse; mais on remarque que l'estomac et le bout de l'intestin, le pancréas, les conduits excréteurs et le réservoir de l'urine, les organes génitaux dans l'un et l'autre sexe, présentent fort rarement des traces de tuberculisation, même chez les sujets qui ont succombé au plus haut degré de cette cachexie. Celle-ci atteint un peu plus fréquemment le foie, la rate et les reins; mais c'est surtout dans l'iléon et le gros intestin, dans le péritoine et les ganglions mésentériques qu'elle concentre ordinairement ses effets et peut, en l'absence de toute lésion profonde vers d'autres organes importants, amener directement la mort par elle-même. C'est dans les cas de cette troisième catégorie que la maladie a reçu le nom à impropre de carreau.

Considérées d'une manière générale, les affections tuberculeuses de l'abdomen n'ont point une importance égale à celles de la poitrine, et cela pour deux raisons, d'abord par leur fréquence moindre et ensuite parce qu'elles existent plus rarement en l'absence de lésions semblables dans les organes du thorax ou de la tête. C'est ce que nous avons démontré ailleurs quand nous avons fait voir que sur cinquante-six sujets chez lesquels l'autopsie a fait constater des tubercules, il y en a eu cinquante-cinq fois dans le thorax et trente-cinq fois seulement dans l'abdomen. Nous avons vu également que sur ces cinquante-six cas les organes du thorax avaient été trouvés seuls affectés treize fois, tandis que ceux de l'abdomen l'avaient été à peine dans un seul cas, et encore la nature de la lésion nous avait paru douteuse.

En poursuivant notre comparaison, nous verrons que la somme de nos connaissances sur le diagnostic des tubercules thoraciques est bien supérieure à celles que nous avons sur les moyens de reconnaître les tubercules abdominaux. Dès qu'une phthisie pulmonaire est au troisième degré, ou si, quoique encore au premier, elle occupe une grande étendue des poumons, le diagnostic en est ordinairement assez facile; la phthisie ganglionnaire mésentérique elle-même n'est point complètement inaccessible à nos moyens d'exploration. Dans l'abdomen il n'en est pas ainsi pour la plupart des organes. Les tubercules du foie, de la rate, des reins, nous restent tout-à-fait méconnus jusqu'à l'ouverture du cadavre; et quant à la phthisie mésentérique, nous verrons que son diagnostic offre le plus souvent de sérieuses difficultés.

Ces remarques nous conduisent à restreindre la description des maladies tuberculeuses de l'abdomen dans des bornes proportionnées à celles que nous avons respectées en traitant des tubercules du thorax. Nous aurons d'ailleurs souvent occasion de renvoyer le lecteur à nos généralités sur la nature, les causes et le traitement de la cachexie tuberculeuse.

Anatomie pathologique.

Les ganglions lymphatiques sont de tous les organes de l'abdomen ceux que la tuberculisation envahit le plus souvent, à tel point que presque jamais nous n'avons trouvé des tubercules dans un organe quelconque du bas-ventre sans en trouver dans quelques-uns des ganglions de cette cavité. Il y a généralement un rapport de siège dans cette coexistence; car les ganglions malades sont presque toujours ceux auxquels aboutissent les vaisseaux absorbants qui viennent des autres parties tuberculisées. Ainsi dans les tubercules crus ou ulcérés de l'intestin, ce sont les ganglions du mésentère ou du méso-colon qu'on trouve malades; dans ceux du foie, de la rate, du pancréas, des reins, etc., ce sont les ganglions voisins de ces organes qui sont

compromis. Enfin, pour ne pas omettre les cas exceptionnels, nous devons dire que parfois les tubercules sont nombreux, volumineux et à une période avancée dans les viscères ou dans le péritoine, bien que les ganglions lymphatiques en offrent à peine quelques traces.

D'autre part, il est rare de trouver des tubercules dans les ganglions sans qu'il y en ait aussi dans les organes auxquels ils correspondent respectivement. Mais ce qui est important à noter, c'est que dans les premiers la lésion peut être très-considérable, très-avancée, former des tumeurs volumineuses, bien que dans les organes les tubercules soient peu nombreux, d'un petit volume et ne constituant encore pour ainsi dire qu'une lésion insignifiante. Il y a donc, sous les rapports que nous venons d'examiner, une grande ressemblance entre les tubercules de l'abdomen et ceux du thorax.

Les ganglions sont susceptibles d'éprouver sous l'influence de la cachexie certaines altérations qui ne consistent pas dans l'infiltration de leur tissu par la matière tuberculeuse. On les trouve plus volumineux qu'à l'état sain et formant des masses rougeâtres, d'un aspect charnu et vasculaire, comme fongueux. Cet état est le même qu'on rencontre dans les glandes du cou chez quelques scrophuleux dont tous les engorgements ganglionnaires ne sont pas nécessairement de nature tuberculeuse. Cette circonstance est une preuve de plus en faveur de l'opinion que nous avons soutenue de la non-identité absolue des scrophules et des tubercules. Nous avons vu plus d'une fois à l'Hôtel-Dieu de Lyon, M. Bonnet, qui partage sur ce point notre manière de voir, extirper des tumeurs ganglionnaires qu'il considérait comme de nature scrophuleuse, bien qu'on n'y rencontrât aucune trace de substance tuberculeuse.

Les ganglions lymphatiques deviennent tuberculeux présentent un volume fort variable. On les voit quelquefois aux complètement convertis en substance tuberculeuse pour qu'il n'y ait plus de traces de leur tissu, et cependant conserver leur volume ordinaire. Dans d'autres cas, soit par l'absorption, soit par la distension d'un kyste formé

autour du ganglion, celui-ci en se désorganisant prend un volume de plus en plus considérable, et peut former une masse homogène de quelques centimètres d'épaisseur qui ne paraît point due à l'agglomération de plusieurs ganglions. Cependant lorsque les tumeurs mésentériques acquièrent le volume du poing et même plus, on reconnaît toujours leur multiplicité primitive, et leur agglomération n'est jamais assez intime pour simuler une tumeur unique. Les exemples qu'on a cités de carcœnes très-volumineux étaient tous de cette espèce, en particulier celui de Tulpius, relatif à un enfant de deux ans, chez lequel on trouva une tumeur du mésentère pesant plus de dix-huit livres. (Portai).

La plus grande analogie existe entre les tubercules ganglionnaires du bas-ventre et ceux du thorax sous le rapport de leurs caractères anatomiques. A l'état cru, la matière tuberculeuse, tantôt grise et demi-transparente, tantôt blanche, jaunâtre, opaque et tout-à-fait caséiforme, forme des granulations distinctes, ou bien est infiltrée dans le tissu ganglionnaire qui plus tard disparaît complètement. La tumeur est dès-lors constituée et s'entoure ordinairement d'un kyste fibreux plus ou moins résistant; dans d'autres cas le kyste manque, par défaut sans doute de plasticité, et la matière tuberculeuse s'épanche de proche en proche entre les lames du péritoine, dans le tissu cellulaire qui entoure les ganglions, et forme des dépôts amorphes d'un volume quelquefois considérable.

C'est une question encore indécidée de savoir jusqu'à quel point les tumeurs ganglionnaires gênent le cours des liquides dans les vaisseaux lymphatiques et sanguins. Semmering avait déjà annoncé que la circulation lymphatique n'était point sensiblement entravée; les travaux de plusieurs autres physiologistes ont paru confirmer cette opinion. Cependant il est une foule de cas dans lesquels la lésion des ganglions est beaucoup trop complète pour que la lymphe et le chyle puissent les traverser; seulement les anastomoses suppléent à cet obstacle et conduisent ces liquides dans le canal thoracique. Mais il n'en résulte pas

moins que l'élaboration du chyle dans la traversée des ganglions ne s'exerce plus comme à l'état normal, et par là s'explique en partie le défaut de nutrition qu'autrefois l'on attribuait à l'arrêt du chyle par l'obstruction des glandes. Les anastomoses entre les vaisseaux sanguins du mésentère sont tellement nombreuses que la circulation du sang n'est jamais bien entravée, et quoique l'ascite s'observe quelquefois dans le cancer, elle paraît moins liée à cette gêne de la circulation qu'à un certain degré d'irritation, puisqu'elle diminue généralement avec les progrès de la maladie.

Dans leur dernière période les tubercules ganglionnaires se ramollissent graduellement jusqu'à l'état de pus liquide. Mais ce dernier degré s'observe rarement, au moins aussi rarement que dans les ganglions thoraciques. Il semble qu'à mesure que le tubercule se ramollit, sa partie la plus liquide soit résorbée, ou plutôt les nodules succombent avant que la désorganisation ait atteint son dernier terme.

La fréquence des tubercules ganglionnaires de l'abdomen chez les sujets phthisiques est bien plus grande dans l'enfance qu'aux autres âges, puisqu'elle est de plus de la moitié des cas d'après les recherches du docteur Papanovine et les nôtres; tandis que M. Louis n'a constaté cette lésion chez les adultes que dans un quart des cas tout au plus.

Nous avons dit ailleurs que les tubercules siègent très-rarement dans l'estomac et le duodénum. Ce fait a été constaté par tous les observateurs exacts, et nos propres recherches n'ont fait que le confirmer. Il est fort difficile d'en donner une explication satisfaisante. Si l'on admet que l'activité fonctionnelle d'un organe le prédispose à devenir le siège d'une altération quelconque, on se conçoit pas facilement comment l'estomac qui chez les enfants est en action presque continuelle, en est si souvent exempt. L'intestin grêle dans sa moitié inférieure et le gros intestin sont bien plus souvent affectés de tubercules, et peut-être y a-t-il un rapport entre cette préférence et la nature des

fonctions de cette portion du tube digestif, qui consiste en grande partie dans des sécrétions excrémentielles.

On connaît les caractères anatomiques que présentent généralement les tubercules intestinaux. Développés au-dessous de la muqueuse, on les rencontre dans les divers points de la circonférence de l'intestin, mais le plus souvent le long de son bord convexe et précisément au niveau des plaques folliculeuses. A l'état cru, leur volume est généralement petit, leur forme arrondie, leur couleur blanchâtre et opaque, quelquefois transparente ou grisâtre (granulations grises), leur nombre très-variable : tantôt isolés les uns des autres, tantôt réunis, agglomérés et confluent; rarement accompagnés de traces d'hypérémie ou de phlogose dans la muqueuse qui les recouvre. Leur période de ramollissement n'offre rien de spécial. Leur suppuration détruisant la membrane muqueuse produit des ulcérations plus ou moins étendues, dans le fond et les bords desquelles on trouve souvent d'autres tubercules naissants ou déjà sur le point de se ramollir et de suppurer. Par les progrès et la durée de la maladie les ulcérations se multiplient, se réunissent pour former des ulcères plus vastes, ou bien restent isolées; quelques-unes se cicatrisent, d'autres, au contraire, gagnent en profondeur et arrivent même à perforer l'intestin, d'où résulte une péritonite suraiguë. Dans la plupart des cas où la lésion s'étend ainsi vers le péritoine, il se forme à la surface de cette membrane des adhérences qui préviennent l'épanchement des matières intestinales ou qui le circonscrivent aussitôt qu'il a lieu. Dans quelques cas de ce genre on trouve une ou plusieurs loges avec lesquelles l'intestin communique largement, représentant une espèce de cloaque où les matières atériques, les gaz et le pus sont mélangés. Nous verrons que cette désorganisation effrayante, avec laquelle les sujets peuvent cependant continuer de vivre quelque temps, se produit aussi par des perforations intestinales de dehors en dedans, et non de dedans en dehors, comme nous venons de le décrire.

Les lésions tuberculeuses de l'intestin sont assez géné-

ralement disséminées sur une grande étendue de cet organe. D'autres fois elles se concentrent dans un seul point, dans la fin de l'iléum, par exemple, dans le rectum ou dans le cœcum, comme nous l'avons vu dernièrement chez un enfant qui a succombé à une méningite tuberculeuse; l'intestin était exempt de tubercules dans toute son étendue, à l'exception du cœcum qui présentait un nombre infini d'altérations tuberculeuses; le mésentère était également tuberculeux. Il n'est pas très-rare de rencontrer des tubercules dans l'appendice vermiculaire du cœcum, et plus loin nous parlerons de quelques cas de ce genre.

Malgré la présence des tubercules des ganglions mésentériques dans l'intestin et dans d'autres organes, il arrive quelquefois que le péritoine est intact. Le plus souvent il est le siège de diverses lésions, et dans quelques cas l'affection tuberculeuse occupe cette membrane exclusivement. Ordinairement on trouve dans le péritoine trois espèces de désordres : 1° des tubercules, 2° des adhérences pseudo-membraneuses, 3° un épanchement séreux ou séro-purulent. On remarque quelquefois des tubercules seuls, mais alors ils sont peu nombreux et peu avancés. La péritonite chronique simple est également très-rare; nous ne l'avons jamais observée chez les enfants, si ce n'est à la suite de l'état aigu. Elle est donc presque nécessairement liée à des lésions tuberculeuses. Cependant il est vrai de dire que ces lésions sont quelquefois presque insignifiantes et que des adhérences très-étendues peuvent exister dans le péritoine, bien que la matière tuberculeuse se concentre à peine dans quelques points. C'est ce qui a fait dire à l'un de nos médecins les plus distingués, M. de Polissière, ancien médecin de l'asile de la Charité de Lyon, que dans certains cas les causes de maladie et de mort ont leur point de départ dans l'altération non tuberculeuse du tissu péritonéal et dans la phlogose chronique concomitante du tube intestinal (1). Enfin l'épanchement manque assez souvent ou est peu prononcé quand la

(1) *Ann. de Méd. de Lyon*, septembre 1844, p. 186.

maladie est ancienne et avancée ; car alors il a fait place aux pseudo-membranes.

Les tubercules se forment le plus souvent dans le tissu cellulaire sous-séreux et y présentent tous leurs caractères ordinaires. Quelquefois ils débütent à la surface interne du péritoine, y forment de petites saillies demi-transparentes, cristallines, d'aspect vésiculeux, qui peu à peu se changent en véritables tubercules crus, opaques, caséux, et s'environnent dès-lors de pseudo-membranes. Quelquefois la matière tuberculeuse, au lieu de former de petites masses rondes et distinctes, s'épanche en couches amorphes et plus ou moins épaisses, soit au-dessous du péritoine pariétal dans les régions où le tissu cellulaire abonde, soit entre les lames des mésentères et des épiploons, soit enfin à la surface libre du péritoine, entre les anses intestinales, et dans ce dernier cas il n'est pas facile de dire si la sécrétion s'est faite avant ou après la formation des fausses membranes. Le fait est que celles-ci existent souvent dans des points où la matière tuberculeuse manque, ce qui tend à les faire considérer comme primitives. Enfin il est d'autres cas bien plus remarquables, dans lesquels on a affaire à de véritables épanchements d'une matière presque organisée, mais analogue par sa couleur et son aspect à la matière tuberculeuse. C'est là qu'on saisit les nuances intermédiaires qui séparent la fausse membrane du tubercule, et qui permettent de considérer celui-ci comme le produit d'une action plastique qui opère sur des matériaux vicieux, tandis que la fausse membrane est due à une plasticité en quelque sorte normale dont les produits sont organisables et vivants. Cet aspect fait remarquable de la matière tuberculeuse n'est point rare chez les enfants ; plus d'une fois il a fixé notre attention dans le cours de nos recherches nécropsiques.

Les adhérences pseudo-membraneuses qui sont le principal caractère de la péritonite chronique, occupent très-rarement toute l'étendue de la cavité abdominale. Généralement elles épargnent cette portion de la séreuse qui forme l'arrière-cavité des épiploons ; les faces antérieures

et postérieure de l'estomac en sont souvent dépourvues ; mais le piquet intestinal en est tellement tapissé que toutes les anses réunies entre elles avec le grand épiploon et même avec la paroi abdominale antérieure, forment une masse dans laquelle toutes ces parties sont intimement confondues ; il y a entre elles pour ainsi dire une continuité de tissu qui s'oppose complètement aux mouvements de glissement qui s'accomplissent à l'état normal. Dans cet état il est évident que les contractions péristaltiques et antipéristaltiques de l'intestin sont devenues impossibles pendant la vie, ou du moins fort incomplètes et fort irrégulières. Cet obstacle mécanique joue certainement un grand rôle dans quelques cas où l'on voit le marasme et la mort survenir, sans qu'aucune autre lésion puisse expliquer l'atteinte profonde portée à la nutrition ; lorsqu'il s'y joint d'autres désordres par suite de la maladie tuberculeuse, il contribue encore pour sa part à avancer l'époque d'une terminaison toujours funeste.

Lorsque la phthisie entière-mésentérique est arrivée au dernier degré, on trouve rarement un épanchement dans l'abdomen, ou bien celui-ci est peu abondant. Il existe plus ordinairement dans les commencements ; c'est à mesure qu'il disparaît que les adhérences s'établissent et que les tumeurs tuberculeuses font des progrès. Le liquide épanché est tantôt une sérosité pure, tantôt une sérosité laïche et opaque, floconneuse, presque purulente. Dans certaines circonstances on trouve des loges pleines de pus et de matière tuberculeuse ramollie qui communiquent avec la cavité intestinale. Dans quelques-uns de ces cas-là n'ayant trouvé dans l'épaisseur des parois de l'intestin aucuns tubercules crus ni rétrécis, nous avons été conduit à penser que les perforations s'étaient faites de dehors en dedans, de manière à permettre l'élimination par la cavité intestinale de la matière tuberculeuse sécrétée à la surface du péritoine et entraînée par la suppuration. On a prétendu que les ganglions du mésentère devenus tuberculeux pouvaient s'éliminer par cette voie ; cela ne peut arriver qu'après leur ramollissement et leur suppuration.

Mais il y a loin de là à croire qu'on ait pu trouver et reconnaître dans les selles des tumeurs tuberculeuses éliminées en masse et que la guérison s'en soit suivie.

Après les ganglions, l'intestin et le péritoine, ce sont le foie et la rate que l'on trouve le plus souvent atteints chez les sujets tuberculeux. La lésion de ces deux organes s'est montrée à nous avec une égale fréquence. Mais d'autres observateurs ont trouvé plus souvent des tubercules dans la rate que dans le foie. D'ailleurs il n'est pas inutile de répéter ce que nous avons dit ailleurs : que sur un nombre donné d'enfants et d'adultes atteints de lésions tuberculeuses, celles-ci se rencontrent dans le foie et la rate bien plus souvent chez les premiers que chez les seconds. Dans la rate les tubercules sont ordinairement très-nombrueux; l'organe en est tellement farci que son tissu semble avoir disparu en grande partie. Nous les y avons toujours trouvés à l'état cru plus ou moins avancé, mais jamais en voie d'élimination et remplacés par des cavernes. Il n'en est pas ainsi pour le foie : souvent il n'en contient pas un grand nombre, et il n'est pas rare d'y rencontrer des excavations ordinairement peu étendues, dans lesquelles on retrouve tantôt du pus et de la matière tuberculeuse, tantôt du pus seul, tantôt enfin un liquide bilieux. Par une dissection convenable on découvre presque toujours une communication entre ces cavités et un conduit hépatique plus ou moins volumineux, par lequel la cavité se vide des liquides qu'elle renferme, pour se remplir plus tard d'une certaine quantité de bile qui reflue par le conduit dans lequel elle s'est ouverte. Ce sont là de véritables cavernes dans lesquelles les racines du conduit hépatique remplissent le même rôle que les bronches dans les cavernes pulmonaires.

Les reins, qui d'après les faits observés par M. Louis ne sont tuberculeux qu'une fois sur quarante, l'ont été dans la proportion d'un huitième des cas chez les enfants tuberculeux soumis à notre examen après la mort. Le plus souvent ces organes sont légèrement altérés, ne présentent que quelques tubercules crus, isolés, dans l'une ou

l'autre de leurs deux substances. Quelquefois ces corps étrangers développés près de la surface libre des mammelons se ramollissent et sont éliminés dans la cavité des calices, d'où ils sont entraînés avec les urines. Nous avons eu occasion d'observer un cas de désorganisation tuberculeuse extrêmement avancée non seulement des reins, mais encore des urètres, de la vessie et de l'urètre; nous le ferons connaître en traitant du diagnostic des tubercules des reins.

Quant au pancréas et aux organes génitaux dans les deux sexes, ils restent presque constamment sains chez les sujets atteints de phthisie même au plus haut degré. Cependant nous avons rencontré une fois, chez un enfant âgé de dix ans, des tubercules dans le pancréas qu'au premier abord on aurait pu confondre avec les granulations de cette glande. Nous avons aussi chez un enfant de quatre ans trouvé les deux testicules presque entièrement infiltrés de matière tuberculeuse à l'état cru. Il n'est pas impossible, mais il est rare de rencontrer des tubercules dans quelqu'un des organes génitaux de la petite fille.

CAUSES.

L'étiologie des affections tuberculeuses de l'abdomen ne présente aucunes particularités importantes qui ne rentrent dans ce que nous avons dit des causes de la cachexie tuberculeuse. Tout ce que nous avons établi sur les influences qu'exercent l'âge, le sexe, le tempérament, la constitution, la prédisposition, l'hérédité, est applicable sans aucune restriction au sujet qui nous occupe en ce moment. Il en est de même de tout ce qui regarde les causes hygiéniques et pathologiques, et nous n'avons à émettre aucunes considérations contradictoires de celles que nous avons avancées ailleurs. Nous devons nous borner ici à discuter jusqu'à quel point les fonctions et les maladies des organes abdominaux peuvent avoir une influence spéciale sur la localisation de la cachexie tubercu-

lisme dans ces organes. Nous suivrons par conséquent la même marche que dans l'étude des causes des tubercules thoraciques.

Nous avons étudié ailleurs l'influence d'une mauvaise alimentation en tant qu'elle modifie l'état général de la constitution, qu'elle débilite tout l'organisme, et appauvrit le sang ou l'altère en lui fournissant des matériaux insuffisants ou viciés. Maintenant nous devons nous demander si cette cause n'a pas en outre une action toute locale sur les organes digestifs, par suite de laquelle les tubercules tendent à se développer dans ces organes plutôt que dans ceux du thorax ou de la tête. Cette manière d'envisager la question a été complètement négligée par les auteurs, et tout ce qu'ils ont dit de l'alimentation se réduit à établir son action générale plutôt que son action locale, ou bien à démontrer que cette dernière produit préalablement un état morbide des voies digestives, sans lequel leur tuberculisation n'aurait point lieu. On a procédé en cela comme pour la phthisie pulmonaire lorsqu'on a admis que le froid se la déterminait qu'autant qu'il produit d'abord une bronchite ou une pneumonie. De même, ceux qui ont accordé à l'alimentation une influence spéciale sur le cerveau, ont pensé qu'elle avait pour premier effet une irritation ou une inflammation gastro-intestinale. Or, il serait fort important de savoir à quoi s'en tenir sur ce point.

Nos recherches n'ont point encore été assez étendues pour nous permettre de résoudre complètement cette question; mais elles nous ont cependant conduit à quelques résultats que nous allons faire connaître.

En mettant d'un côté les sujets chez lesquels les tubercules ont prédominé dans l'abdomen, et d'un autre côté ceux chez lesquels la mort est résultée principalement des tubercules thoraciques ou cérébraux, nous avons observé que chez les premiers la circonstance d'une mauvaise alimentation antérieure s'était présentée un peu plus souvent que chez les seconds. Mais la différence a été si peu marquée, que nous n'osons point en tirer de conséquence positive. Nous avons été d'autant plus retenu de le faire qu'en

étudiant l'influence des autres maladies de l'abdomen sur les tubercules entéro-mésentériques, péritonéaux, spléniques, hépatiques, etc., nous sommes arrivé à reconnaître ainsi positivement qu'on le peut par induction, puisqu'ici l'observation directe n'est pas suffisante, que cette influence est presque nulle, comme nous allons le démontrer.

Les maladies gastro-intestinales que nous savons être les plus fréquentes dans l'enfance, sont celles que nous avons décrites sous le nom de diacrisis folliculaires. Nous savons aussi qu'elles comprennent presque toutes ces maladies connues sous le nom de diarrhée des enfants, et qu'on a dans ces derniers temps rapportées à une seule affection, à l'entérite. Or, ces diarrhées sur la nature desquelles nous nous sommes prononcé, à quelle époque de l'enfance offrent-elles la plus grande fréquence? Nous savons que c'est avant l'âge de cinq ans, c'est-à-dire à une époque où les tubercules sont plus rares que dans les années suivantes. Ce défaut de rapport entre les époques les plus favorables au développement de ces deux genres d'affections, permet de croire qu'il y a entre elles fort peu de connexions étiologiques.

Quoiqu'on nous ayant restreint l'importance des plégmasies proprement dites de l'estomac et de l'intestin dans des limites assez étroites, nous avons cependant admis que comme éléments pathologiques dans le muguet, dans les diacrisis et dans la dothinentérie, elles jouaient un rôle d'une certaine valeur plus souvent chez les enfants qu'aux autres âges. Or, le muguet est une affection des nouveau-nés qui sont très-rarement tuberculeux. D'autre part, la fièvre typhoïde a son maximum de fréquence de dix à quinze ans, époque à laquelle les tubercules paraissent moins fréquents que de cinq à dix ans. Quant aux diacrisis avec inflammation qui constituent les affections dites catarrhales, celles qui dépendent des fièvres éruptives ne nous paraissent point complètement étrangères à la phthisie abdominale; car nous avons vu plus d'une fois cette maladie apparaître à la suite des exanthèmes, surtout lorsque ceux-ci s'étaient compliqués d'un catarrhe intestinal. Mais

sous pensons que cette complication n'agit généralement alors que comme cause occasionnelle et à la condition de rencontrer des sujets prédisposés. C'est sans doute aussi moins à l'inflammation elle-même qu'à sa nature toute spécifique qu'il faut attribuer ces fâcheux résultats. Comme nous nous sommes longuement étendu ailleurs sur cette influence spéciale des fièvres éruptives, nous invitons le lecteur à s'y reporter.

En résumé, de même que pour comprendre l'action de la plupart des causes de la cachexie tuberculeuse, il faut admettre une prédisposition ou idiosyncrasie générale chez la plupart des sujets, de même il faut aussi admettre une prédisposition locale thoracique, abdominale ou cérébrale, pour s'expliquer la localisation plus ou moins fréquente des tubercules dans le thorax, dans l'abdomen ou dans les centres nerveux.

Symphleet, Typhus et Pseudo.

Si l'on voyait souvent l'affection tuberculeuse se localiser isolément dans les ganglions lymphatiques, dans l'intestin ou dans le péritoine, on pourrait lui assigner des symptômes particuliers dans chacun de ces cas. Mais il en est rarement ainsi, et l'invasion simultanée ou successive de la maladie dans les divers organes de l'abdomen rend très-difficile l'appréciation des symptômes respectifs liés à chaque différence de siège. C'est par là qu'on s'explique l'insuffisance des descriptions des auteurs, la plupart ayant attribué au carreau des symptômes qui appartiennent aux tubercules intestinaux ou à la péritonite tuberculeuse, et vice versa.

Ces trois maladies offrent des symptômes communs dans la plupart des cas, et comme très-souvent elles existent réunies, il sera quelquefois difficile de décider à laquelle il faut spécialement attribuer les symptômes qu'on observe. Mais elles ont aussi des caractères particuliers dont la prédominance peut être d'un grand secours pour porter un diagnostic aussi précis que possible.

Les symptômes communs sont d'abord les traits qui dis-

tinguent chez la plupart des sujets la constitution tuberculeuse et scrophaleuse, et ensuite les troubles qui surviennent dans les fonctions digestives. Quant aux premières, nous les avons assez complètement étudiées ailleurs pour qu'il soit inutile d'y revenir et de discuter à fond la valeur des données qu'elles fournissent au diagnostic. Nous dirons seulement que la coïncidence des engorgements scrophuleux externes nous a paru plus fréquente dans les cas de tubercules de l'abdomen que dans ceux où les organes du thorax sont seuls tuberculinés.

Les troubles digestifs n'ont généralement rien d'assez fixe ni d'assez constant dans leurs diverses nuances pour qu'on puisse établir leur rapport avec tel ou tel siège des tubercules. C'est par eux que la maladie débute presque toujours. La diminution et parfois l'augmentation de l'appétit, la voracité même, une soif irrégulière, des digestions plus ou moins pénibles, quelquefois le vomissement, presque toujours des douleurs sourdes dans le milieu du ventre, des alternatives de diarrhée et de constipation, la tension et le météorisme de l'abdomen, tels sont les symptômes qui dans les commencements peuvent faire craindre une affection tuberculeuse sans indiquer positivement son siège. Comme ils peuvent aussi dépendre d'un autre état morbide des premières voies, d'une phtisie ou d'une diarrhée, par exemple, il ne faut point se hâter de se prononcer, mais attendre l'effet des médications employées en vue de combattre ces maladies. Lorsqu'on les voit échouer et que les symptômes augmentent, la présomption d'une maladie tuberculeuse devient de plus en plus forte.

Parmi ces troubles digestifs en est-il quelques-uns qui indiquent, d'une manière un peu positive, le siège principal de la maladie? A cet égard on peut dire que la fréquence ou la continuité de la diarrhée se lie de préférence aux tubercules intestinaux, surtout dès le moment où ils sont ulcérés; que, dans les commencements de la phtisie chronique, il y a plus souvent de la constipation et des vomissements, et qu'enfin, dans le cas où les gon-

gions commencent à se tuberculliser, l'intestin et le péritoine étant encore sains, les dérangements de la digestion sont généralement plus variables, moins continus, moins intenses, bien que la nutrition souffre déjà sensiblement et que l'amaigrissement fasse des progrès.

A mesure que la maladie augmente, les symptômes deviennent plus tranchés et présentent assez souvent des caractères différentiels. C'est ainsi que la tuberculisation intestinale s'accompagne d'une diarrhée de plus en plus continue et abondante; quelquefois les ulcérations fournissent une assez grande quantité de pus pour qu'on reconnaisse sa présence dans la matière des selles, mais le plus souvent cela est tout-à-fait impossible, et ce qui ôte à la diarrhée presque toute son importance au point de vue du diagnostic, c'est qu'elle arrive fréquemment dans une période avancée de toute espèce d'affection tuberculeuse comme un simple effet de colliquation analogue aux sueurs. Quoi qu'il en soit, cette diarrhée offre habituellement un caractère qui peut manquer dans les deux cas dont nous nous occuperons tout-à-l'heure; c'est qu'elle a lieu non-seulement peu de temps après l'ingestion des aliments comme un résultat de l'impuissance où est l'intestin d'élaborer les aliments, mais encore à des intervalles éloignés des heures de repas. Il est par là évident qu'il y a tout à la fois lenterie et flux purulent ou séreux de l'intestin. Dans la péritonite chronique, lorsque des adhérences nombreuses empêchent les mouvements de l'intestin, la diarrhée survient de préférence peu de temps après que les aliments ont été ingérés dans l'estomac, et se suspend souvent d'une manière complète si le malade observe une diète absolue pendant vingt-quatre heures. Enfin, dans le cas de tubercules mésentériques, la diarrhée a toujours des caractères plus variables.

La diarrhée s'accompagne ou non de douleurs abdominales. Celles-ci manquent dans la diarrhée colliquative, et sont moins prononcées dans le cas proprement dit que dans les tubercules de l'intestin ou du péritoine; dans ces deux derniers cas, la douleur paraît non-seulement être

à l'arrivée et au passage des matières chymiques, mais encore à la phlegmasie chronique qui se lie à ces deux maladies, en sorte qu'elle existe dans les intervalles des selles avec un caractère de continuité, mais presque toujours sans intensité.

Les signes véritablement importants des affections qui nous occupent, sont ceux que fournissent la palpation et l'inspection de l'abdomen.

L'augmentation de volume du ventre n'a point une valeur absolue. Trois circonstances principales la déterminent, savoir : l'ascite, le météorisme, et le refoulement des organes abdominaux par le diaphragme. Cette dernière circonstance doit d'abord fixer notre attention.

M. Garreson a bien démontré que, chez les enfants, le ventre est généralement très-volumineux et que, si l'on indique le volume comme un signe ordinaire du carreau, sans le rattacher à telle ou telle cause prochaine, cette indication est absolument insignifiante. En l'absence du météorisme et de l'ascite, l'abdomen est naturellement préminent jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans et même plus tard, soit parce qu'alors l'intestin est relativement plus long, soit parce que le thorax, peu développé jusqu'à la puberté, ne permet pas au diaphragme de remonter autant qu'il le fait plus tard. Les organes qui, chez l'adulte, sont entièrement contenus dans les hypochondres, dépassent habituellement, chez l'enfant, le rebord de la poitrine. Il faut néanmoins toujours s'assurer qu'à ces causes normales il ne s'en joint aucune autre pathologique. En effet, la préminence du ventre est assez souvent due en partie à un rétrécissement transversal ou antéro-postérieur du thorax produit par le rachitisme. Or, s'il est vrai que le rachitisme et le carreau soient deux affections de la même famille, on comprend comment la préminence du ventre due au rachitisme a pu passer aux yeux des anciens comme un indice des plus certains, soit de l'existence du carreau, soit plutôt de la disposition à cette maladie.

Le météorisme, dont le volume de l'abdomen peut dépendre, n'a encore qu'une valeur assez équivoque. Il

accompagne si facilement toutes les maladies dans lesquelles la digestion est troublée que sa présence fournit peu de lumières sur la nature de chacune d'elles. S'il dépend des tubercules mésentériques ou intestinaux, il existe ordinairement d'une manière permanente, mais il n'en est pas moins susceptible d'augmenter ou de diminuer, suivant que les autres troubles de la digestion sont eux-mêmes plus ou moins prononcés. Il manque ordinairement, ou est peu marqué, dans la péritonite.

L'ascite arrive fréquemment dans les tumeurs tuberculeuses du mésentère, surtout lorsqu'elles ont acquis un volume considérable; et si les adhérences dues à la péritonite ne se forment point, on la voit généralement augmenter jusqu'à la fin de la vie. Dans les commencements elle existe souvent seule; plus tard il s'y ajoute soit un œdème des membres inférieurs, soit même une anasarque générale. Cette extension de l'hydropisie, quoiqu'elle puisse résulter uniquement de l'état cachectique général, doit le plus souvent faire soupçonner une compression de la veine cave abdominale par les tubercules, ou celle des gros vaisseaux qui aboutissent au cœur par des ganglions tuberculeux du médiastin. Dans d'autres cas, l'ascite diminue avec les progrès de la maladie; l'épanchement fait place à des adhérences qui rapprochent les points opposés du péritoine; le volume du ventre diminue de jour en jour et finit par devenir moindre qu'à l'état normal. L'ascite manque, au contraire, même dès le début, dans les cas où la péritonite chronique constitue la lésion principale. Elle est également peu influencée par l'existence isolée des tubercules dans l'intestin; ils peuvent y devenir très-nombreux et persister toutes leurs périodes sans la déterminer, si les ganglions sont peu malades et qu'il n'existe aucune gêne de la circulation veineuse. Toutefois il y a des exceptions à cette règle générale.

La palpation et la percussion pratiquées suivant les principes ordinaires nous fournissent les moyens de reconnaître si l'augmentation de volume du ventre est due au météorisme, à un épanchement séreux ou à la présence

de tumeurs volumineuses dans le mésentère. Toutes les fois que ce dernier signe existe, il jette une grande clarté sur le diagnostic ; mais le développement anormal des gaz et l'ascite peuvent empêcher de le constater. En l'absence de ces causes d'obscurité, les tumeurs tuberculeuses se reconnaissent au toucher sous forme de masses marronnées, arrondies, quelquefois du volume d'un œuf et même du poing, tantôt mobiles, susceptibles d'être déplacées en divers sens, mais reprenant leur position primitive aussitôt qu'en les abandonne à elles-mêmes, tantôt, au contraire, fixes et adhérentes. Vers la fin de la maladie, lorsqu'elles sont très-considérables, elles soulèvent la paroi antérieure de l'abdomen amaigrie et rétractée qui les embrasse alors étroitement. Elles sont placées au-devant de la colonne vertébrale, vis-à-vis l'ombilic, dures et indolentes à la pression. L'existence de ces tumeurs suffit ordinairement pour donner au diagnostic toute la certitude désirable ; mais cette précision tardive est moins précieuse que si on pouvait l'acquérir dès le début de l'affection. Il faut d'ailleurs éviter de les confondre avec des tumeurs stercorales ou avec une tumeur tuberculeuse des reins comme nous en avons vu un exemple.

D'après tout ce qui précède, on voit que l'augmentation de volume de l'abdomen se rattache généralement à la présence du carreau proprement dit. Dans des cas plus rares suivant nous que ne le pensent beaucoup d'auteurs, l'ascite peut exister indépendamment du carreau et comme effet des tubercules intestinaux, ou comme le premier degré de la péritonite chronique. Celle-ci surtout a pour effet beaucoup plus constant la diminution et la rétraction du ventre dont nous allons parler tout-à-l'heure, et quand aux tubercules intestinaux, c'est plus souvent en produisant le méliorisme que l'ascite, qu'ils sont capables d'altérer la forme et le volume de l'abdomen.

Lorsqu la péritonite chronique est primitive, elle s'accompagne presque constamment, même dès le début, d'un certain degré de rétraction de la paroi abdominale qui paraît comme collée sur les intestins et faire avec eux partie

d'une même masse ; les mouvements de glissement sont devenus impossibles ; il y a au toucher ce qu'on appelle l'empâtement, c'est-à-dire, une certaine résistance plus dure et moins élastique qu'à l'état normal, qui n'est point non plus celle que donne le météorisme ou l'ascite. Dans l'état normal, il semble au toucher que les parties sous-jacentes glissent et fuient sous la main ; une percussion un peu brusque leur imprime une espèce de secousse ou de tremblement qui se transmet aux parties voisines et indique la grande mobilité dont elles jouissent. Dans la péritonite il n'en est pas ainsi ; les anses intestinales réunies par des adhérences supportent la pression et y résistent sans la transmettre en fuyant aux parties voisines ; le choc semble borner ses effets au point sur lequel il a été exercé ; il s'y épuise sans se transmettre et sans se propager.

Dans quelques cas la simple inspection de l'abdomen fournit à un œil exercé des signes caractéristiques. Ainsi on voit la paroi abdominale si bien appliquée et moulée sur les anses intestinales, qu'elle présente des saillies arrondies qui leur correspondent, et entre elles des dépressions produites par des adhérences qui attirent le péritoine pariétal dans les intervalles des saillies. La région ombilicale considérée dans son ensemble, quoique rapprochée de la colonne vertébrale, a quelquefois une forme arrondie, lorsque des gas s'accumulent dans l'intestin, mais d'autres fois elle est aplatie, très-déprimée, et donne à la percussion un son tout-à-fait mat.

Quand la péritonite chronique succède à l'ascite, on comprend que tous les caractères que nous venons d'indiquer ne se prononcent qu'au fur et à mesure de la résorption de l'épanchement, et que celle-ci peut même n'être pas complète quand la mort survient. Il arrive ainsi quelquefois que l'ascite se déclare dans le cours de la péritonite. Dans ce cas, il est rare qu'elle devienne très-considérable, parce que les adhérences déjà formées s'y opposent, mais on remarque presque toujours une aggravation de la douleur, et des autres accidents qui indiquent le passage de la maladie à l'état aigu ou sub-aigu.

Enfin, lorsque le carreau se joint à la péritonite, on prévoit que la forme et le volume du ventre, ainsi que les autres signes fournis par l'inspection ou la palpation du ventre, pourront être modifiés par la présence de tubercules volumineux dans le mésentère.

Les phthisies mésentérique, intestinale ou péritonéale offrent toujours une marche chronique ou sub-aiguë. Leur durée peut être fort longue, mais dans quelques cas il s'écoule à peine quelques semaines entre les symptômes qui les annoncent un peu positivement et le moment de la mort. Comparées entre elles sous ce rapport dans le cas où elles existent assez complètement isolées, c'est la péritonite chronique qui nous a toujours paru marcher le plus rapidement et avec le moins de rémissions vers une terminaison fatale. Le dépérissement général est plus prompt et plus profond; en quelques semaines le marasme est extrême, comme si la simple gêne mécanique apportée aux mouvements de l'intestin par les adhérences tuberculeuses, empêchait plus complètement la chylification et l'hématose que ne peuvent le faire les ulcères intestinaux et l'obstruction des ganglions mésentériques. Cette marche rapide vers une terminaison toujours fâcheuse, n'a rien au fond qui doive bien nous étonner, car chez les enfants toutes les lésions qui portent une atteinte directe à la récomposition des matériaux nutritifs, ont des suites plus promptement funestes qu'à un âge avancé, alors que le sang se dépouille moins facilement par l'assimilation de ses principes réparateurs.

D'ailleurs la marche des phthisies abdominales est souvent compliquée par d'autres maladies qui abrègent leur durée. Elles favorisent toujours l'évasion des phlegmasies gastro-intestinales et des flux diarrhéiques sous l'influence de simples causes occasionnelles; elles tendent à leur imprimer une ténacité ou une violence qu'elles n'auraient point sans cette coïncidence. Par réciprocity, ces maladies peuvent aussi déterminer l'explosion et accélérer la marche des tubercules.

La seule complication qui ait une connexion intime et évidente avec la tuberculisation abdominale, est la per-

foration des organes creux. Elle peut non-seulement survenir à une époque avancée de la maladie, mais aussi dès le début et dans certains cas elle la précède pour ainsi dire. On voit quelques sujets, en apparence bien portants, être pris tout-à-coup d'une péritonite sur-aiguë qui les emporte rapidement, et à l'autopsie on ne trouve qu'un très-petit nombre de tubercules dans les organes abdominaux; seulement, par une espèce de fatalité, l'un d'eux s'est ramolli, a suppuré et s'est ouvert dans le péritoine avant la formation des fausses membranes qui auraient pu prévenir l'épanchement toujours mortel des matières intestinales dans la séreuse. Des cas de ce genre se sont rien moins que rares; nous en avons déjà réuni plusieurs, dans quelques-uns desquels on aurait pu croire à une péritonite spontanée si l'examen n'eût été fait avec soin. Cette erreur peut être commise, surtout lorsque la perforation s'est opérée dans l'appendice iléo-cæcal; à plus forte raison la nature de la maladie peut-elle être méconnue pendant la vie. Mais comme la péritonite aiguë spontanée est excessivement rare, il faut présumer, surtout chez les enfants, qu'elle résulte d'une perforation tuberculeuse, soit qu'elle survienne au milieu d'une santé satisfaisante en apparence, soit dans le cours d'une affection chronique du bas-ventre.

Si, comme nous l'avons vu, le diagnostic différentiel du carreau, des tubercules de l'intestin et de ceux du péritoine, est dans plusieurs cas enveloppé d'une certaine obscurité, il est encore bien plus difficile de reconnaître la présence des tubercules dans les autres organes de l'abdomen. Ils sont presque toujours latents dans le foie, la rate, les reins, le pancréas, etc., et lorsqu'ils développent quelques symptômes, ceux-ci se confondent d'ordinaire avec ceux qui résultent de la phlogose mésentérique, intestinale ou péritonéale. Toutefois la présence d'une douleur sourde, profonde, continue, dans les hypochondres droit et gauche, la tuméfaction du foie ou de la rate, appréciable par la palpation ou la percussion, quelquefois la forme bosselée de ces organes, pourraient faire soupçonner qu'ils sont aussi tuberculisés. Dans quelques circonstances, l'ac-

lère se manifeste sous l'influence des tubercules du foie ou de ceux qui affectent les ganglions placés autour des vaisseaux biliaires, peuvent gêner l'écoulement de la bile dans le duodénum. Nous avons vu quelques faits de ce genre, mais ils sont rares; le plus souvent les tubercules du foie ne s'annoncent par aucun phénomènes caractéristiques, alors même qu'ils ont parcouru toutes leurs périodes de virulence, de ramollissement et de suppuration éliminatoire.

Il en est à peu près de même des tubercules des reins. Dans la plupart des cas ils ne sont pas même soupçonnés pendant la vie. Dans un seul de ceux que nous avons observés, ils auraient pu être diagnostiqués si l'attention eût été particulièrement dirigée de ce côté. En effet, on avait reconnu pendant la vie, à droite et un peu au-dessus de l'ombilic, une tumeur bosselée, dure, du volume d'un œuf de poule, que l'on avait cru appartenir au mémentère. La malade, âgée de deux ans, ayant succombé aux progrès de l'affection tuberculeuse dans les trois cavités splanchniques et après des symptômes du péritonite sur-aiguë qu'on attribua à une perforation intestinale, l'autopsie fit découvrir l'erreur dans laquelle on était tombé. Outre des granulations tuberculeuses dans les méninges, des tubercules à tous les degrés dans les organes du thorax, dans le tube intestinal, dans le péritoine, dans la rate; outre une perforation tuberculeuse de l'appendice du cœcum qui avait livré passage à plusieurs trichocéphales et produit la péritonite aiguë, on trouva aussi les ganglions mésentériques et tout l'appareil urinaire envahis par la maladie. Dans les premiers elle était médiocrement avancée, tandis que les reins, les urèbres et la vessie étaient profondément désorganisés. On vit que la tumeur sentie pendant la vie à travers la paroi abdominale était due à une augmentation de volume du rein droit, dont l'extrémité inférieure était comme recourbée et dirigée en avant. Les deux lobes latéraux de cette glande étaient entièrement couverts de matière tuberculeuse, les mamelons tombaient en débris, les calices étaient détruits, le bassin et l'urètre étaient infiltrés, dans toute leur étendue, de matière tuberculeuse qui sem-

blait remplacer leurs parois. A gauche, l'altération était moins avancée. Toute la surface du trigône vésical et le commencement de l'urètre étaient tapissés d'une couche tuberculeuse au niveau de laquelle la muqueuse était détruite. Ainsi, dans toute l'étendue des voies urinaires, le pus sortait accidentel *était* en voie d'élimination, et, si l'on avait examiné les urines pendant la vie, on y aurait certainement trouvé du pus et quelques grumeaux de matière étrangère qui auraient éclairé le diagnostic.

L'affection tuberculeuse des reins a été l'objet de recherches spéciales de la part du professeur d'Annan, de Dresde (1). Parmi les observations rapportées par ce médecin, on trouve celle d'un enfant de trois ans et demi chez lequel on reconnut pendant la vie l'existence d'une tumeur abdominale due à l'affection tuberculeuse du rein gauche. A l'autopsie l'abdomen contenait un peu de sérosité; en repliant les parois, on aperçut de suite l'énorme tumeur formée par le rein gauche, de la grosseur du poing; elle refoulait devant elle le colon transverse et le colon descendant, qui était appliqué sur sa face antérieure, du volume d'une tête d'enfant, elle remplissait toute la cavité abdominale gauche et avait formé des adhérences avec les côtes et les vertèbres, adhérences qu'on eut de la peine à détruire. La tumeur, détachée de tous côtés, était ronde, sphérique, mais présentant encore çà et là des vestiges de la figure primitive du rein. En la comprimant, on sentit une fluctuation assez notable. Après l'avoir incisée dans sa partie moyenne, on vit que tout le parenchyme du rein avait subi une dégénérescence tuberculeuse; les calices très-dilatés étaient faciles à apercevoir; la masse tuberculeuse était jaune et ramollie, mais sans vaisseaux, ni épanchements sanguins; l'urètre gauche était bouché, ses parois épaissies et recouvertes çà et là, à l'extérieur, de tubercules isolés qu'enveloppait une membrane celluleuse; le canal interne était obstrué. Le rein droit était augmenté de volume et ramolli, mais sans tubercules; on voyait par contre cette

(1) *Gazette médicale*, 1851, pag. 206.

matière déposée le long des artères et des veines émulgentes.

Les autres observations du professeur d'Ammon sont relatives à des sujets d'un âge plus avancé et présentent des particularités analogues. Chez eux les symptômes rendent le diagnostic plus facile qu'il ne peut l'être chez de jeunes enfants. En effet les malades se plaignent d'abord d'un prurit à l'orifice de l'urètre et d'un légers écoulement vésical, alternant avec une incontinence d'urine. L'altération des qualités normales de ce liquide est un des signes les plus importants de l'affection tuberculeuse des reins. L'urine est d'un jaune paille, aérée; son émission est accompagnée d'ardeur et de lésion au col de la vessie; après quelques heures, elle laisse déposer un sédiment furfuracé, clair, de la couleur des tubercules; elle se montre déjà telle au commencement et reste de même pendant tout le cours de la maladie; cependant le sédiment peut manquer pendant quelques jours, mais il se montre bientôt de nouveau en plus grande abondance aux époques où les tubercules passent de l'état de crudité à celui de ramollissement. Un autre symptôme local des tubercules rénaux dont le diagnostic n'est pas sans difficulté, c'est la tumeur située dans la région du rein, et que l'on peut souvent confondre avec une lésion de l'estomac, de la rate, du foie, du mésentère, du méso-colon, etc. Quant aux symptômes généraux, ce sont tous ceux des affections tuberculeuses en général.

La primauté des affections tuberculeuses de l'abdomen est au moins aussi grave que celle des tubercules du thorax. En effet les premières existent assez rarement sans la coïncidence des seconds; ceux-ci au contraire sont quelquefois seuls. Elles annoncent ainsi ou font au moins pressentir que la cachexie tuberculeuse a plus profondément modifié tout l'organisme, puisque les lésions locales sont plus nombreuses et plus étendues. Dans quelques cas exceptionnels, les tubercules du thorax sont si peu développés que l'obstacle à la guérison ne vient pas de là. Mais, pour que celle-ci ait lieu, il faut au moins que les lésions abdomi-

nales soient encore peu avancées, et que l'affection constitutionnelle soit susceptible d'être enrayée dans sa marche et de rétrograder. Il est malheureusement trop commun de voir la maladie résister à tous les modes de traitement.

Dans quelques cas la phthisie abdominale marche avec une grande rapidité; c'est ce qui arrive quand le mésentère, le péritoine et l'intestin sont simultanément tuberculisés. Mais quand ils le sont isolément, la marche est généralement moins rapide, excepté dans le cas où la lésion occupe le péritoine. La péritonite chronique tuberculeuse nous paraît, parmi les maladies de la même famille, une de celles dont la terminaison est le plus constamment fatale et la durée plus courte.

Ce qui contribue aussi à abrégier la vie dans beaucoup de cas et à déterminer la mort avant que les tubercules de l'abdomen n'aient parcouru toutes leurs périodes, c'est la coïncidence d'autres affections tuberculeuses du thorax ou de la tête, et de certaines complications locales ou éloignées, telles que la perforation de l'intestin suivi de péritonite sur-aiguë, la méningite, les fièvres éruptives, etc.

Il ne répugne point de croire à la possibilité de la guérison ou d'une marche stationnaire de la maladie. La guérison peut avoir lieu : 1^o par le ramollissement et l'élimination de la matière tuberculeuse; 2^o par sa transformation en matière crétacée; 3^o par sa résorption. Ces deux derniers modes n'offrent rien de particulier dans les organes de l'abdomen. Quant au premier, nous avons vu de quelles manières il peut s'accomplir quand nous avons étudié les caractères anatomiques. Mais cette terminaison est malheureusement très-rare, parce qu'alors la guérison suppose le peu d'étendue de la lésion locale, l'intégrité des organes essentiels à la vie et l'arrêt de la diathèse tuberculeuse.

La curabilité du cerveau a été regardée comme assez fréquente par beaucoup d'auteurs. Cette opinion, qu'aucun observateur exact de notre époque n'osait soutenir, vient de ce que l'on confondait avec le cerveau tuberculeux des

affections de l'appareil gastro-intestinal ou du péritoine d'une nature très-différente.

TRAITEMENT.

Les détails dans lesquels nous pourrions entrer sur le traitement des tubercules de l'abdomen ont déjà trouvé leur place dans nos généralités sur la maladie tuberculeuse. Il serait donc aussi fastidieux qu'inutile de reproduire ici tout ce que nous avons dit du traitement préventif et des moyens que l'hygiène met à notre disposition.

Quant à l'emploi des moyens thérapeutiques proprement dits, nous n'aurons encore aucun détail importants à consigner ici qui ne l'aient été ailleurs.

Ainsi les émissions sanguines sont rarement convenables. Au début on peut les mettre en usage lorsqu'il y a des symptômes inflammatoires, tels qu'une douleur vive, étendue à tout l'abdomen ou bornée à une seule région, la tension de la paroi antérieure du bas-ventre, le météorisme et des dérangements digestifs qui paraissent dépendre d'une inflammation gastro-intestinale ou péritonéale.

Lorsqu'une périculite sur-aiguë se déclare dans le cours d'une affection tuberculeuse qui siège dans l'abdomen, elle est presque toujours en-dehors des ressources de l'art et très-promptement mortelle, parce qu'elle résulte de la perforation d'un organe et de l'épanchement d'une matière étrangère dans la cavité abdominale. Les frictions mercurielles à très-haute dose, l'opium administré suivant la méthode que nous avons fait connaître en parlant des perforations d'altérations organiques, et quelquefois les émissions sanguines locales, tels sont les moyens qui peuvent, sans conjurer la mort, du moins la retarder.

Les rubéfiements alternés, l'erde en particulier, sont encore plus souvent contre-indiqués dans le cas qui nous occupe que dans la phthisie pulmonaire, parce qu'ils agissent sur des organes malades ou très-voisins de ceux qui le sont. Nous avons en effet établi en principe que les altérations tuberculeuses des viscères contre-indiquent géné-

ralement la plupart des moyens actifs qui ont quelque succès dans les tubercules des organes externes. Si cependant l'estomac et l'intestin sont sains, si la lésion paraît limitée aux ganglions mésentériques, on peut essayer l'iode à l'intérieur, mais il faut surveiller de près son action, afin de le suspendre à temps si le cas l'exige.

Les mêmes réflexions sont applicables à l'huile de foie de morue dont plusieurs auteurs, en particulier M. V. Stieber, de Strasbourg, ont vanté les avantages contre le cancer proprement dit. C'est surtout lorsque cette maladie consiste dans la tuméfaction avec induration simple des ganglions et non lorsqu'ils sont transformés en matière tuberculeuse, que l'huile de poisson, l'iode et les autres altérants peuvent offrir quelques chances de succès. Mais comme le diagnostic différentiel de ces deux ordres de cas est en quelque sorte impossible, le pronostic ne peut être que fort incertain.

Les purgatifs et les vomitifs ne peuvent être administrés à l'intérieur qu'avec une extrême réserve. Cependant les médecins anglais font un grand usage du calomel donné à doses fractionnées. Il est vrai que ce médicament ainsi administré agit le plus souvent non comme évacuant, mais comme altérant et à la manière des frictions mercurielles sur l'abdomen qui sont préconisées par quelques praticiens.

On a vanté, autrefois surtout, une foule de moyens auxquels nous ne pouvons plus aujourd'hui ajouter foi et qui n'ont probablement eu de succès que dans les cas où il existait toute autre chose que des tubercules de l'abdomen. Ainsi, la gomme ammoniacque, l'aloès, le séuë, l'absinthe, l'ellébore noir, la chiopré, la racine d'arum, le carbonate de potasse, la loryte, et plusieurs préparations composées, telles que l'eau de mercurure de Thodes, l'essence douce de Stahl, les pilules de Béchier, celles de Grateloup, de Jannin, etc., ont pu, à la rigueur, réussir dans quelques cas, mais leur emploi ne saurait être généralisé.

Les toniques à l'intérieur ne seront prescrits qu'autant qu'on y sera autorisé par l'état du tube gastro-intestinal. A

l'extérieur, ils ne sont presque jamais contre-indiqués et l'on se trouvera bien, dans plus d'une occasion, de l'emploi des bains d'eau salée naturels ou artificiels, des bains sulfureux, des fumigations aromatiques sèches, des frictions sèches, excitantes, des bains d'air comprimé, etc.

Dans la dernière période le traitement doit être seulement palliatif. On se borne à faire la médecine du symptôme pour s'opposer aux accidents qui tourmentent le plus les malades et peuvent accélérer la marche funeste de la maladie. Ainsi on combat les douleurs abdominales par des topiques émollients et narcotiques ; la diarrhée par les opiacés et les astringents, quand elle est abondante et coagulative ; les vomissements par les antispasmodiques, la potion anti-émétique de Rivière ; l'ascite par les diurétiques doux à l'intérieur et les frictions sur l'abdomen avec la teinture de digitale.

On aura plus d'une fois à remplir d'autres indications fournies soit par l'état de la poitrine dont les organes éprouvent en même temps l'influence de la cachexie tuberculeuse, soit par les éruptions et autres acrophules externes qui coïncident avec souvent avec le cancer. Ces indications ont été déjà tracées ou le seront dans d'autres parties de cet ouvrage.

TROISIÈME PARTIE.

MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX.

Les maladies du système nerveux n'ont peut-être pas dans l'enfance autant d'importance qu'on leur en accorde généralement. À en croire le langage des auteurs et d'un grand nombre de praticiens, les troubles de ce système sont très-fréquents et font succomber la plupart des sujets qui n'atteignent point la puberté.

Si l'on veut bien se reporter aux relevés statistiques que nous avons produits dans l'introduction et qui, quoique basés sur un nombre encore restreint d'observations, méritent cependant plus de créance que des assertions vagues et approximatives, on verra que les maladies du système nerveux n'approchent point par leur fréquence de celles des autres appareils viscéraux. En effet, nous avons trouvé que sur un nombre donné de cas morbides, elles n'entrent pas même pour un dixième; tandis que les maladies de poitrine y entrent pour deux cinquièmes, celles de l'abdomen et celles des sens respectivement pour un cinquième.

Dans un autre endroit nous avons montré que les jeunes sujets qui succombent à quelque maladie encéphalo-archidienne sont en faible nombre comparativement à ceux qui meurent de quelque autre maladie. Nous avons trouvé en effet que vingt-sept enfants seulement, sur cent treize-six qui ont succombé, ont dû leur mort à diverses maladies des centres nerveux.

Une seule chose est vraie qui justifie en partie l'opinion que nous combattons, non comme fautive, mais comme exagérée, c'est que ces maladies sont presque toujours d'une nature grave, au-delà des ressources de l'art, et

fournissent une mortalité relative très-considérable; c'est ainsi que nous avons pu, en reculant, il est vrai, dans la limite des faits observés par nous, établir que chez les enfants atteints de maladies encéphalo-rachidiennes la mortalité a été de soixante-huit sur cent, et successivement de quarante-huit, de cinquante, de trente-deux sur cent, chez les enfants atteints de quelques maladies du thorax, des sens ou de l'aldement.

Les principales maladies des centres nerveux qu'on observe dans l'enfance se réduisent à un petit nombre de genres. D'abord parmi les névroses nous ne rencontrons que celles de la motilité; celles de la sensibilité et de l'intelligence sont bien plus rares. Par conséquent nous n'avons à décrire ni les névralgies, ni les diverses formes de l'aliénation mentale. À la vérité, l'idiotie appartient à la première période de la vie; mais comme elle résulte d'un arrêt de développement ou d'un vice congénital de conformation du cerveau, et dès lors n'est point une maladie dans le sens ordinaire du mot, nous ne croyons pas devoir nous en occuper. Les névroses complexes, telles que l'hystérie, l'épilepsie, la catalepsie, l'hydrophobie, etc., appartiennent plus à la puberté et à l'âge adulte qu'à l'enfance. L'épéropsie en particulier n'a été jugée assez fréquente dans le jeune âge que parce qu'on la confondait souvent avec la forme grave de l'éclampsie.

Si nous parcourons ensuite la série des maladies caractérisées par des altérations matérielles des organes, nous dirons par avance que l'inflammation des méninges et les tubercules encéphaliques sont les deux seules affections qui exigent une étude détaillée et approfondie. Les congestions et les hémorrhagies encéphalo-rachidiennes, rares dans l'enfance, ne seront l'objet que de quelques remarques sommaires. L'inflammation et le ramollissement de la substance nerveuse ne constituent généralement que des lésions accessoires de la méningite et de l'affection tuberculeuse; par conséquent nous n'aurons point à faire l'histoire de l'encéphalite proprement dite, ni celle du ramollissement cérébral idiopathique, maladie propre

à la vieillesse. Nous verrons aussi que les hydrocèles cérébrales se rapportent soit à la méningite, soit à une diathèse hydro-hémique ou syreux dont nous parlerons plus tard. Enfin nous n'aurons rien à dire des abcès, ni des affections cancéreuses, ni de quelques autres maladies plus fréquentes dans l'âge moyen ou vers le déclin de la vie.

SECTION I.

MALADIES DES CENTRES NERVEUX SANS ALTÉRATION MATÉRIELLE APPRÉCIABLE, OU NÉVROSES.

Les névroses du mouvement sont de deux espèces. Dans l'une le mouvement est affaibli ou aboli, il y a paralysie; dans l'autre il est conservé, mais perversé, il y a convulsion. Les paralysies nerveuses n'offrant rien de spécial dans l'enfance, nous ne devons pas nous y arrêter.

Les convulsions (ce mot étant pris dans un sens générique) se divisent en toniques et en cloniques. Les unes et les autres sont des contractions involontaires des muscles de la vie de relation. Dans les premières la contraction est permanente, les parties sont rigides, il y a une sorte d'immobilité active; dans les secondes, au contraire, la contraction alterne avec le relâchement et produit des mouvements variés, étendus, désordonnés.

Parmi les convulsions toniques nous trouvons à décrire la contracture et le tétanos des nouveau-nés. Toutefois celui-ci étant plus souvent le résultat des épanchements sanguins du rachis qu'une véritable névrose, nous en réunirons l'histoire à celle des congestions et des hémorrhagies encéphalo-rachidiennes. Parmi les convulsions cloniques, nous aurons à étudier les convulsions proprement dites ou l'éclampsie, et la chorée.

Quelques auteurs ont décrit une paralysie spéciale aux enfants. Nous adoptons à cet égard l'opinion de M. Rilliet et Barthez, et pensons que cette maladie a été confondue avec la contracture essentielle. En effet notre pratique et nos recherches dans les auteurs ne nous ont montré aucun ensemble de faits d'après lesquels il serait démontré que les enfants sont plus souvent que les adultes atteints de paralysie essentielle ou que cette maladie revêt chez eux une forme spéciale. Les faits de ce genre sont rares à toutes les époques de la vie et nous nous croyons parfaitement autorisé à nous dispenser d'une description inutile.

CHAPITRE I.

CONTRACTURE.

La contracture, étudiée pour la première fois par Dance (1), sur laquelle ont paru plus tard les mémoires de de la Forge (2), de Constant (3), de M. Tonnelé (4), Mardoch (5), etc., a été bien décrite dans le *Compendium de médecine pratique*. « Vingt-sept observations de cette maladie, disent les auteurs de cet ouvrage, ont été publiées jusqu'à ce jour, nous possédons deux faits nouveaux à ajouter à ceux que nous avons précédemment rapportés ; c'est donc sur vingt-neuf cas que nous pouvons établir la description qui suit... etc. (6). »

Cette affection, quoique moins fréquente que l'éclampsie et la chorée, n'est pas très-rare ; chaque année on en ob-

(1) *Archives*, t. xxi, p. 189, 215.

(2) *Journ. méd. des progr. des sci. et instr. de méd.*, t. ii, p. 161, 257.

(3) *Gen. méd.*, février, 1852, et *Gen. des hôp.*, n^{os} 56 et 57, 1852.

(4) *Gen. méd.*, janvier 1852.

(5) *Journ. méd.*, t. viii, p. 417.

(6) *Compendium de méd. prat.*, par Bouvier et de la Forge, t. ii, p. 491.

serre plusieurs cas à l'hôpital des Enfants-malades. Sans doute ce n'est point une maladie nouvelle, et parmi les nombreuses formes de convulsions indiquées par les auteurs, on en retrouve plusieurs qui sont avec elle un grand rapport. Mais elle a été méconnue comme maladie distincte, erreur facile à une époque où les convulsions toniques n'étaient pas rigoureusement séparés des convulsions cloniques, et qui s'explique par ce fait que la contracture se rencontre chez quelques malades, non pas à l'état simple, mais unie à des mouvements convulsifs cloniques. Enfin les auteurs antérieurs à ces dernières années ne se sont point occupés de distinguer la contracture idiopathique du nerveu de celle qui est symptomatique, et se lie à une méningo-encéphalite ou à d'autres lésions matériellement appréciables des centres nerveux.

La contracture ne se montre pas indifféremment à toutes les périodes de l'enfance. Il résulte en effet de l'ensemble des observations connues et en particulier de celles de Constant qu'elle est plus fréquente chez les enfants de dix-huit mois à cinq ans et chez ceux de douze à quinze. Sur six cas que nous avons recueillis, nous comptons trois enfants âgés d'environ deux ans, un de trois ans, un de onze et un de douze. Les auteurs qui se sont occupés des maladies des nouveau-nés n'ont pas noté l'existence de la contracture ou l'ont peut-être confondue avec le tétanos. Le sexe n'a aucune influence sur sa production. Un tempérament nerveux et irritable se rencontre chez plusieurs des malades qui en sont atteints. Les causes les plus ordinaires sont le travail de la dentition, les vers intestinaux et d'autres maladies du tube digestif, la pneumonie et autres maladies fébriles, la masturbation, les approches de la première menstruation chez les jeunes filles. Dans tous ces cas la maladie pourrait être considérée comme sympathique, mais il en est d'autres remarquables par l'absence de toute espèce de cause pathologique.

Symptômes.

L'invasion n'a pas toujours lieu de la même manière. Chez certains malades on a noté des phénomènes précurseurs qui consistent toutôt en un léger mouvement ébelle, tantôt en un sentiment de fatigue, de brisement, le plus souvent en une sensation d'engourdissement, de fourmillement, de picotement dans les membres atteints de contractures; dans d'autres cas la maladie survient à une attaque d'éclampsie; enfin chez d'autres malades les contractures surviennent brusquement au milieu d'une santé parfaite jusqu'alors et comme par une espèce d'attaque. Il n'est pas rare de voir, dans ce dernier cas, le début s'accompagner de quelques désordres nerveux qui disparaissent bientôt et laissent à la contracture son caractère ordinaire de simplicité. C'est en que nous avons vu une fois chez un enfant de onze ans qui, sans cause connue, fut pris tout-à-coup d'un éblouissement qui le fit tomber dans la rue; s'étant relevé, il eut une peine extrême à marcher, et éprouva ensuite une céphalalgie continuelle avec somnolence; le lendemain il eut encore un vertige du même genre, et ne pouvant marcher il resta au lit. L'ayant examiné le troisième jour, nous trouvâmes que la difficulté de marcher venait d'une flexion involontaire et forcée des pieds sur les jambes, de telle sorte que le malade étant debout ne pouvait appuyer que le talon sur le sol et faisait de vains efforts pour étendre le pied sur la jambe. Les muscles du mollet paraissaient relâchés, tandis que ceux de la région antérieure étaient durs et contractés. Les articulations étaient dans un certain degré d'extension, les membres supérieurs étaient sains. La sensibilité des pieds et des jambes était un peu engourdie, et quand on voulait étendre le pied par force, le malade souffrait dans les muscles contractés. La céphalalgie et la somnolence avaient disparu. Une tisane antispasmodique et des bains tièdes amenèrent la guérison en trois jours.

Il n'est peut-être aucun muscle qui ne puisse être atteint

solément de contracture surtout à la suite de convulsions toniques. Mais quand la maladie est primitive, elle a ordinairement son siège aux extrémités, aux avant-bras, aux mains et aux doigts d'une part, de l'autre aux jambes, aux pieds et aux orteils. Elle n'atteint pas toujours simultanément toutes ces parties, car tantôt elle prédomine aux membres supérieurs, tantôt aux inférieurs, et quelquefois elle laisse libres les articulations du coude, du poignet, du genou, du coude-pied, pour n'affecter que les muscles fléchisseurs des doigts ou des orteils, ou bien elle respecte ces muscles pour n'agir que sur ceux des autres articulations. Au poignet, elle intéresse toujours les muscles fléchisseurs; au coude-pied elle atteint de préférence les muscles extenseurs qu'à, comme on sait, sont les analogues des fléchisseurs du poignet, mais aussi quelquefois, comme dans le fait cité tout à l'heure, elle laisse intacts ces muscles, et attaque les fléchisseurs du pied et les extenseurs des orteils. Le coude et le genou conservent le plus souvent la liberté de leurs mouvements, et l'on ne connaît que fort peu d'exemples dans lesquels la contracture ait envahi la hanche et l'épaulé au même temps que les articulations inférieures.

La contracture des extrémités s'annonce par les symptômes suivants : le malade, quand il est assez âgé pour rendre compte de ses sensations, accuse une grande gêne dans les mouvements et un sentiment de raideur dans l'avant-bras, le poignet, les doigts, la jambe, le pied et les orteils; il lui semble qu'un obstacle extérieur, comme faisait une ligature trop serrée autour du membre, s'oppose à l'exécution des mouvements. Parfois il éprouve des tranches, des élancements, des douleurs plus ou moins vives qui, dans certains cas, suivent le trajet des principaux nerfs. Chez les très-jeunes enfants ces symptômes rationnels ne peuvent être que très-incomplètement reconnus; on peut cependant pressentir l'existence des douleurs aux cris et à l'agitation qui se manifestent par moments. Dans tous les cas l'examen des membres ne laisse aucun doute sur la nature du mal. Ainsi les doigts sont et restent

fléchis vers la paume de la main ; cette flexion porte uniquement sur l'articulation métacarpe-phalangienne, et par un mouvement en quelque sorte inverse, les phalanges conservent entre elles les rapports qu'elles ont dans l'extension, comme si les muscles extenseurs résistaient encore activement et limitaient l'action des fléchisseurs. Les doigts sont écartés les uns des autres et dans un état de raideur qui les empêche d'obéir aux mouvements qu'on voudrait leur imprimer; le pouce cède aussi bien que les autres doigts à la rétraction musculaire; ils inclinent fortement vers la cavité palmaire, et se trouve recouvert par les autres doigts à peu près comme chez les épileptiques. Après les doigts, on trouve ordinairement les poignets et quelquefois les coudes dans un état de flexion plus ou moins prononcé, et les muscles qui l'opèrent sont tendus et saillants sous la peau.

Aux membres inférieurs on remarque le plus souvent la flexion des orteils, une augmentation de la concavité de la région plantaire et l'extension du pied opérée par le tendon d'Achille; dans quelques cas plus rares le pied est fléchi; quand la maladie occupe les muscles de la cuisse, le genou est étendu et inflexible. Les muscles contracturés sont durs et tendus sous les téguments, le tendon d'Achille fait une forte saillie. Presque constamment les contractures qui surviennent dans les membres pelviens succèdent à celles des membres thoraciques.

Un symptôme des plus remarquables est la douleur vive qui se manifeste dans le trajet des muscles, lorsqu'on veut redresser les parties fléchies ou fléchir les parties étendues. Souvent alors on entend des cris aux petits malades. Dès qu'on abandonne les parties à elles-mêmes ou les voit reprendre leur première position.

A l'état de simplicité la maladie se s'accompagne d'aucun autre trouble vers les sens ni l'intelligence; il n'y a pas de mouvement fébrile, les petits malades conservent de l'appétit et digèrent bien; la respiration et les sécrétions n'offrent rien de particulier.

Cependant dans un assez bon nombre de cas on remarque

de la fièvre, et des troubles digestifs. La première peut exister en l'absence de toute complication, comme effet direct de la douleur qui accompagne la contracture et réagit d'autant plus vivement sur le centre circulatoire que les sujets sont plus impressionnables. Mais plus souvent encore la fièvre peut être attribuée à d'autres maladies concomitantes, à une pneumonie, par exemple, ou tout aux troubles digestifs que nous avons déjà énumérés parmi les causes, c'est-à-dire au travail de la dentition, aux affections vermineuses et aux diarrhées muqueuses. On a vu dans quelques cas la fièvre augmenter vers le soir et offrir le type rémittent continu. En général la présence de l'état fébrile devra faire soupçonner au praticien l'existence de quelque autre maladie dont la contracture peut même n'être qu'un simple épiphénomène, circonstance qui change ou multiplie les indications thérapeutiques.

La durée de l'affection est ordinairement de quelques jours; quelquefois elle est très-passagère, d'autres fois elle devient chronique et incurable; chez quelques sujets elle cesse pendant un certain laps de temps pour reparaitre plus tard, ensuite disparaître et se reproduire encore. Elle peut alterner avec des convulsions cloniques.

Le diagnostic est généralement facile entre la contracture essentielle et la contracture symptomatique d'un ramollissement partiel du cerveau, d'une tumeur tuberculeuse ou d'une méningite. Dans le premier cas les autres fonctions cérébrales ne présentent aucun désordre; dans le second, on observe divers troubles de l'intelligence et de la sensibilité, de la fièvre, de la constipation, des vomissements, etc. Le début et la marche diffèrent complètement.

Le pronostic offre peu de gravité. Les six malades que nous avons observés ont parfaitement guéri et en peu de temps. « Tous les sujets dont nous avons pu faire l'autopsie cadavérique, dit Constant, avaient succombé à des maladies intercurrentes, ayant leur siège, soit dans les voies digestives, soit dans l'appareil respiratoire. » Cependant, quand la maladie passe à l'état chronique elle devient souvent d'une cure très-difficile et même impossible. Ceci ar-

rive surtout dans les cas où elle est consécutive aux contractions cloniques, et c'est alors qu'elle devient l'origine de ces déviations qui constituent les pieds-bots, le torticolis, le strabisme et d'autres difformités, dont la nature et la cause prochaine n'ont été dévoilées que par les chirurgiens qui, dans ces derniers temps, ont tant agrandi le domaine de la téno-tomie.

Bien qu'il puisse rester encore sur la nature de la contracture des doutes que des recherches ultérieures ne manqueraient pas de dissiper, nous n'avons point hésité à la ranger dans l'ordre des névroses. En effet, jusqu'à présent les résultats de l'examen microscopique ont été généralement négatifs. On n'a trouvé ni dans les cordons nerveux, ni dans leurs enveloppes, aucune lésion qui puisse rendre compte du trouble des fonctions locomotrices. Les nerfs et les muscles des parties affectées ont été également trouvés intacts. Cependant nous croyons savoir que, pour quelques médecins, la maladie résulterait d'une induration à marche aiguë soit de la moelle épinière, soit des parties blanches centrales de l'encéphale. Dans tous les cas il n'est point probable qu'il s'agisse d'une congestion sanguine, ni, à plus forte raison, d'une phlegmie; car les moyens les plus capables de résoudre, s'il en était ainsi, sont ordinairement inefficaces ou même nuisibles comme nous allons le voir.

Traitements.

Plusieurs observations, entre autres celles de Constant, ont parfaitement démontré que les émissions sanguines générales et locales restent complètement sans effet, et sans les proscrire tout-à-fait, il faut au moins les réserver pour des cas exceptionnels où il peut exister des signes de pléthore générale ou d'hypérémie encéphalo-rachidienne; d'ailleurs on doit y renoncer promptement quand on a cru devoir les employer et qu'elles ont échoué. Les saignées locales ont été essayées soit dans le voisinage du crâne, soit sur le trajet de la colonne vertébrale, et le résultat a été le même. On n'a pas obtenu plus de succès des dérivatifs

culanés, vésicatoires, cautères, moxas, et les topiques, de quelque nature qu'ils fussent, appliqués sur les parties affectées, sont restés sans avantage.

Le traitement dont l'expérience a consacré l'efficacité est très-simple. Il suffit quelquefois de quelques bains tièdes ou froids, suivant la saison, et de l'usage interne de quelques antispasmodiques, tels que le camphre, la valériane et l'assa-fœtida surtout, qu'on donne soit par la bouche, soit en lavements. On emploie souvent avec avantage les purgatifs doux, le calomel, la manne, l'huile d'amandes douces ou de ricin. Le régime sera généralement tonique et fortifiant, surtout quand les sujets sont faibles, délicats, et doivent leur maladie à des excès prolongés de masturbation qui ont déséquilibré leur constitution. Dans certains cas, la cause spéciale de la maladie indique un traitement spécial. Ainsi, la présence des vers dans le tube digestif motivera les anthelminthiques. Si les jeunes filles affectées de contracture éprouvent les prodromes de la première menstruation, on frustrera par des moyens appropriés l'éruption des règles.

Enfin, dans les cas où la maladie se complique de diarrhée, de pneumonie ou de toute autre maladie, on comprend que quelques-uns des moyens que nous venons d'indiquer pourraient être nuisibles; il faudra donc les remplacer par d'autres mieux appropriés à la nature des complications.

CHAPITRE II.

CONVULSIONS CLONIQUES.

Les convulsions proprement dites et la chorée appartiennent au genre des convulsions cloniques.

Dans ces deux maladies l'innervation cérébro-musculaire ou locomotrice est pervertie, désordonnée; en d'autres termes, l'irradiation de l'inducateur qui préside aux

mouvements de la vie de relation et qui, à l'état normal, est régie par la volonté, cesse de lui être soumise; elle s'accomplit malgré elle et de telle manière qu'il se produit des mouvements cloniques. Un autre caractère commun aux convulsions et à la chorée dans la plupart des cas, c'est l'intégrité de la sensibilité et de l'intelligence, et c'est par là principalement qu'elles diffèrent des névroses complexes, telles que l'épilepsie, l'hystérie, etc. Dans certains cas on constate l'altération de ces facultés, mais on comprend que si l'état convulsif prédomine, la maladie puisse conserver le nom de convulsions. Ainsi on admet des éclamptiques avec perte de connaissance, des chorées avec délire. Rien n'est plus commun en pratique que ces cas intermédiaires et ambigus qui se confondent par des nuances insensibles et se trouvent sur les limites de plusieurs genres pathologiques différents.

L'éclampsie et la chorée diffèrent l'une de l'autre par le mode spécial suivant lequel l'innervation volontaire des muscles est atteinte. Dans la première, les mouvements ont lieu sans l'intervention de la volonté et même malgré les efforts qu'elle dirige contre leur production. Dans la chorée, beaucoup de mouvements désordonnés ne s'accomplissent que lorsque la volonté irradié l'influx nerveux locomoteur; elle donne en quelque sorte le signal du mouvement, mais son pouvoir s'arrête là; elle devient impuissante à diriger et à régulariser les contractions musculaires. On peut dire qu'elle les commande encore, mais qu'elle ne les coordonne plus. Dans les convulsions elle ne fait ni l'un ni l'autre.

On s'explique assez facilement par les conditions physiologiques inhérentes à l'enfance, la prédisposition de cet âge aux affections convulsives cloniques. D'une part les irradiations nerveuses sont généralement proportionnées par leur énergie à l'impressionnabilité du système, elles sont en quelque sorte des phénomènes de réaction, et celle-ci tend toujours à égaler l'action. Si donc l'impressionnabilité est vive chez les enfants, elle ne peut être mise en jeu sans provoquer des actes réactionnels. D'autre part il y a une

raison spéciale pour que ces actes chez l'enfant soient presque toujours des troubles de l'innervation cérébro-musculaire plutôt que des désordres intellectuels; c'est que l'intelligence est avancée dans son développement par celui des fonctions locomotrices. Celles-ci dans l'enfance sont relativement plus actives, et c'est par leur accomplissement désordonné que le sensorium ébranlé par une impression quelconque manifestera sa puissance réactionnelle. Prenez un enfant et un adulte; supposez-les un instant doués d'une impressionnabilité égale; soumettez-les à la même impression perturbatrice, à une frayeur, par exemple, ou à une douleur aiguë, vous verrez se développer chez le premier plus souvent l'éclampsie, la chorée, plus souvent au contraire chez le second le délire ou l'aliénation mentale.

La prédisposition dont nous venons d'établir l'origine s'affaiblit graduellement avec les progrès de l'âge; la comparaison des caractères respectifs de l'éclampsie et de la chorée le prouve. Dans la première qui survient plus souvent avant qu'après l'âge de sept ans, il y a soustraction complète des actes de locomotion à la puissance de la volonté. Dans la seconde qui, au contraire, appartient spécialement à la fin de l'enfance, l'intervention de la volonté n'est point tout-à-fait abolie, elle est seulement faible et imparfaite. Ces deux maladies, à tout prendre, diffèrent donc moins par leur nature que par leur intensité, puisqu'elles se rapportent toutes deux à un mode vicieux de l'excitation nerveuse des muscles volontaires, et qu'elles se succèdent dans le cours de l'enfance à mesure que l'innervation cérébro-motrice devient plus régulière et plus parfaite.

Ce rapport des conditions physiologiques de l'enfant avec les affections convulsives en général et surtout avec la chorée, a été bien exprimé par M. Gendrin dans les lignes suivantes: « Dans la première enfance les mouvements sont irréguliers et sans détermination précise; ils s'accomplissent avec plus de vitesse que de force. A mesure que la deuxième enfance se présente, l'influence nerveuse sur l'action musculaire s'établit et se consolide, et la volonté

de l'enfant acquiert de plus en plus la puissance de produire les actes locomoteurs, de les pondérer, de déterminer la puissance et la durée des contractions musculaires pour un résultat déterminé. La chorée qui se manifeste surtout par l'impossibilité de pondérer les mouvements et de les régulariser, et dont le symptôme principal est une rapidité extrême avec absence de précision et de fixité dans les contractions musculaires, survient précisément dans la deuxième enfance; elle n'est autre chose que l'état de faiblesse et d'imperfection d'une fonction qui s'établit. Elle représente l'incitation nerveuse de l'âge de la puberté provoquant les mouvements désordonnés de la première enfance (1). »

ARTICLE I.

AFFECTION CONVULSIVE.

Les convulsions revêtent des formes nombreuses qui n'ont pas toujours été réunies par les auteurs. Quelques-uns l'ont décrite sous le nom d'éclampsie, et n'ont par là embrassé que les cas dans lesquels les accidents sont intenses et se déclarent sous la forme d'attaques analogues à celles de l'épilepsie. D'autres ont étudié comme des maladies presque différentes les convulsions partielles des divers organes.

Cette manière de procéder est vicieuse en ce que ces divisions correspondent moins à des différences de nature qu'à des degrés inégaux de l'affection convulsive. Dans tous les cas la perturbation de l'innervation locomotrice est identique; elle conserve tous ses caractères essentiels et fondamentaux, quel que soit le nombre des muscles affectés. S'il arrive que la sensibilité et l'intelligence ne soient plus intactes et soient même abolies, comme on le voit dans l'éclampsie épileptiforme, c'est que la névrosité,

(1) Thèse de concours, p. 42.

comme le dit M. Corvis, est une force qu'il n'est pas permis de dépenser, sur plusieurs points à la fois. Si elle est prodiguée dans un appareil, elle fait défaut dans un autre (1). » Il y a toujours cette différence essentielle entre l'épilepsie et la forme la plus grève de l'éclampsie, que dans la première l'intelligence, la sensibilité et la locomotilité sont primitivement et simultanément lésées ; tandis que dans la seconde l'abolition de la connaissance et du sentiment se montre comme l'effet du plus haut degré du trouble de l'innervation locomotrice.

Nous décrirons donc dans cet article, sous le nom d'affection convulsive, les convulsions partielles et les convulsions générales, qu'elles existent d'ailleurs avec ou sans perte de connaissance. Nous ne nous servirons de ces divisions qu'autant qu'elles nous faciliteront l'étude et la description des symptômes.

Causes.

Nous avons dit que la prédisposition de l'enfant aux affections convulsives va en diminuant avec l'âge. Cela n'est vrai que d'une manière générale, et dans les cas particuliers il est des différences dont on doit tenir compte. En effet, comme les causes déterminantes n'exercent pas toutes leur action aux mêmes époques, il en résulte que telle variété de la maladie fréquente dans la première enfance est rare dans la seconde. Ainsi l'éclampsie qui se lie à une dentition laborieuse ne se manifeste qu'avec le développement des dents, c'est-à-dire le plus souvent de six mois à deux ans ; celle qui résulte de la présence des vers se montre généralement plus tard ; celle qui dépend de fortes émotions ou de certaines passions ne survient qu'à l'âge où les facultés morales ont acquis un certain degré d'activité.

Dans l'enfance, le tempérament nerveux, pur ou mêlé,

(1) *Des Fonctions et des Maladies nerveuses*, par le docteur Corvis, ouvrage continué par l'Académie impériale de Médecine, p. 529.

est un des plus fréquents, et plus il est prononcé, plus son influence sur la production des convulsions est puissante et fâcheuse. Chez les sujets qui en sont deus la prédominance du système nerveux est caractérisée par une vive impressionnabilité, une intelligence précoce, une tendance continuelle à se mouvoir, l'expression mobile de la physiognomie, la célérité dans tous les actes de locomotion, un sommeil habituellement léger et agité; ces enfants sont d'une humeur irascible, s'empêchent à la moindre contrariété, s'émouvent au moindre bruit, ont des frayeurs nocturnes probablement causées par des rêves. Tout annonce chez eux la vivacité des impressions ganglionnaires, sensoriales et affectives, et une activité correspondante dans les phénomènes de l'innervation cérébro-musculaire ou locomotrice.

Les sujets faiblement constitués sont les plus disposés aux convulsions; mais les enfants forts, bien développés, sanguins, et habituellement bien portants n'en sont point à l'abri. Ces deux conditions peuvent se lier à une prédominance marquée du système nerveux. Mais tandis que la première favorise spécialement les convulsions sympathiques et idiopathiques, la seconde prédispose aux convulsions symptomatiques, surtout à celles qui ont lieu par pléthore.

La prédisposition convulsive est souvent congénitale et héréditaire. Quand on questionne avec soin les parents sur leur santé antérieure, on apprend qu'un très-grand nombre d'entre eux ont eu pendant leur enfance des attaques de convulsions; plus tard ils sont devenus hystériques, hypochondriaques, sujets aux crises de nerfs, aux vapeurs, à la migraine, etc. On pense aussi que les femmes qui, pendant leur grossesse, éprouvent souvent l'action de causes propres à produire la surexcitation nerveuse, telles que les chagrins et toute espèce d'émotion vive, donnent le jour à des enfants prédisposés aux affections convulsives. Souvent la prédisposition est acquise et le résultat d'une éducation physique et morale mal dirigée. Pour la produire il faut en général le concours de deux ordres de causes, les unes ten-

dant à affaiblir la constitution, à appauvrir le sang, les autres à surexciter le système nerveux et à augmenter sa prépondérance déjà si manifeste dans le premier âge. « Tous les enfants, dit M. Brechet, qui présenteront cette mobilité nerveuse n'auront qu'une existence malade. Jeunes, ils seront en proie aux maladies convulsives; plus tard les crises de nerfs seront leur partage, et l'hypocondrie et la mélancolie viendront enlaidir leur vieillesse, à moins que, de bonne heure, une éducation saine et bien dirigée, un régime approprié, et tous les autres soins d'une hygiène bien entendue ne corrigent cette disposition funeste (1). »

On comprend facilement que la mobilité nerveuse se développe sous l'influence d'une surexcitation habituelle du système nerveux par le fait d'une hygiène mal entendue. Mais il est plus difficile d'expliquer comment l'anémie, l'appauvrissement du sang, l'affaiblissement de la constitution, ont une si grande influence sur le système nerveux. Pourquoi la nutrition et plusieurs autres fonctions sont-elles languissantes et incomplètes, tandis que les fonctions nerveuses ont une énergie extraordinaire? Ce problème de physiologie pathologique ne nous paraît avoir reçu aucune solution satisfaisante. Nous sommes si peu avancés dans la connaissance des phénomènes intimes dont le système nerveux est le siège, que tout ce qu'ont dit les auteurs à ce sujet est dû à des vues de l'esprit plus ou moins ingénieuses, et non le fruit d'une observation suffisante alliée à une induction rigoureuse. Cependant nous trouvons dans un ouvrage récent une explication qui, sans être irréprochable (car elle ne nous paraît ni assez claire, ni assez explicite), approche assez du but pour que nous croyions devoir la reproduire ici. « Toute excitation dans un appareil nerveux, pour se produire sous l'influence d'une stimulation appropriée, doit dépenser une somme déterminée de névrosité, ou, si l'on veut, une somme déterminée d'éléments nerveux et

(1) *Traité des convulsions dans l'enfance*, p. 371, 2^e édit.

d'éléments artériels. Cela étant, l'élément artériel qui concourt à la production de la névrosité, dans l'excitation nerveuse, ne saurait être fourni, si la constitution est chétive, si la nutrition générale est appauvrie, par la même quantité de sang qui suffirait pour la faire dans une constitution plus riche. Il en résulte que l'excitation réclamerait le concours d'un volume plus considérable de sang, que ce concours étant disproportionné avec les conditions congénitales du tissu nerveux ne peut être offert, et que tous les symptômes de la surexcitation ont lieu : aussi peut-on affirmer que, dans certains cas, la surexcitabilité nerveuse est en raison directe de l'appauvrissement artériel (1). — Quelle que soit l'explication du fait, il nous importe surtout de constater le rapport pathologique qui lie l'affection convulsive à la mauvaise constitution de sang; car il y a des conséquences importantes à en tirer pour la pratique.

Au rang des causes prédisposantes nous devons encore placer l'influence de l'habitude; c'est-à-dire que tout sujet qui a eu déjà une ou plusieurs attaques de convulsions est beaucoup plus disposé à en éprouver de nouvelles. Chez lui la moindre cause occasionnelle provoquera l'explosion des accidents nerveux; chez un autre sujet il faudra des causes déterminantes plus actives. Ce n'est ici qu'une extension aux phénomènes pathologiques de la loi d'association et de sympathie qui régit la production des phénomènes d'irradiation nerveuse dans l'ordre physiologique.

Les causes qui ont leur siège dans le mode suivant lequel s'accomplit chaque fonction de l'économie animale agissent de deux manières: tantôt elles bornent leurs effets à produire la prédisposition convulsive, tantôt elles déterminent les convulsions par leur action immédiate et instantanée.

Nous ne reparlerons pas de l'influence exercée par le régime de la mère pendant la grossesse, sur la disposition convulsive de l'enfant qui lui doit le jour. Cette cause n'agit

(1) *Cruveilhier, ouvrage cité, page 87.*

pas autrement qu'en modifiant l'hématome utéro-placentaire, et par suite toutes les fonctions de l'enfant. Dans beaucoup de circonstances il faut lui attribuer ces troubles de l'innervation locomotrice qui deviennent l'origine des difformités par contracture que tant d'enfants apportent en naissant, et de ces mouvements vifs, impétueux, descendants et comme convulsifs, exécutés par le fœtus dans le sein de sa mère, et dont les femmes nerveuses accusent si souvent l'existence.

La pléthore et l'anémie ont une influence semblable sur la production des convulsions; ainsi chez le nouveau-né qui est dans un état pléthorique, et chez lequel on a lié trop tôt le cordon ombilical, elles surviennent aussi bien que chez celui qu'une hémorrhagie abondante a rendu anémique. Dans la suite de l'enfance ces deux causes, en apparence si opposées, produisent les mêmes effets. Il est malheureusement bien fréquent de voir des émissions sanguines générales ou locales être suivies de ces fâcheux effets, pour peu qu'elles soient trop copieuses ou employées mal à propos. M. Brechet a cité un cas fort intéressant d'épiptaxis abondante suivie de syncope et de convulsions chez un enfant de huit ans qu'il est beaucoup de peine à rendre à la vie. Il paraît bien certain qu'une hémorrhagie relativement aussi abondante chez un enfant que chez un adulte sera moins bien supportée par le premier, et déterminera plus facilement des désordres nerveux.

Il nous importe de faire remarquer ici qu'un effet identique, les convulsions, peut résulter de deux états complètement opposés, l'hyperémie et l'anémie encéphalique. Il est dès-lors impossible de considérer le sang comme l'agent excitant des fonctions nerveuses, puisque sa soustraction n'empêche point l'excitation de se produire ni même d'être très-vive. La présence du fluide artériel dans les vaisseaux capillaires de l'encéphale n'est qu'une des conditions de l'excitation nerveuse et n'en est point la cause essentielle. Et si, en attribuant les convulsions à une irritation encéphalique, on fait consister celle-ci dans une augmentation de l'activité des capillaires sanguins, on émet une hypo-

thèse que les faits démentent d'une manière péremptoire. Si, au contraire, on se rejette sur ce qu'on a dans ces derniers temps appelé irritation nerveuse, ce mot, dont il nous paraît bien difficile de définir rigoureusement le sens, doit, suivant nous, donner simplement l'idée d'une perturbation de l'innervation dont nous ne connaissons ni la nature ni le mécanisme.

La pléthore fébrile agit comme la pléthore simple. Toutes les maladies à réaction pyrélique se compliquent plus facilement dans l'enfance qu'à un âge plus avancé. C'est ici que nous pourrions mentionner presque toutes les maladies inflammatoires ; mais cette énumération se trouvera mieux placée à mesure que nous ferons la revue des autres fonctions. Remarquons seulement que, dans beaucoup de ces maladies, c'est peut-être moins la pléthore que la viciation du sang propre à chacune d'elles qui produit la surexcitation nerveuse. Dans les fièvres exanthématiques et typhoïdes, par exemple, c'est sans doute moins une congestion sanguine qu'une viciation du liquide artériel, qui joue le principal rôle dans la production des accidents nerveux, en supposant d'ailleurs que la lésion de l'innervation ne soit pas primitive.

De même encore dans certains états pathologiques dont l'anémie est un des caractères essentiels, dans la chlorose par exemple, il y a autre chose qu'une simple diminution de la quantité du sang qui circule dans les vaisseaux, il y a vice dans sa composition ; et qui peut nier que ce sang vicié doive changer les conditions de l'excitation nerveuse, plus encore que l'introduction dans les centres nerveux d'une quantité moindre de ce liquide ayant ses qualités normales ?

Les saisons chaudes et les climats méridionaux sont généralement regardés comme favorisant les maladies convulsives. Beaucoup de faits prouvent aussi que l'exposition accidentelle et momentanée à un air très-chaud et vicié par la respiration d'un grand nombre de personnes peut surexciter assez vivement le système nerveux pour amener des convulsions.

« Nous avons vu fréquemment, disent MM. Guersant et Blache, de jeunes enfants en proie à des convulsions pour être restés dans une chambre fortement échauffée, dans une salle de spectacle ou dans une église, où se trouvaient réunies un grand nombre de personnes (1). » Laumes a vu plusieurs cas de cette espèce et cite entre autres celui d'un enfant nouveau-né bien constitué, et vigoureux, qui ne pouvait léser qu'avec des angoisses inexprimables. — Appelé, dit ce médecin, pour remédier à cet état, je m'aperçus, par une dyspnée qui me saisit en entrant dans la chambre remplie de gens à visites, que la perte du ressort de l'air était le principe des anxiétés de ce jeune enfant, anxiétés dont la mère n'était pas exempte. Je fis retirer tout le monde, couvrir avec prudence les fenêtres et les portes de l'appartement, et modérer le feu de la cheminée (2). » Cette simple précaution eut un succès complet et délivra l'enfant et sa mère. Laumes ajoute avec raison que « puisque les lieux dont l'atmosphère est peu renouvelée, échauffée ou altérée, donnent naissance aux convulsions, on peut sous ce dernier point de vue ranger parmi les causes éloignées de ces maladies le séjour dans les grandes cités. Les abus sans nombre qui en pervertissent l'atmosphère sont connus. »

Les substances délétères dont l'air est le véhicule produisent quelquefois des convulsions ; les émanations de plomb, par exemple. Mais ces causes qui rentrent dans le domaine de l'influence des professions s'exercent rarement chez les enfants.

Nous n'insisterons point sur les effets de la privation des rayons solaires, ni sur ceux des habitations froides et humides, conditions qui modifient la constitution, l'affaiblissent et la prédisposent aux maladies nerveuses, mais ont rarement une action déterminante sur le développement des convulsions. Cependant, lorsqu'une atmosphère froide et humide succède rapidement à une grande cha-

(1) *Dicr. de méd.*, 2^e éd., t. II, p. 449.

(2) *Traité des convulsions*, p. 32.

leur, des convulsions peuvent prendre naissance. L'insolation trop forte a aussi quelquefois les mêmes conséquences. Enfin il n'est pas douteux que l'état électrique de l'atmosphère, pendant les orages et les tempêtes, ou à leur approche, n'agisse de la même manière.

Bonnet a consacré un long chapitre à étudier l'influence des vêtements. Les uns sont trop chauds ou insuffisants; d'autres sont compressifs et apportent des obstacles à la digestion, à la respiration et à la circulation. C'est surtout par ce dernier mode d'action qu'ils sont nuisibles, en causant une pléthore cérébrale.

Certaines causes se trouvent dans des états pathologiques de l'appareil respiratoire, tels que le croup, le pseudo-croup, le catarrhe suffocant, la coqueluche, la pleurésie et la pneumonie.

L'appareil digestif est celui qui, par l'exercice de ses fonctions et par les modifications qu'y apportent les maladies, a le plus d'influence sur le développement des maladies convulsives dans l'enfance.

Nous passerons sous silence ces cas fort curieux, dans lesquels on a vu, par suite d'idiosyncrasies bizarres, des aliments d'ailleurs très-sains ne pouvoir être ingérés dans l'estomac de certaines personnes sans amener des phénomènes nerveux.

Il n'est point rare de voir, chez les enfants, la surcharge de l'estomac amener des accidents convulsifs, et cela d'autant plus facilement que les aliments sont plus grossiers, plus indigestes, ou un mot moins adaptés à l'âge, aux forces digestives et aux dispositions individuelles : ainsi, chez les enfants à la mamelle, la profusion avec laquelle certaines nourrices donnent à leurs nourrissons un lait de bonne qualité d'ailleurs, l'usage prématuré et trop copieux des bouillies et autres aliments artificiels, ont été signalés par tous les auteurs. Quant aux effets d'une alimentation insuffisante, ils consistent plutôt dans l'affaiblissement de la constitution qui, par là, devient plus prédisposée à la surexcitation nerveuse.

Il est des aliments qui exercent une action fâcheuse sur

l'encéphale sans avoir produit aucun dérangement apparent dans les fonctions digestives ; ce sont de véritables poisons qui sont absorbés et vont directement modifier l'innervation. C'est ainsi qu'agit quelquefois le lait d'une nourrice qui a éprouvé une forte émotion, un accès de colère, par exemple. Les auteurs rapportent un grand nombre de faits de ce genre. Le coït, la menstruation, la grossesse peuvent aussi donner au lait des propriétés nuisibles. Enfin on a cité des cas d'idiosyncrasie fort extraordinaires relativement au lait varié de certaines femmes, lequel, très-bien supporté par tel enfant, ne l'est point par tel autre. « Une femme nourrissait son propre enfant sans inconvénient, elle donna son sein à un second enfant qui fut pris de convulsions, à un troisième également, et tous les frères vivants, à l'exception de son enfant, à qui on donna de son lait, éprouvèrent un trouble dans les mouvements (1). »

Dans plusieurs des cas précédents les accidents ont eu lieu sans indigestion préalable ; mais il est vrai de dire que le plus souvent ce sont les troubles digestifs qui réagissent sur l'encéphale. Par conséquent, sans reproduire ici tout ce que nous avons dit ailleurs sur les causes de l'indigestion, répétons seulement ce que disent à ce sujet MM. Corrozet et Blache : « Vingt fois nous avons vu survenir les convulsions les plus graves chez de jeunes enfants qui avaient mangé des poisins secs, des morceaux de carotte, des pommes crues, des lentilles, des pois, des pommes de terre, des haricots mal cuits, etc. ; puis tout rentrer dans le plus grand calme aussitôt que ces substances indigestes avaient été expulsées au-dehors, soit par le vomissement, soit par les selles (2). » M. Trombeau professe aussi « que le plus souvent une indigestion est la cause déterminante de l'éclampsie chez les enfants (3). »

Le vin, les liqueurs alcooliques, le café, le thé, etc.,

(1) *Indreb, Liqueur viciée*, translation par A. Latour, t. III, 235.

(2) *Ess. de méd.*, 3^{me} édit., t. II, p. 129.

(3) *Gen. des Ep.*, 1842, p. 221.

peuvent déterminer des accidents nerveux non moins graves; mais heureusement ces dangers sont assez connus pour que l'action de ces causes soit rare et n'ait lieu que par suite d'une grande incurie de la part des parents.

Nous mentionnerons ensuite l'abus des émétiques et des purgatifs, de tous les médicaments âcres et irritants susceptibles d'enflammer la muqueuse digestive; d'un autre côté n'oublions pas les médicaments stupéfiants dont l'emploi inopportun ou à doses trop élevées est souvent, chez les enfants, la cause de dangers réels.

Les corps étrangers dans la cavité digestive, la rétention du méconium, la constipation et la présence des vers, ont fixé l'attention de tous les auteurs et en particulier de Baumes. Cet auteur établit d'abord que parmi les enfants qui ont l'anus imperforé, il en est chez lesquels la rétention du méconium amène, avec beaucoup d'autres accidents, des phénomènes convulsifs. Quant aux cas dans lesquels il n'y a aucun obstacle mécanique, Baumes démontre que la rétention peut tenir: 1° à la faiblesse de l'enfant, 2° à une trop grande consistance du méconium, 3° au spasme du sphincter anal. Ces divisions ne sont pas à négliger en pratique.

Les cas de convulsions par suite d'une constipation prolongée sont assez communs. « Un enfant de neuf ans, dit le professeur Andral, fut pris de convulsions intenses. En explorant son ventre, je trouvai de petites tumeurs inégales, bosselées, que je reconnus être dues à un amas de matières fécales; il était constipé depuis huit jours. Les laxatifs en relevant la cause firent complètement cesser les convulsions (1). » M. Brachet et MM. Guersant et Blache ont été témoins de cas semblables.

La plupart des maladies de l'appareil digestif exercent une grande influence sur les affections convulsives, et dans la description que nous avons donnée de chacune d'elles nous avons insisté sur ce point important. Nous ne ferons donc plus que rappeler ici la dentition laborieuse, les

(1) *Lépus et Andral*, t. III, p. 262.

phlegmasies de la muqueuse digestive au et sous-diaphragmatique, les diarrées de cette membrane, l'affection vermineuse, les pneumatoses, les indigestions, les lavages, la dothi-enterie, le choléra sporadique, etc.

Les convulsions peuvent survenir comme effet de certains flux, tels que des sueurs abondantes, la diarrhée, la dysenterie, la leucorrhée, etc. Toute déperdition abondante d'un liquide formé aux dépens du sang a le même effet que celle du sang lui-même, de là vient que les flux immodérés agissent en quelque sorte comme les hémorrhagies sur la surexcitabilité nerveuse. Dans beaucoup de circonstances l'acte organique qui constitue la sécrétion ne peut s'accomplir sans produire directement une surexcitation du système nerveux. Telle est aussi l'influence qu'exercent certains actes excréteurs qui exigent une déperdition de névrosité plus ou moins considérable, comme la défécation quand elle est accompagnée de douleur, de bégaiement.

La suppression des sécrétions normales ou pathologiques peut être également funeste quand l'économie n'y a pas été préparée. Ainsi on rencontre assez souvent des enfants chez lesquels les convulsions se sont montrées peu de temps après la disparition intempestivement provoquée d'un exanthème, des dartres, de la teigne, des croûtes de lait, de l'otorrhée, d'un flux nasal, d'un ulcère acrophlégeux, etc. L'influence de cet ordre de causes a été généralement exagérée ou mal interprétée par les anciens; cependant elle est bien réelle, et nous dirons avec le docteur Cerise que « c'est un des mystères les plus effrayants de l'étiologie que l'influence des suppressions de ce genre sur la production de toutes les maladies du cadre nosologique (1). »

Nous avons déjà parlé de la rétention du méconium et de la constipation. La rétention de la bile paraît très-rare chez les enfants, et celle de l'urine, qui est un peu plus commune, produit rarement l'éclampsie. Nous en avons vu cependant un cas, en 1848, sur un enfant nouveau-né pour lequel nous fûmes appelé chez une sage-femme de la

(1) Œuvres complètes, p. 116.

rue du faubourg Saint-Denis. Cet enfant était né depuis trente-six heures ; il avait évacué le méconium, mais pas une goutte d'urine ; des symptômes de douleur et d'agitation avaient graduellement augmenté et pris le caractère convulsif. Ayant trouvé la vessie très-distendue au-dessus du pubis, et jugé que tout retard était périlleux, nous introduisîmes une sonde de gomme élastique, d'un petit calibre et sans mandrin ; nous ne trouvâmes aucun obstacle, une grande quantité d'urine fut évacuée et, peu de temps après, l'enfant revint à un calme parfait. Il n'y avait là sans doute qu'un spasme du col vésical ou une atonie du corps de la vessie, qu'une seule introduction de la sonde fit cesser, car les accidents ne reparurent point.

La présence d'un ou plusieurs calculs dans la vessie doit également être mentionnée parmi les causes de l'éclampsie.

Enfin, avant d'arriver aux causes qui ont leur source dans les fonctions de relation, notons l'influence d'une croissance trop rapide, et disons avec M. Andral que la physiologie ne nous permet pas de méconnaître quelle modification profonde une nutrition trop active peut imprimer à l'innervation cérébro-spinale, soit directement, soit indirectement, par suite de l'épuisement des principes constituants du sang que l'hématose est impuissante à réparer assez promptement.

L'affection convulsive peut reconnaître pour cause la mauvaise direction des exercices des sens. Cette influence agit de deux manières : « 1^{re} les excitations sensoriales portées à l'excès, trop fréquemment renouvelées, donnent lieu à une surexcitation qui peut se propager, dans quelques cas, à la centralité cérébro-rachidienne ; 2^e les excitations sensoriales longtemps interrompues, trop rarement produites, donnent lieu à une surexcitabilité qui peut s'étendre à tout le système nerveux (1). » Nous ferons remarquer que le premier de ces deux modes d'action s'exerce plus fréquemment que le second chez les enfants.

La douleur peut donner naissance aux convulsions. On

(1) *Cetise*, ouvrage cité, page 190.

sait combien la sensibilité est naturellement prédominante dans le premier âge : par elle on s'explique comment des blessures légères qui chez l'adulte seraient parfaitement supportées, peuvent modifier profondément l'innervation et provoquer des irradiations cérébro-musculaires déordonnées. C'est ce qu'on a l'occasion de remarquer chez des enfants atteints de brûlures ou de diverses lésions traumatiques. Une simple piqûre d'épingle a produit le même résultat chez des enfants au sein. Nous avons vu, chez un enfant de dix à onze ans, les efforts de réduction, dans un cas de luxation du coude, amener une éclampsie des plus graves qui cependant se termina heureusement.

La peau considérée comme appareil tactile est quelquefois le siège d'impressions capables de troubler gravement l'action des centres nerveux. C'est ainsi qu'agissent parfois le chatouillement, le contact de certaines substances, telles que le velours, le duvet d'une pêche, etc. Ces phénomènes tiennent à des idiosyncrasies qui chez quelques sujets se manifestent dans l'exercice des autres sens. « De nombreuses observations, dit M. Brachet, attestent que la vue de certaines couleurs, la perception de certains sons (par exemple, le bruit d'un couteau qui crie en coupant), de certaines odeurs, de certains saveurs, deviennent causes de malaise, de syncopes et de convulsions pour quelques personnes.... (1) »

Une excitation sensoriale, sans être d'une nature spéciale, mais par cela seul qu'elle est trop intense, est dans le cas de produire beaucoup d'effets fâcheux, surtout chez les enfants qui viennent de naître ou qui ne comptent que quelques jours, quelques semaines d'existence. « Ainsi, dit Baumes, les accouchements faits dans des appartements très-éclairés, la curiosité de jurer au grand jour de la physiognomie du nouveau-né, les objets éblouissants présentés à l'enfant dont la vue se développe, les bruits de fête ou les acclamations de joie qui se font autour du berceau de celui qui vient de naître, les odeurs fortes ou suaves dont

(1) *Ouvrage cité*, p. 279.

« on aime à l'entourer, toutes ces âmes, dis-je, sont si capables d'élever paternellement les enfants naissans, que Meschion recommande avec ardeur de les mettre à leur naissance dans un lit modérément chaud et point trop éclairé, et que Van-Swieten, dont la tâche délicate était de surveiller l'éducation des enfants du sang impérial, plaignait ces sottes individus de ce que le faste et la grandeur royale les placent, en venant au monde, dans des appartemens fort éclairés, et auprès desquels le canon tire à coups redoublés (1). » Plus loin l'auteur raconte, d'après Hannes, l'observation d'un enfant à qui tout objet rouge donnait un accès d'épilepsie; d'après Skenkius, celle d'un enfant qui fut si effrayé par le bruit inopiné des trompettes, qu'il tomba dans un accès d'épilepsie qui le tua en dix heures de temps, et enfin celle d'une petite fille de trois mois qu'il a vu lui-même éprouver six accès consécutifs d'épilepsie, pour avoir été frappée par le bruit inattendu des canons. « Quoi qu'il en soit, dit-il, nous trouvons dans la nature les preuves des ménagemens qu'il faut garder avec les nouveau-nés, puisque cette sage mère a eu la précaution de rider la corée, de voiler le conduit auditif interne et d'embarrasser les nerfs affectifs par un muco épais (2). »

Si les convulsions peuvent suivre de simples troubles fonctionnels des appareils sensoriaux, elles prennent aussi quelquefois naissance sous l'influence de leurs maladies. Les aïeux, comme l'ophtalmie, l'otite, agissent surtout par la douleur souvent très-vive qui les accompagne, les autres, peu ou point douloureuses, ne peuvent cependant altérer profondément la vitalité des tissus sans modifier en même temps leur impressionnabilité; et là peut se trouver le point de départ des accidents convulsifs.

Le manque d'exercice musculaire favorise d'autant plus la surexcitation nerveuse qu'il est plus complet, que la constitution est primitivement plus faible, que les enfans

(1) Boissier, ouvrage cité, p. 107.

(2) Ouvrage cité, p. 100.

se livrent davantage aux travaux intellectuels, à des préoccupations actives, à la tristesse, et qu'enfin l'ensemble des conditions hygiéniques est plus contraire à une bonne nutrition. Les excès d'exercice peuvent devenir causes efficientes, par la lassitude extrême qu'entraînent la marche ou les jeux auxquels tant d'enfants se livrent sans frein. Mais nous devons surtout mentionner des exercices d'un genre spécial, comme la danse, la valse, l'escarpolette, la salation, qui occasionnent des convulsions essentielles ou consécutives à une congestion encéphalique. Quant aux maladies traumatiques ou autres de l'appareil locomoteur, elles ont la même influence que celles des autres organes.

Rien n'est plus commun que les exemples de convulsions produites par la frayeur, la crainte, la colère; il est inutile de citer quelques-uns de ceux que les auteurs ont rapportés. On a également reconnu que la jalousie, l'envie, le chagrin, la honte même étaient causes d'éclampsie. M. Bouchet cite le cas d'un enfant qui devint triste et maigrit à vue d'œil aussitôt qu'on eut retiré sa sœur de nourrice. « Sa susceptibilité nerveuse fut portée au point de le faire tomber en convulsion toutes les fois qu'il voyait faire quelques caresses à cette jeune sœur. Je conseillai les prises de zinc et de quinquina, et surtout la séparation d'avec sa sœur. Il fut renvoyé à la campagne; sa gaieté revint, les convulsions cessèrent, et il reprit toute sa santé (1). »

Nous avons vu deux enfants amenés à l'hôpital pour une maladie fort légère y être pris de convulsions que nous ne pûmes attribuer qu'à la tristesse et au chagrin qu'éprouvaient ces petits malades d'être séparés de leurs parents, que l'un d'eux, âgé seulement de deux ans, ne cessait de demander et d'appeler avec des cris et des larmes. L'autre, plus âgé, témoignait moins de tristesse par les signes extérieurs, mais elle était empreinte sur sa physionomie et confirmée par ses réponses. Ces deux enfants reçurent un jour la visite de leurs parents, et quelques minutes après

(1) Œuvre citée, p. 452.

leur départ se manifesta une éclamptique épileptiforme dont aucun traitement ne put triompher.

Les grandes passions ne se développant qu'après la puberté, on comprend que dans l'enfance elles ont peu d'importance au point de vue étiologique. Cependant n'est-ce point à l'amour-propre contrarié, à la vanité lésée, à l'ambition non satisfaite, qu'il faut attribuer les accidents qu'occasionnent chez certains enfants le mécontentement d'être vaincus par leurs condisciples dans les luttes de collège et la privation des récompenses ardemment désirées? Tissot a connu un enfant qui, honteux de n'avoir eu aucun prix au collège, tomba dans une suite d'accidents qui annonçaient le spasme le plus marqué et le mieux soutenu (1).

Le développement précoce de l'intelligence annonce toujours une certaine disposition à la surexcitation nerveuse convulsive. Aussi, loin de le favoriser et de le désirer, comme font tant de parents aveugles, faut-il le retarder et le ménager. Hufeland dit avec sa sagesse ordinaire que tout travail de tête doit être absolument interdit avant l'âge de sept ans. Beaucoup de mères enseignent la lecture à leurs enfants dès l'âge le plus tendre, et sont fières des résultats qui répondent à leur empressement; mais celles-là seules sont excusables qui réussissent à faire pour leurs enfants une espèce de jeu des premiers efforts qu'elles demandent à leur intelligence, et l'on ne saurait trop leur proscrire de renoncer à ces tentatives toutes les fois qu'elles entraînent une application pénible et prolongée.

Nous devons rapprocher des causes physiologiques qui agissent directement sur les centres nerveux les maladies de ces organes. Elles sont fort nombreuses depuis l'hypérémie la plus simple jusqu'à l'inflammation la plus étendue et la plus avancée, jusqu'aux dégénérescences de différente nature.

Il nous faudrait ici énumérer les lésions traumatiques de l'axe cérébro-spinal et des méninges, leurs congestions,

(1) Broussais, ouvrage cité, p. 67.

leurs phlegmasies aiguës ou chroniques, simples ou tuberculeuses, les épanchements séreux intra et extra-ventriculaires, les hémorrhagies interstitielles ou par exhalation, les tumeurs tuberculeuses, les hydatides et d'autres maladies que nous pouvons passer sous silence vu leur rareté chez les enfants.

L'appareil génital devient quelquefois le point de départ de l'affection convulsive. Ainsi la masturbation, l'établissement difficile de la première menstruation, et enfin, dans des cas rares, les maladies des organes génitaux, peuvent développer les convulsions.

Après avoir ainsi parcouru le cadre étiologique, nous avons à nous demander s'il est toujours possible de constater l'existence d'une ou plusieurs des causes que nous avons mentionnées. Il faut nous en répondre par la négative, car il est des cas dans lesquels l'affection convulsive se manifeste sans cause connue, et surtout sans cause déterminante appréciable, non-seulement pendant la vie, mais même à l'ouverture du cadavre.

Il est en effet impossible de faire consister la cause prochaine de l'éclampsie dans une lésion matérielle des centres nerveux accessible à nos sens. L'irritation sanguine elle-même, ou la congestion n'est point nécessaire à sa production, et, dans beaucoup de cas où elle laisse des traces sur le cadavre, il est plus rationnel d'attribuer l'hypérémie à l'éclampsie que celle-ci à celle-là. Vouloir ici tout expliquer par une congestion encéphalique, c'est, dit M. Andral, comme si l'on attribuait tout accès de colère à une congestion cérébrale, pendant que celle-ci n'en est que la conséquence. Ce que dit ce professeur en parlant de la cause prochaine du délire, nous paraît identiquement applicable à l'affection convulsive. « Quand on voit un malade affecté de délire, on est porté à penser qu'il y a chez lui excitation du cerveau. Il n'en est cependant pas toujours ainsi, et c'est aller contre les faits de dire que le délire est toujours dû à un état d'irritation et de stimulation. L'irritation et la congestion ne sont pas plus nécessaires à l'existence de deux idées qui s'associent mal, d'où résulte

le délire, qu'à l'existence de deux idées qui s'associent bien, d'où résulte la raison. Une fois le délire produit, la congestion peut bien survenir, mais c'est alors comme résultat et non comme cause. Ainsi, quand un homme se met en colère, et qu'il survient une congestion cérébrale, dira-t-on que c'est parce qu'il y a eu congestion qu'il s'est mis en colère? Non, car c'est la proposition inverse qui est la vraie (1). - Tout ce qui précède peut parfaitement s'appliquer aux convulsions. On arrive ainsi à établir que la cause prochaine de cette maladie est une modification de l'innervation inconnue dans sa nature, et qui peut être mise en jeu dans une foule de conditions diverses, souvent même opposées les unes aux autres. Il n'y a donc rien de constant dans l'influence de ces conditions; leur existence n'est point indispensable, et, quand elle a lieu, elle n'entraîne point nécessairement un effet identique; car la même cause éloignée qui chez une personne provoquera les convulsions, déterminera chez une autre le délire ou des troubles plus complexes des fonctions nerveuses.

Pour établir cependant autant que possible les connexions de la maladie avec ses causes, on a divisé l'affection convulsive en trois espèces, suivant qu'elles sont : 1^{re} essentielles, 2^{re} sympathiques, 3^{re} symptomatiques. Les premières et les secondes sont celles dont aucune lésion sensible de la substance nerveuse ne peut rendre compte; elles diffèrent en ce que, dans celles de la seconde espèce, le point de départ provient d'une modification physiologique ou pathologique d'un organe autre que les centres nerveux, tandis que dans les premières la cause perturbatrice a agi sans aucun intermédiaire sur l'axe cérébro-spinal lui-même. Enfin les convulsions symptomatiques sont celles que produisent des lésions matérielles appréciables des centres nerveux, telles que la congestion, l'inflammation, une tumeur, etc. Dans quelques-uns de ces cas cependant la lésion ne suffit pas en raison de son siège ou

(1) *Époux veldi*, t. II, p. 156.

de sa nature pour expliquer la production des convulsions, qui alors participent des caractères des convulsions essentielles ou idiopathiques.

Symptômes.

L'affection convulsive se montre sous des formes si variées qu'il nous serait impossible de les décrire toutes sans franchir les limites qui nous sont imposées. On comprend en effet que dans les cas où la maladie est partielle, elle peut sévir sur un très-grand nombre de muscles différents, et dès lors entraîner des troubles de la locomotion en rapport avec tel ou tel muscle affecté. Ainsi l'état convulsif d'un ou plusieurs muscles de l'œil produit le strabisme, celui des muscles expirateurs détermine le hoquet, le rire et les éternuements convulsifs, etc.

Ces convulsions partielles sont au moins aussi fréquentes dans l'enfance qu'à un âge plus avancé : dans ce dernier cas elles ne se rencontrent généralement que chez des femmes hystériques. On sait que le strabisme remonte presque toujours à un âge très-tendre, mais nous devons faire remarquer qu'il est à proprement parler l'effet d'une contracture plus ou moins permanente plutôt que celui d'une convulsion tonique. Il en est de même des autres convulsions partielles, qui, à l'exception du hoquet, ont une assez grande tendance à se transformer en contractures chroniques. Sans en donner ici la description, nous dirons seulement que, comme les autres formes de l'affection convulsive, elles peuvent être symptomatiques d'une maladie avec lésion matérielle de la substance cérébrale, ou, au contraire, en être complètement indépendantes. Dans le premier cas elles peuvent s'accompagner de dérangements des fonctions nerveuses qui caractérisent une autre maladie ; mais quelquefois aussi ces dérangements n'ont pas lieu, et alors le praticien se trouve dans l'alternative d'admettre l'essentialité des mouvements convulsifs, ou de les attribuer à une lésion très-circoscrite des fibres médul-

laïres. Il faut bien reconnaître que dans un grand nombre de cas ce diagnostic différentiel est impossible.

Les convulsions proprement dites ont reçu le nom d'éclampsie et ont été longtemps confondues avec l'épilepsie. C'est depuis qu'on a apporté plus d'exactitude dans l'observation des faits cliniques qu'on a bien saisi leurs différences; et si dans quelques cas cette distinction est difficile ou même impossible, ces exceptions ne doivent pas empêcher de tracer leurs caractères spéciaux.

L'éclampsie se manifeste par des attaques dont le début est tantôt brusque et inattendu, tantôt lent, graduel et annoncé par des phénomènes précurseurs qu'il est très-important de ne pas méconnaître. Ces prodromes ne sent chez certains sujets que les caractères exagérés de la surexcitation nerveuse qui leur est habituelle, et chez d'autres les premiers effets de la surexcitation accidentelle qui, sous l'influence de causes ordinairement persistantes, ne tardera pas à se traduire par des désordres plus graves. Dans les deux cas voici les symptômes qu'on observe : l'enfant est irritable, impatient, agité; sa physionomie exprime le malaise, l'inquiétude, le mécontentement, la souffrance; son œil est vif, brillant, même hagard ou fixe; parfois il a de l'abattement et de la somnolence, d'autres fois de l'insomnie ou un sommeil plus léger; il se réveille en sursaut, paraît effrayé et pousse des cris comme quelqu'un qui fait des rêves pénibles; pendant son sommeil, et parfois dans l'état de veille, il a des troussements, quelques contractions spasmodiques des muscles de la face, des grincements de dents, de la raideur et quelques mouvements involontaires dans les membres supérieurs; quelquefois il pousse des cris plaintifs, tantôt interrompus, tantôt continus; chez beaucoup de petits enfants on remarque que les mains se dirigent vers les narines comme pour les frotter, circonstance que les parents sont toujours portés à s'expliquer par la présence des vers.

Les symptômes que nous venons d'énumérer n'aboutissent pas nécessairement à une attaque d'éclampsie.

Appréciable à leur juste valeur par un praticien qui saura en faire disparaître les causes ou les combattre directement, ils peuvent s'amender et s'évanouir. Mais dans beaucoup d'autres cas ils augmentent plus ou moins rapidement jusqu'à ce que les convulsions fassent explosion, ou bien celles-ci surviennent brusquement sans que les prodromes aient offert une marche progressive; enfin dans quelques cas, comme nous l'avons dit, elles se déclarent sans phénomènes précurseurs.

L'attaque d'éclampsie se caractérise par les mouvements désordonnés et involontaires d'un grand nombre de muscles. Les membres se fléchissent, s'étendent tour à tour, les doigts et les orteils s'écartent ou se rapprochent, les mains se portent de l'état de pronation à celui de supination; les membres, surtout les supérieurs, exécutent par moments des mouvements de totalité très-étendus; la tête s'étend en arrière ou se fléchit en avant, s'incline à gauche ou à droite, exécute parfois des mouvements rapides et irréguliers de rotation; les muscles des régions sus et sous-hyoïdiennes élèvent et abaissent alternativement le larynx, imprimant ainsi quelques mouvements au maxillaire inférieur, la langue est tremblante et, quand on peut maintenir les mâchoires écartées, on la voit se mouvoir en divers sens; quelquefois elle se place entre les dents qui en se serrant au même instant la mordent et la déchirent; une espèce de déglutition semble parfois s'opérer, mais très-irrégulièrement; les muscles intrinsèques du larynx sont eux-mêmes souvent convulsés, car le passage de l'air paraît rétréci et gêne la respiration, la voix ne se produit pas ou présente un timbre singulier; les yeux roulent dans leurs orbites, perdent leur parallélisme, deviennent saillants entre les paupières largement ouvertes ou bien se portent fortement en haut, de manière à ce que la cornée soit cachée sous la paupière supérieure et que la sclérotique seule soit visible; les paupières se rapprochent ou s'écartent; les muscles de la face tirent les traits dans tous les sens, déforment surtout l'orifice buccal en agissant sur les lèvres et produisent ces grimaces variées et bizarres

dont quelques-unes ont reçu le nom de rire sardonique ou cynique. Les mâchoires sont serrées l'une contre l'autre; il y a des cliquetis et des grincements de dents. Les muscles du rachis produisent la tension et la rigidité de cette ligne osseuse, ou des flexions alternatives à gauche ou à droite qui rapprochent les épaules des hanches; les muscles des régions antérieures agissent par leurs contractions avec les précédents et font fléchir le bassin et le thorax l'un sur l'autre. La respiration ne s'exécute plus régulièrement, les muscles inspirateurs et expirateurs annulent réciproquement leur action, les parois de la poitrine éprouvent une immobilité active. Dans d'autres instants la respiration s'accroît, devient courte et superficielle. Les violentes contractions du diaphragme et des muscles de l'abdomen impriment aux parois de cette cavité et aux organes qu'elle contient, des déplacements, des mouvements ondulatoires et des secousses très-facilement appréciables par l'application de la main; elles déterminent aussi quelquefois la déplétion de l'estomac, de l'intestin et de la vessie.

Tous ces phénomènes se rencontrent rarement réunis chez le même sujet, si ce n'est au plus haut degré de l'affection, et dans ce cas le malade ne peut résister longtemps à des troubles si graves. Plus souvent les convulsions occupent seulement les membres, quelques muscles du tronc, ceux de la face surtout, et il est rare qu'elles ne soient pas plus pérorées d'un côté que de l'autre; ordinairement c'est du côté gauche; souvent aussi elles se succèdent dans les diverses parties du corps; au lieu de les occuper simultanément, elles passent de l'une à l'autre.

Les yeux et la face, dit M. Brachet, sont par leur grande mobilité, les parties les plus faciles à se convulser; elles le sont presque dans tous les cas de convulsion: je ne les ai peut-être jamais vues calmes et paisibles pendant l'agitation des autres muscles. Les membres supérieurs sont ensuite les plus faciles à ébranler, et ils fournissent un signe fréquent des convulsions. Les membres abdominaux sont moins souvent convulsés; cependant ils peu-

vent l'être ou seuls ou avec les autres.... Écien souvent les convulsions sont bornées à un seul côté du tronc ou aux régions sus-diaphragmatiques ou sous-diaphragmatiques (1). »

Les troubles de la motilité n'existent pas toujours seuls, surtout quand ils sont violents, et occupent un grand nombre de muscles. Ils s'accompagnent alors de dérangements vers l'intelligence, les sens et les fonctions organiques.

L'intelligence est peu troublée dans un certain nombre de cas ; dans quelques-uns elle est tout-à-fait intacte, dans d'autres enfin la connaissance est complètement perdue. Ces différentes nuances sont très-difficiles à apprécier chez les enfants très-jeunes et surtout chez les enfants à la mamelle. Chez ceux-ci ce n'est qu'en excitant les sens ou les facultés de l'instinct, qu'on peut juger jusqu'à quel point l'action du cerveau est modifiée. Si, par exemple, en plaçant une lumière vive devant les yeux, en frappant les oreilles d'un bruit violent et brusqué, en approchant du nez des odeurs fortes, en pinçant la peau, si l'on voit que l'enfant cherche par quelque acte volontaire à se soustraire à ces impressions ; si en introduisant dans la bouche du nourrisson une petite quantité de liquide ou le mamelon de sa nourrice, on voit les actes de la déglutition et de la succion s'accomplir, on peut conclure que toutes les fonctions du cerveau ne sont point abolies, puisque l'instinct s'exerce encore ; à plus forte raison il est démontré que l'impressionnabilité sensoriale est conservée. Mais ces actes peuvent manquer sans que cependant la sensibilité soit éteinte. En effet, si la volonté instinctive est tout-à-fait suspendue, la douleur due au pincement de la peau ou à l'action d'une lumière vive sur la rétine, au lieu de provoquer des actes encore régis par l'influx nerveux volontaire, cette impression, disons-nous, ne donnera naissance qu'à des phénomènes généraux et vagues de douleur. Ainsi, qu'un enfant soit en proie à une attaque

(1) Eschsch, *ouvrage cité*, p. 25.

intense d'éclampsie avec abolition complète des fonctions cérébrales, le pincement de la peau de la jambe ne déterminera aucun mouvement dirigé et calculé dans le but de soustraire ce membre à cette cause de douleur, mais produira une expression générale de souffrance sur la physionomie, ou un redoublement dans les désordres convulsifs. De même encore une lumière vive placée devant les yeux ne sera ni évitée ni recherchée d'une manière active, bien que la contraction instantanée de la pupille annonce que la rétine n'a pas perdu toute son impressionnabilité. Ainsi la perception et l'innervation volontaire locomotrice étant abolies, la sensibilité s'annonce encore par quelques signes. Enfin, au plus haut degré de l'affection convulsive, l'action de tous les sens est complètement détruite. La lumière la plus éclatante laisse la pupille immobile; le bruit le plus violent, les odeurs les plus fortes, les pincements, les piqûres de la peau, l'action du calorique et de tous les agents très-irritants, ne sont suivis d'aucun effet appréciable; le corps vivant reste inerte et étranger à tous les stimulants de la sensibilité animale.

Les accidents convulsifs revêtent parfois une forme connue des gens du monde sous le nom de convulsions internes. Celles-ci se remarquent surtout après un accès de convulsions épileptiformes, mais elles se présentent aussi d'emblée chez quelques sujets. Elles sont caractérisées par de la raideur et quelques contractions convulsives soit du diaphragme, soit des muscles expirateurs, soit des muscles oculaires; sous leur influence, la respiration se suspend momentanément, puis devient fréquente et même tumultueuse, les yeux sont agités de mouvements convulsifs; en même temps la relation des sens et de l'âme avec les objets extérieurs est complètement suspendue. Toutefois il est bien de faire remarquer qu'à cet état s'ajoutent souvent quelques secousses involontaires dans les muscles des membres, c'est-à-dire des convulsions externes.

Tels sont les divers degrés suivant lesquels la maladie porte atteinte aux fonctions de l'axe cérébro-rachidien.

Voyons maintenant si les organes de la vie organique n'éprouvent pas aussi des dérangements notables. On peut dire qu'ils sont pour la plupart consécutifs et un résultat indirect des troubles de la locomotion. Sans doute la physiologie et l'observation clinique ne nous permettent pas de méconnaître l'influence que les centres nerveux exercent sur l'innervation des organes thoraciques et abdominaux. Ainsi il peut y avoir un état spasmodique du tube intestinal et de la vessie, et par suite, des vomissements, des selles involontaires et l'émission de l'urine, dans des cas où les muscles abdominaux ne paraissent le siège d'aucunes contractions convulsives. De même encore l'action du cœur peut être primitivement troublée, le rythme et la force de ces contractions peuvent être modifiés alors que les muscles respirateurs ne sont point convulsés. Enfin, en songeant que le nerf pneumo-gastrique tire directement son origine d'un des centres encéphaliques, que sa ligature chez les animaux vivants entraîne directement des désordres graves dans les fonctions vitales du poumon, il est très-raisonnable de supposer que dans une attaque d'éclampsie l'action respiratoire et l'équilibre peuvent être profondément atteints autrement que par suite des troubles apportés aux phénomènes mécaniques de la respiration par l'état convulsif des muscles moteurs du thorax.

Quoiqu'il en soit de l'influence complexe que nous venons d'établir, les désordres des fonctions végétatives présentent les plus grandes variétés. La circulation est rarement à l'état normal, le pouls est fréquent, développé, plein et dur, d'autres fois il est concentré et petit; les battements du cœur sont tumultueux, irréguliers, intermittents; avec ces divers états de la circulation centrale, les capillaires externes sont assez souvent congestionnés, surtout ceux de la face, qui est violacée, cyanosée et tuméscante. D'autres fois il n'y a nulle apparence de congestion. La stase du sang veineux est toujours plus manifeste quand la respiration est gênée. Celle-ci est alors fréquente, saccadée, inspirieuse, plaintive. Les inspirations et les expirations se succèdent sans régularité. Quand l'accès dure

depuis longtemps, la respiration devient de plus en plus lente, anxiieuse, faible; les muscles inspirateurs, dont la force est épuisée, semblent impuissants à soulever le thorax, qui retombe aussitôt benoquetement, l'expiration étant tout-à-fait passive. Dans les cas légers, la déglutition s'accomplit encore; dans les cas graves elle est difficile, impossible même, ou se répète avec une grande fréquence, comme si la gorge était embarrassée par un corps étranger; il s'écoule parfois de la bouche une salive écumeuse, colorée ou non par du sang fourni par la langue déchirée entre les dents; on remarque des vomissements, des hoquets, des selles involontaires ou une constipation rebelle. Les sécrétions se suppriment et ne se rétablissent qu'après la crise ou lorsqu'elle tire à sa fin. La peau, dont la chaleur est augmentée ou diminuée sur toute l'étendue ou sur quelques point du corps seulement, est d'abord sèche au toucher. Elle se mouille ensuite d'une sueur de bonne nature quand une terminaison heureuse est prochaine; mais quand l'accès se prolonge, que le malade tombe dans la prostration, une sueur froide et visqueuse se répand sur la face et les membres. Les urines quelquefois excrétées dès le début de l'attaque, ne sont plus sécrétées pendant sa durée, mais bientôt après elles redeviennent plus abondantes, et sont ordinairement claires, limpides et aqueuses.

« La durée des convulsions, disent les auteurs du *Catopendium de médecine pratique* (1), comprend l'appréciation de deux faits principaux, savoir : 1^o la durée de l'accès, 2^o la durée de la disposition aux accidents convulsifs. Sous le premier point de vue les convulsions doivent toujours figurer parmi les affections essentiellement aiguës. — En effet les accès les plus violents ne durent pas au-delà d'un certain nombre d'heures, et une violence extrême exclut même une durée aussi longue. Bien souvent les accès ne durent que quelques minutes, mais se répètent plusieurs fois par jour, ne laissant dans leurs inter-

(1) Tome II, p. 426.

valles que des troubles très-légers, tels que la lassitude, les bâillements, le besoin de dormir, d'autres fois l'enfant ne recouvre presque pas sa connaissance, a du délire, de l'agitation, et ces signes doivent toujours faire craindre qu'un nouveau paroxysme n'entraîne le petit malade.

Quant à la durée de la disposition pathologique qui est la cause prochaine des convulsions, elle offre également de grandes différences. La pléthore qui la constitue quelquefois peut être passagère et se dissiper en quelques instants; l'anémie, quoique plus lente à disparaître, peut dans certains cas être promptement modifiée. Si l'affection convulsive reconnaît pour causes une mauvaise constitution, une surexcitabilité nerveuse habituelle, ou quelques maladies soit des centres nerveux, soit des autres organes, on conçoit que très-souvent elle soit de nature à se prolonger pour ainsi dire indéfiniment, ou, au contraire, à se dissiper en peu de temps; lorsque ces maladies sont susceptibles de se reproduire, elle peut aussi reparaître après une guérison complète.

Les convulsions se terminent assez souvent par la mort. « Elle survient de deux manières, dit M. Brachet; ou bien elle commence par l'encéphale: cet organe, trop vivement surexcité, cesse d'agir sur les autres organes; la respiration s'arrête, l'hématoèse n'a plus lieu et la mort est certaine; ou bien elle commence par les poumons: la respiration, gênée par les contractions irrégulières des muscles respirateurs, ne s'exécute qu'imparfaitement; les poumons s'engorgent, le sang ne les traverse qu'en partie; bientôt la suffocation devient imminente, et elle a lieu si des mouvements plus réguliers ne viennent rétablir et la respiration et la circulation. Enfin une syncope peut survenir et se prolonger assez pour ne plus permettre le retour à la vie (1). » Dans certains cas la mort n'est qu'apparente, et l'on a vu, à la suite d'éclampsies très-graves, des enfants qu'en croyait morts recouvrer la vie comme par miracle. M. Brachet, qui insiste avec raison

(1) Œuvres (32), p. 62.

sur la prudence et l'attention qu'il faut avoir avant de prononcer sur la réalité de la mort, rapporte à ce sujet deux observations dont une tirée de sa pratique, qui prouvent toute l'importance de ce précepte.

La guérison s'annonce ordinairement par la diminution graduelle des accidents convulsifs et sans qu'il survienne aucuns phénomènes particuliers. C'est ce qui a lieu surtout pour les convulsions véritablement idiopathiques et pour celles qui tiennent à l'anémie. On a vu plus d'une fois des convulsions jugées par une hémorrhagie, mais il est probable que dans ces cas la maladie avait lieu par phléthore. On conçoit aussi que les vomissemens ou la diarrhée puissent paraître critiques dans les cas où leur manifestation coïncide avec une terminaison heureuse; mais souvent les faits sont susceptibles d'une autre interprétation. Si, par exemple, l'éclampsie résulte d'une indigestion, d'une surcharge gastrique, d'une constipation, il est tout naturel que le vomissement ou la diarrhée en enlevant la cause des convulsions les fasse disparaître; mais alors ces évacuations ne sont point critiques dans le véritable sens du mot.

Les convulsions peuvent disparaître sans laisser à leur suite un état de santé parfaite. D'abord toutes les maladies que nous savons capables de les produire peuvent persister à un degré variable et redevenir plus tard la cause des récidives si fréquentes dans ce genre d'affection. Mais, en outre, l'éclampsie peut engendrer divers accidents, lorsqu'elle est idiopathique et essentielle. C'est ainsi que le strabisme, la contracture de diverses parties du corps, la paralysie même, survivent à certains accès convulsifs. L'anatomie pathologique a démontré que ces accidents consécutifs, quoique se rattachant souvent à des lésions de structure, c'est-à-dire à des maladies encéphaliques dont les convulsions elles-mêmes n'étaient qu'un effet, se rencontrent aussi dans beaucoup de cas en l'absence de ces lésions. Qu'y a-t-il d'ailleurs d'étonnant de trouver des paralysies et des contractures purement nerveuses, quand on admet des convulsions de cette nature?

Qui n'a vu chez des femmes hystériques, par exemple, ce genre d'accidents dont tous les caractères annoncent une affection nerveuse proprement dite, et pourquoi refuser de les admettre à la suite de l'éclampsie des enfants qui a tant de rapports avec l'hystérie ?

Dans quelques circonstances on voit les muscles qui étaient affectés de convulsions, devenir, après l'accès, le siège d'assez vives douleurs. Celles-ci peuvent tenir à des déchirures partielles des fibres musculaires ou aponevrotiques, à des ecchymoses qui en sont la conséquence, mais le plus souvent elles sont simplement l'effet d'une lassitude identique à celle que procurent les exercices musculaires forcés. Enfin on a vu des distensions de ligaments, des déplacements osseux, des luxations, des fractures même se produire sous l'influence des convulsions.

Le dernier mode de terminaison dont nous avons à parler est celui qui a lieu par la fièvre et dont Hippocrate avait déjà remarqué l'influence heureuse lorsqu'il disait : « *Convulsione debente febris supervenire solum maritum* (Aphor. 57, sect. IV), » et ailleurs : « *Febrim convulsioni supervenire melius est, quam convulsione febre* (Aphor. 26, sect. II). Cette vérité a traversé les siècles; tous les jours la pratique la confirme. M. Eschsché pense que les convulsions qu'on a vues se terminer par la fièvre n'étaient point dans un état parfait de simplicité; qu'il y avait alors ou pléthore sanguine ou irritation phlegmasique d'un organe et que la crise a agi en déplaçant l'irritation ou en dissipant la pléthore. Malgré tout le respect que nous professons pour une autorité si recommandable, nous ne pouvons néanmoins partager complètement cette manière de voir. Nous avons vu plusieurs fois une éclampsie indépendante d'un autre état morbide antérieur, et même, selon toute apparence, d'un état pléthorique, laisser à sa suite un mouvement fébrile. Cette espèce de fièvre est ordinairement éphémère, mais dans quelques cas elle persiste plusieurs jours, s'accompagne de nouveaux accidents cérébraux et simule certaines formes de méningite ou plutôt de fièvre cérébrale. Si l'on méconnaît sa nature et son

point de départ qui en font une véritable fièvre nerveuse, et qu'on lui oppose des antiphlogistiques comme s'il s'agissait d'une fièvre inflammatoire, on voit les accidents s'aggraver et la mort survenir. Des cas de ce genre fixent notre attention quand nous traiterons du diagnostic de la méningite.

Diagnose.

Sous certains rapports le diagnostic de l'affection convulsive des enfants offre en général peu de difficultés. Ainsi on ne confondra jamais avec elle les névroses, qui forment la classe des convulsions toniques, le tétanos et les contractures. Nous avons déjà indiqué les caractères généraux des convulsions choréiques, nous n'y reviendrons pas ici. La catalepsie est également très-facile à distinguer. L'hydrophobie serait plus embarrassante dans certains cas chez les très-jeunes sujets; mais heureusement c'est une affection rare; ordinairement les commémoratifs nous mettent sur la voie quand il s'agit de l'hydrophobie virulente. Dans certains cas l'épilepsie peut faire commettre des méprises; c'est lorsque l'éclampsie est violente et s'accompagne d'une abolition complète des facultés intellectuelles et sensorielles. On peut dire avec M. Brachet et M. Gendrin que dans l'épilepsie l'attaque est plus brusque, les convulsions s'accompagnent d'une plus grande rigidité, l'écume à la bouche est plus constante, la durée de l'attaque est généralement plus courte; lorsqu'elle cesse, le malade présente un état de stupeur plus marqué; mais ces différences ne sont point tellement tranchées qu'il ne puisse souvent rester du doute et de l'embarras. Il faut alors étudier les antécédents du malade. S'il a eu d'autres attaques dans lesquelles la connaissance n'était point perdue, si l'attaque s'est déclarée sous l'influence d'une cause appréciable, si les parents ne sont point épileptiques, on sera autorisé à admettre l'existence de l'éclampsie. Le diagnostic n'offre réellement aucune incertitude lorsque l'attaque d'éclampsie est moins violente, parce qu'alors la perte de connaissance n'est pas

constante et n'existe pas depuis le début jusqu'à la fin de l'accès, et parce que la sensibilité n'est pas complètement suspendue. En face d'une attaque menaçante, il n'est pas indifférent de se prononcer pour l'épilepsie ou pour l'éclampsie, car le pronostic est assez différent, et le traitement n'est point identique.

Quel qu'il en soit, ces difficultés de diagnostic ne sont pas les plus importantes. Il est bien autrement utile de reconnaître exactement la nature et la cause des accidents convulsifs.

Les convulsions idiopathiques se développent brusquement en général; elles surviennent au milieu d'une bonne santé, acquièrent promptement une grande intensité, puis disparaissent avec la même rapidité; dans l'intervalle des attaques, la santé est souvent parfaite, aucune fonction ne donne des signes de trouble et de souffrance. Ce sont surtout celles qui succèdent aux causes directement perturbatrices de l'innervation, telles que des émotions fortes, la frayeur, la colère, etc. Les moyens antispasmodiques ont souvent prise sur elles.

Les convulsions symptomatiques se caractérisent par la coïncidence à peu près constante, surtout quand elles sont générales et intenses, de quelques troubles dans les autres fonctions encéphaliques. On devra tenir le plus grand compte d'une céphalalgie vive et continue, d'une exaltation ou d'une diminution de la sensibilité générale ou des sens spéciaux, d'un état d'exaltation ou d'affaiblissement de l'intelligence, d'une gêne de la parole plus ou moins marquée, d'une agitation continue ou alternant avec la somnolence, accompagnée de cris, de contorsions du visage, d'un déculitus bizarre, d'un état fébrile plus ou moins marqué, souvent irrégulier, avec alternances de rougeur et de pâleur à la face, et enfin de divers troubles digestifs, tels que le vomissement et la constipation. Si survient au milieu de ces divers symptômes des phénomènes convulsifs partiels ou généraux, on peut affirmer qu'ils se lient à l'existence d'une autre maladie des centres nerveux, le plus souvent à celle d'une méningite simple

ou tuberculeuse, de quelques produits accidentels dont les plus fréquents chez les enfants sont les tumeurs tuberculeuses, ou bien d'un épanchement séreux plus ou moins dépendant d'un état inflammatoire. De toutes les convulsions symptomatiques, celles qui dépendent de la congestion ou de l'anémie cérébrale sont les plus difficiles à distinguer des convulsions idiopathiques, parce qu'elles ont une marche plus rapide, et ne se compliquent point des désordres généraux que nous venons d'énumérer. C'est dans l'examen complet des conditions dans lesquelles s'accomplit la circulation, des circonstances antérieures à l'accident, et de l'état général et habituel de la santé, qu'on pourra puiser des indices utiles pour la pratique.

Dans le cas de convulsions sympathiques, il y a toujours quelque perturbation ailleurs que dans les fonctions du système nerveux. On cherchera surtout à ne pas méconnaître l'influence de la dentition, des diarrées et des pléguinases gastro-intestinales, des affections vermineuses, de l'indigestion, de la constipation, des coliques et des flatosités abdominales, celle de la pneumonie, de la coqueluche et autres maladies des organes thoraciques, celle enfin des fièvres exanthématiques, qui, à leur début et dans leur cours, se compliquent assez souvent d'accidents convulsifs. Dans leur marche, les convulsions sympathiques ont la plus grande analogie avec les convulsions idiopathiques; mais en tenant compte attentivement de l'état de toutes les fonctions, on reconnaît en général assez facilement leur véritable point de départ.

PROGNOSTIC.

Rien n'est plus difficile que d'indiquer d'une manière générale le pronostic des convulsions. Il est non-seulement subordonné à l'intensité apparente des symptômes, mais encore à la nature des conditions étiologiques si nombreuses et si variées, au milieu desquelles nous savons que la maladie peut prendre naissance.

La plupart des auteurs sont tombés d'accord sur ce fait

que les convulsions sont d'autant moins dangereuses qu'elles sont plus faciles à exciter, que par conséquent elles doivent inspirer moins de craintes, toutes choses égales d'ailleurs, chez les enfants, les femmes et en général chez tous les individus doués d'un tempérament nerveux. C'est ce qu'a exprimé Stoll en disant : « *Convulsio et spasmus, uti frequentius in infantibus, ita minus periculosus uti plerumque est quàm adultis; inter adultos, femine facilius et minori cum periculo convelluntur.* » On conçoit très-bien comment la surexcitabilité nerveuse habituelle rend les convulsions moins graves en général; c'est que le plus souvent elles dépendent de causes peu puissantes et dont l'effet s'épuise facilement par un petit nombre d'irradiations cérébro-musculaires. C'est dans ces cas aussi qu'elles ont pour résultat de diminuer momentanément au moins la mobilité nerveuse habituelle qui prédispose à leur développement.

C'est surtout de la nature des causes que les convulsions tirent la gravité de leur pronostic. On peut à cet égard indiquer quelques différences générales entre les convulsions idiopathiques, symptomatiques et sympathiques.

Dans celles de la première classe, si la cause de la surexcitation nerveuse n'est point persistante, ou si elle est de nature à être facilement appréciée et immédiatement enlevée par les secours de l'art, le pronostic est rarement grave. C'est ainsi qu'une frayeur, un mouvement de colère, une douleur produite par un corps étranger, un instrument piquant fixé dans la peau, par exemple, ne donnent généralement lieu qu'à des accidents passagers.

Il n'en est pas de même des convulsions qui sont liées à un état pathologique des centres nerveux; plus cet état est ancien, plus il a compromis par sa nature ou par son degré avancé, la structure de la substance nerveuse ou de ses enveloppes, plus il y a à craindre une terminaison funeste. Ainsi les convulsions qui surviennent dans le cours des phlegmasies méningo-encéphaliques, celles qui paraissent liées à la présence de quelques tumeurs tuberculeuses, empruntent toute leur gravité à ces maladies, dont elles peuvent en outre hâter la terminaison funeste.

Celles qui sont symptomatiques d'une anémie ou d'une congestion encéphalique, quoique encore graves, le sont moins que les précédentes. Enfin, dans le cas de lésions traumatiques tout dépend de la nature de ces lésions.

Les convulsions sympathiques sont généralement moins dangereuses que les précédentes. Ainsi, dans celles qui dépendent de la dentition, des vers, des indigestions, de la constipation et d'autres maladies gastro-intestinales, si ces affections sont reconnues à temps et convenablement traitées, on peut espérer de prévenir ou de guérir les accidents cérébraux. Dans celles de ces maladies qui sont fraîchement inflammatoires, aussi bien que dans les phlegmasies aiguës de la poitrine et dans toutes les affections qui ont à parcourir des périodes suivies, les convulsions sont généralement moins graves quand elles surviennent dès le début que vers la fin. C'est ce qu'on remarque en particulier dans les fièvres éruptives, au début desquelles Stoll regardait même les convulsions comme d'un heureux augure, ce qui cependant n'a pas toujours lieu. Une des maladies dans lesquelles les accidents convulsifs nous ont paru offrir le plus de gravité, est la coqueluche, surtout s'ils se déclarent après que la maladie dure depuis un certain temps chez des sujets débilités, ou en proie en même temps à une phlegmasie pulmonaire. Nous avons insisté ailleurs sur ce point important de l'histoire de la coqueluche.

Traitement.

L'étiologie de l'affection convulsive est la base sur laquelle on doit établir les principes de la cure de cette maladie.

L'importance de ce précepte est incontestable, mais son application en pratique est souvent restreinte par les difficultés qu'on éprouve à reconnaître la nature de la maladie et de ses causes. Malgré cette incertitude, le médecin n'est pas moins tenu d'agir, et parfois ses efforts sont couronnés de succès. N'arrive-t-il pas souvent, par

exemple, que la cause des convulsions a disparu, et qu'il a suffi de son action instantanée pour que les accidents qu'elle a produits soient insusceptibles de se prolonger? Dans ce cas c'est en elle-même qu'il faut combattre la maladie et non dans sa cause.

Dans d'autres cas le médecin arrive à force d'attention à un diagnostic complet; il voit clairement la nature du mal et son point de départ. Sans doute alors son premier désir serait d'en détruire le principe, parce qu'il est probable qu'à l'instant même les accidents cesseraient; mais il ne le peut pas toujours. Certaines causes ne sont pas de nature à se dissiper promptement, quelquefois même elles ne peuvent disparaître. Alors il est obligé de les négliger, ou ne peut les combattre que par des moyens dont l'action demande un certain temps; mais, en attendant, il lui est impérieusement demandé d'opposer un traitement direct aux accidents nerveux. S'il les amende, il aura au moins gagné du temps, et les autres moyens que réclame la cause du mal pourront agir avec efficacité.

Il y a donc un traitement des convulsions en elles-mêmes : c'est à ce principe que nous voulions en venir. Si nous avons cherché à en démontrer l'opportunité, c'est qu'elle a été contestée par des auteurs qui en cela nous semblent s'être écartés de la voie où les faits pratiques nous ramènent tous les jours. « Est-on fondé, disent les auteurs du *Compendium* (1), à décrire un traitement des convulsions en elles-mêmes? M. Brachet, qui leur a refusé avec juste raison la qualité de maladie, pour ne les reconnaître que comme symptômes, croit cependant devoir exposer les moyens propres à les faire cesser, en combattant directement l'irritation, sans avoir égard aux circonstances accessoires qui peuvent en être cause, et il parle alors de l'emploi des calmants et des antispasmodiques. Nous ne croyons pas devoir suivre cette marche, de peur de tomber dans les errements des vieilles écoles, et de

(1) *Compendium de med. prat.*, t. II, p. 502.

conseiller des médications qui sont plus déplorables et plus nuisibles que l'absence même de tout traitement. »

Peu de praticiens partageront cette manière de voir. Quant à nous, nous n'avons qu'à faire un appel à nos souvenirs pour nous représenter un grand nombre de cas dans lesquels le traitement n'a pu être basé que sur les accidents ayant actuellement lieu, et non sur les causes qui les avaient précédés et déterminés. Délaçons-nous de ces données théoriques par lesquelles on veut faire marcher la science plus vite que les faits, et ne craignons pas de nous confier à l'empirisme quand seul il nous offre quelques ressources. Tâchons seulement d'en raisonner l'emploi autant que possible en observant et en classant les faits qu'il ne nous est point donné d'interpréter.

Nous admettrons donc dans toute sa latitude l'application du principe posé par M. Brachet, à savoir qu'il y a un traitement à employer contre les convulsions en elles-mêmes et, pour ainsi dire, indépendamment de leurs causes.

Le premier soin du médecin appelé auprès d'un enfant atteint de convulsions doit être de le débarrasser de ses vêtements, afin de s'assurer si l'affection ne tiendrait pas uniquement à la constriction qu'ils exercent, à la piqûre d'une épingle, à la présence d'un bandage trop serré, comme Baumes en cite des exemples. Si l'atmosphère de l'appartement est trop chaude, on écartera les personnes inutiles, on ouvrira avec précaution une porte ou une fenêtre; quelquefois on pourra même exposer l'enfant au à un air frais pendant quelques instants. Baumes, le docteur Good, M. Cerrus et MM. Guersant et Blache, citent des cas dans lesquels ces moyens simples ont parfaitement réussi, surtout chez des enfants nouveau-nés.

L'enfant étant ainsi placé le plus tôt possible dans de bonnes conditions hygiéniques, il faut immédiatement rechercher sous quelle influence les accidents se sont développés. Cette détermination, souvent très-difficile, exige le plus grand soin, et lorsque l'inspection attentive de tous les phénomènes appréciables dans l'état de l'enfant ne fournit pas des données précises, ce qui est le

plus ordinaire, on ne pourra en puiser que dans les réponses des parents. Cet interrogatoire exige de la part du médecin une grande sagacité; car il s'agit souvent de reconnaître le point de départ des convulsions dans des circonstances peu importantes en apparence, et de se défier des rapports de certaines personnes toujours promptes à mettre leurs opinions ou leurs préjugés à la place des faits. Ainsi on voit des parents qui, sans aucunes données positives, soutiendront que les convulsions de leur enfant tiennent à la présence des vers, d'autres à la dentition, quelquefois à une chute très-ancienne, bien qu'il n'y ait aucuns signes réels en faveur de ces opinions. Combien n'en voit-on pas qui, habitués à gorger leurs enfants d'aliments copieux ou indigestes, ne veulent pas reconnaître l'influence d'une indigestion dont ils sont par leur incurie les premiers auteurs. Dans d'autres circonstances ce sont des châtimens rigoureux infligés avec une sévérité condamnable qu'on n'osera pas avouer. Le médecin s'informera surtout avec soin de l'état antérieur de la santé, et si, malgré les recherches les mieux dirigées, il ne peut découvrir la cause des convulsions, voici quelle conduite il devra tenir dans ces cas difficiles.

Nous supposons d'abord que l'attaque d'éclampsie s'accompagne des troubles circulatoires qui annoncent une disposition pléthorique.

Il est quelquefois impossible de déterminer sûrement si la congestion céphalique a précédé et produit les convulsions, ou si, au contraire, elle en est la conséquence. Il est tels cas où l'on ne peut être certain, en éliminant l'état pléthorique général ou local par une émission sanguine, d'amender la marche du mal. Dans ces cas difficiles où le médecin ne peut procéder autrement que par tâtonnements, la saignée ne doit être considérée en quelque sorte que comme un moyen de diagnostic. Faite avec modération, elle sera innocente dans la plupart des cas. Si elle augmente les accidents, le médecin devra penser que la pléthore n'est pour rien dans leur production. Si, au contraire, elle a d'heureux effets, il sera probable

qu'on avait réellement affaire à des convulsions par hyperémie, et la voie à poursuivre pour achever la cure sera nettement indiquée. Si une première saignée, en diminuant la pléthore, a arrêté les accidents, une seconde pourra les enlever tout-à-fait.

En se réglant d'après ces données, on voit dans quelles circonstances on sera conduit : 1^o à essayer empiriquement les émissions sanguines, 2^o à en continuer ou à en suspendre rationnellement l'emploi.

Toutes les fois que la phlébotomie est possible, elle nous paraît préférable aux saignées et aux ventouses scarifiées, qui à cause de la douleur, peuvent avoir quelquefois des inconvénients. Ceux-ci sont peu à craindre dans l'éclampsie épileptiforme; il est même avantageux d'agir alors en stimulant la sensibilité. La saignée dégorge immédiatement le système sanguin général, et l'on voit quelquefois, à mesure que le sang coule, les mouvements se calmer et la connaissance revenir. Toujours proportionnée à l'âge de l'enfant, la première saignée doit être en général peu copieuse; il vaut mieux être dans le cas de la répéter au bout de quelques heures que de la faire d'un seul coup très-abondante. Après une ou deux saignées, on d'emblée, lorsque la phlébotomie est impossible, on prescrit des sangsues derrière les oreilles, aux tempes ou autour des malléoles. Ce dernier mode d'application augmente l'effet révulsif de la perte sanguine; il a été fortement recommandé par M. Chauffard, d'Avignon, contre la plupart des maladies de la tête, et MM. Gaesent et Blache le trouvent préférable chez les enfants très-irritables ou à très-grosse tête, lorsque la face est vultueuse, parce qu'alors la douleur et l'attraction congestive produites par l'application des sangsues aux tempes ou aux oreilles pourraient augmenter les accidents (1).

C'est dans des cas d'hyperémie cérébrale que la compression de la carotide paraît avoir obtenu quelques succès. Si ce moyen répond rarement à l'attente de ceux qui l'em-

(1) *Bec. de Méd.* 2^e éd., t. II, p. 153.

placent, la raison en est peut-être dans la difficulté de ne pas comprimer la veine jugulaire interne sous le doigt qui comprime l'artère; car la veine étant oblitérée, comme le sang qui arrive encore au cerveau par les artères vertébrales ne peut retourner au cœur par les veines jugulaires, le moyen paraît plus propre à augmenter qu'à détruire la congestion cérébrale. Il faudrait donc tâcher de ne point comprimer en même temps la veine. Dans les cas assez rares où ce moyen a réussi, son action a été instantanée; son inutilité, après quelques minutes de tentatives, doit le faire abandonner. On peut consulter sur ce sujet une observation et un mémoire intéressant de M. le professeur Trousseau (1).

On aide à l'action des émissions saignées en produisant sur des parties éloignées de la tête une dérivation active au moyen des irritants. Ainsi on applique sur les extrémités inférieures des cataplasmes de farine de moutarde pure ou mêlée à celle de lin, on promène en différents points une éponge imbibée d'eau bouillante, on pose un ou deux vésicatoires au marteau, etc. Enfin on agit sur l'extrémité inférieure de l'intestin par des lavements laxatifs ou purgatifs.

Lorsque ces moyens employés depuis quelque temps ont eu peu de succès, ou même sans attendre leurs effets, on peut recourir aux applications réfrigérantes sur la tête, c'est-à-dire à la glace pilée dans une vessie dont on prolonge le contact avec le crâne, ou bien aux affusions d'eau fraîche sur la tête renouvelées à quelques minutes d'intervalle. On a aussi conseillé les irrigations continues dirigées de préférence sur la fontanelle chez les jeunes enfants. Enfin on réussit assez souvent en plaçant le malade dans un bain tiède, où on le laisse aussi longtemps que possible, tout en continuant les applications réfrigérantes.

L'usage combiné et un peu prolongé de ces moyens est suivi de succès dans un certain nombre de cas; dans d'autres, la maladie leur résiste et ne peut dès-lors être

(1) *Ann. des malad. méd. chir.*, t. v., deuxième partie, p. 125.

attribuée à une hyperémie ni à une irritation sanguine de l'encéphale ; elle doit être combattue comme un état nerveux essentiel. Ici se présentent les agents antispasmodiques et calmants.

Au premier rang se placent l'oxyde de zinc, seul ou associé à l'extrait de jusquiame, le musc, les éthers, la valériane, l'assa fetida et les stupéfiants.

« L'oxyde de zinc, dit M. Brachet, mis en vogue par le célèbre Galcius, a été tantôt vanté avec enthousiasme, tantôt ravalé avec injustice... Sans entrer dans les détails de tout ce qui a été dit pour ou contre, je n'invoquerai que le témoignage de mon expérience, et, d'après elle, je ne crains point de regarder l'oxyde de zinc comme un des meilleurs antispasmodiques qu'on puisse diriger contre les convulsions des enfants. Toujours je l'ai vu produire le calme ; mais lorsque la cause persistait, ce calme n'était que momentané, et le remède paraissait n'avoir produit aucun effet (1). » M. Brachet unit ordinairement ce médicament à l'extrait de jusquiame noire, de manière à faire prendre dans les vingt-quatre heures au moins dix centigrammes d'oxyde de zinc et vingt centigrammes d'extrait de jusquiame, sans jamais porter la dose de l'un ni de l'autre au dessus de cinquante centigrammes ; on les fait partager en quatre, huit ou douze prises qu'on donne toutes les deux ou trois heures dans une cuillerée de potion, de tisane ou de sirop. Dans les cas graves, on peut rapprocher davantage les premières prises. Ce médicament n'a paru à M. Brachet exiger de la réserve dans son emploi, que lorsque les voies digestives sont trop irritées, et encore dans ce cas conserve-t-il ses avantages sans nuire, si on l'associe à quelques calmants, comme la jusquiame, l'opium, la thériaque, etc. MM. Guersant et Blache préfèrent le donner seul : « Alors, disent-ils, on peut élever la dose progressivement jusqu'à dix-huit et vingt-quatre grains par jour, dans un simple julep gommeux ou mêlé à du sucre en poudre et partagé en neuf ou douze prises.

(1) *Œuvre* cité, p. 393 et 405.

Quelquefois cependant nous l'avons associé au musc, et nous en avons obtenu des résultats très-favorables. »

Le musc a été préconisé surtout par les médecins allemands; il est assez peu employé en France. Il en est de même du succinate d'ammoniaque, que Goëlis recommande dans une forme particulière de l'éclampsie qu'il appelle *fièvre bleue*, et qui paraît due à ce que l'état convulsif occupant surtout les muscles respirateurs, il se produit une stase du sang veineux à la périphérie du corps et une espèce de cyanose.

Le camphre, la valériane, l'assa foetida, ont joui aussi pendant longtemps d'une vogue qu'ils n'ont pas complètement conservée. Leur saveur désagréable rend difficile leur administration par la bouche; en lavements ils peuvent rendre de grands services quand les enfants ne les rejettent pas immédiatement.

Les éthers ont une action vive mais peu soutenue; ils arrêtent quelquefois ou diminuent momentanément les mouvements convulsifs, mais il faut en renouveler l'emploi à des intervalles rapprochés, et dans tous les cas un peu graves ne compter que faiblement sur leur efficacité; d'ailleurs ils ont peu d'inconvénients. Comme les enfants les prennent difficilement par la bouche à cause de leur odeur forte et pénétrante, on peut les administrer à dose assez élevée dans des quarts de lavement presque froids. L'absorption dans le rectum en est très-prompote et quelquefois très-salutaire. On peut aussi les employer à l'extérieur en en versant à plusieurs reprises une certaine quantité sur les membres; ils agissent alors un peu comme calmants par l'absorption, mais surtout comme réfrigérants par leur évaporation instantanée à la surface de la peau. Cette impression locale et subite du froid peut modifier avantageusement la surexcitation du système nerveux.

L'emploi des stupéfiants offre de grandes difficultés dans la pratique. Les effets bien connus de l'opium et de ses succédanés peuvent faire craindre le développement d'une congestion cérébrale ou l'augmentation de celle qui accompagne l'état convulsif, et, toutes choses égales d'ailleurs,

ce danger est plus imminent chez les enfants. Cependant les Anglais en font un usage assez commun. De Haën a vu l'opium réussir dans un cas de convulsions qui avait résisté à tous les moyens. « L'opium, dit M. Brachet, jouit d'une énergie qui le rend précieux toutes les fois que le système nerveux est exalté par de longues et vives souffrances, et qu'il n'y a ni somnolence ni disposition à une congestion cérébrale. Autant il serait pernicieux dans ces dernières circonstances, autant on aura à s'applaudir de ses bons effets dans la première. » On peut, en effet, établir que l'opium est contre-indiqué : 1^o lorsqu'il existe une maladie fébrile, 2^o lorsqu'en l'absence de la fièvre, il y a pléthore générale ou hyperémie locale vers la tête. Lorsque la surexcitation nerveuse se lie à des conditions opposées, à l'anémie, par exemple, lorsqu'elle est habituelle, on l'effet d'une cause qui agit directement sur le système nerveux sans modifier la circulation ; enfin, lorsqu'une douleur vive paraît le point de départ des accidents et la cause qui les entretient, les stupéfiants pourront parfaitement réussir ; seulement remarquons que dans ce dernier cas ils agissent peut-être plus en modifiant la sensibilité qu'en diminuant l'excitation nerveuse ; ils détruisent plutôt la cause de la maladie que la maladie elle-même.

Une foule d'autres moyens ont été conseillés contre les convulsions essentielles ; leur simple énumération serait fastidieuse. Les uns, appartenant à la classe des antispasmodiques, n'ont généralement qu'une efficacité douteuse ; les autres, qui ne sont point des antispasmodiques, n'ont pu être considérés comme tels que par ceux qui ont méconnu l'action intermédiaire qui les a fait quelquefois réussir. Ainsi, un émétique, un purgatif, lorsqu'ils guérissent les convulsions, ne sont point des antispasmodiques ; leur action curative s'explique parce qu'ils ont modifié un état vicieux de l'estomac ou de l'intestin qui était la source des accidents, ou produit une révulsion qui a détruit la pléthore ou tout autre état morbide de l'encéphale dont les convulsions étaient l'effet symptomatique. Tous ces moyens s'adressent donc en général aux causes de

l'affection convulsive, et non à cette maladie elle-même. C'est à ce titre que nous allons maintenant en parler.

L'étude de cette partie du traitement des convulsions recevrait ici tout le développement qu'elle comporte si nous ne craignons de nous exposer à des répétitions inutiles. En considérant, par exemple, les causes pathologiques, nous devons nous rappeler que dans l'histoire de chacune des maladies qui nous ont occupé dans le cours de cet ouvrage, nous n'avons jamais omis de parler de leur influence sur le système nerveux; nous avons montré que plusieurs d'entre elles se compliquaient d'accidents convulsifs, et en discutant les principes du traitement qui leur conviennent, nous avons toujours posé les indications principales relatives à ce genre de complication. On n'a qu'à se reporter à ce que nous avons dit des accidents cérébraux dans la pneumonie, la coqueluche, le croup, la dentition, les diarrhées, les affections vermineuses, et à ce que nous dirons plus tard à propos des maladies qu'il nous reste à décrire, pour voir que notre tâche se trouve ici singulièrement abrégée. Nous n'avons maintenant qu'à établir quelques principes généraux applicables à la cure des convulsions symptomatiques ou sympathiques.

Dans les convulsions symptomatiques, le traitement doit être approprié à la nature de l'affection qui les produit.

Dans la plupart des maladies cérébrales, la circonstance des convulsions modifie peu les règles générales de traitement. Ainsi, dans la méningite, la présence de quelques mouvements convulsifs dans les membres, le strabisme, les contorsions des mâchoires et des lèvres, etc., sont des symptômes directement liés à la lésion matérielle des organes intra-crâniens et dont celle-ci rend parfaitement compte. De même encore, la contracture, ou les mouvements convulsifs partiels qui accompagnent certaines tumeurs tuberculeuses ne sont qu'un symptôme de la maladie, et non un accident qui réclame par lui-même un traitement spécial. Mais dans quelques circonstances on voit survenir des accidents convulsifs que n'explique point une autre maladie déjà reconnue des centres nerveux. Ainsi,

est-ce à la présence d'un tubercule cérébral dans une région limitée et latérale du cerveau, sans autre lésion dans le voisinage, que l'on pourra attribuer une attaque d'éclampsie, c'est-à-dire ces désordres étendus et graves qui supposent une modification pathologique de tout le système cérébral? Non, sans doute. La tumeur tuberculeuse peut bien avoir contribué à la développer, mais elle ne la constitue point elle-même, n'en est point la cause prochaine, et ne saurait devenir à ce titre l'objet essentiel du traitement. Celui-ci doit être le même que dans les éclampsies partielles essentielles, et dirigé suivant les principes que nous avons déjà posés.

En conséquence on peut tracer la règle suivante : dans le cas d'une maladie cérébrale quelconque qui produit par elle-même les convulsions et les explique complètement, le traitement s'adresse à cette maladie et non aux convulsions ; lorsqu'au contraire celles-ci paraissent n'en dépendre que d'une manière indirecte et accessoire, le traitement antispasmodique retrouve ses indications, parce que les accidents sont au moins en partie essentiels et idiopathiques.

Quelquefois la lésion cérébrale qui produit les convulsions n'est qu'une fraction d'un état pathologique général contre lequel il faut agir en premier lieu, sauf à combattre plus tard isolément l'état cérébral et même les convulsions en particulier. Ces cas se rapportent surtout à ce que nous avons dit de l'hypérémie et de l'anémie générale.

L'hypérémie peut être, 1^{re} simple de sa nature, 2^{re} compliquée, c'est-à-dire fébrile.

Nous avons vu que chez le nouveau-né l'état apoplectique ou la pléthore qui résulte d'un ancranchement long et laborieux ou de la ligature intempestive du cordon, peut faire naître des accidents convulsifs. Rappeler cette cause, c'est indiquer le moyen à mettre en usage, c'est-à-dire qu'il faut laisser saigner convenablement le cordon, attendre pour le lier que l'état apoplectique soit dissipé et la respiration bien établie, enlever même la ligature quand elle a été placée trop tôt, et enfin, quand il est trop tard,

quand, malgré la pléthore, le cordon ne saigne plus, on retire par la saignée trente à soixante grammes de sang ou on applique une ou deux saignées. M. Brachet conseille d'ouvrir la veine jugulaire.

Dans la pléthore simple, à toutes les époques de l'enfance, les émissions sanguines trouveront leur emploi à doses plus ou moins élevées, suivant l'âge des sujets et les diverses circonstances dont il faut toujours tenir compte en pratique, telles que le tempérament, la constitution, les causes de la pléthore, etc.

Nous avons énuméré les maladies dans lesquelles la fièvre paraît le point de départ des convulsions en produisant un certain degré de congestion vers l'encéphale. Mais nous avons fait voir aussi que dans la plupart de ces maladies l'état nerveux pouvait tenir également à une lésion primitive de l'innervation ou consécutive à l'altération du sang. C'est ce mode d'action qui paraît appartenir aux fièvres éruptives et à toutes les fièvres essentielles. Dans les cas de ce genre, on peut se trouver fort embarrassé en pratique, surtout lorsque les convulsions surviennent de bonne heure et avant que la maladie dont elles dépendent soit bien caractérisée. C'est ainsi que la variole, la scarlatine, la rougeole, s'accompagnent quelquefois au début d'un ou plusieurs accès d'éclampsie. Nous insisterons ailleurs sur les difficultés du diagnostic dans les cas de ce genre et sur le traitement le plus convenable. Contentons-nous de dire à présent qu'en général il faut beaucoup de réserve dans l'emploi des émissions sanguines; si elles paraissent utiles chez quelques malades, c'est à la condition d'être modérées, et beaucoup de praticiens ont reconnu qu'employées trop largement elles devenaient funestes. Les révulsifs et les irritants cutanés sont bien préférables. MM. Guersant et Blache recommandent avec raison d'appliquer aussitôt que possible ces topiques sur les endroits où l'éruption tend à se porter. « L'un de nous, disent ces auteurs, n'hésita pas à appliquer un vésicatoire sur la joue d'un enfant faible affecté de convulsions, avec un léger gonflement d'un des côtés de la face. Dès que le vésica-

toire commença à agir, les convulsions cessèrent; un érysipèle se développa, et suivit sa marche sans aucun accident (1). » La réserve à apporter dans l'emploi des émissions sanguines est d'autant plus nécessaire que l'enfant est d'une constitution plus faible, plus délicate, plus irritable. Dans les cas contraires, quand la constitution est forte et le système sanguin bien développé, il est permis de saigner avec plus de vigueur; car il est bien reconnu qu'une saignée pratiquée à propos fait cesser les convulsions et favorise l'éruption des maladies exanthématisques.

Dans les maladies inflammatoires simples et locales, la pléthore cérébrale qui cause les convulsions n'est qu'un des éléments de la fièvre et un des phénomènes de réaction suscités par la phlogose. C'est donc celle-ci qu'il faut attaquer directement, et en général il suffit de l'amener pour faire tomber la fièvre et les accidents cérébraux. En parlant de la pneumonie, nous avons montré les exemples qui justifient ce précepte également applicable à une foule de cas analogues par leur nature.

Il n'est point en notre pouvoir de modifier aussi promptement l'anémie générale que la pléthore, et le traitement des convulsions consécutives aux pertes de sang abondantes et à l'appauvrissement de ce liquide, exige du temps et la combinaison de plusieurs médications. Il faut ici mettre en première ligne tous les moyens hygiéniques propres à reconstituer le fluide nourricier, un régime tonique et fortifiant, un bon air, l'aération, la bonne direction des exercices physiques et moraux, etc. En même temps on aura recours aux préparations martiales, aux amers, aux toniques, aux astringents, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, en frictions, en bains, etc.

On sait quelle influence les dérèglements des fonctions digestives exercent sur la production des convulsions. Nous n'avons, pour ainsi dire, qu'à renvoyer le lecteur à ce que nous avons dit dans notre seconde partie en traitant des différentes maladies de l'appareil digestif, et en particu-

(1) *Dict. sci. nat.*, t. 3, p. 161.

lier de la destitution laborieuse, des phlegmasies et des différentes formes de diacrisis gastro-intestinales, des vers et de l'indigestion. Relativement à cette dernière, il est pourtant indispensable que nous revenions sur des détails que nous avons à dessein retranchés ailleurs pour les rattacher au sujet qui donne à l'indigestion des enfants sa plus grande importance. Nous insisterons aussi sur les cas dans lesquels la constipation joue le même rôle.

L'influence des indigestions sur l'éclampsie est un fait sur lequel on ne saurait trop appeler l'attention des médecins, surtout de ceux qu'une étude spéciale n'a point familiarisés avec les maladies des enfants. Dans le cas qui nous occupe la difficulté essentielle git dans le diagnostic; celui-ci une fois établi, l'indication est claire, il suffit ordinairement de la remplir pour obtenir un succès complet. Il faut donc s'informer avec soin du régime habituel de l'enfant, de la nature et de la quantité des aliments récemment ingérés, de l'heure à laquelle le repas a eu lieu, rechercher si l'enfant était ou non dans une santé parfaite avant le début de l'éclampsie, s'il s'est plaint de malaise, de pesanteur et de gêne dans la région de l'estomac, s'il a eu des nausées, des éructations, des vomissements, des hiccorygues, des coliques, etc. On examinera si la région abdominale est douloureuse à la pression. La percussion sera souvent d'un grand secours; entre les mains d'un homme qui en connaît bien la technique, elle fournit sur l'état de l'estomac des données précieuses, puisque rien n'est plus facile que de reconnaître si ce viscère est distendu par des gaz ou par des aliments, ou s'il est vide et rétracté. Lorsque par des recherches exactes on s'est assuré de la plénitude de l'estomac, et dans le cas même où l'on n'a sur ce point que des probabilités, l'indication est trompée, elle est urgente, il faut faire vomir.

Ici peut se présenter un obstacle. Dans l'éclampsie les mâchoires sont quelquefois si fortement serrées et la déglutition si difficile, qu'on ne peut faire avaler le vomitif. Doit-on, comme le conseillent quelques médecins, pratiquer une émission sanguine et saisir le moment de la dé-

sente pour administrer les évacuants par le haut et par le bas? Il nous semble que dans certains cas cette tentative pourrait non-seulement échouer, mais encore être nuisible, et que, si la saignée n'est pas spécialement réclamée par la forme des accidents, il vaudrait mieux à la rigueur écarter de force les saignéeurs, ou bien introduire le vomitif par les cavités nasales. Quand une fois le liquide est au-delà du voile du palais, la déglutition, quelque imparfaite qu'elle soit, tend plutôt à le faire descendre dans l'estomac qu'à le rejeter par la bouche. Aussi faut-il, quand on peut l'introduire par cette cavité, tâcher de le porter immédiatement dans l'arrière-gorge avec une petite cuiller ou même avec une seringue convenablement disposée. Ce dernier moyen nous paraît commode et sûr chez les très-jeunes enfants.

Il peut arriver aussi qu'un trop grand état de faiblesse soit un obstacle à l'administration immédiate du vomitif, car le vomissement exige une certaine puissance de réaction. Il faut alors, avant de le provoquer, ranimer les forces au moyen des irritants cutanés et en faisant avaler quelques gouttes d'éther ou d'une liqueur alcoolique quelconque.

Après ces soins préliminaires, on donne, suivant que l'administration du médicament est plus ou moins facile, le tartre stibié ou l'ipécacuanha en poudre, seuls ou mêlés ensemble, ou une solution d'émétique dans l'eau. On favorise également les évacuations par le bas au moyen des purgatifs pris par la bouche ou en lavements.

Parmi les cas très-nombreux de succès obtenus par le vomitif et dont nous regrettons de ne pouvoir citer quelques-uns, il en est de fort curieux dans lesquels on a vu le séjour des aliments qui irritaient l'estomac se prolonger pendant plusieurs jours de suite. Il faut qu'il y ait alors une atonie bien profonde des muscles qui opèrent le vomissement ou un spasme violent des orifices gastriques. « Dans un cas observé par l'un de nous, disent MM. Guersent et Blache, les convulsions duraient presque sans interruption depuis neuf jours, et la vie paraissait près de

s'éteindre, quand un peu de vin d'Alicante introduit de force dans la bouche fut avalé et détermina le vomissement d'une portion d'omolite et d'un grand nombre de groseilles à maquereau, dont quelques-unes étaient encore entières. Les mouvements convulsifs cessèrent presque immédiatement, et l'enfant se rétablit bientôt après. La même chose arriva à un enfant de quatre ans, dont parle le docteur Locock, et chez qui un vomitif fit rendre des raisins secs mangés huit jours auparavant (1). —

Lorsque c'est à la constipation qu'on attribue l'éclampsie, il faut se hâter de recourir aux purgatifs; on emploie l'huile de ricin, le calomel seul ou associé à la rhubarbe, une goutte d'huile de crotoniglium, des lavements purgatifs, ou l'introduction d'un suppositoire de savon dans le rectum. La rétention du méconium n'exige pas l'emploi exclusif des purgatifs; Baumes l'a bien démontré: sans parler du cas tout spécial où l'anus est imperforé, la rétention peut tenir à la faiblesse du nouveau-né et réclame alors les frictions toniques et aromatiques sur l'épine du dos et sur le ventre, quelques légers toniques à l'intérieur, un mélange d'eau de fleurs d'orange et d'un peu de vin, une eau légèrement cordiale; on associe à ces médicaments un peu de sirop de chicorée ou quelque autre doux purgatif. Quand l'enfant est fort et ne peut cependant se débarrasser du méconium, on tâche de lui faire avaler une tisane simplement éblayante ou additionnée de miel ou d'un peu de manne; l'huile d'amandes douces réussit également bien. Ces divers médicaments peuvent aussi se donner en lavements. Enfin, suivant Baumes, il peut y avoir un spasme de l'anus dont un des principes, dit-il, est le spasme de la peau. Chez un enfant né depuis vingt-deux heures et qui n'ayant rendu qu'une très-petite quantité de méconium, malgré du vin sucré et de l'huile d'olives pris à plusieurs reprises, avait de vraies attaques d'éclampsie, Baumes pensa que « l'irritation de la peau qui était sèche et ridée, opérait un spasme sympathique du sphincter de l'anus (il

(1) Article cité, page 153.

était si serré qu'on ne put point y introduire un suppositoire). L'usage des fomentations émollientes amena la sortie du méconium après la détente générale du corps. —

Quand les convulsions paraissent dues à un développement de gaz dans les intestins, on emploie les divers moyens connus contre les pneumatoses. On peut surtout se servir avec avantage d'une grosse casule de gomme élastique introduite assez avant dans le gros intestin, à laquelle on adapte une seringue pour faire le vide, en même temps qu'on applique doucement sur le ventre. (Gorrieut et Blache.)

Ce que nous avons dit de l'influence des qualités du lait sur l'éclampsie des enfants à la mamelle, a dû faire prévoir quels conseils le médecin est alors appelé à donner. Lorsqu'une nourrice s'est laissée aller à quelque emportement de colère ou d'impatience, qu'elle a éprouvé une émotion vive, elle doit par prudence vider ses mamelles et attendre quelque temps pour faire téter son enfant. Les mêmes précautions sont quelquefois nécessaires chez la nourrice qui s'est livrée au coït ou qui a ses règles. Cependant le plus souvent ces deux circonstances sont sans action, et il suffit d'être sur l'éveil pour empêcher l'aggravation des accidents qu'elles peuvent produire. Si, comme nous l'avons vu, les qualités du lait qui développent les convulsions sont habituelles chez la nourrice, ou si cet effet paraît dépendre d'une idiosyncrasie propre au nourrisson, la seule chose à faire c'est de changer de nourrice.

Nous n'avons rien de particulier à dire sur les convulsions dont le point de départ se trouve dans quelque maladie de l'appareil respiratoire, que nous n'ayons déjà indiqué en parlant de la pléthore fébrile, ou lorsque nous avons fait l'histoire de la pneumonie, de la coqueluche, du croup, etc.

Dans l'étiologie nous avons exposé l'influence que l'exagération ou la suppression des sécrétions physiologiques ou pathologiques peut exercer sur la production de l'éclampsie; nous avons vu aussi en parlant de l'anémie que l'action de tous les flux inmodérés pouvait lui être assé-

visible, et dès-lors réclamer l'usage d'une médication reconstituante. Lorsque ces flux persistent, ils réclament divers modes de traitement que nous ne devons pas indiquer ici. Quand, au contraire, c'est la suppression d'un flux normal ou anormal, la rétrocession d'un exanthème, d'une dartre, d'une teigne, le dessèchement rapide d'une plaie, d'une fistule, etc., qui produisent et entretiennent les convulsions, le traitement doit avoir pour but de rétablir la sécrétion supprimée ou d'en produire une nouvelle qui ait avec elle le plus d'analogie possible. Ainsi le moyen le plus efficace pour faire cesser l'éclampsie, quand elle s'est montrée immédiatement après la disparition de la diarrhée, c'est de rappeler celle-ci avec le calomel, et d'aider par quelques bains d'effusion l'action de ce médicament. On trouve un bel exemple de succès obtenu par cette pratique dans une leçon de M. Troussseau (1). Les purgatifs trouvent aussi leur emploi alors même que le flux supprimé n'était pas une diarrhée, et c'est dans le même sens qu'agissent les irritants cutanés, vésicatoires, cautères, etc.

Nous pourrions encore passer en revue toutes les maladies des organes de la locomotion, des fonctions sensoriales et enfin de la génération, et nous verrions, comme dans tous les cas que nous avons examinés jusqu'ici, que la conduite du médecin doit toujours avoir pour but de détruire l'influence exercée par ces maladies, soit sur l'activité de la circulation et les qualités du sang et médiatement sur le cerveau, soit par la douleur qui les accompagne sur la surexcitation nerveuse. La masturbation et l'établissement difficile de la menstruation chez les jeunes filles motivent l'emploi des moyens spéciaux utilisés en pareille occurrence.

M. Troussseau se déclare hautement partisan de l'expectation dans un grand nombre de cas de convulsions. « Les mères, dit-il, qu'on interroge avec soin sur les convulsions de leurs enfants, répondent souvent que leurs nourrissons

(1) *Gaz. des Méd.* 1842, p. 331.

ont eu plusieurs attaques d'éclampsie, et qu'elles ont traité les petits malades, soit en leur mettant dans la bouche une pincée de sel, soit en leur faisant respirer du vinaigre ou de l'eau distillée de fleurs d'oranger, soit en leur jetant au visage quelques gouttes d'eau froide, soit en faisant toute autre médication aussi insignifiante : en d'autres termes, le traitement se réduit à l'expectation, ou, si vous l'aimez mieux à l'homœopathie. Mais si les pauvres mères épouvantées, ont appelé à leur aide un médecin, les applications de sangsues, les bains, le calamel sont aussitôt mis en œuvre, et le pauvre petit malade, qui guérit si facilement de sa maladie, aura maintenant à guérir de la médication intempestive qui lui a été infligée..... Est-ce à dire que, en présence d'une convulsion et au milieu des terreurs d'une famille, nous devons rester spectateurs tout-à-fait oisifs? Je crois bien fermement que, moins nous ferons, mieux nous ferons en général; mais il faut pourtant employer ces moyens qui, sans nuire à l'enfant, peuvent laisser au médecin les honneurs de la cure. Les phéligues sinapisés, les lavements purgatifs ou antispasmodiques, des aspersions d'eau froide, des bains antispasmodiques et froids ne seront peut-être pas sans quelque utilité (1). »

Dans certaines circonstances, on devra recourir à des moyens chirurgicaux, tels que la section complète d'un nerf piqué, contus ou tirailé; l'extraction d'un corps étranger venu du dehors ou développé spontanément dans les organes, des calculs vésicaux, par exemple; l'extirpation de certaines tumeurs douloureuses qui agissent en irritant les nerfs d'une partie et par suite le système nerveux central. Dans la pratique de toutes les opérations sanglantes, dans la réduction des luxations, dans le traitement des brûlures, le chirurgien cherchera à prévenir autant que possible les effets fâcheux de la douleur. C'est surtout avant le développement de la fièvre traumatique que l'o-

(1) *Gaz. des Dép.*, 1842, p. 627.

pium et les autres stupéfiants offriront les plus grands avantages et le moins d'inconvénients.

Quant au traitement prophylactique, on peut le résumer en disant qu'il faut écarter toutes les causes actuelles de la maladie et prévenir toutes celles qui peuvent survenir. Une hygiène bien dirigée pourra seule diminuer ou même enlever radicalement la prédisposition convulsive que nous avons vue être tantôt héréditaire, tantôt acquise.

ARTICLE II.

CHOREE.

La chorée est une affection convulsive, apyrétique, caractérisée par des mouvements irréguliers, non coordonnés, en partie involontaires, partiels ou généraux, du système musculaire, et principalement des membres. Elle a reçu un très-grand nombre de dénominations dont la plus connue est celle de *danse de St-Guy*.

Jusqu'ici on a fait de vains efforts pour retrancher la chorée de la classe des névroses et pour la rattacher à une lésion matérielle appréciable des centres nerveux. Si quelquefois des altérations ont été trouvées dans les organes encéphalo-rachidiens, leur diversité ne permet pas de les considérer comme la cause prochaine de la chorée ; elle ont pu seulement agir d'une manière accessoire sur sa production.

M. Hache (1) a étudié avec soin les cas, assez rares d'ailleurs, où la mort a permis de constater l'état des organes, et a judicieusement discuté leur valeur pathologique. Ainsi le docteur Frichard a trouvé trois fois une quantité assez considérable de sérosité dans la cavité rachidienne, avec injection des vaisseaux de la moelle. M. Serres a fait l'autopsie de quatre sujets choréiques, et a trouvé dans un cas une tumeur lardacée, implantée sur les tubercules qua-

(1) *Dict. de méd.*, 3^e éd., t. vi, p. 555.

drijumeaux; dans un autre, une irritation vive avec épanchement sanguin à la base de ces éminences; chez les deux autres sujets elles étaient le siège d'une inflammation qui se prolongeait sur le plancher du quatrième ventricule. Ces faits ont conduit M. Serres à localiser la chorée dans la région des tubercules quadrijumeaux et à la combattre comme une irritation inflammatoire de ces organes, ainsi que nous le dirons plus tard.

L'hypertrophie de la substance corticale encéphalique a été observée par M. Monod et M. Rutin. M. Gendron a vu deux fois un ramollissement partiel de la moelle, M. Courtois une fois le ramollissement complet de ce cordon. M. Ruge (1), dans ses intéressantes recherches, a cité deux cas dans lesquels il y avait une diminution de consistance dans l'axe rachidien et deux autres où le ramollissement était encore plus marqué. L'injection des membranes du cerveau et de la moelle avec ramollissement de la substance cérébrale a été vue par M. Ruzer, et dans un cas observé par M. Deplaigne, il y avait un ramollissement d'ontoux du segment inférieur. M. Guérin et le docteur Brow ont vu chacun dans un cas une concrétion calcaire dans la substance cérébrale. Semmering et Frank avaient rencontré des produits membraneux à la surface du cerveau; la même lésion s'est présentée une fois à M. Lélut. Enfin Georges dit que l'on a observé la chorée sur des enfants, dans le cerveau desquels existaient des tubercules.

« Que conclure de lésions aussi disparates, dit M. Blache, sinon qu'elles ne sauraient être considérées comme la cause d'une maladie qu'on a observée le plus souvent sans aucune d'elles, et qu'on doit les regarder comme le résultat de simples coïncidences ou de complications (2). » En effet, les cas dans lesquels les recherches microscopiques donnent un résultat négatif sont infiniment plus nombreux. En ne cherchant que ceux dont une description

(1) *Arch. de méd.*, 1851, t. II, p. 333.

(2) *Ibid.* *ibid.*, p. 354.

détaillée et l'habileté connue des observateurs fournissent une garantie suffisante d'exactitude, M. Blache a pu facilement en réunir une dizaine dans lesquels il n'a pas été possible de découvrir dans les centres nerveux les moindres traces d'altération. Nous avons pu nous aussi constater un cas du même genre chez une jeune fille que nous avons observée en 1841, à l'Hôtel-Dieu de Lyon avec notre ami M. Lacour, alors interne du service dans lequel la malade avait été placée.

25^e Obs. — Jeune fille âgée de huit ans. Surexcitation nerveuse; frayeur; chorée quelque temps après; marche rapide de la maladie qui atteint le plus haut degré d'intensité et résiste à toutes les médications. Mort. — Berninie Portier, âgée de 8 ans, née à Dortan près Nantua (Ain), d'une assez bonne constitution, d'un tempérament lymphatique nerveux, est admise le 24 mai 1841, dans la salle Montaut.

Sa mère raconte que pendant la convalescence d'une maladie assez grave, dont la nature n'est point précisée, elle offrit des symptômes qu'un médecin attribua à une affection vermineuse. Néanmoins le calomèlas prescrivit plusieurs fois ne fit évacuer aucun ver. L'enfant se rétablit, mais pendant cette seconde convalescence, son caractère qui était déjà timide et très-inquiet le devint encore davantage; peu de temps avant cette époque elle avait ressenti une frayeur dont l'impression avait été si vive sur son esprit qu'on évitait toutes les occasions de réveiller sa disposition pusillanime. On ne sait si malgré ces précautions elle eut une nouvelle frayeur. Tout ce que nous pûmes savoir, c'est que le 4 mai 1841, la mère s'aperçut que le bras droit de sa petite fille exécutait des mouvements insolites. Bientôt le membre inférieur du même côté fut envahi. La marche n'avait plus lieu que par des espèces de sauts. Trois jours après des mouvements semblables eurent lieu du côté gauche, en sorte que tout le corps était agité convulsivement. La progression devint impossible; lorsque l'enfant voulait poser le pied sur le sol et le porter en avant, le membre était involontairement jeté en avant ou de côté, de telle sorte que la marche n'é-

tail, comme dit sa mère, qu'une suite de faux pas. Le cinquième jour la parole devint brève et saccadée. Tous ces symptômes allèrent en augmentant jusqu'à l'époque où on l'apporta à l'hôpital.

A son entrée nous constatâmes l'état suivant : tout le corps est convulsé sans qu'on puisse observer la moindre rémission ; toutefois, en fixant fortement l'attention de la malade, l'agitation se modère mais ne s'arrête point. La face est dans un état continu de grimaces et de contorsions ; on entend à distance le grincement des dents ; la déglutition n'est pas moins difficile que la prehension de la louche ; l'enfant est irascible, capricieuse ; l'intelligence a toujours été nette, les paroles sont très-râres. Outre les mouvements choréiques proprement dits, il existe par moments une contracture dans les muscles du cou ; la tête est fortement portée en arrière. Parfois la malade se plaint de céphalalgie, parfois aussi les mouvements de la langue et des parois buccales font couler une salive écumeuse aux commissures des lèvres. Anorexie, soit vive. Il est impossible de s'assurer de l'état de la langue, quelquefois on aperçoit son extrémité qui paraît sans enduit ni coloration anormale. Ventre souple, indolent, urines normales ; peau chaude, sèche sur le tronc, balutueuse à la face ; pupilles dilatées ; pouls régulier à 64. — Potion avec la valériane, lavement avec l'assa-fœtida.

Le 16 elle a dormi deux heures ; le reste de la nuit, cris et agitation. Les contractions des mâchoires ont été si fortes que trois dents ont été brisées. — Potion avec le camphre et la valériane. A trois heures du soir on enveloppe la malade dans la peau de mouton qu'on vient d'écorcher.

Le 17 la nuit a été comme les précédentes ; pas d'audition. Friction tout le long de la colonne vertébrale avec la teinture de noix vomique.

Les jours suivants, les mouvements convulsifs, loin de diminuer, ne firent qu'augmenter, de telle sorte qu'aucun muscle du corps n'en était exempt. Cet état continu d'agitation était très-pénible à voir ; les grimaces les plus

horribles, les contorsions les plus opposées alternent les unes avec les autres, et se cessent par courts intervalles que pour laisser sur la physionomie l'empreinte de la souffrance ou de la stupeur. Dans les derniers jours l'enfant était d'une irritabilité extrême; la seule présence de sa mère augmentait les convulsions, elle ne pouvait ni parler ni faire le moindre geste expressif; enfin elle succomba le 4 juin. M. Gubian, chef du service, avait inutilement continué l'usage des antispasmodiques et des stupéfiants; on essaya aussi la strychnine à une assez forte dose. On aurait voulu employer le galvanisme, mais le mauvais état de la pile força d'y renoncer.

OUVERTURE DE CADAVRE. — 28 heures après le mort. — Légère hyperémie de la pie-mère rachidienne; pas d'altères lésons dans les centres nerveux ni dans les autres organes. — Amaigrissement très-prononcé. — L'avant-bras présente des écorchures dues aux chocs répétés qui pendant la vie avaient lieu contre les colonnes ou bar qui soutiennent les rideaux du lit; les lèvres sont écorchées et saignantes, en les écartant, on voit que toutes les incisives supérieures et deux inférieures ont été cassées; les membres ne sont pas raides.

Cerveau. — La dure-mère, l'arachnoïde, la pie-mère ne paraissent pas plus injectées qu'à l'ordinaire; l'arachnoïde est parfaitement transparente. Nous examinons couches par couches aussi minutieusement que possible, ayant égard à la couleur, à la consistance, le cerveau et ses pédoncules, le mésocéphale, les tubercles quadrijumeaux, le cervelet et le bulbe, sans y rencontrer la moindre altération; la substance cérébrale offre une consistance assez ferme malgré l'élévation de la température.

La consistance de la moelle épinière est normale; mais les vaisseaux de la pie-mère rachidienne sont injectés dans presque toute la longueur de la moelle.

Thorax. — Les poumons, le cœur et les gros vaisseaux sont sains.

Abdomen. — Après avoir ouvert l'intestin dans toute son étendue, nous l'examinons avec beaucoup de soin. La

muqueuse est très-saine, nous ne trouvons des entozoaires dans aucune partie. Le foie, la rate, et les autres organes abdominaux sont dans un état d'intégrité complète.

Nous pensons que la congestion qui existait à un faible degré dans les méninges rachidiennes ne rend point compte des symptômes observés pendant la vie. Peut-on admettre que cette altération a existé pendant treize jours sans changer de nature et sans devenir une véritable inflammation tout en provoquant des troubles fonctionnels très-violents? Est-il de l'essence des congestions artérielles de persister aussi longtemps sans faire place à des lésions de structure plus profondes? N'y a-t-il pas disproportion entre les effets observés et la cause qu'on supposerait ainsi les avoir engendrés? En un mot, n'est-il pas probable que l'hypérémie spinale a été plutôt l'effet que la cause de la maladie et n'est dans des cas de ce genre qu'un simple résultat de l'excitation nerveuse? On conçoit que celle-ci étant exagérée appelle un plus grand afflux de sang qui s'annonce après la mort par un certain degré de congestion. Nous n'hésitons pas à nous ranger de cette opinion, et ce que nous disons ici de la chorée s'applique de tout point, sinon toujours, du moins dans beaucoup de cas à l'éclampsie.

CHOREE.

La chorée est une maladie de la seconde enfance, c'est-à-dire qu'elle se rencontre presque exclusivement de six à quinze ans. Certaines auteurs ont circonscrit dans la période de dix à quinze ans l'existence de la danse de Saint-Guy; mais cette assertion démentie par un trop grand nombre de faits ne semble avoir été émise que pour soutenir une théorie que les observateurs de notre époque ont généralement rejetée. « Je me crois autorisé, dit l'auteur d'un traité complet sur la chorée, à ériger en principe, que la nature a spécialement affecté cette maladie à l'époque de la vie qui répond à la puberté; qu'elle

doit être regardée comme une dépendance, un symptôme préliminaire de la révolution pubère un peu entravée.

« J'adapte ce sentiment avec d'autant plus de confiance que mes observations sont conformes sur ce point à l'autorité et à l'assentiment de médecins très-respectables. *Pueri paralytici*, dit Sydenham, *e decimo octavo anno ad pubertatem irrumpit* (1). »

Cette opinion est aussi celle de Collen, de Baumes, de Pinel, etc.

L'influence des approches de la puberté a été exagérée par les auteurs que nous venons de citer. En effet, M. Rufe a trouvé la chorée presque aussi fréquente de six à dix ans que de dix à quinze, et l'on en voit des exemples, soit dans la première enfance, soit après l'adolescence. Il est vrai que ces exemples sont rares, puisque Billard ne parle point de cette maladie dans son traité, non plus qu'Underwood et tous ceux qui ont eu spécialement en vue les maladies des nouveau-nés. Mais d'autres auteurs en ont cité quelques-uns chez des enfants très-jeunes. On a vu également la maladie survenir à vingt-deux ans, à quarante, à soixante et même à quatre-vingts ans dans un cas cité par Bouteille.

On peut donc conclure que la puberté n'a qu'une influence secondaire et que la chorée se rattache plutôt à l'ensemble des conditions qui prédisposent l'enfance aux affections convulsives et en particulier à l'établissement de la faculté coordinatrice et pondératrice des mouvements, lequel s'opère surtout vers la fin de cette époque.

La chorée n'est pas une maladie bien fréquente. Si l'on veut s'en rapporter aux calculs de M. Rufe, auxquels on peut reprocher de ne reposer que sur des registres d'hôpital tenus en général avec une grande négligence, on verra que sur trente-deux mille neuf cent soixante-seize malades admis à l'hôpital des Enfants pendant neuf années (1824 à 1833), cent quatre-vingt-neuf étaient affectés de chorée, ce qui donne la proportion de 1/174.

(1) Bouteille, *Traité de la Chorée*, p. 82.

L'influence du sexe est très-bien démontrée par les relevés de M. Ruff et de M. Dufoué (1). Le premier n'a trouvé que cinquante-un garçons sur cent quatre-vingt-neuf malades, et le second soixante-dix-neuf sur deux cent quarante cas. En additionnant ces chiffres on trouve comme rapport général que pour deux garçons atteints de chorée on rencontre cinq filles.

Il est probable que le sexe féminin ne prédispose davantage à la chorée que parce qu'il est plus souvent doué d'un tempérament nerveux et irritable. De plus, on pourrait expliquer cette différence en admettant que la puberté et la menstruation agissent d'une manière plus active chez les petites filles. Dans tous les cas il est bien certain que pour la chorée comme pour toutes les maladies nerveuses, une constitution faible, délicate, une surexcitabilité nerveuse, congénitale ou acquise, sont, parmi les causes prédisposantes, les mieux démontrées et les plus puissantes.

La chorée paraît dans quelques cas se transmettre par hérédité, telle est du moins l'opinion du docteur Elliotson qui en a publié des exemples. Toutefois cette circonstance est assez rare; mais il ne faut pas méconnaître que très-souvent les parents des enfants atteints de chorée sont ou ont été sujets à d'autres maladies nerveuses telles que les convulsions, l'hystérie, l'épilepsie, l'hypochondrie, etc. On doit aussi remarquer que souvent ces enfants ont été ou seront plus tard sujets à ces mêmes affections dont la connexion avec la chorée est ainsi rendue évidente.

L'influence des climats chauds qui n'est guère contestable sur la production des maladies convulsives en général, paraît peu puissante sur celle de la chorée. Cette maladie est en effet très-rare dans les régions équatoriales, d'après les rapports des médecins qui ont pratiqué dans ces contrées. Cependant dans nos climats les mois les plus chauds de l'année sont les plus favorables à son dé-

(1) Thèse, n. 126 année 1852.

veloppement. C'est au moins ce qui résulte des relevés de MM. Kufs, Dugès et Blache.

Elle paraît avoir régné parfois épidémiquement. Plin et Mézeray parlent en historiens de quelques faits de ce genre. Cullen, plus compétent sur cette matière, dit qu'en l'a vue paraître comme épidémique dans certains cantons d'une province. Enfin, il y a quelques années que le professeur Hecker, de Berlin, a écrit un mémoire fort curieux sur la chorée épidémique du moyen-âge. On peut reprocher à cet auteur d'avoir rapporté à la chorée des affections qui sont de la même famille, mais non de la même espèce. La chorée du moyen-âge, telle qu'il l'a décrite, ressemble plus à l'hystérie ou à certaines monomanies qu'à la chorée connue aujourd'hui.

La plupart des causes déterminantes que nous avons assignées aux convulsions agissent aussi sur la production de la chorée, et il est vrai de dire qu'en présence d'une même cause occasionnelle la différence des effets ne vient souvent que de celle des causes prédisposantes, de l'âge par exemple. Ainsi la peur et toute émotion vive, en général, qui chez un enfant de deux ou trois ans amènerait des convulsions, ne produit qu'une chorée chez un enfant de dix à douze ans.

De toutes les émotions celle de la frayeur est en effet la cause la plus ordinaire de la chorée. M. Guersent fait observer qu'il ne faut pas prendre pour cause de la maladie cette disposition à s'effrayer que présentent les enfants dès le début de l'affection et qui n'est qu'un symptôme. Sur soixante-dix cas recueillis par M. Dufossé (1) dans différents auteurs, vingt-sept fois on a attribué à la peur le développement des accidents morbides; sur vingt choréiques il a constaté sept fois cette influence, et cite en particulier l'histoire de deux enfants bien portants qui assistaient au feu d'artifice d'une fête publique et y témoignaient une crainte très-vive; le lendemain l'un fut frappé subitement de chorée, chez l'autre l'affection se

(1) Thèse citée.

déclara bientôt, mais plus graduellement. M. Blache emprunte à la clinique de Depuytren le fait suivant : « Une jeune fille, à peine âgée de quinze ans, était occupée à travailler dans une chambre lorsqu'un homme ivre vint se devant d'elle, les parties sexuelles à découvert et à l'état d'érection : frappée de terreur, elle fut prise de malaise, de dégoût, de frissons, de fièvre avec céphalalgie, et bientôt après de chorée dont les premiers symptômes se manifestèrent d'abord aux bras et à la langue (1). » Les faits analogues à celui-ci sont fréquents.

Il faut rapprocher de l'action de la peur celle des accès de colère, des contrariétés, de la jalousie. Les travaux intellectuels paraissent avoir peu d'influence, et, quant à celle de l'imitation dont quelques auteurs ont tant parlé, elle paraît très-rare, car les médecins de l'hôpital des Enfants s'accordent à dire qu'ils ne l'ont jamais constatée. Celle de la masturbation et des approches de la menstruation est plus réelle dans quelques cas.

Nous n'avons plus à indiquer que les causes pathologiques. Celle dont on a le plus exagéré l'importance est la présence des vers dans le tube digestif; elle a pu être réelle dans certain cas, mais le plus souvent elle est absente, ou bien elle n'agit nullement sur la production des accidents choréiques qu'on voit persister malgré l'évacuation d'une grande quantité d'entozoaires provoquée par les anthelminthiques. On a vu quelquefois la suppression d'une diarrhée, d'un flux habituel quelconque, la pléthore, l'état anémique qui succède à une hémorrhagie abondante, un coup, une chute sur la tête, déterminer la danse de St.-Guy. M. Guersant a vu plus d'une fois la maladie se manifester à la suite de phlegmasies gastro-intestinales, contre lesquelles on avait abusé des moyens débilitants. M. Blache l'a vue survenir chez son frère après une fièvre typhoïde dont la durée avait été fort longue.

(1) *Béq. de méd.*, 2^e éd., t. 10, p. 345.

Symptômes.

Il y a des chorées partielles qui n'affectent que les muscles d'un membre ou d'une région déterminée, comme le visage, le cou, etc. La maladie est générale quand elle occupe les deux côtés du corps, c'est-à-dire, les quatre membres et un certain nombre de muscles du tronc. Dans les chorées générales il arrive ordinairement, comme dans l'éclampsie, qu'un des côtés est plus fortement affecté que l'autre. Nos observations sont d'accord avec celles de MM. Ruff et Blache, pour établir que c'est le côté gauche qui présente le plus souvent cette prédominance. Dans les chorées partielles latérales, c'est ce même côté qui est plus souvent que le droit le siège des mouvements anormaux.

Dans le plus grand nombre des cas, l'invasion est lente et graduelle. On s'aperçoit d'abord que l'enfant est plus impressionnable, qu'il s'irrite et s'impatiente pour la moindre chose, ses mouvements sont plus vifs, plus fréquemment renouvelés, ses gestes et sa physionomie ont une expression bizarre, déjà même il exécute des grimaces que ses parents peuvent croire volontaires et dignes de réprimande. Sydenham a vu le mal commencer par une espèce de boîtement ou de faiblesse de jambe que le malade traînait en marchant; nous avons observé un cas semblable. Chez d'autres malades c'est un bras qui se prend le premier, puis la jambe et ensuite le reste du corps. Enfin chez quelques sujets, chez ceux surtout qui ont été soumis à une cause instantanée et énergique, le début a lieu subitement, ou bien il suffit de quelques heures pour que les symptômes acquièrent une grande intensité.

Quand une fois la maladie existe, les mouvements désordonnés qui la caractérisent varient suivant son siège. Ainsi, les bras se meuvent en divers sens, tantôt dans l'adduction, tantôt dans l'abduction; l'avant-bras se fléchit et s'étend tour-à-tour sur le bras, se porte dans la

expiration ou dans la pénétration; la main, les doigts se meuvent de même sans aucune régularité. Les mouvements sont plus remarquables par leur vitesse que par leur violence; il suffit de leur opposer une certaine résistance extérieure, sinon pour empêcher la contraction des muscles, du moins pour retenir les membres dans une immobilité apparente; la volonté du malade a même assez de prise sur les muscles pour empêcher le membre d'exécuter de grands mouvements, et ce n'est qu'en le touchant ou en l'observant de près qu'on reconnaît les contractions involontaires dont les muscles sont le siège. Mais lorsque le malade veut exécuter un mouvement étendu, complexe, qui demande de l'énergie, de la persistance dans les contractions, et surtout une coordination et une espèce d'équilibre entre elles, comme il en faut, par exemple, dans les mouvements de prehension, les désordres deviennent alors plus apparents. Si le malade veut saisir un objet, sa main se portera plus loin, ou bien à gauche ou à droite avant de l'atteindre; une fois l'objet saisi, s'il veut le placer dans un endroit déterminé, il n'y réussira qu'après des efforts multipliés; s'il veut boire, après avoir saisi le verre avec peine, au lieu de le porter directement à la bouche, sa main obéit à deux espèces de mouvements, les uns volontaires qui tendent à porter le vase à la bouche, les autres involontaires qui l'en éloignent et l'en écartent: « faisant, dit Sydenham, plusieurs aberrations et écarts à la manière des histrions, jusqu'à ce qu'enfin le hasard lui faisant rencontrer la bouche, il vide rapidement le verre, et avale le liquide qu'il contient d'un seul trait comme s'il voulait faire rire les spectateurs. » D'autres fois le verre apporté à grand-peine sur le bord des lèvres, est saisi avec les dents qui ne l'abandonnent qu'après que le liquide est avalé. Souvent les enfants ont tant de difficulté à porter les aliments à la bouche, qu'ils réclament l'assistance d'une autre personne pour leur donner à manger.

Lorsque les membres inférieurs sont atteints, la marche est difficile; quelquefois impossible; au lieu de marcher en ligne droite, l'enfant dévie d'un côté ou de l'autre,

s'arrête subitement, repart tout à coup; en général il court plutôt qu'il ne marche. Ce premier mode de progression exigeant moins de durée dans les contractions musculaires, paraît lui être plus facile qu'une marche lente et mesurée; il ne peut rester immobile, ses jambes plient sous lui pour se redresser à l'instant; veut-il faire un pas en avant, le pied se détache du sol à une trop grande hauteur, et, au lieu de se porter directement en avant, décrit un demi-cercle en fauchant, comme si la jambe était plus longue que l'autre; dès que le pied pose sur le sol, l'autre l'abandonne et se meut de la même manière; tous ces mouvements irréguliers ontient des espèces de glissades, d'enjambées, de sauts et d'écartés qui ressembloient aux pas d'une danse irrégulière et mal cadencée; de là le nom de danse ou saut de St.-Guy donné à la maladie. Lorsqu'elle existe à un haut degré, la combinaison des mouvements irréguliers des membres, de la tête et du cou, fait ressembler les enfants, jusqu'à un certain point, suivant la comparaison de M. Ruffe, à ces pantins que l'on fait mouvoir à l'aide d'une ficelle. Enfin la progression peut devenir impossible; les malades tombent, se renversent, se roulent par terre sans pouvoir se relever; ils sont obligés de se coucher, et pour les maintenir au lit il faut se servir de la camisole de force. Leur agitation continuelle cause des frottements qui excorrient toutes les parties saillantes du corps, celles surtout qui en supportent principalement le poids.

À la face, la chorée donne à la physionomie une mobilité singulière; ce sont des grimaces perpétuelles qui donnent tour-à-tour aux traits du visage l'expression de la joie, de la tristesse, de la terreur, de l'ironie, du plaisir, de la douleur, etc.; les yeux sont sans cesse en rotation; les sourcils, la peau du front, les ailes du nez, se contractent et se relâchent successivement; la bouche est tour-à-tour ouverte et fermée; la langue se meut dans cette cavité, frappe le palais et produit une espèce de lappement, se porte entre les dents au moment où les mâchoires s'écartent, celles-ci en se rapprochant la serrent quelquefois, la déchirent et la font saigner; quelquefois même, les convulsions des

muscles masticateurs sont si énergiques que les dents claquent et se brisent. Le son de la voix est changé, l'articulation des mots est difficile, il y a un véritable bégaiement, quelques malades font entendre une sorte d'aboiement. Le larynx entraîné par ses muscles estriés se porte en haut, en bas, les muscles du cou impriment à la tête des mouvements de flexion en avant ou sur les côtés qui alternent avec ceux d'extension en arrière; quelquefois les mouvements de rotation s'exécutent aussi avec une rapidité extraordinaire. Enfin, il n'est pas jusqu'aux muscles du thorax et de l'abdomen qui ne fassent désier le tronc en divers sens, et qui, glissant par leurs contractions irrégulières le jeu de la cage thoracique, ne nuisent à l'exercice de la respiration. La déglutition est parfois embarrassée; il est des malades qui accusent des palpitations et des borborygmes dans l'abdomen, ce qui permettrait de croire que les muscles de la vie végétative participent à l'état convulsif de ceux de la vie de relation.

Tels sont les principaux désordres musculaires qui déterminent la chorée. La description la plus exacte ne saurait en donner une idée aussi fidèle que la vue d'un seul malade, et il suffit d'en être témoin une fois pour apprécier la véritable nature de cette forme singulière des maladies convulsives. Ces mouvements, comme nous l'avons dit ailleurs, ne sont point complètement soustraits à l'empire de la volonté, ils résultent du mélange d'un certain nombre de contractions involontaires et inégales, et d'autres qui sont volontaires mais trop faibles pour neutraliser les premières. C'est cette intervention insuffisante de la volonté qui explique le défaut de coordination et de pondération dans tous les actes de la locomotion.

L'agitation choréique augmente quand les malades éprouvent quelque émotion, comme la colère, le chagrin, la frayeur et la contrariété d'être observés par d'autres personnes. Le sommeil, au contraire, calme les mouvements et les suspend tout-à-fait, si ce n'est dans les cas où la maladie a une grande intensité. Une insomnie presque continue est d'un fâcheux augure.

Rien que la chorée consiste essentiellement dans un désordre de l'innervation cérébro-musculaire, la sensibilité et l'intelligence ne sont que rarement intactes. Les malades sont d'une humeur très-variable, parfois ils versent des larmes, s'emportent et se fâchent pour la moindre raison; cette mobilité morale est souvent analogue à celle qu'éprouvent les hystériques, mais il est rare de la voir dépasser cette limite, ce n'est que dans les cas exceptionnels que les troubles de l'intelligence vont jusqu'au délire. Il est moins rare de constater la perte ou la diminution de la mémoire, et même un certain degré d'imbécillité. L'affaiblissement intellectuel a été nié par M. Rufe, mais il existe indubitablement chez quelques malades, surtout quand l'affection est générale et d'une certaine acuité.

Les troubles des sens, comme ceux de l'intelligence, sont rarement intenses et n'ont rien de constant. La céphalalgie se rencontre quelquefois chez certains malades; elle se fait sentir surtout à la partie postérieure et inférieure du crâne. Dans quelques circonstances on a constaté une rachialgie plus ou moins étendue et n'ayant rien de fixe dans son siège par rapport aux différentes régions de l'épine. Les sens spéciaux n'offrent presque jamais de dérangements notables.

Quant aux fonctions de la vie végétative, elles ne présentent le plus ordinairement aucun trouble. Lors même que la chorée est intense et très-aiguë, pourvu qu'elle soit simple, le pouls reste lent et calme, la peau fraîche; la respiration n'est gênée que d'une manière secondaire par les contractions irrégulières des muscles respirateurs, les digestions s'accomplissent bien, il n'y a ni diarrhée, ni constipation opiniâtre.

La marche est aiguë ou chronique. Dans le premier cas, l'agitation ne reste point constamment au même degré pendant tout le cours de la maladie; elle a des alternatives de diminution et de recrudescence. Quand la guérison doit avoir lieu, les accidents diminuent peu à peu, presque jamais subitement.

La durée varie entre un et trois mois; chez la plupart

des malades elle est de sept à huit semaines. Passé trois mois elle devient chronique et alors sa durée peut être, pour ainsi dire, indéfinie. On voit ainsi des chorées durer dix, vingt ans, toute la vie. Elles sont alors ordinairement partielles, limitées à un côté du corps, ou à une seule région, aux muscles du cou, comme nous en connaissons un exemple fort remarquable. Quand la chorée chronique est très-étendue ou générale, elle cause souvent un affaiblissement de l'intelligence et même un idiotisme très-prononcé. Les muscles qui sont depuis longtemps agités de mouvements choréiques s'atrophient, se rétractent, se raccourcissent. Les malades presque habituellement privés de sommeil, maigrissent et s'affaiblissent à la longue; leur santé générale finit par languir et s'altérer.

Dans quelques cas la danse de St.-Guy offre une marche intermittente. On a cité des malades chez lesquels les convulsions choréiques commençaient tous les jours à midi pour finir à six heures du soir. M. Ruff a vu un fait du même genre. Dans ces cas là on peut considérer l'affection comme une espèce de fièvre larvée plutôt que comme une véritable chorée.

Quelles que soient les complications, elles n'exercent presque jamais une influence bien appréciable sur la marche de la maladie. On voit les fièvres exanthématiques, rougeole, scarlatine, variole, la pneumonie, les affections gastro-intestinales parcourir leurs périodes avec leur régularité ordinaire sans que la chorée soit modifiée en aucune manière.

La danse de St.-Guy se termine ordinairement par la guérison; mais dans ces cas heureux elle laisse souvent à sa suite une grande impressionnabilité nerveuse, sous l'influence de laquelle on voit, à la moindre occasion, la maladie récidiver; Sydenham prétend même que ceux qui en ont été atteints y retombent l'année suivante. La guérison de la chorée n'est pas toujours complète. Georget parle de tic convulsif de la face, des yeux, des paupières qui lui succèdent. On peut dire que ce sont là de véritables chorées partielles qu'on rencontre également quelquefois dans les

muscles qui meuvent la tête, dans ceux d'un membre. Les chorées partielles, primitives, ou consécutives sont plus souvent incurables que les chorées générales; mais celles-ci amènent aussi la mort dans des cas heureusement fort rares, même en l'absence de toute complication importante: nous en avons rapporté plus haut un exemple. La présence de certaines complications rend le pronostic plus grave. Si les désordres de l'intelligence et de la sensibilité sont considérables, on doit craindre qu'ils ne se lient à quelque lésion organique de l'encéphale, aiguë ou chronique, dont le traitement ne puisse triompher.

Le diagnostic est toujours facile. On ne peut rencontrer quelques difficultés qu'au début, tant que les mouvements choréiques sont peu prononcés. Mais quand une fois ils sont un peu intenses, leur forme singulière, les contorsions ridicules des membres et des traits de la face suffisent au médecin pour reconnaître la maladie au premier coup d'œil.

TRAITEMENT.

En lisant ce que les auteurs nous ont transmis sur le traitement de la chorée, on s'étonne d'abord de la diversité des médications qu'ils ont préconisées. Il n'est peut-être pas un seul des agents les plus actifs de la matière médicale qui n'ait été employé et auquel on n'ait attribué des succès. Il est arrivé ici ce qui se voit si souvent en médecine, c'est que les médecins qui ont réussi avec telle ou telle médication ont en général exagéré ses avantages, l'ont présentée comme applicable à tous les cas, sans tenir compte des exceptions qu'elle comporte, et ont déversé le blâme sur d'autres méthodes qu'ils connaissaient mal.

Comme méthodes générales et capables de réussir dans la grande majorité des cas, l'expérience a constaté l'efficacité des bains froids et des bains sulfureux.

Les praticiens qui ont le plus expérimenté les bains froids sont Méné, Jadelot, Depuytren. Ce dernier professait que la chorée ne résiste jamais au bain froid par im-

merveille ou par surprise; mais cet éloge est empreint d'un peu d'exagération. Voici de quelle manière on procède à leur administration. Deux hommes vigoureux, après avoir saisi le malade, l'un par les bras, l'autre par les jambes, le font passer entre deux lances d'eau, à une température de 12° à 18° + 0 cent., en faisant plonger la tête ainsi que le reste du corps. A la sortie du bain le malade doit prendre de l'exercice, ou si la marche est difficile ou la température de l'air froide, on le couche dans un lit bien chaud, afin d'exciter la transpiration cutanée. Au lieu du mode d'immersion dont nous venons de parler, on peut employer les affusions, c'est-à-dire placer le malade au dans une baignoire vide, et lui verser sur le corps l'un après l'autre deux ou trois seaus d'eau fraîche ou un plus grand nombre encore quand l'impression du froid n'est pas trop pénible. Enfin le moyen le plus simple est l'usage du bain ordinaire à la température de 15° à 18° cent., que le malade prend tous les jours en y restant une heure. Ce dernier procédé est le plus employé à l'hôpital des Enfants malades, où l'on a reconnu qu'en agissant par surprise l'eau froide affecte péniblement les enfants. D'ailleurs quel que soit le procédé que l'on préfère il faut, avant d'y recourir, examiner l'état des organes : l'irritabilité du poulmon et des bronches, la scrofulisation, certaines maladies dans lesquelles il faut redouter de produire ou d'augmenter une congestion viscérale; et les saigns rigoureux sont des contre-indications qu'il faut respecter.

C'est à M. Bandelocque, médecin de l'hôpital des Enfants, qu'on doit d'avoir appliqué le premier les bains sulfureux à la cure de la chorée. Ces bains sont préparés avec cent vingt-cinq grammes de sulfure de potasse concré dans huit toises d'eau; le malade en prend un tous les jours et y reste environ une heure. M. Bandelocque publia en 1832 (1) le résultat de ses observations, et constata que sur trente malades la guérison avait eu lieu vingt-huit fois. Plus tard ce praticien disait à M. Blache : « Tout ré-

(1) *Bulletin du Médecin*, p. 224.

comment j'ai traité six garçons atteints de chorée, quatre ont été parfaitement et rapidement guéris par les bains sulfureux, chez un cinquième, la chorée exaspérée par ces bains, le sous-carbonate de fer et les émissions sanguines, a cédé comme par enchantement à l'emploi des purgatifs que je mis en usage dès que j'appris que l'enfant, actuellement constipé, était très-sujet à la diarrhée avant de devenir choréique. Le sixième garçon a été guéri par le sous-carbonate de fer employé à très-haute dose (1). »

Les essais de M. Baudeloque, répétés par les autres médecins de l'hôpital des Enfants, ont démontré l'efficacité très-grande de sa méthode qu'il faut peut-être placer avant celle des bains froids, et dont l'administration chez les enfants est d'ailleurs plus facile.

Cependant elle ne réussit pas toujours et dans quelques cas elle aggrave les accidents; nous venons d'en voir un exemple cité par M. Baudeloque lui-même. M. Blache parle d'un autre cas relatif à un jeune homme qu'il eut occasion de traiter à l'hôpital de la Charité, et chez lequel les bains sulfureux ayant paru notablement augmenter l'intensité des mouvements choréiques, il fut dès le sixième bain obligé d'y renoncer.

Les purgatifs, les antispasmodiques, les stupéfiants, les toniques, l'électricité, etc., ont été tour à tour et plus ou moins préconisés par les praticiens.

Les purgatifs sont très-employés en Angleterre. Le docteur Hamilton attribue la chorée à la constipation et au mauvais état des voies digestives; partageant sa marche en deux périodes, il donne dans la première des purgatifs doux à des distances convenables, et les remplace dans la seconde, par des purgatifs énergiques donnés sans interruption jusqu'à la fin de la cure. Il affirme que dix à quinze jours suffisent pour obtenir la guérison. Les purgatifs qu'il préfère sont le calomel associé au jalap, l'aloès et la coloquinte.

« J'ai vu, dit M. Blache, M. Guersent employer avec un

(1) *Ibid.*, en 25 vol., t. vi, p. 581.

grand avantage cette médication à l'hôpital des Enfants, seulement les purgatifs dont il se servait étaient moins actifs que ceux employés par Hamilton. Le docteur Chapman, en parlant de la même méthode, dit qu'il n'en connaît pas qui guérissent plus promptement la chorée (1). »

M. Breschet, guidé par l'exemple des médecins italiens qui combattent souvent les névroses par des drastiques administrés concurremment avec le tartre stibié à haute dose, eut recours à cette méthode en 1831, chez une fille de quatre ans, dont la maladie avait résisté à plusieurs autres médications; la malade fut complètement guérie en peu de temps, et M. Breschet dit avoir depuis cette époque constamment employé cette médication avec succès. On donne le tartre stibié à la dose de 20 à 40 centig. au plus, toujours associé à l'opium et incorporé dans une infusion très-aromatique pour éviter le vomissement; on fait prendre en même temps des pilules composées d'aloès ou de gomme gutte, de scammanée et de jalap; on commence par une pilule par jour et l'on augmente graduellement les jours suivants. Malgré le succès que M. Breschet attribue à ce mode de traitement, il ne paraît pas avoir été adopté par aucun autre praticien en France comme méthode générale. M. Blache le trouve beaucoup trop énergique pour être employé dans les cas ordinaires.

Parmi les antispasmodiques, ce sont la valériane et l'assa-fœtida qui paraissent le mieux mériter les éloges qu'on leur a donnés. La valériane se donne en poudre à la dose d'un, puis de plusieurs grammes par jour, incorporée avec du miel ou de la confiture, condition indispensable pour masquer la saveur désagréable de cette substance. L'assa-fœtida est difficile à faire prendre aux enfants par la bouche; détrempée en lavement elle n'est pas toujours gardée, en sorte que c'est une médication souvent infidèle.

Les stupéfiants, si l'on en croit les auteurs qui ont écrit récemment sur la chorée, mériteraient peu de confiance, cependant on sait que Stahl et Murray employèrent

(1) Art. cité, p. 556.

avec succès, l'un l'extrait de belladone, l'autre celui de *datura stramonium*, et si beaucoup de praticiens ont échoué avec ces médicaments et avec l'opium, c'est qu'ils ont craint sans doute de les donner à une dose élevée. Il est bien évident que dans la chorée comme dans le tremblement mercuriel, comme dans certains cas de tétanos ou d'éclampsie, on ne peut réussir avec les stupéfiants qu'à la condition d'opérer une sédation forte et soutenue. Voici comment s'expriment à ce sujet M. L. Trousseau et Pidoux, dont les tentatives nous paraissent dignes d'être imitées par les praticiens, au moins dans les cas graves et rebelles : « La chorée ne cède pas toujours aux bains froids par affusion ou par immersion, et aux médications diverses qui la modifient ordinairement; dans les cas les plus rebelles nous avons d'abord tenté, en désespoir de cause, de hautes doses d'opium, et nous sommes arrivés à des résultats si extraordinaires et si satisfaisants, que désormais nous avons traité toutes les chorées par cette méthode, et nous n'en avons vu qu'une sur quatorze ne pas être rapidement guérie. Mais ici l'opium doit se donner à des doses considérables, de cinq centigrammes à un gramme par jour; à l'Hôtel-Dieu, nous avons porté chez une femme la dose de sulfate de morphine, jusqu'à quarante centigrammes dans les vingt-quatre heures; en un mot, nous faisons donner vingt-cinq milligrammes d'opium d'heure en heure jusqu'à ce que les mouvements convulsifs soient notablement calmés, et qu'il y ait commencement d'ivresse; puis nous entretenons toujours le malade dans le même état d'intoxication pendant cinq, six et même huit jours; nous nous arrêtons alors pour donner quelques bains et faire reposer le malade, puis nous recommençons quelques jours après. Il est rare qu'au bout de quinze jours la chorée ne soit pas tellement modifiée, que la nature achève elle-même la guérison en peu de temps (1). »

Parmi les toniques, les ferrugineux occupent le premier

(1) *Traité de Thérapeutique*, 2^e édit., t. II, p. 38.

rang. Le sous-carbonate de fer à haute dose a été expérimenté sur une vaste échelle par le docteur Elliotson qui lui reconnaît une grande efficacité, et dit que sur une centaine de cas il n'a jamais échoué lorsque la chorée ne datait pas de très-loin, que les malades étaient jeunes et de bonne constitution. Suivant ce médecin, le médicament doit être donné à forte dose dès le commencement, il est toujours innocent pourvu que l'on entretienne la liberté du ventre; suivant l'âge de l'enfant on varie la dose de huit à quinze grammes par jour. M. Baubeloque a obtenu aussi, comme nous l'avons déjà vu, de bons effets du même moyen donné à haute dose.

Le quinquina est plus rarement employé; cependant il peut convenir comme tonique quand il faut relever les forces d'une constitution délabrée, ou comme antipériodique dans les cas rares où la chorée a une marche intermittente. Les autres toniques amers sont d'une utilité accessoire.

L'électricité a été employée par un certain nombre de praticiens. Généralement elle n'a été appliquée qu'après l'échec des autres médications, et c'est alors qu'elle a pu réussir dans des cas désespérés. Il semblerait même que dans les chorées simples et idiopathiques, l'électricité convient moins que dans les chorées compliquées. En effet, parmi les cas de succès cités par le docteur Addison (1), le premier est un exemple de chorée avec hystérie, épilepsie, aménorrhée; dans le second il y avait eu même temps épilepsie; le troisième était une chorée simple; dans le quatrième cette maladie était compliquée d'une paralysie d'origine hystérique, et dans trois autres cas il existait des symptômes d'épilepsie, d'idiotie, etc. Les faits tirés de la pratique du docteur Iard (2), portent aussi à croire que les chorées partielles, d'ailleurs si rebelles aux autres médications, sont celles dans lesquelles l'électricité offre le plus d'avantage, car sur neuf observations dues à ce pra-

(1) *Journal l'Expérience*, 13 novembre 1837.

(2) *Gazette française*, 15 novembre 1837.

ticien, il en est sept relatives à des chorées partielles. Dans deux cas la maladie affectait la moitié droite du corps, dans le membre droit supérieur; dans trois autres elle était limitée soit aux muscles sterno-cléido-mastoïdiens, soit aux muscles des doigts des deux mains, soit à ceux de la mâchoire inférieure; dans un cas où elle n'occupait que le bras et la main du côté droit et paraissait due à une aménorrhée, le retour des règles provoqué par l'électricité fit disparaître la maladie; dans les deux autres cas il s'agissait, suivant l'auteur, d'une chorée vermineuse. Enfin, une remarque à faire sur l'ensemble de ces observations, c'est que plusieurs sont relatives à des sujets avancés en âge et non à des enfants. Il nous paraît probable, en effet, que les jeunes sujets doivent moins bien supporter que les adultes tous les moyens excitants parmi lesquels l'électricité est un des plus énergiques.

Quant au mode d'administration de l'électricité, Addison se sert d'une machine électrique ordinaire; le malade étant sur un siège isolé, on établit la communication entre le premier conducteur de la machine et le corps du malade; une boule de cuivre garnie d'un fil de fer ou d'une chaîne en rapport avec la terre, est promené du haut en bas, dans la direction de l'épine, à la distance d'environ un pouce de la peau. La machine étant mise en action, le corps du malade se charge et l'électricité continue à passer accompagnée d'étincelles, dans la boule de cuivre et de là dans le sol par le fil ou la chaîne. De la sorte une rapide succession d'étincelles est entretenue, et on la fait durer jusqu'à ce qu'il survienne une éruption qui offre l'aspect du lichen urticatus; le temps nécessaire pour la production de cette éruption varie, suivant les malades, de cinq à dix minutes.

Dans les cas cités par Bird, on a employé le bain électrique et soutiré les étincelles dans la région de l'épine. Lorsqu'on veut agir sur les organes utérins, dans le cas, par exemple, où l'aménorrhée paraît tenir la chorée sous sa dépendance, on soutire les étincelles de la périphérie du bassin. Enfin, quand on veut produire des éruptions

on emploie la bouteille de Leyde. La pile est aussi d'un emploi très-convenable si l'on a soin de placer les deux pôles de manière à ce que le courant aille autant que possible le trajet de la moelle épinière.

Nous rapprocherons de l'électricité l'emploi de la strychnine, qui agit comme un excitant local de l'axe rachidien. Ce médicament a été mis en usage depuis quelques années par MM. Rougier et Poufflon, médecins de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Le professeur Trouseau a publié en 1843, sur le même sujet, un mémoire auquel nous serons tout-à-l'heure quelques emprunts.

Sur les dix observations que renferme le mémoire de M. Rougier, une seule a rapport à un homme adulte, les autres ont toutes pour sujets des enfants de six à seize ans. La durée de la maladie variait d'un mois à quatre ans. La plus longue durée du traitement a été de deux mois; la plus courte de six jours. Dans les dix cas il y a eu guérison, et une seule fois récidive, qui a cédé à un traitement répété.

Huit malades ont été traités par la strychnine seule; les deux autres ont pris en même temps des potions calmantes et du camphre. La strychnine a toujours été donnée en pilules et à une dose qui a varié entre deux et douze milligrammes par jour; la dose la plus ordinaire a été de trois milligrammes en vingt-quatre heures.

Chez tous les malades, cette médication a d'abord augmenté les symptômes, et produit chez la plupart des accidents tétaniques parfois très-alarmants, mais que l'injection d'un verre d'eau froide a toujours dissipés promptement. Après cette exaspération, les mouvements se sont réguliers, et la maladie a disparu. D'après cela M. Rougier pense que, pour que ce médicament exerce sur la charée une action en quelque sorte spécifique, il faut qu'il soit porté au point de produire une espèce de tétanos, ou du moins d'augmenter d'une manière sensible l'énergie des mouvements involontaires. A ce trouble momentané ne tarde pas à succéder une amélioration notable qui conduit progressivement à la guérison, laquelle devient

exemple de recéder à condition, toutefois de ne cesser que pendant quelques jours le médicament, que l'on continue ensuite pendant un certain temps à dose décroissante.

On voit dans l'observation de M. Foulhioux (1), que l'enfant qui était âgé de treize ans, après avoir pris la strychnine, eut pendant une nuit des crises musculaires si violentes qu'il se précipita deux fois de son lit sur le carreau, et que la sœur veilleuse avait eu plusieurs fois que le malade allait expirer. La crainte d'accidents graves en pareils cas serait de nature à retenir les praticiens qui voudraient faire l'essai de cette médication, si nous n'insistions avec quelques détails sur les précautions et les soins qu'elle exige et que M. Troussau a eu raison de faire exactement connaître dans son mémoire (2). D'abord il est bon de savoir que l'extract de noix vomique s'altère et s'affaiblit lorsqu'il est préparé depuis un certain temps. Dès lors il faut se mettre en garde contre les inconvénients qui résulteraient, dans le cours d'un traitement, de la substitution inattendue d'un extract récemment préparé à un extract plus ancien. Il faut aussi ne pas faire faire à la fois plus de pilules qu'on n'en doit consommer dans l'espace de cinq à six jours, parce qu'il se fait, dans les pilules même préparées depuis peu de temps, des changements qui en affaiblissent l'énergie. Il faut encore recommander de les prendre toujours chez le même pharmacien et de n'en prendre que demi-dose le jour qu'on renouvellera la provision. Sous le rapport de son altérabilité, la strychnine offre moins d'inconvénients que l'extract de noix vomique. Enfin, comme l'action de ces médicaments est plus ou moins énergique suivant les individus, il faut toujours, surtout au commencement d'un traitement, surveiller attentivement leurs effets et n'en élever la dose qu'avec prudence et d'une manière bien graduée.

(1) *Gazette médicale*, 1844, pag. 323.

(2) *Annales de M. d.*, 1845, 3^e de juin, juillet et août.

La noix vomique se donne ordinairement en pilules qui doivent être argentées. Si le malade peut supporter l'amertume du médicament, et s'il peut, trois les jours, le faire préparer par un pharmacien, l'extrait sera dissous dans une potion.

Le premier jour, chez les enfants de dix à quinze ans, la dose est de quinze centigrammes d'extrait, en deux fois, autant que possible, au commencement ou au milieu du repas. Il ne faut pas donner le médicament avant le repas, parce qu'il cause quelquefois un trismus presque aussitôt après avoir été ingéré et par conséquent l'impossibilité de mâcher. On reste pendant deux jours, à cette dose; et s'il n'y a aucune action convulsive produite, on donne 10 centigrammes, puis 15, 20, 25 et jusqu'à 30, en distribuant autant que possible cette dose en trois ou quatre repas. Chez les enfants au-dessous de dix ans, on doit commencer par 1, 2 ou 3 centigrammes par jour, en augmentant ensuite progressivement.

Comme il est très-difficile de faire avaler des pilules aux jeunes enfants, M. Trousseau conseille la strychnine qu'on fait dissoudre dans du sirop simple à la dose de cinq centigr., pour cent grammes de sirop. On donne à l'enfant ce sirop pur ou dissous dans l'eau, à la dose d'une cuillère à café, une, deux, trois et jusqu'à six fois par jour, jusqu'à ce qu'en obtienne l'effet convulsif. On sait d'ailleurs que la strychnine a une action huit fois plus énergique que l'extrait de noix vomique; par conséquent la dose de la première doit être huit fois moindre que celle du second.

Il faut augmenter graduellement mais assez rapidement la dose du médicament jusqu'à ce que son action convulsive se fasse sentir. Alors on n'augmente plus les doses pendant quatre ou cinq jours. L'influence convulsive se manifeste par un resserrement pénible des mâchoires, avec un peu de vertige et de tendance au sommeil; en même temps il y a assez souvent un peu de douleur et de raideur dans les muscles du cou, moins de facilité dans le jeu des muscles des jambes. Il ne faut pas toujours en rester à ce point, mais on peut augmenter les doses jusqu'à ce qu'il y ait un

les maux très-promouvés et douloureux, des vertiges plus forts, une raideur considérable du cou, des jambes, avec secousses convulsives, et parfois une gêne légère de la respiration. Après avoir maintenu le malade dans cet état convulsif pendant plusieurs jours, on voit la chorée se modifier et guérir en peu de temps, ce qui n'arriverait pas si le médicament n'avait pas été donné en assez grande quantité pour produire les effets que nous venons de décrire. Quand l'agitation choréique a presque cessé, on diminue les doses, de manière cependant à obtenir encore de la raideur musculaire, et l'on continue une huitaine de jours après que tout mouvement choréique a disparu.

Nous n'avons encore parlé que des méthodes de traitement les plus simples, il en est de plus complexes que nous ne pouvons passer sous silence. Sydenham commençait par des saignées, puis donnait des purgatifs et enfin les toniques; ici l'expérience n'a pas sanctionné complètement les idées en partie théoriques qui avaient conduit l'Hippocrate anglais à cette méthode de traitement. Colles a combattu l'usage des émissions sanguines, Kouteille ne les employait qu'avec réserve, et Constant a démontré que pour beaucoup de malades elles constituaient une médication dangereuse. Aujourd'hui on en restreint généralement l'usage à certains cas où la chorée s'accompagne, sinon de pléthore générale, au moins d'un certain degré d'hypérémie encéphalique, qu'annoncent ordinairement la céphalalgie et un désordre plus ou moins marqué de l'intelligence.

M. Serres, qui attribue la chorée à une irritation aiguë des tubercules quadrijumeaux, et ceux qui en placent la cause dans une lésion analogue du cervelet, considéré par eux comme l'organe de l'équilibration et de la coordination des mouvements volontaires, font appliquer des sangsues à la nuque. Nous avons vu cette méthode réussir dans un cas de peu de gravité, il est vrai, entre les mains de M. Lafranc qui partage sur ce point l'opinion de M. Serres. Dans le manque où nous sommes d'observations assez nombreuses, nous n'avons pu nous former un sentiment personnel sur la valeur de cette méthode; mais

nous devons dire que jusqu'ici elle n'a point obtenu l'assentiment de la plupart des praticiens qui ont écrit sur la charrée.

En retranchant les saignées, la méthode de Sydenham, réduite aux purgatifs et aux toniques, peut rendre de grands services, puisque ces deux espèces d'agents, alors même qu'on les emploie isolément, sont, comme nous l'avons vu, doués d'une grande efficacité.

Le docteur Bardley, après avoir essayé presque toutes les médications généralement employées, s'est arrêté à l'usage combiné des purgatifs et des antispasmodiques. Après avoir déterminé plusieurs éracérations alvines, il donne le musc et le camphre, (vingt centigr. de chaque), toutes les cinq heures, et ajoute pour le soir un lavement composé de cent vingt-cinq grammes de mixture d'assa-fœtida avec vingt à trente gouttes de laudanum de Sydenham.

Nous n'en finirions pas si nous voulions indiquer tous les médicaments dont des praticiens honorables ont fondé la réputation, en attachant leur nom aux formules spéciales sous lesquelles ils ont préconisé leur administration. Ainsi la teinture de Chrestien, de Montpellier, qui n'est autre chose que le liniment de Rouen, se compose de soixante grammes d'esprit de genièvre avec huile de gérolle et baume de muscade, de chaque deux grammes ; elle s'emploie en frictions sur le rachis. MM. Stamblo en Italie, et Byran en Amérique, conseillent les frictions sur le trajet de l'épine avec la pommade stibée. Richerand promenait des cautères et des vésicatoires le long de cette région. M. Prichard emploie aussi cette méthode et dit qu'elle réussit. Enfin, l'on sait que les pilules de Mèrat (nitrate d'argent, camphre, musc, opium), ont joui et jouissent encore d'une certaine réputation.

Quoique la nature de la charrée soit à peu près inconnue, il ne doit pas nous être interdit de rationaliser son traitement, et ce serait un empirisme grossier et absurde que l'emploi aveugle des différentes médications dont nous avons parlé. Dans un bon nombre de cas l'indication fondamentale repose sur l'étiologie, c'est-à-dire, sur quelque

ciuse de parfaitement appréciable. Ainsi, par exemple, que la constipation, comme dans le cas rapporté par M. Taubeloque, ou tout autre état morbide des voies digestives paraissent le point de départ de la chorée, les purgatifs, les vomitifs, les anthelminthiques trouvent leur emploi. Il faut donc tenir compte des causes de la maladie même de celles qui paraissent n'être que prédisposantes. Une constitution faible, délicate, le tempérament lymphatique, un état anémique, chlorotique, réclament les toniques, en y joignant les exercices gymnastiques, la promenade au grand air, l'insolation, une nourriture féculente, l'usage d'un vin amer et généreux, surtout chez les sujets qui souffrent de la misère.

Les antispasmodiques et les stupéfiants conviendront surtout dans les chorées essentielles, idiopathiques, qui ne sont souvent que le plus haut degré d'une surexcitation nerveuse habituelle et accrue par une cause morale, une frayeur, par exemple.

Les antiphlogistiques ne devront point être omis en présence d'un état pléthorique évident ou probable. Employés avec mesure chez des enfants non anémiques, la saignée ou les sangsues seront de temps en temps d'une grande utilité.

Enfin, en l'absence d'indications fournies par l'étude approfondie des causes, on devra généralement commencer par les bains froids dont l'action directement sédatrice du système nerveux ne peut être contestée; les bains sulfureux doivent aussi être mis en première ligne. Ce n'est qu'après avoir constaté leur insuccès que l'on aura recours à l'électricité ou aux préparations de noix vomique. Nous pensons que ces excitants directs de l'axe rachidien demandent une certaine réserve, surtout si l'on a affaire à un état d'éréthisme nerveux très-prononcé, si les secousses musculaires sont continuelles et fortes. De nouvelles observations modifieront peut-être par la suite notre manière de voir, mais nous ne pouvons exprimer aujourd'hui que celle qui nous paraît appuyée par l'expérience et l'induction.

SECTION II.

MALADIES DES CENTRES NERVEUX AVEC ALTERATION MATÉRIELLE APPRÉCIABLE.

CHAPITRE I.

HYPERÉMIES ET HÉMORRHAGIES ENCEPHALO-RACHIDIENNES.

C'est surtout dans l'enfance qu'il convient de rapprocher et d'étudier simultanément les hyperémies et les hémorrhagies encéphalo-rachidiennes, car l'épanchement du sang dans l'épaisseur du tissu nerveux, ou ce qui est plus ordinaire, à la surface des méninges, n'arrive en général qu'au plus haut degré de la congestion qui se fait dans ces organes. A un âge avancé l'hémorrhagie est fréquemment liée à une cause prochaine spéciale, c'est-à-dire à une lésion de tissu, à l'ossification et à la friabilité des artères, ou à un ramollissement d'une nature particulière de la pulpe nerveuse que M. Rochoux a eu raison de décrire sous le nom d'hémorrhagipare. Souvent aussi le centre de la circulation est affecté de lésions organiques qui déterminent mécaniquement la stase du sang veineux dans l'encéphale, ou augmentent l'énergie de l'impulsion artérielle. L'absence de ces conditions chez les enfants rend très-rare les hémorrhagies interstitielles, c'est-à-dire les véritables apoplexies; on n'observe guère à cet âge que des apoplexies méningées.

Il importe pour la clarté de notre exposition de séparer l'histoire de ces maladies suivant qu'elles s'observent chez le nouveau-né, ou dans la suite de l'enfance. Rien de bien important ne se rattache à cette seconde division, et nous

allons en peu de mots énoncer les principales remarques dont elle peut être l'objet.

La congestion cérébrale survient fréquemment comme symptôme ou comme élément dans un grand nombre de maladies; elle se développe surtout facilement dans toutes les affections fébriles et dans celles qui, exemptes de réaction pyrétiqne, sont cependant de nature à retentir par la douleur ou par les sympathies sur l'appareil central de l'innervation. C'est souvent, mais non pas toujours, à un certain degré de congestion qu'il faut rapporter l'agitation, l'insomnie, le délire, la somnolence et l'abattement ou les troubles convulsifs qui se manifestent dans le cours ou plutôt encore au début des phlegmonies thoraciques et abdominales, et de celles qui, siégeant dans les organes voisins du cerveau, modifient facilement la circulation capillaire de cet organe. La congestion paraît aussi s'établir plus aisément chez les enfants dans les affections générales, telles que les fièvres éruptives et typhoïdes.

Dans ces diverses circonstances, la disposition de l'encéphale aux congestions actives s'explique par la prépondérance de la circulation artérielle qui, chez l'enfant, est parfaitement en rapport, dans le système nerveux, avec la nutrition active qu'exigent sa prédominance en volume et la précocité de son développement. Si de cet état physiologique à l'état de congestion morbide, il n'y a qu'un pas facile à franchir par l'intervention d'une maladie qui excite la circulation générale, on conçoit que ce passage ait également lieu par la seule influence d'une excitation cérébrale idiopathique. C'est alors que la congestion est dite essentielle; souvent dans ce cas elle est passagère et constitue à peine une maladie; si, au contraire, elle persiste, elle fait place presque inévitablement à une altération plus profonde, c'est-à-dire à une phlogose.

Ces considérations nous dispensent d'entrer dans les détails d'une histoire complète des hyperémies encéphaliques chez les enfants arrivés au-delà du premier mois de leur

vie. D'ailleurs, à l'occasion de chacune des maladies dont cet ouvrage renferme la description, nous avons toujours indiqué les accidents cérébraux dont elles s'accompagnent. Nous savons aussi que les hyperémies primitives ou secondaires sont quelquefois l'origine de l'affection convulsive qui nous a longuement occupé; c'est à leur forme la plus grave. Dans d'autres cas la congestion s'annonce par des accidents légers, tels que la céphalalgie, la somnolence, quelquefois par la perversion éphémère de l'intelligence, par le délire; enfin, dans des cas rares, elle revêt une forme plus menaçante, analogue à celle qui s'observe plus souvent à un âge avancé, nous voulons parler de la forme apoplectique. Nous avons trouvé dans nos recueils périodiques quelques faits de ce genre, un entre autres recueilli par Comtat (1), chez une jeune fille qui, amenée tardivement à l'hôpital, succomba environ trente heures après le début des symptômes qui avaient simulé une hémorrhagie double et considérable du cerveau, puisqu'il y avait résolution des quatre membres, intelligence abolie, sensibilité très-étendue, respiration stertoreuse; à l'autopsie on ne trouva qu'une forte congestion des hémisphères cérébraux. L'auteur pense que dans ce cas la plethore était due aux approches de la première menstruation, comme les renseignements tendraient à le faire croire. C'est, en effet, dans des circonstances de ce genre que la congestion cérébrale se montre quelquefois.

Les hémorrhagies rachidiennes-rachidiennes qui ont leur siège dans l'épaisseur de la substance nerveuse, sont infiniment plus rares que les congestions. Jusqu'en 1833, M. Guereux, dans le cours d'une pratique de vingt ans, n'en avait encore observé que deux cas. Elles ne sont encore connues que par un très-petit nombre d'observations qui se résument, disait M. Rochoux en 1832 (2), « aux cas suivants, successivement observés sur une fille de quatorze ans par les médecins de Breslaw, sur un jeune

(1) *Gas. méd.*, année 1835, p. 578.

(2) *Dict. de méd.*, 2^e éd., t. ix, p. 380.

homme du même âge par M. Guibert, sur une fille de quatorze ans par H. Payen, et sur un garçon de douze ans par M. Andral. Dans ce dernier cas le malade s'était exposé au froid à un œcilardent. « Un cas semblable a été observé sur un enfant de sept ans, qui, après avoir joué longtemps au soleil, eut ensuite un violent accès de colère pendant lequel il mourut; chose remarquable et fort rare, l'hémorragie siégeait dans un des hémisphères du cerveau. M. Tonnelle, médecin à Tours, a publié une observation d'hémorragie cérébrale sur un enfant de deux ans. M. Farnet sur un enfant d'un an, M. Serres sur un enfant de trois mois (1). » Nous rappellerons ensuite le cas d'un enfant de trois ans dont M. Lallemand a consigné l'histoire dans sa troisième lettre, celui d'un enfant de onze ans rapporté par Constant (2). Quant à nous, nous n'en avons encore rencontré aucun cas dans le cours de nos recherches. M. Beequerel, qui a récemment publié un bon travail sur les hémorragies encéphaliques (3), dit que pendant trois années d'observation et sur plus de quatre cents autopsies qu'il a pratiquées, il n'a jamais rencontré d'hémorragies simples de la substance cérébrale; il en cite un seul exemple qui lui a été communiqué par un de ses confrères. Nous rarement il a rencontré l'apoplexie sanguine au milieu du ramollissement que déterminent quelquefois les tumeurs tuberculeuses; il a vu quatre cas de cette espèce.

Toutes ces observations ne sont curieuses qu'à un seul titre, celui de leur rareté; mais elles sont encore trop peu nombreuses pour permettre de tracer un tableau complet de l'hémorragie cérébrale chez les enfants. D'après les faits connus jusqu'ici d'apoplexie simple, les symptômes et la marche de la maladie n'ont rien offert d'extraordinaire et qui ne soit conforme à ce qui arrive généralement chez l'adulte. Quant aux hémorragies qui compliquent

(1) Andral, *Lectures médicales*, recueillies par A. Latour, t. III, p. 69.

(2) *Gas. méd.*, année 1824, p. 405.

(3) *Cas. de la clinique des enfants*, avril 1849.

des lésions tuberculeuses de la pie-mère et du cerveau, il faut, suivant M. Becquerel, faire dans leur symptomatologie la distinction suivante : lorsqu'elles compliquent une méningite tuberculeuse aiguë, les symptômes des deux maladies se confondent et on ne peut diagnostiquer l'hémorrhagie. Si l'épanchement sanguin complique une méningite tuberculeuse chronique, il donne naissance à des symptômes cérébraux qui peuvent être appréciés, mais qui ne sont point assez nets ni assez tranchés pour conduire à un diagnostic précis.

Les hémorrhagies des méninges sont un peu plus communes que celle du trau cérébral. Elles ont lieu par exhalation, soit dans la grande cavité de l'arachnoïde, soit dans les ventricules, soit dans le tissu sous-arachnoïdien. Entre la dure-mère et le feuillet pariétal de la séreuse il ne peut se faire que de petites ecchymoses ou taches sanguines, mais jamais de collections considérables de sang. C'est aux hémorrhagies des méninges que se rapporte l'apoplexie méningée de M. Serres.

L'histoire des hémorrhagies chez les enfants, en exceptant les nouveau-nés, ne présente aucune particularité importante qu'en ne retrouve à un âge plus avancé, surtout dans la vieillesse, époque à laquelle cette maladie est très-fréquente. M. Becquerel n'admet comme causes bien démontrées chez les enfants que : 1° les coups ou une chute sur la tête ; 2° l'existence d'une diathèse hémorrhagique. Nous pensons que toutes les causes de la congestion cérébrale peuvent déterminer l'hémorrhagie qui n'en est très-souvent que le plus haut degré ou la conséquence. Nous avons, en traitant de la coqueluche, raconté un cas dans lequel la congestion due aux quintes de toux et de suffocation a paru devenir la source de l'hémorrhagie. On peut dire que l'exhalation sanguine des méninges est liée à leur congestion, comme l'épistaxis à l'hypérémie de la muqueuse pituitaire. Les mères et les autres sont favorisées dans l'enfance par les conditions dans lesquelles s'accomplit la circulation dans les organes céphaliques.

Ce que nous avons dit des hémorrhagies cérébrales s'ap-

plique aussi à celles des méninges, à savoir que les faits connus jusqu'ici sont insuffisants pour tracer le tableau de leurs symptômes. Sur les deux malades qu'il a observés, M. Baquerel a constaté chez l'un un état comateux, faiblesse, régularité dans le pouls, qui donnait cent seize pulsations par minute, et chez l'autre des convulsions générales. Dans le cas que nous avons rapporté les symptômes ne furent point appréciés par la personne placée auprès de l'enfant qui fut trouvé mort dans son lit.

On peut par induction admettre que les épanchements sanguins des méninges une fois produits, doivent se manifester par les symptômes d'une compression générale de l'encéphale. Comme la libre communication des cavités ventriculaires et l'étendue de celle de l'arachnoïde permettent au sang exhalé de se répandre sur une vaste surface, il faut, pour que les symptômes de compression soient évidents, que l'hémorrhagie soit abondante; sans cette condition la lésion peut passer inaperçue. Dans la plupart des cas il est impossible de distinguer dans les symptômes, ce qui appartient à une simple congestion des méninges et de la substance nerveuse, des effets qui pourraient résulter d'une hémorrhagie diffuse. C'est surtout lorsque celle-ci se réduit à une infiltration séro-sanguinolente sous-arachnoïdienne qu'il est difficile de la distinguer d'une simple congestion. Enfin, dans quelque cas, un épanchement séreux produit les mêmes effets que l'épanchement sanguin, et il est impossible d'arriver à un diagnostic même approximatif.

Tout ce qui précède s'applique, comme nous l'avons déjà annoncé, aux enfants qui ont franchi la période de transition de la vie intra-utérine à la vie indépendante, c'est-à-dire à ceux qui comptent plus de deux ou trois semaines d'existence. Chez les enfants nouveau-nés l'histoire des congestions et des hémorrhagies présente des particularités plus importantes.

Les hémorrhagies de la substance nerveuse doivent peu nous occuper, car elles sont excessivement rares. M. Valleix pense cependant que cette affection atteint plus fré-

quemment les enfants naissants que ceux qui ont déjà vécu quelques années. — A peine, dit-il, cite-t-on quelques cas isolés d'hémorrhagie cérébrale à 3, 12 et 15 ans, tandis qu'en réunissant les faits que j'ai présentés à ceux qui ont été recueillis par Billard et MM. Soutier et Casalis, on en a sept sur lesquels aucun doute ne peut s'élever.

« La rareté de cette affection n'est donc pas aussi grande qu'on le croit communément; mais elle l'est beaucoup plus qu'on ne serait porté à le croire, si l'on ne consultait que les idées théoriques, car la mollesse du cerveau est si grande chez l'enfant naissant, qu'il semble que son tissu doit céder au moindre choc. Il n'en est rien cependant; et ce fait prouverait bien, si tant d'autres ne l'avaient surabondamment prouvé, combien il est dangereux de devancer l'expérience, et combien on risque de s'égarer en prenant un autre point de départ que l'observation exacte et souvent répétée (1). »

Les observations d'apoplexie cérébrale qu'on a recueillies chez le nouveau-né ont été en général exotées sans détails. C'est ainsi que dans les trois faits présentés par M. Soutier et par M. Casalis, la description est presque toute consacrée à l'anatomie pathologique et fait à peine mention des symptômes (Valleix). Billard se borne à dire que dans le seul cas qu'il a rencontré, l'enfant était mort le troisième jour après sa naissance, et qu'il avait offert les symptômes ordinaires de l'apoplexie. Nous ne connaissons encore que les trois faits rapportés par M. Valleix qui l'aient été avec des détails suffisants pour permettre d'en tirer quelques conséquences. Dans aucun de ces cas la maladie n'a paru avoir pour origine des violences éprouvées par la tête pendant l'accouchement, et les causes en sont demeurées fort incertaines. Dans un cas les symptômes furent très-prononcés et le diagnostic facile, car il y avait une hémiplegie des membres caractérisée; en remarquant que la sensibilité générale et spéciale n'était point abolie et n'était peut-être pas même diminuée, autant du

(1) *Ann. des mal. des enfants* nov.-déc., p. 200 et 203.

moins que l'exploration put le faire constater. La maladie marchait rapidement vers la guérison, quand la mort survint sous l'influence d'une maladie thoracique étrangère à l'affection primitive. A l'autopsie on constata un foyer apoplectique dans le point de jonction de la couche optique avec le corps strié du côté droit; la paralysie avait existé à gauche. Dans le second cas l'hémorrhagie s'était faite dans le corps strié, mais les symptômes s'étaient perdus au milieu de ceux qui appartiennent à l'œdème des nouveau-nés; car c'est principalement à cette maladie que la mort dut être attribuée. Parmi les phénomènes observés, le seul qui put être rapporté à l'hémorrhagie fut l'immobilité des membres. Le troisième cas est parfaitement semblable au précédent sous le rapport des symptômes qui, masqués par ceux de l'œdème, ne permirent pas de porter un diagnostic exact; mais la lésion anatomique était différente. Au lieu de trouver un seul foyer hémorrhagique on en trouva un grand nombre qui étaient très-petits et constituaient cette forme d'apoplexie à laquelle on a donné le nom de capillaire; de sorte, dit M. Valleix, que l'on retrouve chez les nouveau-nés toutes les formes de l'hémorrhagie cérébrale.

Ce n'est point à cette maladie que se rapporte celle qui a été décrite par les accoucheurs sous le nom d'apoplexie des nouveau-nés; celle-ci est une hémorrhagie des cavités séreuses de l'encéphale. Elle est infiniment plus fréquente que toutes les autres espèces d'hémorrhagies, et souvent on l'a confondue avec l'asphyxie des nouveau-nés.

M. Cruveilhier a fait à la Maternité de nombreuses recherches sur cette affection qu'il regarde comme la cause de la mort de plus d'un tiers des enfants qui succombent peu avant ou pendant le travail de l'accouchement. Il n'est pas toujours facile d'en déterminer la cause. Souvent elle semble n'être qu'une conséquence directe de l'état apoplectique ou, pour mieux dire, pléthorique, dans lequel se présentent certains enfants au moment de la naissance. Or, on sait que cette pléthore s'observe non-seulement après des accouchements longs et pénibles,

mais aussi après un travail prompt et facile. On se l'explique en pareil cas, soit par la compression du cordon ombilical, soit par celle du cœu qu'exerce le cordon, ou parfois l'effluve du col jectérin. S'il est facile alors de se rendre compte de l'hémorrhagie, il n'en est pas ainsi lorsqu'elle se déclare après le premier jour de la naissance, et que la respiration paraît bien établie. M. Valleix raconte un cas de ce genre ; et voici comment Desormeaux s'exprime à ce sujet : « L'état que nous venons de décrire (l'état apoplectique) se renouvelle quelquefois ou même se développe pour la première fois après que la respiration s'est établie. Je l'ai vu survenir, sans cause appréciable, le lendemain de la naissance ; quelquefois alors il reconnoît pour cause quelque obstacle apporté au cours du sang à travers le pœumon ; et, en effet, toutes les fois que l'enfant pousse des cris violents et prolongés, la face se tuméfie et prend une couleur violacée ou bleuâtre prononcée surtout autour des lèvres ; les pieds et les mains présentent aussi la même couleur, etc. (1). »

Dans l'apoplexie des nouveau-nés on trouve la cavité de l'arachnoïde occupée par un épanchement de sang liquide coagulé en partie, formant une couche plus épaisse dans les parties déclives, c'est-à-dire autour du vervelet et des lobes cérébraux postérieurs. On ne peut jamais ou presque jamais découvrir les déchirures des veines superficielles que l'on pourrait présumer avoir fourni le sang épanché, et l'on doit admettre qu'il a été exhalé goutte à goutte. Les ventricules sont plus rarement le siège de l'épanchement ; mais presque toujours M. Cravellhier a vu la dure-mère rachidienne distendue par du sang liquide, contenu à la fois et dans la cavité de l'arachnoïde et dans l'espace sous-arachnoïdien. Ces épanchements sont souvent accompagnés de céphalématome, d'ecchymoses dans le pœumon, dans le thymus et dans d'autres organes, c'est alors aussi qu'on rencontre des hémorrhagies dans les voies digestives et surtout des engorgements sanguins du

(1) *Proc. de méd.*, T. VII, p. 30, p. 121.

foie, de la rate, etc. La coïncidence de ces lésions prouve que l'hémorrhagie méningée est de même nature et dépend de la même cause, savoir, la pléthore.

On conçoit très-bien l'enchaînement des effets qui résultent de cet état pléthorique général. Le trop plein du système sanguin ne peut se verser dans le placenta avec lequel l'enfant ne communique plus ; d'un autre côté, la respiration qui dégorgerait le système, si elle avait lieu, ne peut entrer en exercice parce que la compression du cerveau paralyse l'action des muscles et en particulier celle des muscles respirateurs. Dans quelques cas où cette paralysie n'existe point encore, l'obstacle à la respiration peut venir d'une accumulation de mucus dans la bouche, le nez, les voies aériennes, ou de quelque autre circonstance analogue. Quoi qu'il en soit, la turgescence veineuse qui produit la compression du cerveau et par suite la paralysie de la poitrine, tend à persister à son tour sous l'influence de ces deux conditions, en sorte que ces trois phénomènes, pléthore, congestion cérébrale, asphyxie, sont réciproquement cause et effet l'un de l'autre. Or c'est au plus haut degré de cet état que s'accomplissent les hémorrhagies.

La pléthore du nouveau-né, ou, pour parler le langage des auteurs, l'état apoplectique est facile à reconnaître. La peau de tout le corps, surtout celle du visage et de la partie supérieure du tronc, offre une teinte violacée, diffuse, parsemée de taches bleues ; la tête est tuméfiée et chaude ; les lèvres sont violettes, gonflées et renversées ; les yeux sont saillants ; la langue, gorgée de sang, remplit la bouche et reste collée au palais ; toutes les muqueuses extérieures sont visiblement congestionnées comme la peau. On remarque une bouffissure générale, sensible surtout à la face ; les chairs sont fermes, mais les muscles sont sans action ; tout le corps est immobile ; les battements du cœur, d'abord forts et durs quand la pléthore est très-récente, deviennent graduellement moins étendus, plus concentrés, encore durs, puis tard enfin faibles et inappréciables ; le cordon est gorgé de sang et donne des

pulsations dont les caractères correspondent aux divers états du cœur que nous venons d'indiquer.

Lorsque cet état pléthorique est très-intense, la mort arrive promptement s'il n'est convenablement combattu. Lorsqu'il n'est pas rapidement mortel, qu'il est reconnu et combattu à temps, il est ordinairement peu grave, et cède rapidement à un traitement rationnel. Mais si déjà il y a épanchement de sang dans la substance de l'encéphale, ou plus ordinairement dans ses cavités séreuses internes ou externes, la gravité augmente, et il est probable que peu d'enfants réviennent de cet état.

Les signes spéciaux de l'épanchement sont fort incertains et ressemblent à ceux d'une simple congestion. On doit cependant soupçonner son existence lorsque, la pléthore générale ayant disparu spontanément ou par les secours de l'art, on voit les symptômes de la compression encéphalique persister. Il est très-probable que s'il n'y avait eu que congestion, celle-ci aurait disparu avec l'état général, et que les symptômes cérébraux auraient cessé; puisqu'ils persistent, c'est qu'ils tiennent à une lésion plus profonde, c'est-à-dire, à une apoplexie. Il serait important d'avoir les éléments d'un diagnostic exact, car le pronostic et le traitement varient un peu suivant les circonstances.

Lorsqu'on a affaire à la pléthore générale, l'indication est précise, c'est de faire cesser la compression du cerveau et l'engorgement des poumons. On y parvient en coupant promptement le cordon ombilical et en le laissant saigner pendant quelques instants. En général, dès qu'il s'est écoulé un peu de sang, la respiration s'établit, la teinte asphyxique de tout le corps diminue et disparaît, l'enfant exécute des mouvements, etc. Si des mucosités obstruent l'arrière-bouche, on a soin de les enlever avec le doigt.

La circulation est quelquefois tellement affaiblie, ou plutôt le système artériel s'est si complètement vidé dans le système veineux que les artères ombilicales ne versent pas de sang. On exprime alors entre deux doigts le cordon depuis son insertion jusqu'au lieu de sa section, ou mieux encore, on en renouvelle la section sur un point plus rap-

prochë de l'ombilic; on peut aussi favoriser l'effusion du sang en plongeant le nouveau-né dans un bain tiède. Si aucun de ces moyens ne réussit, on applique une sangsue au bas de chaque oreille, ou bien même on ouvre la veine jugulaire.

Lorsqu'après la disparition de l'état pléthorique général et l'établissement de la respiration, on voit persister un état comateux, l'immobilité et la résolution des membres, la diminution ou l'abolition de la sensibilité, il est rationnel de croire à l'existence d'une hémorrhagie intra-crânienne. On a vu quelquefois, en particulier dans un cas rapporté au long par M. Valleis, cette maladie déterminer des convulsions. Mais ce médecin fait remarquer avec raison que les faits de ce genre ne sont point encore assez nombreux pour mettre hors de doute le rapport de cause à effet entre les convulsions et l'hémorrhagie méningée, et ce cas rentre peut-être dans ce que nous avons dit ailleurs de certaines éclamptiques, qui coïncidant avec des lésions matérielles appréciables des centres nerveux, ne s'expliquent point complètement par elles, n'en sont pas un véritable symptôme, mais conservent quelque chose de la nature des convulsions idiopathiques ou essentielles.

Le traitement de l'apoplexie méningée ne comporte l'usage des émissions sanguines qu'autant que la pléthore générale n'a point disparu ou qu'il paraît rester encore une hyperémie de l'encéphale. En l'absence de ces indications, il faut agir par des révulsifs cutanés et même intestinaux pour empêcher le travail consécutif à l'hémorrhagie de dégénérer en une phlogose aiguë. Les topiques rubéfiants et vésicants, quelques laxatifs et des diurétiques doux favoriseront la résorption du sang épanché, l'organisation du kyste autour du caillot, et l'on pourra, dans quelques cas heureux, voir les enfants se relever et guérir d'une maladie toujours très-grave.

Les hémorrhagies du rachis qui surviennent chez le nouveau-né, ont été dans ces dernières années l'objet de quelques recherches intéressantes. Ces travaux, s'ils n'ont pas fixé l'état de la science sur la maladie que les auteurs ont ap-

pelée *tétanos des nouveau-nés*, ont au moins ajouté quelque chose à nos connaissances jusqu'ici fort incomplètes sur ce sujet.

Cette maladie est rare et fort peu connue en France. « Je ne connais, dit Billard, aucun fait propre à éclairer son histoire; elle se rencontre bien plus rarement dans nos climats que dans les pays chauds où elle fait périr un grand nombre d'enfants. Je ne puis me prononcer ni pour ni contre les opinions émises par les auteurs sur cette maladie; je n'ai observé que deux cas de *tétanos* sur les enfants naissants; ils étaient caractérisés par la rigidité assez prononcée de la colonne vertébrale, et surtout par le trismus. Je n'ai trouvé qu'un épanchement de sang très-abondant et coagulé dans le rachis; ce sang était exhalé entre les deux feuillets de l'arachnoïde, et remplissait le canal médullaire depuis la moelle allongée jusqu'à la région sacrée. Les symptômes tétaniques étaient-ils dus à cette hémorrhagie rachidienne? je serais porté à le croire (1). »

M. Valleix dans sa clinique a complètement passé sous silence le *tétanos des nouveau-nés*.

C'est qu'en effet cette maladie paraît extrêmement rare dans notre pays, et n'a pu encore y être complètement étudiée. Aussi nous reste-t-il beaucoup d'incertitude sur sa nature. Est-elle identique au *tétanos des adultes*? Est-elle comme celui-ci essentielle, tout à fait étrangère à nos besoins matériels de la vie ou liée à nos besoins matériels de la vie? Tout nous porte à croire que ces deux espèces de *tétanos* se rencontrent chez les nouveau-nés; mais la démonstration n'en sera acquise qu'après des recherches ultérieures. L'existence du *tétanos essentiel* demande de nouvelles observations pour n'être plus contestée.

Quant au *tétanos symptomatique de l'hématorachis*, Ollivier, d'Angers, qui a clairement démontré son existence chez l'adulte (2), ne doute point de son identité,

(1) Page 638 et suiv.

(2) *Traité des Maladies de la moelle épinière*, etc., 3^e éd., tom. II, pag. 161-156, obs. 82, 84, 85, 86, 87.

dans la plupart des cas, avec celui des nouveau-nés. Il rappelle à ce sujet que Abercrombie (1) a vu chez un nouveau-né, qui succomba le quatrième jour de sa naissance, après avoir été affecté de spasmes tétaniques et de trismus, un long caillot sanguin qui occupait toute l'étendue du canal rachidien et qui était placé entre les lames vertébrales et la face postérieure de la dure-mère.

Le tétanos des nouveau-nés a été récemment étudié par M. Matasinski (?), qui a recueilli la plupart de ses observations à l'hôpital de Stuttgart. Sur huit cent quarante-huit enfants reçus dans cet établissement, de 1828 à 1833, le tétanos a été observé vingt-cinq fois, ce qui fait environ un sur trente-quatre. D'après les travaux du docteur Finck, il paraît certain que cette maladie s'observe beaucoup plus souvent dans le midi de l'Allemagne que dans toute autre contrée de l'Europe. A St-Pétersbourg, Doepp ne l'a observée que vingt fois sur quarante-cinq mille enfants trouvés.

Sur vingt sujets qui ont été ouverts, le docteur Matasinski a trouvé seize fois un liquide à demi coagulé dans le canal rachidien, entre la dure-mère et les lames vertébrales; dans quelques cas, l'épanchement était borné à l'une des régions cervicale, dorsale ou lombaire; chez plusieurs, la couche de sang coagulé, partout également épaisse, séparait les membranes rachidiennes dans toute leur circonférence du canal osseux; la dure-mère était saine à l'exception d'un ou deux cas où elle était rouge et épaissie; même état de l'arachnoïde; la pie-mère était presque constamment très-injectée, parfois épaisse; deux fois la moelle était très-rouge, une seule fois ramollie, une autre fois indurée, saine dans tous les autres cas.

Il y avait à peu près constamment épanchement dans le crâne, occupant de préférence le tissu cellulaire sous-arachnoïdien, les ventricules et les plexus choroïdes. A part une injection plus ou moins intense, les membranes

(1) Des Maladies de l'encéphale et de la moelle épinière, etc. 1821.

(2) *Ger. med.*, 1837, p. 328.

du cerveau ne présentaient rien de remarquable; le cerveau était généralement sain.

On n'a rien trouvé d'important dans les autres organes; les artères et la veine ombilicale ne présentaient aucune altération.

D'après tout ce qui précède on voit la plus grande analogie entre l'apoplexie méningée encéphalique et l'hématorachia, avec cette seule différence que dans celle-ci le sang est quelquefois épanché entre la dure-mère et les os; en qui n'arrive jamais dans la première.

M. Matsusinkî a fait tous ses efforts pour assimiler, sous le rapport des causes, le tétanos des nouveau-nés au tétanos traumatique qui s'observe à tout âge. Suivant lui, c'est à la plaie de l'ombilic consécutive à la chute du cordon et à l'action du froid qu'il faut attribuer la maladie. Cette opinion ne nous paraît point suffisamment démontrée. Chez l'adulte l'existence d'une blessure mise à l'action du froid produit un tétanos presque toujours nerveux, c'est-à-dire indépendant de l'hématorachia; chez le nouveau-né cette hémorrhagie est la lésion primitive, et il ne paraît pas aisé de comprendre son développement sous l'influence de la plaie ombilicale et du froid; il semblerait plus simple de s'expliquer l'hémorrhagie rachidienne par les mêmes causes que nous avons assignées à celle des méninges encéphaliques. Quoi qu'il en soit, il est vrai de dire que souvent on a constaté l'inflammation de l'ombilic avant le début du tétanos, et que l'hiver est la saison la plus favorable au développement de cette maladie, puisque sur les vingt-cinq cas cités par le médecin de Stuttgart, trois seulement ont eu lieu dans la belle saison, tous les autres ont été observés dans les mois de janvier, février, mars et avril.

Le début a lieu ordinairement dans la première semaine par des prodromes peu caractéristiques, tels que les cris, l'agitation, le réveil en sursaut; les paupières restent entr'ouvertes pendant le sommeil. M. Matsusinkî dit que les cris reviennent périodiquement et ont un caractère particulier, mais il omet de les décrire. L'enfant s'agit

évidemment le vomissement et le laïme échapper aussitôt; la miction devient difficile, impossible. Il y a toujours dérangement des voies digestives, éructations, vomissements ou flatuosités et dévoiement de matières verdâtres.

Bientôt les symptômes se produisent de plus en plus; la face exprime la souffrance, elle est contractée, grimpée; le trismus, d'abord faible et intermittent, devient plus intense et continu; la langue est raide, le spasme gagne ensuite les muscles du cou et du tronc et détermine le plus souvent l'opisthotonos. Dans cet état l'enfant paraît par moments tranquille et endormi, ayant la respiration libre, quoique accélérée, la figure pâle; mais dans d'autres moments, il est agité de convulsions violentes, il pousse des cris; la respiration est gênée, la face rouge, les conjonctives injectées, les lèvres couvertes de mousse. Les intervalles qui séparent les crises deviennent de plus en plus courts et les convulsions tétaniques finissent par être permanentes. L'impression de la lumière, du bruit, le contact d'un corps étranger, suffisent pour redoubler leur intensité. Quand cet état a duré une demi-journée ou une journée au plus, l'enfant tombe dans le collapsus; l'amaigrissement est extrême, la face pâle et bleuâtre, le pouls insensible, la respiration devient stertoreuse, la déglutition impossible, et l'enfant meurt dans une prostration complète. Dans la dernière période il y a quelquefois un état fébrile, et on constate souvent une chaleur sèche dans la région dorsale pendant que les extrémités sont glacées.

Parmi les nouveau-nés comme parmi les adultes, quelques sujets sont trop faibles pour dépasser la période du trismus. Enfin souvent on observe l'arrêt du travail de cicatrisation de l'ombilic. La surface de la plaie s'enflamme, se fétide et fournit une mauvaise suppuration.

Fréquemment la jaunisse survient avant l'invasion du tétanos ou pendant son cours.

La durée de la maladie varie ordinairement entre 36 et 56 heures. M. Malucinski l'a vue durer quinze fois moins de 20 heures, cinq fois 3 jours, deux fois 5 jours; dans

un cas une semaine, dans un autre 9 jours; et enfin une seule fois 31 jours.

« C'est une chose assez triste dans l'histoire du diagnostic, dit ce médecin, que les maladies souvent les plus faciles à reconnaître sont celles qui admettent le moins de chances de guérison. Le téanus des nouveau-nés en est un exemple. Le cri caractéristique des enfants, la face grimpée, le trismus, les contractions des membres, et surtout la coïncidence de ces phénomènes avec l'inflammation et la suppuration de l'ombilic, suffisent pour ôter toute espèce de doute sur la présence de cette affection. »

Quant au pronostic, il est extrêmement fâcheux. Rien n'est plus rare que la guérison de cette redoutable maladie qui fait de grands ravages aux Antilles et en général dans tous les pays chauds.

L'insuffisance de la thérapeutique est ici déplorable. Les uns préfèrent les émissions sanguines, les autres les antispasmodiques. Ces deux médications ont également échoué dans tous les faits observés à Stuttgart; les antispasmodiques, et surtout le musc, ont paru seulement prolonger la vie des malades un peu plus longtemps que les autres moyens.

Cependant, suivant Ollivier, d'Angers, les altérations cadavériques sont tellement caractéristiques, l'indication est tellement évidente, qu'il faut toujours recourir, dès le début, aux émissions sanguines locales, soit sur le rachis, soit aux apophyses mastoïdes quand il n'y a encore que trismus. Peut-être le peu de succès qu'on a retiré des saignées locales vient-il de ce qu'on a craint de tirer une trop grande quantité de sang chez des enfants si jeunes. M. Ollivier pense que les ventouses scarifiées sont préférables aux saignées.

Nous avons exposé l'opinion de M. Matassinski qui accorde une grande influence à l'inflammation de l'ombilic et à l'action du froid sur le développement du téanus. Quoiqu'elle ne soit pas, suivant nous, parfaitement démontrée, comme elle n'est pas dénuée de vraisemblance, on doit dans la pratique de tous les jours veiller avec soin

à ce que la cicatrisation de la plaie ombilicale ne soit point entravée par une inflammation et s'opère à l'abri d'une température froide et humide. Si ces précautions constituent réellement un traitement prophylactique, on en comprend d'autant mieux l'importance, que la maladie, une fois développée, est ordinairement rebelle à toutes les ressources de l'art.

CHAPITRE II.

INFLAMMATION ET HYDROVIES ENCÉPHALO-RACHIDIENNES.

Considérée d'une manière générale et comparée chez les enfants et les adultes, l'inflammation des organes encéphalo-rachidiens présente plusieurs différences importantes, relatives à son siège et à sa nature.

Quant au siège, rien n'est plus rare chez les enfants que l'inflammation franche et primitive de la substance cérébrale; chez eux l'encéphalite proprement dite, diffuse ou circonscrite, telle en un mot qu'on la rencontre aux autres âges, ne s'observe presque jamais. Les traces de phlogose qu'on trouve assez souvent dans la pulpe nerveuse à l'ouverture des cadavres coïncident presque toujours avec la méningite et lui paraissent consécutives; de telle sorte qu'on peut rattacher tout ce qu'il y a à dire de l'inflammation des centres nerveux à celle des méninges. Celle-ci, au contraire, se rencontre fréquemment, et si elle n'est point spéciale au premier âge, elle rentre au moins dans la catégorie des maladies que leur fréquence à cette époque de la vie nous oblige de débiter avec tous les développements convenables. D'ailleurs elle se recommande plus spécialement encore à notre attention par sa nature.

La méningite telle qu'elle s'observe en général à tous les âges, c'est-à-dire, simple, primitive et franchement inflammatoire, n'offre rien de particulier dans l'enfance; elle est même, suivant certaines probabilités,

plus rare à cette époque qu'à un âge plus avancé. Si au contraire on considère à part cette espèce de méningite dans laquelle prédomine l'exhalation séreuse arachnoïdienne ou ventriculaire, et celle qui se caractérise par des lésions d'origine tuberculeuse, on ne tarde pas à se convaincre que ces deux espèces demandent, par leur plus grande fréquence chez les enfants, une étude particulière. Nous consacrerons par conséquent un article spécial à l'Hydrocéphale aiguë, en y rattachant les considérations dont la méningite aiguë simple peut être l'objet; dans un second article nous traiterons de la méningite aiguë tuberculeuse avec tous les développements qu'exige cette maladie, l'une des plus importantes qu'on observe dans l'enfance; enfin nous parlerons dans un troisième article de la méningite et de l'hydrocéphale chroniques.

Le ramollissement cérébral qui s'observe chez les adultes et surtout chez les vieillards est une affection presque étrangère à l'enfance. Nous n'en connaissons aucun exemple bien positif. Ce n'est pas que le ramollissement de la pulpe nerveuse ne se rencontre chez un certain nombre de jeunes sujets, mais alors il est à peu près constamment un effet secondaire soit de l'inflammation de la pie-mère, soit d'un épanchement ventriculaire, soit des tumeurs tuberculeuses, et sa description se rattache entièrement à celle de ces diverses maladies.

Nous avons observé quelques faits qui offraient quelques circonstances spéciales sans faire toutefois une exception absolue à ce que nous venons de dire, puisqu'on trouve en même temps les traces d'une méningite tuberculeuse aiguë. Mais le ramollissement offre des caractères anatomiques et, chez deux malades, des symptômes différents de ceux qui appartiennent aux méningites ordinaires. Dans le premier cas rapporté ailleurs (L. I, p. 322), à cause de l'intérêt qu'il présentait sous d'autres points de vue, il existait dans une petite étendue du noyau de l'hémisphère cérébral droit, au voisinage de la corne sphénoïdale du ventricule latéral, un ramollissement jaune serin très-bien caractérisé. Aucun symptôme n'avait pendant la

rie paru en rapport avec cette lésion circonscrite, qui, vu l'importance des autres lésions propres à la méningite tuberculeuse coïncidente, n'offrait aucune valeur. Il n'en fut pas de même dans deux autres cas dont nous nous contenterons de donner une courte analyse.

Un enfant de sept ans, faiblement constitué, dont quatre frères ou sœurs étaient morts de convulsions, malade depuis trois mois à la suite d'une coqueluche intense, ayant beaucoup maigri, entra à l'hôpital des Enfants, le 24 août 1826. Depuis huit jours il se plaignait de mal à la tête et de constipation; le bras et la jambe gauches avaient perdu leur force, et dans ce court espace de temps la faiblesse était devenue presque une hémiplegie. Outre ces symptômes, nous constatâmes une affection tuberculeuse du thorax. Le pouls était peu fréquent, l'enfant poussait par moments des cris sans cause appréciable. Les jours suivants il y eut quelques vomissements, de l'assoupissement, une grande irrégularité dans le pouls. L'hémiplegie fut bientôt complète et étendue à la face. Le 29 août survinrent des mouvements convulsifs dans les muscles extrinsèques de la langue et du larynx, et le lendemain une attaque de convulsions dans tout le côté droit, avec abolition de l'intelligence; la sensibilité nulle à gauche (était très-diminuée à droite; les sens avaient perdu toute impressionnabilité. La mort survint huit heures après le début de l'éclampsie. A l'autopsie nous ne trouvâmes point d'épanchement ni en dehors ni au dedans du cerveau, il y avait une injection générale des vaisseaux de la surface de l'encéphale. Dans beaucoup de points la méninge viscérale présentait des traces d'inflammation récente et des granulations tuberculeuses. L'hémisphère gauche était sain, mais le noyau blanc de l'hémisphère droit était tellement ramolli qu'en touchant la substance nerveuse elle restait attachée au doigt comme de la crème, et que le moindre frottement d'eau la faisait tomber en deliquium; agitée en petite quantité avec l'eau, elle lui donnait l'apparence d'une émulsion. Le tissu cérébral ainsi ramolli était d'un jaune serin clair. Ses vaisseaux n'étaient point injectés; nulle part il n'y

avait d'épanchement sanguin. La surface des ventricules était saine. Tubercules nombreux et à tous les degrés dans les poumons, les ganglions lymphatiques du thorax et de l'abdomen, dans le foie, la rate, le péritoine.

Nous voyons dans cette observation un exemple remarquable d'hémiplégie et d'éclampsie compliquant une méningite tuberculeuse, dont on retrouve les lésions anatomiques à l'autopsie et les principaux symptômes pendant la vie. L'hémiplégie fut graduelle et par là essentiellement différente de celle qui reconnaît pour cause une hémorragie dans l'un des hémisphères. Le ramollissement qui en fut évidemment la cause avait pour siège précis la portion de substance blanche qui réunit la paroi supérieure du ventricule latéral avec l'inférieure, en dehors du corps strié et de la corne optique, et se prolongeait en arrière vers le corpus geniculatum externum. La couleur jaune du tissu ramolli nous fit penser que l'altération était de nature inflammatoire, ou qu'au moins elle avait eu pour origine, soit une congestion, soit même une hémorragie capillaire. Quant à l'éclampsie, on ne peut l'expliquer que par une congestion générale de l'encéphale survenue comme un effet secondaire des autres lésions concomitantes, ou par une perturbation simplement fonctionnelle de cet organe, laquelle n'a laissé que des traces peu appréciables à l'ouverture du cadavre.

Ce fait nous en rappelle un fort remarquable rapporté par Constant, (1) qui en diffère en ce que l'éclampsie ne vint pas compliquer la maladie primitive, mais qui, sous les autres rapports, offre beaucoup d'analogie. Chez une fille de onze ans, on observa, pendant deux mois, quelques symptômes cérébraux, de la toux, de la diarrhée; après ce temps les accidents nerveux augmentèrent, une hémiplégie qui devint rapidement complète se manifesta à droite, le coma et tous les symptômes ordinaires d'une méningite entraînèrent la petite malade. L'état aigu avait duré six à sept jours. On trouva toutes les traces d'une

(1) *Obs. méd.*, 1836, p. 521.

méningite tuberculeuse occupant spécialement la base du cerveau. Lorsqu'on voulut détacher les membranes de la base du lobe moyen gauche on entraîna des portions de substance cérébrale ramollie et ayant l'apparence de la pulpe de certaines poires cuites. En incisant plus profondément ce lobe, on trouva sa portion blanche également réduite en une bouillie d'un beau jaune vermillon, quelques petits caillots du volume d'une lentille étaient contenus dans la portion ramollie.

Avec Constant nous n'hésitons pas à voir dans ce cas un ramollissement de nature inflammatoire. Si la mort eût été moins prompte, le sang rassemblé en petits caillots aurait pu être résorbé ou se combiner avec la pulpe devenue ramollie, et alors on aurait trouvé un simple ramollissement jaune sans épanchements sanguins comme dans l'observation que nous avons recueillie. M. Lallemand a démontré que ce genre de ramollissement cérébral peut être considéré comme une inflammation.

Nous ne pensons pas qu'il en soit de même pour un autre exemple de ramollissement qui nous a été fourni par un enfant âgé seulement de trois ans, admis à l'hôpital le 14 mai 1828. Depuis huit jours il avait de la constipation, des vomissements opiniâtres, mal à la tête et une envie continuelle de dormir. Pendant trois jours il ne nous présenta que ces symptômes et quelques autres dérangements de la santé moins importants. Examené par sa mère, il fut ramené deux jours après, dans un état beaucoup plus grave, que nous trouvons dans nos notes décrit de la manière suivante :

Les deux premiers jours la mère a donné à son enfant des aliments copieux et indigestes qu'il a tous vomis ; il a cessé de parler, a peiné le regard fixe, sa physionomie s'est altérée, l'amaigrissement a fait des progrès rapides.

État actuel le 19 mai. L'état du malade est très-difficile à dépeindre ; celui avec lequel il a le plus d'analogie est une extase profonde sans production d'actes. Soit qu'on le tiennne sur les bras, assis ou couché dans son lit, l'enfant a les yeux largement ouverts, dirigés en face de lui,

comme fixés sur un objet qu'ils semblent ne pas voir; rien ne peut le détourner de cette espèce de contemplation, ni le bruit, ni l'interposition de quelque objet qu'on approche de ses yeux; le clignement s'exécute de loin en loin et souvent d'une manière incomplète, de sorte que la partie inférieure de la cornée est sèche et lerne. Il est très-difficile de s'assurer si le malade voit, car il ne suit point du regard les objets brillants que l'on promène devant lui; pupilles immobiles, médiocrement et également dilatées des deux côtés. L'ouïe n'est pas abolie, car un bruit violent aux oreilles du malade lui fait cligner les yeux et quelquefois le fait s'agiter dans son lit, mais ce semblerait suspendu comme celui de la rue par un travail intellectuel tout intérieur. La sensibilité cutanée est plus irritable; le pincement arrache peu de plaintes, mais le malade s'y soustrait en retirant le membre comme une personne qui méprise la douleur et dédaigne de se plaindre. Il reste presque constamment immobile, mais il n'a ni paralysie, ni contractures, ni convulsions, ni strabisme, ni malchanceusement. Quand on lève un membre il retombe lentement; parfois il reste en l'air pendant quelques secondes comme dans la catalepsie. D'après l'expression du faciès il semble que l'intelligence n'est point abolie, mais qu'elle a perdu tout rapport avec le monde extérieur. Le malade ne parle point spontanément, ne répond à aucune question; si on le dérange, il ne témoigne de l'impatience que par ses gestes qui offrent une certaine vivacité. La nuit, l'état du malade reste le même, les yeux ne se ferment point, pas d'agitation; le pouls est fréquent, de 110 à 120, la peau un peu chaude. L'enfant ne demande ni à manger, ni à boire; quand on lui donne à boire il avale bien; il a encore vomis ce matin; pas de selles; menses naturelles; amaigrissement déjà très-prononcé.

Les deux jours suivants, on suit à vue d'œil les progrès du marasme qui devient extrême; le pouls devient irrégulier monte à 140. Les symptômes cérébraux conservent leur même physionomie et ne font que s'aggraver; la mort arrive le 22 mai sans nouveaux phénomènes.

Voici ce qui fut remarqué à l'ouverture du cadavre : sérosité assez abondante à la base du crâne; la tête étant renversée en arrière sur le billot, il se fait à l'extrémité postérieure de l'hémisphère droit une perforation qui laisse écouler près de cent grammes de sérosité venant des ventricules où on en trouve encore une trentaine de grammes. La substance blanche en contact avec le liquide, sur toute la surface ventriculaire offre une diminution de consistance qui n'a rien d'extraordinaire; les couches optiques et les corps striés, là où la substance blanche est entremêlée de substance grise, ont une consistance assez normale, mais à la sortie de ces corps les fibres nerveuses sont ramollies et réduites presque à l'état liquide; le même ramollissement occupe tout le centre ovale aux deux hémisphères, et se prolonge en diminuant jusque dans la lame blanche centrale de chaque circonvolution. Dans cet état la pulpe nerveuse est comparable à de la crème délayée dans une petite quantité d'eau, ou plutôt à un lait de chaux par l'éclat de sa blancheur. Au milieu de ce détritus on ne trouve ni injection, ni épanchement de sang. Ce vaste ramollissement qui occupe presque toute la partie blanche du cerveau est plus prononcé dans les lobes antérieurs que dans les postérieurs. La substance grise des circonvolutions n'est point ramollie. Dans les méninges de la base du cerveau et dans beaucoup d'anfractuosités on trouve les traces d'une inflammation récente, mêlées de granulations tuberculeuses. Le cervelet renferme un tubercule du volume d'une noisette. On trouve, soit des granulations miliaires, soit des tubercules caséiformes dans les poumons, dans les ganglions bronchiques et mésentériques, dans le foie, l'intestin grêle, le péritoine, etc.

Lorsque nous aurons tracé le tableau des symptômes de la méningite on verra plus clairement combien ce cas diffère de ceux qu'on observe ordinairement. Dès à présent nous pouvons faire remarquer que les troubles de la motilité et ceux de l'intelligence surtout ont revêtu un aspect tout particulier. La céphalalgie, le vomissement et la constipation ont annoncé le début comme dans les cas ordinairement.

rea; mais bientôt il a été impossible de rapporter les symptômes cérébraux au type de la méningite, et le vaste ramollissement constaté à l'autopsie paraît avoir éclipé en partie les effets de la phlegmasie méningée. Le ramollissement examiné sur le cadavre n'a présenté aucun des caractères qu'il revêt quand il est de nature inflammatoire. Cette circonstance nous conduisit d'abord à penser que peut-être il n'était qu'un phénomène cadavérique dû à l'imbibition de la substance cérébrale par le liquide ventriculaire; mais l'analyse des symptômes et le ramollissement plus prononcé des lobes antérieurs, quoique le sujet eût été couché sur le dos dans l'intervalle de la mort au moment de l'autopsie, ne nous a pas permis de ne voir là qu'un phénomène de macération cadavérique, et nous pensons avoir eu affaire dans ce cas à un de ces ramollissements blancs idiosyncrasiques dont la nature est encore si peu connue.

Nous nous bornerons à la citation de ces deux faits et aux courtes remarques dont nous en avons fait l'objet. La plupart des cas plus ou moins analogues racontés par les auteurs l'ont été avec trop peu de détails pour nous permettre un rapprochement dont on puisse tirer quelques conséquences générales. Espérons que de nouveaux faits jetteront quelques lumières sur ce sujet.

La myélite est une maladie non moins rare dans l'enfant que l'encéphalite proprement dite. Nous ne croyons point nécessaire par conséquent d'en tracer ici la description.

ARTICLE I.

MÉNINGITE ET HYDROCÉPHALE AIGUES SIMPLES.

La maladie connue sous le nom de fièvre cérébrale, d'hydrocéphale aiguë, d'arcanitis, de méningite aiguë, etc., a été l'objet d'un nombre incalculable de monographies, de mémoires, de thèses, d'articles de dictionnaire. L'analyse de tant de travaux serait une œuvre immense,

mais aussi stérile que fastidieuse. Ce qui peut attirer l'attention d'un bibliographe n'offre souvent qu'un médiocre intérêt au pathologiste qui tient plutôt compte des progrès accomplis que des effets qu'ils ont coûtés.

C'est aux progrès récents de l'anatomie pathologique qu'est due la distinction importante des méningites ou hydrocéphales en simples et en tuberculeuses. Les travaux antérieurs à notre époque n'en offrent que des vestiges, et c'est à peine si quelques auteurs avaient entrevu l'influence de la cachexie tuberculeuse sur le développement et la terminaison constamment fatale du plus grand nombre des affections cérébrales aiguës. Ainsi ne peut-on maintenant baser la description de ces maladies que sur les recherches les plus récentes, et ce serait presque sans aucun avantage que l'on consulterait sur ce sujet la plupart des ouvrages du temps passé.

Des observations déjà fort nombreuses, mais dont les plus anciennes ne remontent pas au-delà d'une quinzaine d'années, ont démontré que la méningite tuberculeuse est infiniment plus fréquente chez les enfants que la méningite simple, et que c'est à la première qu'il faut rattacher la plus grande partie de ce qui a été écrit dans tous les temps sur les inflammations et les hydropisies des centres nerveux. Elles nous ont fait connaître les caractères anatomiques de cette maladie, ses causes, ses symptômes, sa marche et sa terminaison, et leur ensemble nous permet aujourd'hui d'en donner une description générale. Enfin elles ont assigné à la méningite et à l'hydrocéphale aigües simples le degré d'importance qu'il faut leur accorder dans un traité de pathologie infantile. Or, disons-le sans hésiter, cette importance est beaucoup moindre qu'on n'était généralement porté à le penser. Qu'on lise les mémoires de MM. Buhl, Foë, Gerhard, on verra que sur différentes catégories de faits s'élevant chacune à une vingtaine de cas environ, à peine en est-il un ou deux dans lesquels la méningite ait été non tuberculeuse. Sur dix-sept ouvertures cadavériques M. Ecoquerel n'a constaté qu'une fois l'existence d'une méningite simple, et nous

même, en ne consultant que celles de nos observations dans lesquelles l'autopsie a été faite, nous ne trouvons sur près de trente faits que quatre cas de méningite non tuberculeuse. Dans trois autres cas suivis de guérison nous croyons avoir eu affaire à une méningite simple. On voit par ces faits que cette maladie n'appartient réellement point au jeune âge par sa fréquence. M. Guersant professe formellement cette opinion. « Il résulte, dit-il, des relevés que j'ai fait faire plusieurs années de suite à l'hôpital que, sur les enfants de deux à quinze ans, la proportion de la méningite simple par rapport à la méningite tuberculeuse est tout au plus comme deux est à douze; passé l'époque de la puberté, la méningite simple redevient plus fréquente, c'est surtout de seize à quarante-cinq ans que cette maladie se rencontre le plus ordinairement à l'état aigu (1). »

Les enfants à la naissance sont plus souvent affectés de méningite simple que les sujets d'un à quinze ans sur lesquels portent les relevés et les remarques précédentes; on, de moins, la fréquence de cette maladie est plus prononcée comparativement à celle de la méningite tuberculeuse. C'est à elle que se rapportent les exemples de la méningite dont Billard parle dans son ouvrage, et quelques autres présentés, soit par Abercrombie, soit par MM. Parent et Martin. M. Guersant en a observé plusieurs, et M. Baron, médecin de l'asile des Enfants trouvés, rencontre assez souvent la méningite simple, tandis qu'il n'observe presque jamais la méningite tuberculeuse chez les enfants du premier âge.

D'après tout ce qui précède, nous pensons que ce ne sera point laisser une lacune dans cet ouvrage que de ne pas y donner la description complète de la méningite simple. D'ailleurs, pour y suppléer, il suffirait de séparer, dans l'histoire de la méningite tuberculeuse, tout ce qui se rattache à l'élément tuberculeux de ce qui concerne l'élément phlegmasique; car cette maladie résulte de l'alliance de

(1) *Id.*, de méd., 2^e éd., t. III, p. 411.

ces deux éléments morbides. Que dans l'anatomie pathologique on fasse abstraction de ce que nous dirons des granulations méningiennes; que dans l'étiologie on n'ait pas égard aux circonstances qui agissent sur le développement des tubercules, et qu'on fasse jouer un plus grand rôle aux causes directes d'inflammation, on connaîtra parfaitement les caractères anatomiques et les causes de la méningite simple. Quant à ses symptômes, il est impossible de les décrire séparément de ceux de la méningite tuberculeuse, car ils sont les mêmes à peu de chose près et la marche de l'affection n'offre des différences bien tranchées que dans un petit nombre de cas. C'est ce que nous démontrerons en étudiant avec soin le diagnostic. Quant au traitement, toutes ses indications se retrouveront dans celui de la méningite tuberculeuse, qui n'en diffère pas essentiellement et pour lequel on n'a qu'à surajouter aux indications antiphlogistiques celles que réclame la nature tuberculeuse de l'affection, indications d'ailleurs fort secondaires en pareille circonstance.

Ces deux espèces de méningite se différencient véritablement, à part leur nature, que par leur terminaison et leur pronostic. Il est permis de croire à la guérison de la méningite simple dans un assez grand nombre de cas, tandis que celle de la méningite tuberculeuse est excessivement rare; il est même douteux qu'elle ait pu être constatée authentiquement.

Nous devons maintenant poser et chercher à résoudre la question des hydrocéphales aiguës essentielles.

Tous ceux qui de nos jours se sont appliqués à l'étude de l'anatomie pathologique sont d'accord pour regarder ces maladies comme excessivement rares. Ils pensent que les épanchements séreux des cavités encéphalo-rachidiennes coïncident à peu près constamment avec d'autres maladies dont ils ne sont qu'un effet. Le plus communément c'est à la méningite qu'il faut en rapporter l'origine surtout chez les enfants. A un âge plus avancé, dans la vieillesse principalement, on sait que l'hémorrhagie et le ramollissement s'accompagnent assez souvent d'un épanchement de séro-

sité que sa formation rapide a fait appeler apoplexie éphémère.

Cependant il ne faut pas rejeter complètement l'existence de l'hydrocéphale aigu idiopathique. On en trouve des exemples assez positifs dans les auteurs, et quelques-uns ont été recueillis chez des enfants. Tels sont ceux des observations 62^e et 63^e d'Albercroome et quelques autres rapportés dans l'ouvrage de M. Bricheteau (1).

Malgré la confiance qu'on doit accorder à ces observateurs, il est permis de se demander si leurs investigations ont toujours été bien complètes et si l'examen a été assez soigneux pour qu'aucune lésion inflammatoire ou autre n'ait échappé. On est porté à en douter au moins pour quelques cas qui manquent de détails suffisants pour porter dans l'esprit une conviction entière. Nous ne saurions même faire comprendre la réserve nécessaire en cette matière qu'en empruntant à M. L. Guérin et Bloch les judicieuses remarques qu'on va lire : « A la suite de ce petit nombre d'observations, disent-ils, nous pourrions en citer quelques-unes analogues qui nous sont particulières ou qui ont été recueillies dans notre service à l'hôpital des Enfants. Mais nous n'avons pas une confiance entière dans ces observations, prises à une époque où les investigations cérébrales se faisaient avec moins de soin qu'aujourd'hui, et nous n'osons en tirer aucune conséquence rigoureuse. Les faits observés incomplètement sont en général perfides : au lieu de servir aux progrès de la science, ils entravent sa marche et la font au contraire rétrograder. Ce qui nous porte à croire que nous avions d'abord mal vu, c'est que nous ne trouvons plus maintenant aucun épanchement cérébral aigu sans quelque lésion organique concomitante. Nous ne sommes cependant pas du nombre de ceux qui rejettent constamment les observations des autres, et n'admettent comme vrai que ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux; seulement nous pensons que le total des hydrocéphales

(1) *Traité théorique et pratique de l'hydrocéphale avec ses formes aiguës et chroniques*, Paris, 1879, p. 5.

plales aiguës ou lésion organique est extrêmement minime, et qu'elles sont encore plus rares peut-être que les hydropisies essentielles des autres cavités séreuses. Mais nous ne voyons pas non plus pourquoi les membranes séreuses de l'encéphale feraient exception à cet égard, et nous admettons l'hydrocéphale aiguë comme maladie essentielle, mais comme maladie très-rare (1). »

On a rapporté assez souvent à l'hydrocéphale aiguë essentielle des cas d'épanchements ventriculaires coïncidant avec le ramollissement du septum lucidum et de trigône cérébral. Abercrombie, qui rapporte plusieurs faits de ce genre, n'hésite pas à considérer ce ramollissement comme de nature inflammatoire, et pense que l'épanchement séreux n'est point le phénomène morbide primitif. Nous dirons que ces observations sont paraissent peu concluantes; datant d'une époque où on ne connaissait ni l'importance des granulations, ni les précautions nécessaires pour ne pas les méconnaître lorsqu'elles sont peu nombreuses ou situées dans les parties cachées de la plèvre, ces faits ne peuvent être admis qu'avec réserve; il ne faut donc point se hâter d'en tirer des conséquences. D'après quelques cas nous sommes porté à croire qu'il suffit d'un petit nombre de granulations pour déterminer une augmentation de l'exhalation ventriculaire; de même qu'on voit, en l'absence d'autres lésions, des tubercules situés sous la plèvre, sous le péritoine ou dans le grand épiploon, peu nombreux et encore à l'état naissant, déterminer un épanchement séreux dans la cavité de ces membranes. Le ramollissement des parties blanches centrales ne nous a jamais offert des caractères qui nous aient permis de le considérer comme inflammatoire et comme la cause primitive de l'épanchement.

En l'absence de toute espèce de lésions appréciables dans l'encéphale, on voit quelquefois survenir un épanchement séreux qui n'est qu'une fraction d'une hydropisie générale. Celle-ci peut dépendre d'une gêne au cours du sang

(1) *Ann. de méd.*, 2^{me} s. t. VI, p. 507.

dans les gros vaisseaux, mais autant ce genre d'hydropisie est fréquent chez les vieillards, autant il est rare chez les enfants. Celle qui survient à la suite des exanthèmes fébriles et en particulier de la scarlatine, est beaucoup plus spéciale à l'enfance et c'est à elle que se rattache une variété d'hydrocéphale dont nous devons parler ici.

Les hydrocéphales scarlatineuses sont tantôt des méningites ordinaires, dans lesquelles l'épanchement n'est que la conséquence de la phlogose, tantôt une hydropisie sans inflammation, analogue à celle du tissu cellulaire et des autres cavités sereuses. Cette distinction essentielle n'a pas été saisie par tous les médecins. « Les cas les plus graves et les plus fréquents des maladies cérébrales inflammatoires, survenus par suite des maladies fébriles, dit Abercrombie, sont ceux qui succèdent à la scarlatine. Un enfant convalescent de la scarlatine, qu'il peut avoir eue à un faible degré, est pris, peut-être après s'être exposé au froid, de céphalalgie à laquelle succèdent rapidement les convulsions suivies elles-mêmes de récité et de coma. Les accidents cérébraux peuvent avoir été précédés de l'anasarque qui survient fréquemment après la scarlatine. Cette circonstance porte à les attribuer à un épanchement subit dans le cerveau; cependant la maladie est entièrement inflammatoire, et le malade ne peut être sauvé que par le traitement le plus énergique, par les saignées, les purgatifs et autres moyens semblables. Par ces moyens de traitement on guérit plusieurs de ces malades; d'autres périssent et présentent les lésions ordinaires des inflammations ordinaires du cerveau (1). »

Abercrombie, comme on le voit, rapporte à l'inflammation, dans tous les cas, les accidents cérébraux qui compliquent quelquefois la scarlatine, soit dans son cours, soit après la disparition de l'éruption et lorsqu'il est déjà survenu une anasarque. Pour nous, le méningite n'est primitive que dans le premier cas, et il est vrai de dire qu'alors elle peut réclamer tous les antiphlogistiques ordinaires.

(1). Abercrombie, trad. par G. J. Davis, 2^e éd., p. 296.

Dans le second cas, l'épanchement se produit sans autres caractères locaux inflammatoires et peut durer ainsi plusieurs jours à l'état d'hydropisie essentielle, c'est-à-dire, indépendante d'aucune altération de l'encéphale. Nous démontrerons mieux la vérité de ce fait quand nous parlerons de l'hydropisie scarlatineuse en général; faisons remarquer seulement que lorsqu'il en est ainsi le traitement ne réclame pas toujours, en première ligne, les saignées, et que l'hydrocéphale peut guérir comme l'anasarque par les diurétiques, les diaphorétiques et les purgatifs hydragogues. Les antiphlogistiques deviennent plus nécessaires dans une seconde période, car alors l'inflammation se développe et joint ses effets à ceux de l'épanchement.

L'hydrocéphale scarlatineuse étant encore peu connue et d'ailleurs assez rare, nous allons en rapporter quelques exemples.

« Une petite fille de neuf ans, au quinzième jour d'une fièvre rouge très-bénigne ou desquamation, se lève la nuit au mois de juillet, ouvre la fenêtre pour prendre le frais, se plaint bientôt du froid; on la recouche et le lendemain survient une amygdalite, œdème à la face, arrêt de l'urine, diminution des urines qui déposent un sédiment rouge-brun viscéux. Le même jour, attaque subite d'amaurose avec immobilité parfaite de la pupille; convulsions très-fortes du côté droit, palpitations vives, anoxupnée. (Application de sangsues sur la tête, émélique, digitale en poudre, tisanes diurétiques.) Le cinquième jour, diminution de l'œdème et des symptômes nerveux. L'enfant revint en peu de temps en la santé (1). »

Voici une autre observation plus détaillée, intitulée par l'auteur : *Céphalite compliquée d'ascite aiguë et d'épilepsie*. Pour nous c'est un exemple d'hydrocéphale aiguë scarlatineuse.

26^e cas. — Enfant de treize ans; éruption cutanée; anasarque; accidents cérébraux très-graves; émissions sanguines abondantes, réelles; guérison. — Pierre Bouchard, âgé de

(1) Fiel, *Mémoire sur l'hydrocéphale aiguë*, *Gaz. méd.*, 1827, p. 346.

treize ans, présent dans les premiers jours de juillet 1834, une affection cutanée, qui a, d'après le rapport des parents, le caractère rubéolique. Cette maladie, abandonnée aux efforts de la nature, dura seulement trois jours; l'enfant se livra aussitôt à ses exercices et à ses travaux ordinaires; il ne tarda pas à ressentir des douleurs de tête violentes, qui cédèrent à une hémorrhagie nasale.

La céphalalgie reparut bientôt; les pieds et les jambes s'œdématisèrent; cette infiltration s'accroît et gagne insensiblement les hanches et le ventre.

Le 24 juillet, le jeune homme est frappé dans la matinée de plusieurs accès d'épilepsie; il se plaint dans les intervalles d'une douleur de tête qui lui arrache des cris, et qu'il rapporte à toute la tête. Bientôt il perd la vue et la parole, et tombe dans l'astopnisme. Retour fréquent des accès d'épilepsie, pendant lesquels le col s'engorge considérablement; la figure devient violette, la bouche se remplit d'une écume sanguinolente, dont le malade rend une grande quantité; les contorsions sont horribles.

Appelé ce jour-là pour la première fois, je le vois saisi devant moi d'un accès qui dure plusieurs minutes. Comme il a été dit plus haut, les pieds, les jambes et les hanches sont infiltrés et le ventre plein de sérosité. — Application de douze sangsues sur le trajet des jugulaires; vésicatoire comparé à chaque veine; cataplasme émollient sur le ventre. A l'intérieur, tisane mucilagineuse nitrée; administration répétée toutes les heures de dix gouttes d'éther sulfurique étendus dans un peu d'eau. Ce n'est qu'avec une grande difficulté qu'on parvient à faire avaler au malade quelques gouttes de liquide, à cause de la contraction convulsive des muscles des mâchoires. Retour fréquent des accès dans la nuit; continuation de l'état carotéique.

Le 22 au matin, même état que la veille; pouls dur, accélération; pupille excessivement dilatée, insensible à la lumière; les extrémités inférieures et le bas-ventre sont dans le même état. — Saignée du bras droit d'environ 200 grammes. — Je reviens une heure auprès du malade; il reprend un accès semblable aux précédents. Avant de le

quitter, je retire la saignée et tire encore environ 400 grammes de sang. Dans la journée, par suite des mouvements que fait l'enfant dans ses accès, le bandage de la saignée se déplace; une hémorrhagie sort, dont on ne s'aperçoit que le soir, à lieu par l'ouverture de la veine; tout le côté droit est enflammé; on trouve à côté de lui cinq à six caillots de sang du volume d'un gros œuf. Dès la cessation des accès, qui n'ont pas reparu depuis.

Le 23 au matin, pouls petit, faible et souple; disparition totale de l'assèté et de l'assèté des extrémités inférieures. Du reste l'assèpissement est le même et l'enfant n'y voit point encore; il n'a pas repris la parole. Néanmoins, l'état grave dans lequel il était la veille s'étant amélioré, j'ai permis aux parents ^{de} des crises; la rendu à la santé. On ^{avait} ~~devenait~~ ^{devenait} ~~accablée~~, et dans ce moment le malade s'agite, crie et vocifère plusieurs juréments, mais il ne tarde pas à s'assoupir. — Montanide appliquée aux pieds et aux jambes. A l'intérieur, potion dans laquelle je fais entrer de la teinture de castoréum, celle de sucin et l'éther sulfurique; pour boisson ordinaire, infusion de laurier-cerise et de feuille d'oranger. Lavement avec la décoction de fougère mâle.

A midi, retour de la parole; l'assèpissement fait place à une agitation continuelle, dans laquelle l'enfant crie et jure continuellement; il dit souffrir horriblement de toutes les parties de son corps, sauf de la tête; il refuse de boire; on veut l'y contraindre et le faire boire dans une tige de sirop, il en casse le col entre les dents.

Dans la nuit, il recouvre la vue et son entière connaissance; dès-lors il demande à boire et à manger.

Le 24, il est sans fièvre et entre en convalescence. — Bouillon clair.

Aujourd'hui 25, le jeune homme se lève, se promène et n'éprouve plus qu'un sentiment de faiblesse; les digestions se font facilement, et tout annonce qu'il est à l'abri de tout accident.

* Cette observation, ajoute M. Lécassé qui l'a publiée

dans la *Gazette Médicale* (1), prouve combien il est impudent, après les affections cutanées, de s'exposer trop tôt aux intempéries de l'atmosphère. Le jeune homme qui en fut le sujet aurait inévitablement succombé sous le poids de sa maladie, sans les saignées abondantes qui lui ont été pratiquées. »

Le fait suivant mérite aussi d'être cité. Il a été rapporté par M. Marshall Hall (2).

27^e cas. — *Ces d'anatropas signat meos contrahens supervenit à la suite de la scarlatine. Saignées abondantes, purgatives, etc. Guérison.* — Je dois à M. Daffron, dit M. Marshall Hall, d'avoir eu l'occasion d'observer un des faits les plus intéressants que j'aie jamais rencontré dans ma pra-

tique.

Je me conduisis à High-Gate où je trouvai un petit malade âgé de deux ans, qui auparavant avait eu une scarlatine sous la forme la plus légère; il avait à peine gardé le lit et n'avait pu en à souffrir de *stricto medici diligentia*. Le dimanche matin il avait été pris d'un gonflement de la face qui avait apparu et s'était développé subitement. L'enfant tomba en même temps et avec la même rapidité dans un état de collapsus très-grave, puis il fut pris de convulsions qui firent bientôt suivre de coma.

Lorsque j'arrivai auprès de l'enfant, il avait des convulsions, après lesquelles il tomba dans un coma profond. Le vin et l'eau-de-vie qui étaient sur la table indiquaient bien la gravité de sa maladie et la manière dont elle avait été considérée.

Je restai cependant persuadé, malgré les apparences, que le seul moyen de le sauver était de désempiler le système vasculaire de la tête; mais je sentais que l'emploi de ce moyen n'était pas sans danger. J'exposai mon espoir et mes craintes au père de l'enfant, qui s'en rapporta à nous sur les moyens à employer.

(1) *Année 1851*, p. 729.

(2) *The Lancet et Gaz. méd. de Paris*, 1850, p. 169.

Nous inclinâmes alors le petit malade debout et ouvâmes la veine jugulaire. Je tins le doigt sur le poulx pendant qu'on laissait couler 615 grammes de sang! Les convulsions cessèrent, le coma diminua, mais ne disparut pas; alors je me hasardai à ouvrir une veine du bras, et je fis encore couler 218 grammes de sang.

En moins d'une heure le petit malade reconnut ses parents. Nous lui prescrivîmes le calomel et une potion purgative, une lotion froide sur la tête et des fomentations aux pieds; quelque temps après on appliqua aussi des sangsues; mais il est évident que c'est à la saignée qu'on doit attribuer principalement l'amélioration.

Le petit malade guérit promptement, et, ce qui est important, sans éprouver aucun symptôme des effets morbides de la perte de sang.

Nous pensons que c'est aux hydrocéphales scarlatineuses qu'il faut rapporter ce que les médecins anglais ont dit dans ces derniers temps sur les accidents cérébraux qui surviennent dans les maladies des reins, c'est-à-dire dans la néphrite albumineuse ou maladie de Bright. Cette affection, dont un caractère essentiel est l'hydropisie du tissu cellulaire et des cavités séreuses, se rattache assez souvent en effet, chez les enfants surtout, à une scarlatine antérieure; et l'on comprend très-bien que l'arachnoïde et la séreuse ventriculaire soient, comme les autres cavités exhalantes, le siège de cette hydropisie; c'est ce qui démontre d'abord le docteur Bright. Ensuite le docteur Addison prétendit que certains symptômes cérébraux se rattachent à une altération des reins, même dans des cas où il n'y a ni œdème des extrémités, ni urine coagulable. Plus tard, on reconnut qu'on les rencontre aussi fréquemment et plus peut-être chez les enfants à la suite de la scarlatine que chez les adultes. Enfin, le docteur Bird (1) s'est proposé dernièrement de rechercher s'il ne serait pas possible de trouver dans les caractères propres de ces symptômes cérébraux, l'existence d'une altération des reins.

(1) *Ann. méd.*, 1840, p. 471.

Ce médecin émet d'abord l'opinion que les maladies des reins déterminent plus souvent qu'on ne le pense des accidents cérébraux. La scarlatine passe jadis d'une fois inaperçue chez les enfants des classes pauvres; elle est souvent prise pour un simple rhume ou pour un mal de gorge. On amène souvent à l'hôpital des malades chez lesquels la pâleur de la figure, la bouffissure des paupières font soupçonner une altération des reins reconnaissable à l'examen de l'urine, et sur les antécédents desquels on ne peut avoir aucun renseignement; il faut donc chercher dans les caractères des symptômes la nature réelle de l'affection. Parmi les jeunes sujets observés par M. Brier, il en est deux laquelle la présence de l'albumine dans l'urine a suffi pour faire soupçonner l'altération des reins, lors même qu'il n'y avait pas d'œdème des extrémités inférieures; chez d'autres, le coma partiel ou de la stupeur, qu'on avait cru être le résultat de l'action d'un poison narcotique, la pâleur de la face, la bouffissure de tout des yeux et l'absence de cris semblaient indiquer que la maladie avait la même origine. L'auteur pense même que ces accidents peuvent se développer chez les enfants non atteints antérieurement de la scarlatine. En effet, des deux observations qu'il rapporte, la seconde est relative à un enfant âgé de huit jours chez lequel les accidents cérébraux paraissent le résultat de l'impossibilité de fonctionner où se trouvaient les reins par suite d'un obstacle mécanique à l'exercice de l'urine.

Nous croyons cette dernière interprétation de M. Brier un peu aventureuse. Mais nous ne mettons nullement en doute l'influence de la maladie dite de Bright, qu'elle soit consécutive ou non à la scarlatine, sur le développement de certains hydrocéphales aigus.

Il est impossible d'après les faits que nous venons cités de contester l'existence de l'hydrocéphale aiguë comme maladie indépendante de la méningite.

Nous sommes fort peu avancés sur l'étiologie et la symptomatologie de cette affection. Sous ce double rapport, nous ne pouvons que lui appliquer, dans la plupart des cas,

les connaissances que nous possédons sur la méningite. Cependant, en généralisant les faits les mieux observés, malheureusement encore trop peu nombreux, on reconnaît que les épanchements séreux idiopathiques se présentent généralement sous deux formes différentes. Dans la première, l'épanchement se faisant plus lentement, les symptômes, très-analogues à ceux du début de la méningite, se caractérisent par des phénomènes d'excitation, tels que la céphalalgie, le délire, l'agitation, les cris, les mouvements convulsifs. Cette période dure de quelques heures à plusieurs jours, mais elle est très-rarement aussi longue que la première et la seconde période réunies de la méningite aiguë. Dans la seconde phase de la forme d'hydrocéphale qui nous occupe, les symptômes précédents font place à l'abolition de l'intelligence et des sens, au coma, à l'anasarque, à la surdité, à l'insensibilité de la peau, à la résolution de tous les mouvements volontaires. Toutefois ce dernier symptôme n'est pas constant; car souvent au milieu du collapsus il y a des convulsions très-violentes, de véritables accès épileptiformes. Dans la seconde forme de l'hydrocéphale aiguë, la première période manque; les phénomènes de la seconde se déclarent d'emblée. C'est alors que la maladie peut être vraiment considérée comme une apoplexie séreuse. C'est surtout celle qui survient dans le cours de l'hydropisie scarlatineuse.

Le traitement des hydrocéphales aigus ne doit pas être le même dans tous les cas, mais l'impossibilité de les distinguer des méningites simples ou tuberculeuses conduira le praticien à employer le traitement qui convient plus spécialement à ces maladies. Si cependant la forme apoplectique de la maladie, si la coïncidence d'une hydropisie dans d'autres parties du corps, si l'état des urines, si la nature des antécédents du malade viennent éclairer le diagnostic, on verra clairement la nécessité de mettre en première ligne les médications qui réclame ordinairement l'hydropisie scarlatineuse, c'est-à-dire les diaphorétiques, les diurétiques et les purgatifs hydragogues. La gravité des accidents imposera l'obligation d'agir avec énergie et d'a-

jouter aux moyens préétablis l'emploi des révulsifs cutanés très-actifs tels que les vésicatoires. Enfin l'expérience ayant paru démentir que les émissions sanguines sont utiles, quoique l'hydrocéphale ne soit probablement pas une maladie primitivement inflammatoire, on serait blâmable de ne pas y avoir recours. On emploiera donc, suivant les circonstances, les saignées générales ou locales, et quelquefois les unes et les autres.

ARTICLE II.

MÉNINGITE AIGUE TUBERCULEUSE.

Les recherches qui ont fait connaître la nature de la méningite tuberculeuse et permis de lui assigner sa véritable place dans le cadre nosologique, sont récentes, et cette découverte, comme le dit avec raison un de nos meilleurs critiques (1), « est une des plus intéressantes et des plus brillantes dont l'anatomie pathologique puisse se glorifier. »

Sans doute les auteurs anciens avaient déjà constaté que parmi les malades qui succombaient à l'hydrocéphale aiguë, à la fièvre cérébrale, etc., un certain nombre présentaient de véritables tubercules dans les centres nerveux, et dans ces cas ils n'hésitaient pas à dire que le vice scrophuleux avait porté son action sur les organes de la tête. Mais on méconnaissait cette influence lorsqu'au lieu de productions évidemment tuberculeuses, on ne rencontrait, au milieu des traces ordinaires de phlogose, que des granulations miliaires dans la pie-mère; celles-ci possèdent même très-souvent isoperques, ainsi que le prouve la lecture d'une foule d'observations dans lesquelles on trouve tous les caractères directs et indirects de la méningite tuberculeuse parfaitement indiqués, hormis les granulations

(1) M. Broussais, *Ann. de méd. et de chir. mod.*, 1855, septembre, p. 323.

dont l'existence est restée ignorée faute d'investigations assez exactes.

L'attention plus scrupuleuse apportée dans ces dernières années à l'étude des altérations que les maladies laissent après la mort dans les organes, a été la première source du progrès dû à nos contemporains. On a commencé par constater la fréquence très-grande des granulations méningées chez les enfants morts à la suite de l'hydrocéphale aiguë. On ne peut refuser à M. Guersent une grande partie de l'honneur de cette première découverte, puisque dès l'année 1827 cet habile médecin avait séparé la méningite avec granulations des autres espèces d'inflammations cérébrales, et lui avait donné le nom de *méningite granuleuse*, comme le constatent les registres de l'hôpital des Enfants. M. Guersent semblait même avoir entrevu la connexité de cette maladie avec les autres affections tuberculeuses, puisqu'il avait remarqué qu'on trouvait, en même temps que des granulations dans les méninges des tubercules, soit dans les ganglions bronchiques, soit dans les poumons, et puisque dans ses leçons cliniques il considérait les enfants hydrocéphaliques comme des phthisiques qui mouraient par le cerveau. Mais il n'avait encore, à cette époque, considéré les granulations comme de véritables tubercules, et l'honneur d'une démonstration positive était réservé à d'autres observateurs.

Les opinions très-répandues de Laennec sur la nature des granulations miliaires du poulmon, devaient naturellement acheminer les anatomo-pathologistes vers la détermination de la nature des granulations méningées. C'est ce que fit Dance en 1829 (1), qui n'hésita pas à les rapprocher des tubercules miliaires des poulmons, et considéra leur coïncidence avec l'hydrocéphale aiguë comme assez fréquente même chez les adultes; mais cette vérité ne pouvait être mise hors de doute et appréciée dans la généralité de son application, que par des observations recueillies chez les enfants, ce que Dance n'avait pu faire. Ce sont les

(1) *Arch. gén. de méd.*, t. IX, p. 177.

recherches datant à peu près de la même époque, de MM. Rufe, Gerbârd, Constant, Piet, qui ont amené une démonstration positive. Le premier travail de M. Rufe parut en 1833 (1), le second en 1835 (2); le mémoire de M. Gerbârd fut publié en 1834 (3) et celui de M. Piet en 1836 (4). Quant à Constant, ses observations remontent à la même époque que celles des médecins que nous venons de nommer; il paraît même, suivant M. Guérard, que les premières recherches de cet observateur furent antérieures à celles de MM. Rufe et Gerbârd. Quoi qu'il en soit, Constant recueillit les principaux matériaux d'une monographie sur la méningite tuberculeuse, qu'il présenta en 1835, de concert avec M. Fabre, à l'Académie des sciences, et qui fut honorée d'un prix Monthyon. En 1836 parut dans un journal allemand (5) un mémoire de M. Green, qui fut reproduit dans les journaux anglais, puis dans les journaux français. Ce travail n'est pour ainsi dire que confirmatif des précédents; on peut en dire autant de la thèse de M. Coignet (6) et de la monographie de notre ancien collègue le docteur Boquerel (7). Ce dernier ouvrage se recommande toutefois par l'esprit d'observation impartiale et rigoureuse apporté à l'examen de tous les faits. Enfin M. Le Diberder (8) et M. Vallée (9) ont démontré que la méningite tuberculeuse ne s'observe pas seulement chez les enfants mais aussi quelquefois chez les adultes.

C'est un progrès réel et incontestable, ayons-nous dit, que d'avoir démontré la nature tuberculeuse de la plupart des méningites ou hydrocéphales aigus, qui font tant de

(1) *Arch. de méd.*, février, 1833.

(2) *Théoriques et Clin. méd.*, page 121.

(3) *Annuaire médical, années, années*, février et avril 1834.

(4) *Thèse inaugurale*, 1836, et *Clin. méd.*, 1837, 2, 372.

(5) *Arch. Médica für die gesammte Heilkunde*, t. XXIV, 2^e série.

(6) *Thèse de Paris*, 1837.

(7) *Bulletin (Hôpital) sur Méningites du Crâne*, 1838, 1-2.

(8) *Thèse de Paris*, 1837, 2, 436.

(9) *Le N. de méd.* (juillet 1837).

victimes dans le jeune âge; mais il faut bien convenir que jusqu'ici cette découverte n'a porté, pour ainsi dire, aucun fruit pour la pratique. Outre la difficulté, dans beaucoup de cas, d'établir un diagnostic différentiel entre la méningite simple et la méningite tuberculeuse, cette distinction n'a fait découvrir aucune méthode de traitement plus efficace; elle est cependant fort utile en ce qu'elle nous montre que la seule voie à suivre pour arriver à des résultats plus satisfaisants, est la même qui se présente dans toutes les affections de nature tuberculeuse. Jusqu'à ce que les effets et les progrès de la science, jusqu'à ce qu'un hasard heureux peut-être, nous révèlent le moyen curatif de ces terribles maladies, c'est vers l'hygiène que nous devons nous tourner dans l'espoir d'altérer les ravages qu'elles exercent sur les jeunes générations.

Anatomie pathologique.

Les lésions les plus importantes appartiennent aux méninges et aux ventricules encéphaliques.

La *méninge pariétale*, c'est-à-dire la dure-mère doublée de son feuillet séreux, est presque toujours intacte. Sa surface interne est lisse et unie, libre d'adhérences, exempte d'injection, en un mot telle qu'on la trouve à l'état normal; dans quelques circonstances sa surface participe de la sécheresse et de l'état poisseux que nous indiquons bientôt dans le feuillet viscéral de l'arachnoïde. Quant aux sinus veineux contenus dans la dure-mère, on les trouve souvent remplis de sang avec ou sans caillot. Cette accumulation de sang veineux coïncide ordinairement avec un certain degré d'injection des vaisseaux des méninges et de la substance nerveuse.

L'accumulation d'un liquide séreux dans la grande cavité de l'arachnoïde est assez rare; on la rencontre cependant quelquefois, soit sur la convexité, soit à la base du crâne. Cette sérosité est le plus souvent pure et limpide; d'autres fois elle est trouble, blanchâtre et même puriforme; parfois on y trouve des flocons pseudo-membra-

neux, ou des fausses membranes foliacées, minces et d'une grande étendue. D'autres fois la sérosité manque ou existe à peine; alors les pseudo-membranes que rien ne sépare des deux feuillets séreux, contractent des adhérences toujours molles et faiblement organisées à moins qu'elles ne soient anciennes. Enfin, dans les cas beaucoup plus communs où la cavité de l'arachnoïde est vide, la surface de cette membrane, au lieu d'être humide et glissante comme à l'état sain, est sèche et plus ou moins pultueuse.

C'est dans la pie-mère qu'existent ordinairement les lésions les plus considérables et les plus caractéristiques, sa structure essentiellement vasculaire en rend parfaitement compte.

Pour ne laisser échapper aucun de ces lésions il ne faut point se borner à examiner la surface du cerveau enveloppée de sa meninge, car les circonvolutions rapprochées les unes des autres cachent à l'œil les parties de la pie-mère qui sont ordinairement les plus altérées. Il faut d'abord constater s'il y a injection des vaisseaux visibles au-dessous de l'arachnoïde; s'il y a infiltration au niveau des grands espaces sous-arachnoïdiens de la base et des anfractuosités. On examine si le liquide sous-arachnoïdien n'a pas fait place à des concrétions plastiques dont on étudie la forme et la nature. Cet examen qui n'exige aucune dissection étant achevé, on incise et l'on déchire l'arachnoïde tout le long des scissures de Sylvius et des anfractuosités, de manière à mettre à nu les parties profondes de la pie-mère qui tapissent les faces conjuguées des circonvolutions. Ce mode de dissection doit s'étendre à tout l'encéphale; c'est le seul qui permette de ne jamais méconnaître les altérations cachées dans la profondeur des anfractuosités, comme le sont les granulations dans certains cas.

L'injection sanguine occupe principalement les ramuscules veineux; elle est en général d'autant plus prononcée que la mort est arrivée à une époque plus rapprochée du début.

Lorsque l'inflammation a dépassé le premier degré, elle se caractérise par l'infiltration d'une sérosité trouble et

blanchâtre, d'autres fois rouge et sanguinolente, ou bien d'une certaine quantité de pus quelquefois liquide, plus souvent concret et ayant l'aspect d'une matière couenneuse ou pseudo-membraneuse, d'un blanc mat ou verdâtre. Ces divers produits d'une plasticité morbide se rencontrent surtout dans les grands espaces sous-arachnoïdiens, c'est-à-dire, au-devant des pédoncules cérébraux, dans toute la région qui correspond au plancher inférieur du troisième ventricule, puis dans les scissures de Sylvius, en arrière autour des pédoncules cérébraux, en suivant la fente de Richet, jusqu'aux tubercules quadrijumeaux et sur le sommet du cervelet. A la consistance on les rencontre plutôt au niveau des anfractuosités que sur le sommet des circonvolutions. Le tissu propre de la pie-mère est épais, induré, en quelque sorte fibreux, mais cassant et sans élasticité. La lymphe plastique qui s'est formée dans ses mailles est disposée par traînées ou par plaques plus ou moins larges le long des artères. Ces diverses altérations se prolongent très-souvent autour de la protubérance et même du bulbe rachidien; quelquefois aussi elles occupent la pie-mère du cervelet, principalement au niveau du quatrième ventricule et autour des pédoncules cérébelleux.

C'est dans le tissu de la pie-mère que se forment les granulations qu'on rencontre dans la plupart des méningites des enfants. Les unes sont disséminées dans l'épaisseur de la matière couenneuse sous-arachnoïdienne, qui leur forme comme une espèce de gangue; les autres sont attachées aux filaments cellulo-vasculaires de la pie-mère, sans traces d'inflammation autour d'elles. Ces dernières représentent tout-à-fait les granulations miliaires du poumon et des séreuses autour desquelles rien n'annonce le plus léger degré de phlogose. Il faut souvent une dissection minutieuse et une inspection attentive pour ne pas méconnaître leur présence, surtout lorsqu'elles sont très-petites et de la même couleur que les parties contigues. Il en est souvent de plus avancées qui ont déjà le volume d'une tête d'épingle, opaques, blanches ou jaunâtres; d'autres enfin sont parfaitement semblables à des tubercules crus, et dans

certain cas rien n'est plus facile que d'apprécier une transition insensible entre ces divers aspects qui se rapportent évidemment aux phases successives de l'évolution du tubercule, si l'on connaît dans les autres organes.

Le siège précis des granulations tuberculeuses, avons-nous dit, est dans la pie-mère; mais il y a ici quelques variétés dont il faut tenir compte. Les unes siègent exclusivement dans le caisson de cette membrane; d'autres, développées dans les points où elle est en contact avec l'arachnoïde, adhèrent à celle-ci, font corps avec elle, la soulèvent même et lui font faire relief; d'autres fois, au contraire, les granulations s'enfoncent dans la substance cérébrale et la dépriment; on pourrait croire alors qu'elles ont pris naissance dans l'épaisseur même du cerveau, mais en remarquant qu'elles adhèrent toujours par quelques points de leur périphérie avec la pie-mère, surtout avec les prolongements qu'elle envoie au fond des anfractuosités, on ne peut se tromper sur leur véritable origine. Enfin nous avons vu dans des cas rares, il est vrai, de véritables granulations miliaires, demi-transparentes, cristallines, analogues à celles qu'on rencontre quelquefois à la surface des pierres et du péritoine, développées à la surface interne de l'arachnoïde, n'adhérant avec elle que par un point de leur périphérie. Aussi pensons-nous, contrairement à ce qu'ont écrit les plus récents observateurs, que la pie-mère n'est pas le siège exclusif, mais seulement le plus ordinaire des granulations méningiennes, et qu'elles peuvent se développer à la surface libre de l'arachnoïde. Nous ne croyons point ici être tombé dans une méprise qui consiste à prendre pour ces granulations des aspérités extrêmement petites, confluentes, à peine visibles, mais très-sensibles et rugueuses au toucher comme une peau de chagrin, qui se rencontrent parfois à la surface libre de l'arachnoïde, et plus souvent encore sur la membrane ventriculaire chez des sujets affectés de méningite chronique. Ces aspérités n'ont aucune analogie avec les granulations tuberculeuses, et sont un mode d'inflammation chronique qui peut se rencontrer dans les séreuses.

céphaliques comme dans celles du thorax et de l'abdomen, car il y a des pécariés et des péritonites granuleuses qui ne sont point tuberculeuses.

Les granulations ne peuvent être confondues avec les glandes de Pacchioni; celles-ci ne se rencontrent qu'au voisinage de la grande scissure médiane, sont toujours intérieures à la grande cavité de l'arachnoïde, et s'observent indifféremment chez les sujets morts de méningite ou de toute autre maladie. Les granulations tuberculeuses sont plus nombreuses à la base, sous-jacentes à l'arachnoïde, et ne s'observent que chez des sujets tuberculeux; enfin elles s'accompagnent de toutes les autres traces de la méningite qui manquent dans tout de cas où existent des glandes de Pacchioni.

Après les altérations de la piémière, l'élément anatomique le plus important de la méningite est l'épanchement ventriculaire. Beaucoup d'auteurs lui ont fait jouer le principal rôle dans la production des symptômes, et l'ont considéré comme le caractère essentiel de la maladie; des recherches plus récentes ont prouvé que ces opinions étaient exagérées: il manque, en effet, dans beaucoup de méningites qui ont suivi une marche ordinaire, c'est-à-dire qu'on ne trouve dans les ventricules réunis que dix, vingt ou trente grammes de sérosité. On ne peut admettre la présence réelle d'un épanchement que lorsqu'on trouve au moins cinquante à soixante grammes de liquide; dans quelques cas on en rencontre jusqu'à cent grammes et même plus. Sur soixante cas observés par M. Charpentier, Gerhard et Piet, on a constaté que vingt-cinq fois la quantité de sérosité n'excédait pas une cuillerée par chaque ventricule; souvent elle était moindre et se bornait à quelques gouttes; il n'y avait pas d'épanchement réel. Dans vingt-sept autres cas chaque ventricule contenait de trente à quarante cinq grammes, et dans huit cas, la quantité s'élevait jusqu'à soixante ou cent grammes; « d'où il suit, dit M. Piet, que l'épanchement auquel on a si longtemps rapporté tous les désordres, et qui a servi à désigner la maladie, a manqué dans la moitié des cas

à peu près, et que huit fois seulement il a été de nature à produire des symptômes de compression; qu'enfin, sur le reste des sujets il n'était pas assez abondant pour qu'on pût avec certitude lui faire jouer un rôle important (1). »

L'épanchement est le plus souvent d'une abondance égale dans les deux ventricules; dans des cas très-rare l'un contient plus de liquide que l'autre. C'est d'après ce fait qu'on a été conduit à nier la communication des ventricules latéraux avec le moyen, par les trous de Monro qui seraient bouchés par la réflexion de la membrane des parois ventriculaires sur les plexus choroïdes. Mais cette oblitération ne nous a point paru exister, et nous pensons avec M. Piet que l'inclinaison du cadavre, en faisant écouler le liquide d'un ventricule dans l'autre, est la cause de leur dilatation inégale.

Quant aux qualités du liquide épanché, il est le plus souvent aussi clair et aussi liquide que la sérosité de l'état normal; rarement il est *séro-sanguinolent*; mais assez souvent il est un peu trouble et tient en suspension des filaments ou flocons blancsâtres, débris du ramollissement des parois ventriculaires et des parties blanches centrales. Dans quelques cas plus rares la sérosité est lactescente et purulente comme dans les épanchements de la plèvre; on y trouve des flocons de lymphes plastiques libres de toute adhérence et précipités au fond de la cavité par leur poids spécifique, ou adhérents aux parois qui présentent dans le même point une espèce d'érosion. A part ces cas véritablement exceptionnels et que nous avons plutôt observés dans les méningites simples que dans les méningites tuberculeuses, la surface interne des parois ventriculaires présente son apparence normale; de sorte que l'exhalation de la sérosité a été augmentée sans laisser aucune lésion appréciable de la membrane qui tapise les cavités encéphaliques; à peine peut-on constater qu'elle est légèrement épaissie et plus résistante qu'à l'état sain. Dans la plupart des cas, elle ne protège pas même, contre l'action émolliente du liquide,

(1) *Gaz. méd.* 1857, p. 211.

la voûte et le sésium sur lesquels elle s'étend, mais où elle n'a qu'une très-faible épaisseur.

Considéré par rapport à son volume et à sa disposition générale, le cerveau présente souvent une exubérance qui donne à la dure-mère non encore incisée une tension très-sensible; aussitôt que cette membrane est ouverte il fait hernie, et quand on a complètement découvert la convexité des hémisphères, on est frappé de l'aplatissement des circonvolutions qui sont tassées, serrées les unes contre les autres, et entre lesquelles les anfractuosités semblent avoir disparu; ce tassement prouve évidemment que le cerveau était comprimé. Or, deux causes peuvent amener cette compression : l'une est l'épanchement ventriculaire, l'autre la turgescence sanguine qui existait pendant la vie. Comme l'épanchement manque assez souvent, c'est à la seconde cause qu'il faut alors recourir pour expliquer la compression dont on voit les traces; c'est ainsi que l'on comprend comment la présence ou l'absence de l'épanchement doit peu modifier les symptômes, et quelle a été l'erreur des médecins qui ont exagéré l'importance de l'hydrocéphale en lui rapportant uniquement des phénomènes qu'une autre cause peut produire.

Quoiqu'on ne puisse, en l'absence de l'épanchement, attribuer le tassement des circonvolutions qu'à la turgescence des vaisseaux du cerveau, il faut ajouter que cette congestion, que l'on porte à admettre pendant la vie, ne laisse point toujours après la mort des traces évidentes. Dans bien des cas nous n'avons point trouvé le piqueté sanguin de la substance blanche ni la rougeur saignée de la substance grise, qui annoncent le premier degré de l'inflammation. On comprend assez bien ce résultat en considérant qu'ici la maladie primitive est celle des méninges. La congestion cérébrale lui est consécutive, et dès-lors ne modifie pas la vitalité des vaisseaux aussi profondément que si elle était primitive. Tout se réduit au passage d'une plus grande quantité de sang à travers les vaisseaux de la substance nerveuse; il y a simple augmentation plutôt que perversion de la circulation capillaire, et dès que la vie

est éteinte, l'irritabilité morbide ayant disparu, la contractilité des petits vaisseaux qui, comme on le sait, persiste quelque temps après la mort, est encore assez puissante pour chasser le sang dans les veines d'un certain calibre; alors l'accumulation de ce liquide, soit dans les vaisseaux extérieurs au cerveau, soit même dans les sinus, est la seule trace d'une hyperémie qui pendant la vie siégeait dans le système capillaire.

Dans beaucoup de cas cependant la congestion cérébrale se révèle après la mort par l'effusion de la substance nerveuse; mais il est fort rare d'y trouver des lésions plus profondes que cette simple hyperémie, si ce n'est dans la substance corticale du cerveau. Celle-ci, dans les points où elle est sous-jacente à des portions de méninges gravement altérées, présente une rougeur vive, un ramollissement très-marqué et tel que la membrane ne peut être enlevée sans entraîner une couche de substance grise d'un à deux ou trois millimètres d'épaisseur. Dans les points où la méninge altérée est en contact avec la substance blanche, à la protubérance et autour des pédoncules, par exemple, on peut plus facilement l'enlever sans entraîner la substance sous-jacente moins disposée à se ramollir que la substance grise.

Généralement le noyau central des hémisphères, c'est-à-dire le centre de Vieussens, le corps strié et la couche optique se présentent dans leur épaisseur ni coloration anormale, ni diminution de consistance. Il n'en est pas de même du trigone cérébral, du septum lucidum et de toute la couche de substance blanche ou grisâtre qui tapisse la cavité des ventricules. Toutes ces parties, les premières surtout, présentent dans plus de la moitié des cas un ramollissement blanc crémeux, souvent porté à un degré tel que leur substance tombe en débris et en flocons déliquides qui troublent la sécrésité cérébrale. Ce ramollissement dont la valeur pathologique a été souvent exagérée, en particulier par Abercrombie qui en forme une variété de l'encéphalite, nous a presque toujours donné l'idée d'un résultat purement cadavérique. On se le constate presque

jamais sans que les ventricules ne contiennent une certaine quantité de sérosité. Il serait téméraire d'affirmer que ce ramollissement n'est que l'effet d'une macération cadavérique, mais il est bien certain que s'il se produit pendant la vie et résulte d'une altération pathologique, il n'entraîne aucune modification notable dans l'ensemble des symptômes. On trouve des méningites sans ramollissement parfaitement semblables à d'autres qui s'en accompagnent.

Dans des cas exceptionnels on trouve un ramollissement véritablement pathologique de la substance cérébrale qui peut alors modifier les symptômes. Chez un enfant dont nous avons déjà rapporté l'histoire (voy. t. I, p. 335), qui présentait toutes les lésions propres à la méningite tuberculeuse, il existait un ramollissement partiel jaune-ecru dans le voisinage de la corne sphénoïdale du ventricule latéral droit; mais les symptômes qui auraient pu caractériser cette altération pendant la vie s'étaient perdus au milieu de ceux de la méningite. Il n'en a pas été de même dans les cas que nous avons rapportés page 347 et suivantes de ce second volume; nous avons alors accompagné ces faits de remarques qui nous dispensent d'y revenir actuellement.

Nous avons déjà dit que parmi les granulations méningées on en rencontrait souvent d'assez avancées pour représenter de véritables tubercules; quelquefois même ceux-ci ont un volume considérable et forment de petites masses par leur agglomération. Dans beaucoup de cas on trouve aussi des tubercules dans l'épaisseur de la substance cérébrale, ou bien de grosses masses de même nature qui, développées primitivement dans les méninges, se sont enfoncées dans la substance nerveuse qui les entoure presque de toutes parts, et semblent avoir pris naissance dans son épaisseur. Nous décrirons ailleurs plus en détail l'anatomie pathologique des tubercules encéphaliques.

Chez les sujets qui ont succombé à une méningite tuberculeuse on trouve presque constamment des lésions de même nature dans les viscères du thorax et de l'abdomen. Dans la plupart des cas ces tubercules sont encore peu

avancés, souvent même à l'état de granulations miliaires. Les ganglions bronchiques, les poumons, les ganglions mésentériques, les plèvres et la séreuse abdominale, sont les organes où on en rencontre le plus ordinairement. Leur coïncidence avec les granulations méningées est un indice des plus précieux sur la nature de celles-ci, difficile à déterminer dans certains cas où elles sont peu nombreuses et encore à l'état naissant. On trouve en effet de temps en temps des cas embarrassants : on voit, par exemple, chez quelques sujets des traces très-marquées de phlegmasie dans les méninges et à peine quelques granulations, on comprend qu'alors on soit tenté de ne voir là qu'une méningite simple; mais si des tubercules existent ailleurs, il est bien plus probable que la méningite a son point de départ dans la cachexie tuberculeuse. On voit dans d'autres cas les viscères thoraciques et abdominaux parfaitement sains, bien qu'il y ait dans les enveloppes du cerveau des granulations de nature évidemment tuberculeuse. Ces différences dépendent de ce que, dans le premier cas, il a suffi d'une influence très-faible de la part de la cachexie sur les organes intra-crâniens, pour y développer une inflammation; et dans le second cas, de ce qu'en vertu d'une prédisposition spéciale de l'encéphale, c'est sur lui en premier lieu que la cachexie a porté son action pour s'y localiser.

La nature de la méningite tuberculeuse nous est donc ainsi connue que celle des pleurésies et des péritonites tuberculeuses. La différence essentielle à établir entre ces maladies, c'est que la localisation de l'affection générale qui les produit toutes, s'opère plus souvent d'une manière sourde et latente dans la plèvre et dans le péritoine, tandis que dans les méninges elle développe immédiatement une inflammation très-vive; ainsi cette méningite est-elle beaucoup plus aiguë que les pleurésies et les péritonites tuberculeuses, et il est infiniment plus rare de constater des granulations non accompagnées de phlogose dans les méninges que dans tous les autres organes. Dans le cours de nos recherches nous n'avons encore rencontré que deux

cas de ce genre. M. Piet n'a également trouvé que deux fois des granulations chez des sujets qui n'avaient jamais présenté de symptômes cérébraux.

Ces considérations nous conduisent à établir que dans la méningite tuberculeuse l'inflammation a une plus grande part aux symptômes et à la marche du mal que dans les phléisies thoraciques et abdominales. Cette vue est la seule qui puisse servir de base aux indications rationnelles que comporte le traitement de cette affection.

CAUSES.

Les causes de la méningite tuberculeuse sont de deux ordres. Les unes sont éloignées et ont pour effet primitif la diathèse tuberculeuse ; les autres agissent directement sur les centres nerveux et déterminent la localisation de l'affection générale dans ces organes, en même temps qu'elles favorisent le développement de la phlogose concomitante.

Les premières sont toutes celles que nous avons étudiées dans nos généralités sur la maladie tuberculeuse. Nous nous croyons dispensé d'y revenir. Ce que nous avons à rechercher ici ce sont les circonstances en vertu desquelles cette aberration de la nutrition se manifeste dans les organes encéphaliques plutôt que dans d'autres parties du corps, et pour quelles raisons cette localisation ne peut s'effectuer sans entraîner presque constamment une phlogose aiguë ou sub-aiguë qui souvent n'est point en rapport par son intensité avec la lésion tuberculeuse elle-même.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'état physiologique du système nerveux dans l'enfance, pour se rendre compte de la fréquence des méningites tuberculeuses à cet âge. En effet, ce système jouit déjà d'une certaine énergie fonctionnelle et d'une grande activité nutritive. A aucune autre époque de la vie les systèmes capillaires de la pulpe nerveuse et des méninges ne sont injectés et parcourus par une plus grande quantité de sang. L'exhalation séreuse paraît aussi plus active, car la quantité de sérum ventri-

culaire ou extra-cérébral qu'on trouve sur le cadavre offre une moyenne relativement plus considérable que chez les adultes.

Soit que l'on considère la pie-mère comme l'organe sécréteur de la pulpe nerveuse, soit qu'elle ait simplement pour usage de fournir un lais celluleux aux innombrables vaisseaux qui ne doivent pénétrer dans la substance encéphalique qu'à l'état de ramifications capillaires, cette membrane n'en est pas moins un tissu éminemment vasculaire. Elle offre sous ce rapport une analogie parfaite avec le poumon, l'appareil ganglionnaire, la rate, le foie, qui sont si souvent le siège de la tuberculisation. Si donc cette condition est favorable, comme il n'est pas permis d'en douter, au dépôt de la matière tuberculeuse, on conçoit que la pie-mère étant plus vasculaire dans l'enfance, devienne à cet âge le siège assez fréquent de la maladie. Enfin, il est évident que cette condition favorise également le développement d'une phlogose aussitôt qu'il existe dans les méninges un certain nombre de granulations, dont l'action peut être assimilée à celle de tous les corps étrangers qui irritent les organes dans lesquels ils séjournent.

De ces considérations et de ce que nous avons dit ailleurs de la fréquence des maladies tuberculeuses dans l'enfance, nous pouvons conclure que si la méningite tuberculeuse s'observe très-souvent à cet âge, c'est en premier lieu parce que la cachexie y est très-fréquente. En second lieu, si, sur un nombre égal d'adultes et d'enfants cachectiques, l'affection se localise plus souvent dans les méninges chez les jeunes sujets, on en trouve la raison dans l'excitabilité plus grande des centres nerveux, dans leur vascularité et dans l'activité de leur nutrition.

On sait par la thèse de M. Le Diberder (1) et le mémoire de M. Valleix (2) que cette maladie se rencontre pendant la jeunesse et même dans l'âge moyen. Nous en avons nous-même observé quatre cas chez des sujets de dix-huit

(1) Thèse de Paris, 1837.

(2) *Arch. gén. de méd.*, 1833, 2^e série, t. 1, p. 2.

à trente ans, à l'Hôtel-Dieu de Lyon ; mais il est bien certain que ces cas sont rares et que la maladie est presque spéciale à l'enfance. D'après les relevés déjà assez nombreux qu'on possède sur ce point, il est démontré que le rapport de fréquence aux différentes époques de l'enfance est à peu de chose près le même pour cette maladie que pour l'affection tuberculeuse considérée en général. Nous avons établi ailleurs (t. I, p. 481) que leur plus grande fréquence apparaît de cinq à onze ans. Nous allons voir qu'il en est à peu près de même pour la méningite.

M. Piel dit que sur un relevé de quatre-vingt-dix observations, entre onze mois et quinze ans, le maximum de fréquence portait sur les 6^e, 7^e et 8^e années. Mais ces observations n'étant pas exclusivement relatives à la méningite tuberculeuse, il ne faut pas en tirer de conséquences trop absolues. D'après le relevé de M. Boquerel, qui porte sur trente cas, on en trouve treize de deux à cinq ans, deux de cinq à dix, cinq de dix à quinze. On voit ici déjà que la maladie est plus fréquente dans la première période, qui n'est que de trois années, que dans chacune des suivantes qui est de cinq ans. On voit à peu près les mêmes rapports dans le relevé suivant présenté par M. Guersent. Sur quarante-six cas observés avant quinze ans, ce médecin en a trouvé quatorze avant cinq ans, vingt-un de cinq à dix ans, onze de dix à quinze ans.

Voici à notre tour les résultats de notre observation. Sur trente-six cas recueillis avant l'âge de quinze ans, nous en avons compté vingt avant cinq ans, dix de cinq à dix ans, six de dix à quinze ans.

En réunissant ces trois catégories, qui ne comprennent que des cas de méningite tuberculeuse, nous aurons le relevé général suivant :

Avant l'âge de 5 ans,	47 cas.
de 5 à 10 —	43
de 10 à 15 —	32

Total : 122 cas.

On voit par ce relevé que le maximum de fréquence des affections tuberculeuses, considérées en général dans les périodes successives de l'enfance, correspond assez bien à celui de la méningite tuberculeuse. Cependant cette affection a une plus grande tendance à se développer chez les plus jeunes sujets, tandis que la phthisie abdominale appartiendrait un peu plus spécialement à la période moyenne de l'enfance, et la phthisie thoracique à la dernière.

L'influence du sexe est encore assez mal connue, parce que la plupart des auteurs n'ont pas indistinctement recueilli leurs observations sur des enfants des deux sexes. En consultant les auteurs qui ne connaissent pas exactement la maladie, on voit que la plupart l'ont jugée plus commune chez les filles, d'autres ont pensé qu'elle attaque également les deux sexes. M. Guersent professe que la méningite tuberculeuse est un peu plus commune chez les filles que chez les garçons. Nous voyons dans le mémoire de M. Bequaert que sur trente cas il en a recueilli vingt chez les filles, dix chez les garçons. Il aurait fallu dire si le mouvement des deux services avait été le même; nous pensons que dans ce cas la différence eût été moins prononcée. D'un autre côté nous trouvons dans le même mémoire qu'au mouvement de quatre cents malades environ du 1 avril au 1 octobre 1837, dans le service des filles, a fourni dix-sept cas de méningite. Or, l'année suivante, dans le service des garçons, nous avons, sur quatre cent deux enfants observés du 1 avril au 1 octobre, rencontré dix cas de méningite tuberculeuse. On voit que ces relevés portent sur un mouvement à peu près égal, mais qu'étant pris dans deux années consécutives ils ne sont pas parfaitement concluants. On n'aura sur ce point des données précises qu'autant qu'on comparera les cas recueillis sur un même nombre de sujets des deux sexes et dans le même temps. En attendant nous sommes porté à croire que, comme les autres affections tuberculeuses et comme les maladies cérébrales en général, la méningite tuberculeuse est plus fréquente chez les filles.

C'est encore parce qu'en a longtemps confondu la méningite simple avec la méningite tuberculeuse, que les auteurs ne sont pas d'accord sur l'influence de la constitution et du tempérament. Fothergill et Osier pensent que les sujets les plus prédisposés sont les enfants vigoureux, actifs, avancés de corps et d'esprit. Au contraire MM. Sena, l'arant, Charpentier, ont noté au nombre des causes prédisposantes le tempérament lymphatique ou nerveux et une constitution affaiblie. D'après les observations plus récentes de MM. Pict, Gerhard, Guersant, Becquerel et les nôtres, il est démontré pour nous que ce que nous avons dit de la constitution et du tempérament dans ses rapports avec la cachexie tuberculeuse est généralement applicable à la maladie qui nous occupe en ce moment; c'est-à-dire que le tempérament lymphatique et une constitution primitivement faible se rencontrent chez la plupart des malades. Mais il faut aussi reconnaître qu'un tempérament nerveux, une surexcitabilité nerveuse habituelle favorisent, chez des sujets disposés à la maladie tuberculeuse, sa localisation dans l'appareil de l'innervation.

L'influence de l'hérédité doit être également examinée sous un double rapport. Tantôt on constate que les parents ont succombé à quelque maladie tuberculeuse, tantôt à des maladies cérébrales, à des affections convulsives par exemple. On voit dans certaines familles tous les enfants succomber, les uns à des affections tuberculeuses ou acrophaseuses, les autres à des maladies cérébrales simples; d'autres enfin, soumis à l'influence complexe de l'hérédité, sont atteints de méningite tuberculeuse. On n'a qu'à réunir les remarques que nous avons faites sur l'hérédité en traitant de la cachexie tuberculeuse, à ce que nous en avons dit en parlant des convulsions, pour se faire une idée complète de ce genre d'influence.

L'action des saisons n'est pas encore bien connue. La plupart des observations faites par les auteurs sont relatives à la méningite considérée en général. C'est pour cela que nous ne les indiquerons pas. D'après les conséquences approximatives qu'on peut néanmoins en tirer, d'après

ou relevé de M. Piet et un autre de M. Becquerel, d'après l'ensemble de nos observations, nous penons, avec M. Garreson, que les saisons les plus favorables au développement de la méningite tuberculeuse sont le printemps et l'été.

Les causes externes, telles que des coups et des chutes sur la tête, l'insolation, se rencontrent rarement. A cet égard il est bon de se tenir en garde contre les rapports des personnes préposées aux soins de l'enfant, qui sont souvent portées à attribuer à des chutes ou à des contusions légères toute espèce de maladie et surtout les maladies-cérébrales quand elles surviennent peu de temps après. Cependant ces rapports ne sont pas toujours dénués de fondement. Dans certains cas on peut admettre, en l'absence de toute lésion physique, que la frayeur et l'émotion causées par une chute, ont amené une perturbation de l'innervation capillaire, chez un enfant prédisposé, de donner le signal de l'explosion d'un mal latent et déjà préparé par des conditions étiologiques. Au résumé on ne constate l'influence des causes traumatiques que dans des cas exceptionnels. Celle de l'insolation est peut-être un peu plus fréquente, mais seulement comme cause occasionnelle. Si elle agissait seule avec assez d'énergie pour développer une méningite, celle-ci serait simple et non tuberculeuse.

La dentition laborieuse est rarement le point de départ de cette maladie, comme le prouve son peu de fréquence avant l'âge de deux ans. Il en est de même des vers et de la plupart des autres maladies des organes thoraciques et abdominaux. Leur mode d'action a été pendant longtemps mal compris. Si, par exemple, on voit assez souvent la méningite tuberculeuse survenir chez des sujets affectés d'une maladie chronique interne ou externe, ou récemment atteints de fièvres éruptives, d'éruptions dartreuses, d'une coqueluche opiniâtre, c'est que ces maladies sont de nature tuberculeuse, ou ont contribué à développer la cachexie. Celle-ci, une fois produite, se localise dans l'encéphale moins sous l'influence de ces diverses maladies, que sous celle des autres causes prédisposantes ou

occasionnelles que nous connaissons déjà. Cependant comme on voit dans certaines circonstances ces affections exercer une action directe sur les centres nerveux et y développer des congestions ou des inflammations simples, on ne peut pas révoquer en doute cette manière d'agir dans quelques cas de méningite tuberculeuse.

On peut résumer tout ce que nous savons de l'étiologie de cette affection dans les propositions suivantes :

1° Tout sujet qui en est atteint doit être considéré comme préalablement en proie à la cachexie tuberculeuse à un degré variable.

2° La localisation de la cachexie dans le système nerveux, lorsqu'elle est prématurée et à un degré plus avancé que dans les autres organes, s'explique par certaines causes physiologiques ou accidentelles qui modifient l'état de ce système et le prédisposent à cette localisation.

3° Le développement si fréquent de la phlogose dès le début de la localisation, s'explique par l'irritabilité du système nerveux, par l'activité de sa circulation et de sa nutrition.

4° Il est démontré que toutes ces conditions existent plus souvent réunies et à un plus haut degré dans l'enfance qu'aux autres âges.

Symptômes.

Dans la plupart des cas, le début de la maladie est bien tranché et rapide, dans quelques-uns elle est précédée de phénomènes chroniques d'après lesquels on peut soupçonner que les lésions tuberculeuses sont restées quelque temps sans éveiller vivement l'irritabilité de l'encéphale. Si ces lésions sont considérables, mais circonscrites, et agissent sur une seule région latérale du cerveau, elles peuvent déterminer des symptômes assez bien caractérisés que nous étudierons plus tard ; si, au contraire, elles sont disséminées dans plusieurs points des méninges ou des centres nerveux, leurs effets sont plus généraux. Ce sont communément une céphalalgie plus ou moins continue et

régulière, en état graduellement croissant d'apathie, de somnolence, de délire sourd, etc. ; il est rare que ces symptômes ne fassent pas place, au bout de quelques jours, à ceux d'une méningite aiguë, et qu'ils amènent la mort sans perdre leur forme chronique.

Que le début en soit ou non précédé, trois symptômes le caractérisent, savoir : la céphalalgie, le vomissement et la constipation.

Chez tous les enfants en âge d'exprimer leurs sensations on constate l'existence de la céphalalgie. Ordinairement frontale, elle est rapportée par quelques malades au sommet de la tête, ou arrière ou aux régions temporales. Elle est continue avec des redoublements de courte durée qui arrachent aux malades des plaintes ou des cris.

Le vomissement est aussi un symptôme presque constant. M. Gerhardt l'a constaté huit fois sur dix cas, M. Rulé deux fois sur quatorze, M. Pict dix-neuf fois sur vingt-quatre, M. Boquerel treize fois sur dix-sept et nous-même quatorze fois sur seize; ainsi sur quatre-vingt-un cas les vomissements n'ont manqué que quinze fois, c'est-à-dire dans moins du cinquième des cas. Ils varient d'ailleurs beaucoup sous le rapport de leur abondance et de leur qualité ; les uns ont lieu après l'ingestion des aliments et des boissons, les autres sont formés par un liquide mucoso-bilieux ; d'autres fois par du mucus ou de la bile pure.

La constipation est peut-être encore plus constante que les vomissements. Sur quatre-vingt-sept cas analysés par ces mêmes observateurs que nous venons de citer et par nous-même, elle n'a manqué que sept fois. Dans ces cas exceptionnels il existait une diarrhée produite par une désorganisation tuberculeuse de l'intestin ; c'est en effet la seule circonstance qui puisse s'opposer à la constipation, et dans plusieurs cas celle-ci ne s'en établit pas moins. On peut reconnaître en principe que toute diarrhée qui ne se lie pas à des désordres intestinaux très-graves, s'arrête sous l'influence de la méningite.

A ces trois symptômes essentiels du début il s'en ajoute

longues quelques autres plus ou moins caractéristiques. Par moments l'enfant est agité, dans d'autres il est abattu et porté à dormir; il commence même à délirer dans cette période; il est irritable, les mouvements qu'on lui impose semblent augmenter la céphalalgie, il pousse des cris aigus que l'on ne peut s'expliquer que par une souffrance intérieure; leur caractère spécial les a fait appeler par M. Coindet cris *hydrocéphaliques*. Parfois il grince des dents, a quelques mouvements convulsifs dans les muscles de la face, du strabisme, la face est tumescente et offre des alternatives de pâleur et de rougeur; avec ces changements coïncident souvent les redoublements céphalalgiques. La rétine est très-sensible à la lumière; la pupille tantôt dilatée, tantôt contractée, est agitée d'oscillations; les paupières sont closes, et quand on veut les écarter le malade les contracte fortement; l'ouïe paraît souvent plus sensible qu'à l'état normal, des bruits un peu violents fatiguent visiblement le malade; la sensibilité cutanée est augmentée, quelquefois elle l'est à un tel point que le moindre attouchement paraît douloureux et le pincement de la peau insupportable. C'est à cet état qu'il est souvent permis d'attribuer la douleur que la pression développe à la région épigastrique et sur tout l'abdomen. Cette douleur qui peut cependant être réelle et se rattacher, comme les vomissements, à une lésion spéciale de l'innervation, est toujours un signe équivoque quand la sensibilité de la peau est exagérée; il est loin de suffire pour prouver l'existence d'une gastrite comme on le pensait souvent à une époque encore peu éloignée. Le ventre est généralement souple et rétracté; il peut en être autrement quand il existe une phthisie abdominale. Il y a toujours anorexie, mais peu de soif; la langue est communément sans rougeur et sans sécheresse. La fréquence du pouls est à peu près constante, et souvent on y trouve déjà un peu d'irrégularité ainsi que dans la respiration. La peau est plus chaude qu'à l'état normal, et chez quelques malades le molimen hyperémique détermine des épistaxis.

Dans la seconde période, quelques-uns des symptômes

que nous venons d'énumérer disparaissent, la plupart persistent, mais se modifient. Pour en faire un examen plus complet nous passerons méthodiquement en revue toutes les fonctions.

Les désordres de l'intelligence sont presque toujours appréciables même chez les jeunes enfants. Dans un âge très-tendre ce n'est point un véritable délire qu'on peut constater, mais pour peu que l'on soit familiarisé avec l'observation, qu'on ait appris à juger à quel degré dans l'état normal l'intelligence est développée aux différentes époques de l'enfance, on peut toujours reconnaître, même avant l'âge de deux ans, que les facultés fondamentales de l'entendement, l'attention et la perception, sont plus ou moins dérangées. Il faut toutefois se garder d'attribuer à une maladie ce qui ne serait que l'effet de la colère ou une irritabilité morale passagère. C'est ici que les renseignements fournis par les parents ont ordinairement une grande valeur, surtout s'ils sont instruits et d'un esprit judicieux; connaissant mieux, par l'habitude de tous les jours, le degré d'intelligence acquis par l'enfant, ils sont plus capables d'apprécier les moindres changements survenus dans les actes de l'entendement.

Le délire se manifeste dès la première période, surtout pendant la nuit; quelquefois il est le premier symptôme de la maladie; généralement il augmente pendant quelques jours; il est presque toujours tranquille, analogue à des rêveries mêlées de mots sans suite, mal articulés et d'une espèce de marmonnement; rarement il est bruyant, accompagné de vociférations et de mouvements violents, et l'on n'est presque jamais obligé d'attacher les malades. Il y a moins de loquacité que dans le délire qui se lie à beaucoup d'autres maladies, à la fièvre typhoïde elle-même dans certains cas. Cette forme du délire n'est pas, comme l'ont pensé Parent et Martinet, spéciale aux méningites de la base; on la rencontre dans beaucoup de cas où de fausses membranes existent sur la convexité; mais elle est due à la marche souvent sub-aiguë de la méningite tuberculeuse, ou bien plutôt à ce que chez les enfants plusieurs des

facultés intellectuelles, notamment l'imagination, ne sont encore que peu ou point développées.

« Jamais continu, dit M. Piet, le délire alterne dès le commencement avec le coma. On peut aisément, sauf les derniers jours ou les dernières heures, tirer le malade de son état. Qu'on le questionne, il répond juste, mais d'un ton toujours bref, non traînant, comme celui des typhoïdes, d'un air maussade, en fronçant la racine du nez. Il sort la langue quand on l'ardonne, et semble quelques-fois l'oublier hors de sa bouche; il appelle lui-même pour ses besoins, et, une fois satisfait, retombe dans sa rêverie. Odier nous peignait fort bien cet état de torpeur. « Ce n'est, dit-il, ni de la léthargie, ni le sommeil ordinaire, mais plutôt, cette sorte d'engourdissement qu'on éprouve le matin lorsqu'on a bien dormi, qu'on voudrait dormir encore, mais qu'on en est empêché par quelque cause extérieure trop légère pour réveiller complètement, suffisante pour réveiller à demi. » Et plus loin : « ils semblent rêver plutôt qu'ils ne délirent. Ils rêvent souvent les yeux ouverts. » Souvent le calme est si profond, l'expression de la face si tranquille, qu'on ne pourrait croire à l'imminence de la mort (1). »

Les cris dits hydrocéphaliques sont un des caractères du délire propre aux méningites. Ils ne dépendent pas exclusivement de l'épanchement, comme le pensait M. Coindet, car on les observe dans les méningites sans épanchement. La nature de ces cris est très-difficile à déterminer. Si parfois ils paraissent provoqués par des lancements douloureux dans la tête, d'autres fois ils s'échappent sans aucune cause apparente, au milieu du calme le plus complet, et à l'instant même où le malade dira qu'il ne sent aucun mal. Ils semblent alors résulter d'une véritable aberration de l'entendement et de la volonté. Aigus dans le principe, traînants, paraissant sortir de la tête, comme on l'a dit, poissés par intervalles, ils s'éteignent en un murmure sourd ou confus, ou s'arrêtent brusquement pour laisser

(1) Piet, *monographie*, Gaz. méd., p. 776.

tomber le malade dans le coma. Violents et répétés dans les premiers jours ils diminuent et disparaissent à mesure que l'assoupissement augmente.

Tels sont les caractères du délire; il va en diminuant à mesure que la somnolence fait place à l'assoupissement et celui-ci à un état comateux et catolique. Dans des cas peu nombreux le délire manque à toutes les périodes du mal; le coma débute d'emblée.

Les lésions de la sensibilité sont encore plus constantes que celles de l'intelligence et plus mises à reconnaître.

La sensibilité cutanée, déjà augmentée dans la première période, devient encore plus vive au commencement de la seconde pour s'affaiblir ensuite peu à peu. La céphalalgie n'est presque plus accusée par le malade, soit qu'elle disparaisse réellement, soit que le trouble des idées s'oppose à ce que le malade exprime bien ses souffrances. L'irritabilité de la rétine, vive d'abord, diminue à mesure que l'agitation et le délire font place au coma. L'état des pupilles est variable; tantôt elles sont dilatées ou rétrécies également des deux côtés, tantôt elles le sont inégalement. Très-souvent il y a un strabisme convergent des deux yeux ou d'un seul, plus rarement le strabisme a lieu en dehors. Les paupières sont à demi fermées, se contractent quand on veut les écarter; il peut y avoir d'un côté paralysie de l'élevateur, de l'autre ce muscle agit encore. Ces différentes lésions de l'appareil oculaire peuvent être attribuées à l'irritation générale des parties du cerveau qui président à la vision et aux mouvements de l'œil, mais souvent aussi à ce que les portions de méninges contiguës aux bandelettes, au chiasma et aux nerfs optiques, ou bien aux nerfs des troisième, quatrième, cinquième et sixième paires, sont enflammées, épaissies tout autour de ces nerfs. L'ouïe, ordinairement exaltée pendant la première et la seconde périodes, se conserve le plus souvent jusqu'à la mort. Quant à l'état du goût et de l'odorat, il est difficile de s'en assurer.

Parmi les lésions du mouvement, nous avons déjà parlé de celles qui se rapportent aux muscles des yeux. Dans le

reste du corps où constate assez souvent de véritables convulsions. Le plus ordinairement elles sont partielles et presque jamais générales. Elles se rencontrent de préférence chez les plus jeunes sujets.

Les contractures sont plus communes que les convulsions cloniques proprement dites. On a cherché à les expliquer par les ramollissements cérébraux qui accompagnent la méningite; mais M. Pict, dont les observations ont confirmé l'opinion de M. Lallemand qui considère les parties blanches moyennes comme étrangères à la sytilité, a parfaitement démontré, après MM. Sans, Charpentier et Gerhard, etc., que l'on rencontre assez souvent des contractures dans des cas de méningite sans ramollissement, et, par contre, des cas de ramollissement sans contractures. « Celles-ci, dit-il, indiquent parfois certains de ramollissements ou de tubercules cérébraux, lorsqu'elles se développent sans fièvre et d'une manière chronique, n'ont plus la même valeur lorsqu'elles surviennent dans le cours d'une méningite aiguë, et dans ce cas elles ne déterminent point s'il existe ou non de ramollissement, ni que siège il peut occuper.

Les contractures occupent quelquefois les muscles du tronc et produisent le renversement de la tête ou la rigidité de la colonne vertébrale; si dans ce cas elles sont permanentes, elles indiquent ordinairement que l'inflammation s'étend à la moelle épinière ou à ses enveloppes. Elles siègent de préférence aux membres et plutôt aux supérieurs qu'aux inférieurs. Elles consistent en une raideur fixe d'une ou plusieurs articulations dans la position demi-fléchie. Il ne faut pas les confondre avec la résistance volontaire apportée par le malade aux mouvements qu'on imprime à ses membres. Elles appartiennent à la seconde période, et se prolongent dans la dernière pour faire bientôt place à la résolution ou au moins alterner avec elle.

Le faciès, déjà remarquable dans la première période, devient plus caractéristique encore dans la seconde. Nous avons parlé des rougeurs momentanées qui remplacent spontanément ou sous l'influence d'une excitation quelcon-

que la pâleur habituelle du visage. Celui-ci ressemble à une statue de cire tant par le teint que par l'immobilité et le défaut d'expression de tous les traits. On constate une déviation permanente de la bouche ou de la langue ; tout se résume le plus souvent à quelques mouvements convulsifs d'un ou plusieurs muscles qui produisent quelques grimaces passagères. Presque tous les malades ont des mâchonnements ou quelques grincements de dents. Dans certains cas on voit même des phénomènes de trismus. Quant au décubitus, il varie dans les premiers jours ; mais aussitôt que l'agitation diminue, le malade change moins souvent de place dans son lit, et se tient de préférence couché sur le côté, les jambes fléchies sur les cuisses et celles-ci sur le tronc, les bras ramenés contre la poitrine, les coudes fléchis et les mains rapprochées devant l'estomac, près du menton. Il est ramassé sur lui-même comme quelqu'un qui a froid. C'est ce mode de décubitus qu'on a appelé *en chien de faulx*. Quand la maladie est plus avancée, que le coma et la résolution des membres existent, le décubitus est ordinairement dorsal.

L'état du pouls, qui n'est jamais normal dans la méningite aiguë, est fort important à bien connaître. Selon Robert Whytt, le pouls, fréquent dès le début, devient ensuite lent, et plus tard il s'accélère de nouveau. C'est sur ces trois états différents que le médecin d'Edimbourg a basé sa division de l'hydrocéphale aiguë en trois périodes. Ces phases ne sont pas assez constantes pour servir de base unique à cette division, et si elle mérite d'être suivie, c'est encore plus pour la manière dont l'ensemble des symptômes se comporte qu'uniqueinent d'après les caractères du pouls. Néanmoins la remarque de Whytt est applicable au plus grand nombre des cas. Quelquefois le pouls n'est fréquent au début que pendant très-peu de temps, et se ralentit avant que les autres symptômes annoncent la seconde période. Le caractère du pouls le plus important à constater, c'est son irrégularité. Elle se reconnaît de plusieurs manières, savoir : à ce que d'une heure à l'autre ou même dans l'espace d'une minute un

nombre souvent très-irrégulier de pulsations, ensuite à ce que, sur cent pulsations comptées de suite, les unes se succèdent rapidement, les autres lentement; enfin souvent à ce qu'il y a des intermittences. La même irrégularité se manifeste dans la force des pulsations comparées entre elles, soit au même instant, soit aux différentes heures de la journée. Toutes ces variations ont lieu dans de très-larges limites. Chez un enfant dont nous examinâmes le pouls quatre fois dans le même jour, à trois heures de distance, nous trouvâmes une différence de plus de cinquante pulsations par minute.

La chaleur de la peau est très-variable, elle est rarement continue. Par moments elle devient très-sensible, il y a des exacerbations fébriles qui correspondent en général à des redoublements dans les troubles cérébraux. Après ces paroxysmes la peau devient souvent moins chaude qu'à l'état naturel; les enfants semblent alors avoir froid et cherchent à s'envelopper de leurs couvertures, comme pour se réchauffer.

La respiration n'est pas moins irrégulière que la circulation. Elle est habituellement plus lente qu'à l'état normal, mais par moments elle s'accélère sans cause appréciable et s'élève de seize ou vingt à trente ou quarante ampliations du thorax par minute et même plus. Ces ampliations sont inégales, les unes courtes et incomplètes, les autres longues et profondes, souvent entrecoupées de soubresauts et presque singultueuses. Très-souvent il n'y a aucun rapport entre les irrégularités de la respiration et celles du pouls.

Les vomissements cessent ordinairement dans la seconde période; la constipation, au contraire, persiste et résiste même parfois jusqu'à la fin avec une opiniâtreté que ne peuvent surmonter les purgatifs les plus énergiques. Dans les cas où une maladie chronique a désorganisé une partie de l'intestin, la diarrhée, d'abord supprimée, reparaît vers la fin et les selles deviennent quelquefois involontaires. D'ailleurs, dans les cas simples, la palpation de l'abdomen, l'état de la langue, qui n'offre rien de particu-

lier, la soif peu intense, prouvent que le lobe digestif n'est le siège d'aucune altération de nature inflammatoire. Si parfois la langue et les lèvres sont sèches, fuligineuses même, c'est lorsque la bouche reste habituellement ouverte et qu'on néglige de faire boire l'enfant. C'est la même cause et peut-être aussi un défaut d'exhalation de la membrane pituitaire, qui produisent l'aspect pulvéulent des urines.

La déglutition qui s'opère bien pendant les deux premières périodes, devient plus difficile dans la dernière, et quelquefois les liquides reviennent en partie par le nez.

Quant à l'état des urines, de nombreuses observations ont confirmé l'assertion de M. Coindet qu'elles sont micacées. Seulement elles sont assez rares, souvent sédimenteuses. Leur émission devient involontaire vers la fin de la vie. De là l'odeur urineuse qu'exhalent souvent les malades. Cet écoulement n'a presque jamais lieu par regorgement chez les enfants, tandis que chez les adultes il est presque toujours l'effet de la rétention.

Les symptômes de la troisième période annoncent l'abolition presque complète de l'intelligence, la diminution de la sensibilité et l'affaiblissement de la puissance locomotrice. Aussi l'a-t-on appelée période de coma, de collapsus et de résolution. Le délire disparaît ; rien ne peut réveiller le malade du coma profond où il est plongé, pas même les piqûres, le placement de la peau, etc. ; à peine donne-t-il alors quelques signes de sensibilité, à peine a-t-il la volonté et la force de retirer le membre qu'on soumet à ces impressions douloureuses. La vision est très-affaiblie ou même abolie ; la pupille, souvent très-dilatée, est immobile ; la déviation des globes oculaires plus ou moins permanente ; les paupières écartées laissent exposé à l'air le segment inférieur de la cornée qui devient terne, se couvre d'une couche aqueuse ou s'ulcère. L'ouïe se conserve plus longtemps que la vue. Les contractions alternent avec la résolution d'un ou plusieurs membres. Par moments l'irradiation cérébro-musculaire redevient plus énergique, et produit parfois des convulsions partielles ou

générales. Ces dernières sont rares, et quand elles ont lieu, souvent la vie épuisée par ce dernier effort s'éteint tout-à-coup à une époque où l'enfant paraissait devoir vivre encore quelques heures ou même quelques jours. Dans beaucoup de cas les forces locomotrices s'affaiblissent et s'éteignent peu à peu, les quatre membres sont dans une résolution complète, la respiration devient de plus en plus irrégulière, lente, anxieuse, stertoreuse. Le pouls, à peine sensible, a une fréquence extrême. Des tumeurs partielles et froides recouvrent différents points du corps. Le faciès devient méconnaissable. Le trismus est extrême, même chez des sujets non affaiblis avant le début et dont la maladie n'a duré que quelques jours. Enfin la vie cesse par cette extinction graduelle de toutes les fonctions.

La durée de la méningite aiguë varie dans d'assez larges limites. En réunissant les relevés de M. Green qui portent sur cent dix-sept cas à ceux de M. Boquerel qui reposent sur vingt-huit faits et aux nôtres qui sont déduits de nos observations complètes au nombre de vingt, nous trouvons que la maladie s'est terminée :

Avant le 8 ^e jour dans 40 cas.	
de 8 ^e au 15 ^e — — 69 —	
du 15 ^e au 21 ^e — — 54 —	
Après cette époque	10 —

Total : 165 cas.

On voit que la durée considérée d'une manière générale offre de grandes variations. Les trois périodes considérées isolément présentent encore de notables différences suivant les cas individuels. On voit des sujets chez lesquels la première dure un jour, chez d'autres elle en dure dix et même quinze. Chez d'autres la seconde passe presque inaperçue, le délire, les vomissements font place au coma, à la paralysie; à peine la lenteur du pouls peut-elle être constatée pendant quelques heures. Enfin la dernière période elle-même peut manquer ou être excessivement courte. Des convulsions ou une résolution subite

peuvent amener la mort quelques heures ou quelques instants après que tous les autres symptômes faisaient regarder le malade comme n'étant encore que dans la seconde phase de la maladie. Il ne faut donc point exagérer l'importance de la division que nous avons admise; car elle n'est applicable qu'à la pluralité et non à l'universalité des cas.

En résumé on peut dire que la marche est assez souvent aiguë plus souvent encore subaiguë, comme le sont en général les phlegmones qui dépendent de la carboxie tuberculeuse. Dans quelques cas la marche est beaucoup plus lente, et la méningite peut être considérée comme chronique. Les remarques dont cette forme de la maladie doivent être l'objet trouveront leur place dans la description des tumeurs tuberculeuses de l'encéphale, qui en sont ordinairement le point de départ. Enfin on doit reconnaître, comme le veut M. Guersent, que chez un grand nombre de sujets la méningite tuberculeuse est composée de deux périodes principales, l'une primitive chronique, l'autre aiguë qui n'est presque jamais que secondaire. Quand il en est ainsi il est permis d'établir que le dépôt des granulations tuberculeuses a précédé les lésions phlegmasiques de l'état aigu, et que celui-ci ne s'est déclaré qu'après que les granulations devenues plus nombreuses ont produit sur les méninges une irritation plus vive et plus étendue. Il faut opposer ces cas à ceux où la phlogose la plus aiguë se développe d'emblée, bien qu'il n'y ait encore qu'une très-petite quantité de ces produits morbides naissant dans l'encéphale.

Diagnose.

Le diagnostic différentiel de la méningite est sans contredit le point le plus difficile et le plus obscur de son histoire. Malgré les progrès récents de la science, d'importantes lacunes existent encore sur ce point. Il faut sans doute les attribuer d'abord à la difficulté même du sujet et aussi à ce qu'on a moins soigné à résoudre les questions dont la solution intéresse la pratique, qu'à établir des dis-

vinctions minutieuses. Souvent on a ainsi perdu un temps et des efforts précieux en discussions oiseuses. Il faut reconnaître en effet qu'il est peu important d'établir un diagnostic différentiel entre la méningite et d'autres maladies lorsque le traitement doit être identique. Une distinction absolue est alors à peu près inutile et ne peut être l'objet que d'une vaine curiosité. En un mot, c'est discréditer l'art du diagnostic que de le faire descendre à des subtilités dépourvues d'applications. Au contraire, rien n'est plus digne de notre étude que la détermination des signes propres à nous faire distinguer les unes des autres les maladies dont le traitement doit être différent; car si notre diagnostic est incertain ou erroné, nous n'aurons pour nous diriger dans le traitement aucune base sûre, aucun guide fidèle; c'est alors que la médecine pût tout entière, pour ainsi dire, dans le diagnostic, puisqu'il est la source d'où découlent toutes les applications pratiques.

Lorsqu'il s'agit de la méningite, est-il vraiment nécessaire, quand les signes annoncent une inflammation évidente de l'appareil cérébro-spinal, de savoir si la substance nerveuse seule est atteinte, ou si les enveloppes le sont exclusivement, ou si enfin la première et les secondes le sont simultanément? Il nous semble qu'on peut hardiment répondre par la négative, puisque dans tous les cas où ces diverses affections se ressemblent, le traitement est à peu près identique. Nous ne voulons pas condamner les efforts de quelques auteurs, et surtout du professeur Lallemand, pour arriver à la solution de ces difficultés; mais nous nous affirmer qu'ils ont porté peu de fruits. Il est bien autrement important de ne pas méconnaître une méningite lorsqu'elle existe seule ou en même temps qu'une autre affection, et il n'est pas sans danger de croire à son existence lorsqu'elle est simulée par une maladie qui, en réalité, en est très-différente; car le traitement devient presque inévitablement contraire ou incomplet.

Pendant longtemps on a, chez les enfants surtout, confondu la fièvre typhoïde avec la méningo-encéphalite. C'est principalement à l'époque où cette fièvre était considérée

comme une gastro-entérite que cette erreur a été fréquemment commise. Quand il y avait prédominance de l'élément nerveux, on appelait l'affection une gastro-céphalite, et l'on attribuait les accidents cérébraux soit à une complication de méningite, soit à une sympathie entre l'estomac et le cerveau, et cette seconde manière de voir aurait facilement l'emprise à tous les cas où l'autopsie ne faisait point découvrir de traces évidentes d'inflammation dans l'appareil cérébral. Lorsqu'un peu plus tard on a mieux connu la nature de la fièvre typhoïde, on a vu que les accidents cérébraux ne pouvaient s'expliquer simplement par une sympathie, mais qu'ils étaient aussi essentiellement liés que la dothiéntérie à un état général de l'économie, à une altération du sang, et que les cadavres ne présentaient que fort rarement les traces d'une véritable méningite.

Pendant longtemps on a commis une erreur d'un autre genre. On sait que dans la méningite les vomissements sont constants au début, et que souvent il existe une épigastralgie qui n'a ordinairement d'autre cause que l'exagération de la sensibilité cutanée. Or la réunion de ces deux symptômes et de quelques autres moins importants faisait diagnostiquer une gastrite. Peu importait l'état de la langue et l'existence d'autres signes négatifs, l'enfant accusait de la céphalalgie, bientôt le délire survenait : on disait alors que l'état du cerveau primitivement sympathique devenait la maladie principale, et qu'il fallait combattre une gastro-céphalite. Que d'erreurs dans cette interprétation des faits, et qu'il est facile de s'en convaincre par la lecture des travaux publiés à cette époque sur la méningite des enfants ! Combien d'hydrocéphales aigües ont été et sont encore mal à propos combattues par les sangsues à l'épigastre comme moyen principal de traitement !

Loin de nous cependant l'idée de prétendre qu'il y ait incompatibilité entre une gastrite ou une gastro-entérite et un ensemble d'accidents nerveux dépendant d'une méningite ou d'une simple réaction sympathique. Nous nous garderons bien de nier cette corrélation entre les maladies

de l'estomac ou de l'intestin et celles du cerveau ; et ce que peuvent produire une pneumonie, un érysipèle, etc., pourquoi une gastrite ne le pourrait-elle pas aussi bien ?

Il nous suffit d'avoir indiqué ces causes d'erreur ; car ce que nous avons dit ailleurs de la fièvre typhoïde et de l'influence qu'exercent les affections phlegmasiques ou diacritiques du tube digestif sur le développement des accidents cérébraux, nous a déjà donné la mesure des cas dans lesquels ces accidents peuvent être attribués à une véritable méningite. Les recherches les plus récentes ont prouvé, en effet, ainsi que nous l'avons vu, que la fièvre typhoïde est une maladie fréquente chez les enfants, et que beaucoup d'observations données par les auteurs comme des exemples de méningite, surtout dans les cas de guérison, n'étaient autre chose que des fièvres typhoïdes prises pour des méningites. D'un autre côté, on a démontré que dans l'immense majorité des cas, la méningite des enfants est liée à la diathèse tuberculeuse comme un résultat de sa localisation dans l'appareil cérébro-spinal, et que fort rarement elle est simple et franchement inflammatoire.

Ces données préliminaires étant établies, nous allons immédiatement aborder les questions de diagnostic différentiel qu'il est important de résoudre. Et d'abord demandons-nous s'il est possible et réellement utile de distinguer la méningite simple de la méningite tuberculeuse.

Reconnaissons franchement que cette distinction est difficile ; que si l'on peut la soumettre à quelques règles générales, celles-ci laissent beaucoup de faits en dehors de leur application, et qu'elles ne fournissent presque jamais les éléments d'une certitude complète. C'est surtout en effet, par la coexistence des signes de la cachexie tuberculeuse qu'on peut arriver à cette détermination ; or, si cette cachexie est peu avancée, si ses signes généraux sont nuls, si elle n'a encore entraîné aucune lésion locale appréciable dans les organes de la poitrine ou du ventre ; si, en un mot, elle a été complètement latente jusqu'au moment de l'invasion de la méningite, comment établir pen-

dant la vie que celle-ci reconnaît pour cause prochaine une cachexie tuberculeuse ? En supposant même que cette cachexie soit révélée par des signes peu équivoques, peut-on, par cela seul, affirmer que la méningite n'est pas simplement inflammatoire et qu'elle est nécessairement tuberculeuse ? Nous ne le pensons point. On voit beaucoup de cas dans lesquels les deux espèces de méningite ont des symptômes identiques, et bien qu'une marche sub-aiguë et une durée plus longue soient plus ordinaires dans la méningite tuberculeuse, comme celle qui est simple peut aussi marcher lentement et durer longtemps, cette différence ne peut conduire qu'à des probabilités et non à une certitude absolue, surtout au début du mal.

Quoi qu'il en soit de cette insuffisance de nos moyens de diagnostic, elle n'a, selon nous, qu'une importance médiocre au point de vue du traitement. C'est seulement pour le pronostic que ce défaut de lumières peut dans la pratique nous donner des regrets ; car il est malheureusement trop certain que la méningite tuberculeuse est constamment mortelle, tandis que la méningite simple laisse quelquefois un espoir de guérison. Dans ces deux cas, l'état actuel de la science ne nous permet pas de poser des règles différentes de traitement. Si l'on excepte les données fournies à la thérapeutique par l'existence de la cachexie tuberculeuse, et dont il est même le plus souvent impossible de tenir compte pendant le cours de l'affection aiguë qui la complique, on trouve une identité complète dans les indications que présentent ces deux espèces de méningites et dans les moyens à l'aide desquels on cherche à les remplir.

Il devient plus difficile et plus important de distinguer la méningite de quelques autres maladies de l'encéphale. Peu importe qu'elles soient primitives, idiopathiques ou qu'elles se développent au début ou dans le cours de quelque autre affection, et qu'alors elles soient consécutives et sympathiques, la difficulté est la même dans la plupart des cas.

Ces affections sont de plusieurs espèces : les unes ne

laissent à leur suite, sur le cadavre, qu'un épanchement séreux intra ou sous-arachnoïdien, ou plus souvent encore ventriculaire; d'autres ne laissent que des altérations fort légères ou même aucun désordre appréciable.

Nous avons déjà établi que les hydrocéphales aigües indépendantes de la méningite sont des maladies rares, et que celles qui mériteraient véritablement le nom d'essentielles sont aussi peu communes que l'hydrothorax et l'asthrite idiopathiques. Celles qu'on rencontre dans l'enfance peuvent à la rigueur dépendre, comme cela a lieu habituellement dans la vieillesse, d'un obstacle à la circulation veineuse. C'est ce qu'a démontré M. Tonnellé dans ses recherches sur les maladies des sinus de la dure-mère (1). Dans d'autres cas l'épanchement séreux n'est que l'extension d'une hydropisie occupant déjà d'autres membranes séreuses ou le tissu cellulaire. C'est ce qu'on peut voir dans les anasarques qui surviennent facilement chez des enfants affaiblis par de longues maladies. Mais c'est surtout ce qu'on observe dans l'anasarque scarlatineuse. Toutes ces variétés d'hydrocéphale aiguë présentent dans leur marche un caractère général qui les distingue des méningites : c'est la marche rapide de leurs symptômes et leur forme grave dès le début; les méningites, au contraire, vont en se prononçant graduellement par des symptômes de plus en plus tranchés et leur durée est plus longue.

Parmi les névroses idiopathiques, le plus grand nombre ne peuvent simuler la méningite aiguë; telles sont l'épilepsie, l'hystérie, la chorée, les convulsions. Les unes sont intermittentes (épilepsie, hystérie, convulsions dans beaucoup de cas), et ce caractère suffit pour écarter l'idée d'une maladie essentiellement inflammatoire. D'autres, comme la chorée, constituent une lésion limitée à la locomotion, caractère que ne présente point la méningite, qui, sinon au début, du moins dès la seconde période, compromet la sensibilité, l'intelligence et la motilité. Enfin les autres, comme l'éclampsie, lorsqu'el-

(1) Mémoires de l'Académie de Médecine, en 1822.

les se déclarent pour la première fois et qu'on ne peut encore constater l'intermittence, ont leur début, pour ainsi dire, foudroyant et des symptômes immédiatement graves; ce caractère manque dans les méningites. Enfin ces névroses ne sont point, en général, des affections fébriles, tandis que la méningite est toujours accompagnée de fièvre.

En dehors de ces maladies il existe un état nerveux, tantôt sympathique, tantôt idiopathique, qui simule presque complètement la méningite, et qui, en raison de cette ressemblance, pourrait être appelé pseudo-méningite. A en juger par les symptômes, on croirait à une véritable méningite; et, si l'on s'en rapporte à l'anatomie pathologique, rien de plus certain que l'absence de cette maladie, puisqu'on ne trouve aucune lésion appréciable dans les centres nerveux ni dans leurs enveloppes.

Cet état nerveux existe fréquemment comme complication de diverses maladies. Le diagnostic offre dans ce cas de sérieuses difficultés, parce que plusieurs symptômes généraux qui caractérisent une méningite idiopathique, peuvent être attribués à la maladie primitive, se suffisent à déceler la présence d'une phlogose encéphalique. C'est à cet ordre de faits que se rapportent les observations de M. Piet (1), dont nous allons parler.

Dans un premier fait il s'agit d'une fille de sept ans, affectée d'une variole dont la marche fut régulière jusqu'au deuxième jour. A cette époque, résorption des pustules; délire, cris, agitation vive pendant la nuit, qui cessaient pendant le jour. Cet état dura deux jours; alors grincement de dents, délire contin, mais calme; quelques convulsions mineures, diarrhée bilieuse. Les jours suivants, mêmes symptômes, coloration variable de la face, grincements de dents, trismus, cris aigus; réponses incohérentes, pupilles inégalement dilatées; assoupissement, perte incomplète de connaissance, céphalalgie, pouls à 112; sensibilité générale du ventre. Les derniers jours de la vie, coma incomplet, diminution du trismus et du grin-

(1) Mém. de méd.

cement de dents, langue sèche, nouvelles fausses membranes qui s'ajoutent à celles qui depuis plusieurs jours s'y déposaient par petites plaques; toux habituelle, vive. L'enfant, qui n'a jamais eu de constipation, meurt sans convulsions trente-six jours après le début de la variole. A l'autopsie les méninges sont saines, la substance cérébrale piquetée seulement d'un peu de sang. Point d'épanchement séreux ni d'infiltration sous-arachnoïdienne. *Mucosae gastricae, recouverte de mucosité épaisses, rouge, épaissie, réduite en bouillie dans la région pylorique. Même état du duodénum. Etat sain de l'intestin grêle, des plaques de Peyer et du mésentère.*

« Ce fait, dit M. Piet, avait bien l'apparence d'une méningite : vomissements, délire, douleurs de tête, grincements de dents, trismus, pâleur et rougeur alternatives de la face, cris hydrocéphaliques, asoupissement, presque tous les symptômes étaient réunis. Il ne s'est distingué des méningites ordinaires que par l'invasion lente et graduelle du délire, qui dans celles-ci débute ordinairement d'emblée; par la durée plus longue des symptômes cérébraux, et, ce qui peut-être avait plus de valeur diagnostique, par la liberté du ventre, qui se conserva toujours, et se changea même en diarrhée au plus fort des symptômes cérébraux. Cependant ces différences étaient trop légères pour qu'on fût en droit de nier pendant la vie l'existence d'une méningite. »

Nous ferons sur ce fait une remarque dont nous tirerons parti plus tard. Sans doute la résorption prématurée des pustules varioliques devait faire craindre une inflammation viscérale; mais, comme les symptômes annonçaient en même temps d'une manière positive une inflammation gastro-intestinale, et d'une manière un peu équivoque une inflammation encéphalique, on devait par là soupçonner une pseudo-méningite plutôt qu'une méningite. Si celle-ci eût existé avec une intensité proportionnelle aux symptômes, elle n'eût pas manqué d'occulper l'inflammation gastro-intestinale, et surtout d'amener la constipation au lieu de la diarrhée.

M. Piet cite ensuite la dix-neuvième observation de l'ouvrage de M. Charpentier comme un exemple d'accidents cérébraux simulant la méningite. « Ce cas nous montre résolu sur un enfant de trois ans, aux symptômes d'une gastro-entérite intense, le renversement de la tête en arrière, la raideur du tronc, la dilatation des pupilles, les convulsions du globe oculaire, le strabisme, l'amaurose, l'assourissement prolongé, l'emprostothorax, sans aucune lésion sensible ni du cerveau ni de ses membranes; mais on voyait une vive injection de la muqueuse gastrique en rouge piqueté, au voisinage du pylore et dans le duodénum; l'inflammation de quelques valvules de la partie supérieure du jéjunum; des ulcères dans l'iléon avec de larges et convergentes plaques de follicules rouges, boursoffles, surtout vers la valve; les glandes méésentériques étaient rouges, mais non tuberculeuses. »

Il est évident que cette prétendue gastro-entérite n'était autre chose qu'une fièvre typhoïde. Les principaux symptômes de l'élément intestinal ne se suspendirent point malgré les accidents cérébraux, et cette circonstance devait faire présumer que ceux-ci tenaient moins à une véritable méningite qu'à l'élément nerveux un peu exagéré qui est essentiel à cette affection générale.

M. Piet cite un troisième fait, relatif à une petite fille de dix ans qui fut prise, au quatrième jour, d'une scarlatine en pleine éruption, d'accidents cérébraux qui durèrent dix jours, au bout desquels la mort arriva. On trouva l'encéphale sain, un phlegmon séparé du cou et des traces de péritonite sub-aiguë. Ce fait avait réuni plusieurs symptômes de la méningite; ramissements au début, constipation, coma, crânières, dilatation des pupilles, pâleur de la face, etc. Mais il n'y avait eu ni grimaces, ni trismus, ni méchonnement, et le pouls n'avait jamais eu cette lenteur qu'on remarque dans les premières périodes de la méningite. Nous remarquons encore que coïncidemment à l'apparition des accidents cérébraux il n'y a pas eu rétrocession de l'exanthème, circonstance qui en pareil cas peut éloigner l'idée d'une inflammation cérébrale, et que

si les accidents cérébraux se sont liés primitivement à la maladie générale, à la scarlatine, ils ont pu plus tard dépendre d'une influence sympathique exercée par le phlegmon de la région sous-thyroïdienne. Nous avons vu dans un cas analogue un phlegmon du cou se lier à une angine extrêmement intense, et nous regrettons que dans l'autopsie M. Piet n'ait pas mentionné l'état de la bouche, de la gorge et du larynx, puisque pendant la vie on avait remarqué que l'éruption scarlatineuse était vive à l'intérieur de la bouche, à la gorge; la langue sèche et râpeuse, etc.

On voit par ces faits, et nous pourrions en citer un plus grand nombre, que les accidents cérébraux qui compliquent les maladies générales, telles que les fièvres typhoïdes et éruptives, peuvent simuler la méningite, bien qu'à l'ouverture du cadavre ou a posteriori la preuve que cette maladie n'existait point pendant la vie. C'est aussi ce qu'on voit tous les jours dans l'infection purulente.

Ces accidents cérébraux, à l'ensemble desquels nous avons donné le nom de *pseudo-méningite*, se présentent même dans des maladies que nous avons l'habitude de considérer comme locales. Nous avons déjà montré combien il est fréquent de voir chez les enfants la pneumonie lobulaire ou lobaire s'accompagner au début ou dans son cours. Des cas de ce genre occasionnent de fréquentes méprises. Souvent on a méconnu la pneumonie et l'on n'a combattu que la méningite qu'on supposait exister. Ainsi a-t-on vu souvent des insuccès déplorables. S'il est arrivé qu'on ait triomphé du mal, on a cru avoir guéri une méningite quand on n'avait réellement guéri qu'une pneumonie dont la disparition avait entraîné celle de la pseudo-méningite. Nous avons prouvé par des faits (voir t. I, p. 222, et plus loin les observ. 9, 10 et 11) que la pneumonie s'accompagne tantôt d'une véritable méningite, tantôt d'un état nerveux simplement sympathique; et ce qui est vrai de la pneumonie s'applique à une foule d'autres maladies locales. C'est un fait si connu qu'il est inutile de le démontrer.

Nous n'hésitons pas à regarder comme nuisible dans la plupart des cas le traitement qu'on dirige contre les

pseudo-méningites. En effet, on emploie un traitement antiphlogistique là où il n'y a qu'une lésion de fonction, une névrose, pour ainsi dire, une irritation cérébrale, si l'on veut, mais qui ne dépend point d'un afflux sanguin, qui est bien plus nerveuse qu'inflammatoire, et qui le plus souvent ne fait que s'exagérer sous l'influence des moyens débilitants, si ceux-ci ne sont pas rendus nécessaires par la maladie coïncidente. Une autre circonstance Debove, c'est que les accidents nerveux étant en apparence très-effrayants, l'attention se concentre peut-être trop sur eux; ils font perdre de vue la maladie qui en est le point de départ, et l'on néglige de la combattre. Cherchons donc s'il n'est pas possible de donner au diagnostic des pseudo-méningites réflexives ou sympathiques, un peu plus de certitude qu'il s'en présente dans l'état actuel de la science.

Les maladies susceptibles de se compliquer d'accidents cérébraux graves sont, comme nous l'avons vu, générales ou locales. Dans les premières la méningite n'est probable que lorsque les lésions par lesquelles la maladie générale se localise dans certains organes sont peu prononcées, ou s'effacent à mesure que les accidents cérébraux se développent davantage. Si, au contraire, ces lésions locales continuent à se révéler par des troubles fonctionnels très-graves, les accidents cérébraux doivent être attribués à une pseudo-méningite. Voici de quelle manière on peut comprendre ces différences et les conséquences qu'il faut en déduire.

Lorsqu'une maladie générale, comme la fièvre typhoïde, partage son influence entre les organes des trois cavités splachniques, cette influence ne s'équilibre pas entre ces diverses localités, et ne va pas jusqu'à produire l'inflammation simultanée de tous les organes qui y sont renfermés. Mais elle agit en premier lieu sur la muqueuse intestinale, c'est là qu'elle se concentre pour former l'élément matériel et appréciable à nos sens le plus constant. En second lieu, elle détermine un état catarrhal de la muqueuse séreuse, qui se dégrade point aussi souvent que

la lésion intestinale ou une phlegmasie profonde; ce n'est que dans des cas exceptionnels que cet élément, en s'exagérant jusqu'à amener une pneumonie, devient une véritable complication. Enfin, un troisième élément de la fièvre typhoïde est le résultat de son influence sur le cerveau. Celui-ci, quoiqu'il détermine des accidents assez intenses et à peu près constants (céphalalgie, délire, assoupissement, stupeur, etc.), ne constitue point anatomiquement une lésion aussi appréciable que l'élément bronchique, et surtout que l'élément intestinal. Le plus souvent, à l'autopsie, le cerveau est sain ou ne présente que des traces d'hyperémie. Cet élément est donc pour nous bien plus une lésion de fonction qu'une lésion de structure. Or, la pseudo-méningite n'est que cette lésion de fonction exagérée, tandis que la méningite est une lésion de structure. Alors on remarque que la première ne modifie jamais aussi profondément la marche et les effets des éléments abdominal et thoracique que la seconde. S'il n'y a que pseudo-méningite, la diarrhée, la chaleur et le météorisme de l'abdomen, ne se suppriment, ni ne se modifient beaucoup; on voit évidemment que l'inflammation qui s'y rattache n'a point diminué sous l'influence des accidents cérébraux, parce qu'elle n'a point été déplacée par eux. Mais s'il y a méningite véritable, alors celle-ci opère une dérivation puissante par rapport aux autres éléments de la fièvre typhoïde, leurs symptômes s'effacent, l'inflammation intestinale est en grande partie déplacée par celle de l'encéphale, et l'activité vitale se concentre pathologiquement sur l'organe dont la lésion est devenue prépondérante.

Une interprétation analogue se présente pour les autres maladies générales; il est inutile de la développer.

Dans les maladies que nous considérons comme locales, une pneumonie par exemple, une gastro-entérite, un érysipèle, etc., le problème, quoique difficile à résoudre, l'est cependant un peu moins, et ici très-souvent le diagnostic approche du degré de certitude qu'il nous est donné en général d'atteindre en médecine. Dans ces cas il arrive

l'une ou l'autre de ces deux choses : ou la maladie encéphalique entrave la marche de l'affection qu'elle complique, ou ne l'entrave pas et semble, au contraire, suivre dans ses modifications celles de la maladie principale : dans le premier cas, il y a méningite ; dans le second, pseudo-méningite.

On sait, en effet, qu'il est rare de voir deux inflammations graves marcher simultanément, sans que bientôt l'une prédomine sur l'autre et l'éclipse, pour ainsi dire ; car, c'est alors qu'est applicable dans toute sa vérité l'apophorisme si connu : *Duas laboribus simul abortio*, non in eodem loco, vehementer obcurat alterius. Si donc une méningite complique une pneumonie, une gastro-entérite, un érysipèle, etc., la pneumonie, la gastro-entérite, l'érysipèle, etc., ne tardent pas à suspendre leur marche et disparaissent même complètement à mesure que la méningite fait des progrès. Nous en avons cité plusieurs (1), un exemple fait remarquer c'est celui d'un enfant de dix ans qui présenta d'abord des symptômes de pneumonie, mais qui bientôt eut tous les accidents caractéristiques d'une méningite ; pendant tout le temps que ceux-ci furent intenses, les symptômes rationnels de la pneumonie furent à peu près nuls, et ne reparurent que lorsque la méningite eut cédé à un traitement actif qui fut tout entier dirigé contre elle pendant plusieurs jours. Dans ce cas, l'antéposé a manqué pour vérifier l'exactitude du diagnostic ; mais le succès du traitement est une preuve suffisante et d'ailleurs bien plus satisfaisante.

Par contre, les accidents cérébraux, lors même qu'ils paraissent très-graves, s'ils ne modifient en rien la marche des maladies qu'ils compliquent, doivent être attribués à une pseudo-méningite. Dans ces cas là, on peut souvent présumer qu'ils ne sont qu'un effet sympathique d'une inflammation intense fixée sur un autre organe ; car, à mesure qu'un traitement rationnel diminue cette phlegmasie, on voit les accidents cérébraux diminuer ainsi

(1) T. I, p. 360, etc., 117.

et disparaître sans qu'on ait employé directement contre eux aucun moyen actif de traitement, ou bien par le seul usage des antispasmodiques, comme le fait si souvent avec succès M. Récamier, dans certaines pneumonies compliquées d'accidents nerveux qui cèdent comme par enchantement à l'emploi du musc. Nous avons rapporté aussi (1) deux observations de pneumonies compliquées à leur début d'accidents cérébraux, qu'à la rigueur on aurait pu attribuer à une méningite commençante, et qu'il y était certainement étrangers, puisqu'on se contenta de combattre la pneumonie par les antiphlogistiques ordinaires qui, en arrêtant ses progrès, firent disparaître la pseudo-méningite.

En résumé, c'est donc en étudiant l'influence des accidents cérébraux sur la marche et les symptômes, soit des divers éléments dont l'ensemble constitue les maladies générales, soit des maladies locales, dont ils sont une complication, qu'on pourra parvenir à déterminer s'ils se rapportent à une pseudo-méningite ou à une méningite. C'est aussi en étudiant les effets probables de ces maladies générales ou locales, en tant qu'elles provoquent les sympathies du cerveau et les effets des premiers tâtonnements thérapeutiques mis alors en usage, qu'on arrivera plus facilement à cette détermination. Ce but est très-important en pratique; car à la méningite il faut opposer un traitement actif, et non pas l'expectation; tandis que la pseudo-méningite ne réclame, pourvu qu'on traite convenablement la maladie à laquelle elle se rattache comme effet sympathique, que l'expectation ou une médication antispasmodique.

Nous arrivons maintenant à l'examen de quelques cas beaucoup plus rares que ceux dont nous nous sommes occupé jusqu'à présent: ce sont ceux dans lesquels, en l'absence de toute autre maladie, on constate les symptômes et la marche d'une méningite dont on ne trouve aucunes traces sur les organes des sujets qui succombent. Avant de

(1) T. V, p. 295 et 297, 260, 27 et 28.

discuter la nature de cette maladie, donnons une observation qui en prouve l'existence.

35^e obs. — *Enfant de quatre ans. Attaque d'éclampsie; retour incomplet à la santé; symptômes du début de la méningite; accroissement graduel de tous les accidents; mort après dix-huit jours de maladie.* — Thorel, âgé de quatre ans, d'une constitution moyenne, d'une santé habituellement bonne, est admis le 11 juillet 1838 à l'hôpital des Enfants malades, salle Saint-Thomas, n^o 8.

Les renseignements fournis par les parents de ce malade apprennent qu'il y a huit jours, au milieu d'une bonne santé, et après une malaise de quelques heures, il a été pris subitement de convulsions générales avec perte de connaissance, strabisme, serrement des mâchoires. Cette attaque d'éclampsie a duré plusieurs heures. Le lendemain, attaque semblable, mais qui n'a duré que quelques minutes, et qui ne s'est pas renouvelée. Les jours suivants céphalalgie, délire peu violent, agitation, alternant avec la somnolence; vomissements répétés et constipation opiniâtre; les parents ne savent pas si l'enfant a eu de la fièvre depuis les attaques d'éclampsie qui ont été d'ailleurs traitées par les moyens employés d'ordinaire, les sangsues, les rubéfians, les antispasmodiques. On s'est contenté les jours suivants de faire boire au petit malade une tisane émolliente. Mais la persistance des symptômes a engagé les parents à l'amener à l'hôpital.

Le 13 juillet, neuvième jour. Depuis hier le malade a été tantôt plongé dans la somnolence, tantôt agité; il a déliré, poussé des cris; pendant la nuit, il n'a cessé de changer de place dans son lit; ce matin il est assoupé, mais en lui parlant on l'éveille facilement; plusieurs de ses réponses sont justes, mais il répond comme quelqu'un qui s'impatiente et s'irrite; évidemment les facultés intellectuelles sont troublées; les sens paraissent plus excitables qu'à l'état normal, car le moindre pincement fait pousser des cris; l'œil fuit la lumière, bien que la pupille offre un état normal; il semble qu'il existe un léger strabisme; d'ailleurs il n'y a pas d'altération de la motilité; le

pouls est fréquent, à 110 environ; la peau est chaude; le faciès est animé et coloré, mais je n'observe pas d'alternatives de rougeur et de pâleur; la respiration est intacte; le malade n'a eu ni vomissement ni selles; abdomen indolent et peu développé, anorexie, soif vive, langue pâle.

Du diagnostic une méningite dans la première période, et l'on prescrit une fricte *délayante*, *sinapismes* aux jambes, *six sangues* à l'avant, un peu de lait pour aliment.

Le 14, pas d'amélioration; mêmes symptômes que la veille, même prescription, sauf les sangues; demi-lavement simple.

Le 15, la constipation persiste; pas de vomissements; le délire et l'agitation sont plus prononcés la nuit que le jour et alternent avec l'assoupissement; les sens sont toujours très-irritables, les mouvements sont intacts; le décubitus est très-varié et le faciès toujours animé; la nuit il y a eu une épistaxis légère; le pouls est à 120; la peau est chaude; on trouve sur le ventre trois ou quatre petites saillies papuleuses d'un rouge pâle, un peu analogues aux taches rosées de la fièvre typhoïde; mais il n'y a ni gargouillement ni météorisme; l'auscultation de la poitrine est tout-à-fait négative. — *Demi-lavement* avec miel *mercuriel*, 20 grammes.

Le 16, malgré le lavement purgatif, la constipation continue; la soif est vive et l'état fébrile se soutient; du côté du cerveau les troubles sont les mêmes que les jours précédents; le strabisme est plus marqué, les yeux sont hagards; expression d'inquiétude dans la physionomie; l'articulation des mots n'est pas nette, il semble que le malade, en parlant, a la bouche pleine de farine; la respiration est inégale et quelquefois suspicieuse. — *Demi-lavement* avec le *sulfate de soude*, *compresses* d'eau froide souvent renouvelées sur la tête.

Le 17, le lavement a amené une selle dans la soirée d'hier; d'ailleurs même état.

Le 18, quatorzième jour, le strabisme est plus évident, l'assoupissement plus marqué; l'agitation et le délire moindres; pouls à 120, irrégulier dans son rythme et

dans la soirée; rien vers l'admission. — Même traitement. Le soir le malade est très-agité, et le pouls est à 136.

Le 19 et le 20, assoupissement de plus en plus profond; cependant le malade se réveille quand on l'appelle et paraît reconnaître son père qui est venu le voir; mais presque toutes ses réponses sont incohérentes; la vue, le tact, l'ouïe sont peu irritables; légères contractures dans les doigts, les orteils, et dans les poignets qui sont en même temps portés dans la pronation; par moments, spasmes dans les muscles de la face; pas de malchouements; soif vive; adoncos à l'état normal; depuis hier il y a eu une selle, le malade urine bien; pouls à 120-122; peau chaude, humide par moments. — Même traitement.

Le 21, les contractures persistent toujours à un faible degré; le malade s'agite et change de place dans son lit, repousse ses couvertures; dans d'autres moments il est fort tranquillement assoupi. — On suspend l'usage de l'eau froide sur la tête, et l'on prescrit cinq saignées à la nuque.

Le 22, dix-huitième jour, les contractures sont plus fortes; depuis hier il y a eu deux selles; rien autre de nouveau, si ce n'est que le pouls est à 142. — Six saignées à la nuque.

Le même jour, entre trois et quatre heures, aggravation considérable de tous les accidents; rigidité tétanique dans tous les muscles; les membres sont tendus et contracturés, les doigts et les orteils surtout; raideur et serrement des mâchoires, aspect étiré de la face par l'état de contraction permanente où sont tous les muscles; le rachis est inflexible comme une barre de fer quand on veut soulever le malade; point de paralysie nulle part; pupilles médiocrement dilatées, mais peu sensibles à la lumière; quelques réponses aux questions; connaissance à peu près perdue; pouls petit, irrégulier, inégal, à 160; par moments la peau se couvre de sueur; face pâle; respiration bruyante, comme stertoreuse, irrégulière et très-accelérée; lèvres sèches, croûteuses, noirâtres; saignes pulvérisées. — Saignées et émissions aux catécistes inférieures; arap d'écier par cuillerée.

Le malade succombe la nuit suivante, après avoir eu des mouvements convulsifs dans tout le corps à plusieurs reprises; les contractures ont persisté jusqu'à la fin; la respiration s'est embarrasée de plus en plus, et la mort est arrivée vers 4 heures du matin.

EXAMEN DE L'ADÈVE. (25 heures après la mort). — *État sain de tous les organes.* — Dans le thorax aucun organe n'offre d'altération appréciable.

Dans l'abdomen l'estomac, le foie, les reins, la vessie, la rate sont parfaitement sains. L'intestin est également sain; seulement on remarque dans l'iléon un développement notable des plaques de Peyer, sans caractères qui annoncent que ce développement soit réellement morbide. Les follicules isolés ne sont visibles que dans le gros intestin, qui n'offre d'ailleurs aucune lésion. Les matières contenues dans l'intestin étaient peu abondantes, à demi-solides dans le côlon et ne renfermaient point de vers.

Tête et rachis. La cavité de l'arachnoïde est humide, mais sans collection séreuse. Au-dessous d'elle est une infiltration séreuse d'aspect gélatiniforme dont le liquide s'écoule assez rapidement en piquant la membrane; celle-ci est mince, comme à l'état normal, et transparente ainsi que le liquide qu'elle recouvre.

La pie-mère présente aussi un état d'intégrité parfaite, ses vaisseaux ne sont point notablement injectés. Au-dessous d'elle la substance grise, qui s'en isole facilement sans se déchirer, offre sa couleur et sa consistance normales. Les circonvolutions du cerveau sont ni aplaties, ni serrées et tassées les unes contre les autres. Le corps calleux, vu par sa face supérieure, n'offre pas cette convexité qui accompagne l'hydrométrie ventriculaire; et, en effet, les ventricules cérébraux ne contiennent, tout au plus, qu'une cuillerée à bouche d'un liquide séreux bien transparent. Toute la surface des parois ventriculaires est à l'état normal sous tous les rapports. Le septum lucidum, le trigone et tout le centre ovale des hémisphères présentent une consistance très-ferrée, mais qui ne paraît point morbide. Le cervelet, la protubérance et la moelle épé-

nière, et soignés avec autant de soin que le cerveau, ne présentent absolument aucune altération appréciable.

Ainsi, voilà une maladie qui commence par une épilepsie dont les attaques se renouvellent deux jours de suite et qui laisse à sa suite du mal de tête, des symptômes de malaise et d'irritation cérébrale, etc. A ces symptômes se joignent bientôt des vomissements et une constipation opiniâtre; les jours suivants tous les phénomènes nerveux, délire, agitation, somnolence, embarras de la parole, etc., augmentent graduellement. A l'exagération de la sensibilité succède son affaiblissement; on voit paraître de nouveaux symptômes convulsifs, la raideur tétanique du tronc, les contractions des membres; enfin, mouvements convulsifs proprement dits, abolition de l'intelligence et du sentiment, embarras de la respiration, mort après dix-huit jours de maladie. N'oublions pas de faire remarquer que depuis l'épilepsie jusqu'à la fin de la vie le pouls n'a point été naturel, mais a offert une fréquence graduellement croissante; la peau a été souvent chaude; il y a donc eu un état fébrile. Par l'autopsie on a vu qu'aucune lésion notable n'existait dans le système nerveux, il y avait seulement une légère infiltration sous l'arachnoïde et une consistance ferme des parties blanches centrales du cerveau.

Peut-on regarder ces deux états comme des lésions suffisantes pour expliquer les symptômes? Assurément non. Qui ne sait que l'infiltration d'un liquide séreux transparent dans la trame cellulaire sous-arachnoïdienne n'a, par elle-même, aucune valeur, puisqu'elle se rencontre dans une foule de cas dans lesquels il n'a existé pendant la vie, aucun trouble nerveux, et surtout chez les sujets qui ayant été malades pendant un certain espace de temps, ont maigri. Dans ce cas, l'exhalation séreuse sous-arachnoïdienne est un effet nécessaire de la diminution de volume du cerveau; aucun vide ne pouvant exister dans le crâne, lors du retrait de la masse encéphalique, c'est le liquide sous-arachnoïdien qui en prend la place. Quant à la consistance des parties blanches centrales du cerveau qui paraît assez considérable, l'habitude que

nous avons acquis, par de nombreuses ouvertures cadavériques, de juger dans quelles limites la constance de ces parties varie dans l'état normal, nous autorise à affirmer que dans ce cas elle n'avait rien de morbide.

Maintenant abandonnons la question au point de vue anatomo-pathologique et demandons-nous si les symptômes ont véritablement simulé une méningite.

Dans une première période, et après la disparition de l'éclampsie, qui, sans autre prodrome, a marqué le début, nous trouvons la céphalalgie, le vomissement et la constipation, ces trois symptômes caractéristiques qui ne manquent presque jamais au commencement des méningites; bientôt il s'y joint de l'agitation, du délire, une sensibilité plus prononcée soit vers la peau, soit vers les autres sens; et enfin un état fébrile médiocrement développé. Ensuite se prononce une seconde période dans laquelle le délire, les cris, les autres symptômes d'excitation tendent à diminuer et alternent avec l'assoupissement, la stupeur; déjà quelques symptômes de raideur, de contracture, quelques mouvements convulsifs partiels se manifestent, le pouls augmente de fréquence, la constipation persiste. Dans la troisième période, qui est très-courte, les facultés de l'entendement s'abolissent de plus en plus, les sens deviennent moins excitables, la raideur et les contractures sont plus permanentes. Enfin la résolution se manifeste et la mort survient rapidement. Dans cette dernière phase de la maladie, la fréquence du pouls devient beaucoup plus grande. N'y a-t-il pas entre ces symptômes, soit par leur ensemble, soit par leur mode de succession, la plus grande analogie avec ceux des véritables méningites?

Cette analogie, ou plutôt cette ressemblance entre les symptômes de deux maladies qui ne sauraient cependant être identiques par leur nature, devient, comme on le prévoit facilement, la source de difficultés presque insurmontables lorsqu'on cherche à établir leur diagnostic différentiel; et si, sous le rapport thérapeutique, cette distinction était inutile, elle ne devrait jamais nous préoccuper; mais nous tâcherons de prouver tout-à-l'heure qu'il n'en

est point ainsi, et qu'il serait fort avantageux de trouver pendant la vie les éléments d'un diagnostic précis.

Dans notre observation une seule circonstance paraît avoir une certaine valeur sémiologique; c'est le début de la maladie par des convulsions sous la forme d'éclampsie. Ce mode d'invasion est très-rare dans les véritables méningites; il ne s'est présenté dans presque aucune de nos observations; M. Bocquereau paraît ne l'avoir observé dans aucun des trente faits dont son mémoire contient l'analyse; les travaux de M. Piet, de M. Riuh, ont constaté le même résultat; cette particularité doit donc être prise en considération. Nous croyons d'autant plus devoir la signaler que parmi les symptômes de la maladie, on ne trouve rien de plus caractéristique pour la différencier d'une véritable méningite.

Cette difficulté du diagnostic, en face de laquelle nous aimons mieux avouer notre impuissance que chercher dans de simples nuances symptomatiques des différences qui échappent presque toujours à l'attention du praticien, cette difficulté, disons-nous, constitue une véritable lacune dans la science; car le traitement de ces pseudo-méningites essentielles ne doit pas être semblable à celui des méningites; cette vérité nous semble parfaitement ressortir de l'analyse approfondie du fait que nous avons rapporté.

En appréciant les effets du traitement employé, qui, au point de vue de la méningite, a été très-rational, on voit qu'ils ont été ou ne sont plus fâcheux, puisque les progrès les plus marqués et les plus rapides ont eu lieu immédiatement après l'emploi des moyens les plus actifs dont ce traitement s'est composé. Or, ce traitement a été essentiellement antiphlogistique; les émissions sanguines et les révulsifs en ont fait la base; et c'est surtout après les applications de sangsues que l'aggravation du mal a été plus sensible. Il est difficile de croire qu'en face d'une inflammation franche, on eût observé les mêmes effets. Si, au contraire, on admet dans cette maladie un caractère nerveux, spasmodique, on conçoit très-bien le résul-

est fâcheux d'un traitement débilitant. Nous ferons remarquer enfin que le mauvais effet de la médication antiphlogistique, au début des accidents, pourrait être pris en considération pour le diagnostic.

Les faits de la nature de celui que nous venons d'analyser sont loin d'être rares. Nous avons rapporté ailleurs (1) une observation analogue, publiée par notre ami le docteur Keisner, dans le tome premier des *Mémoires de la Société médicale d'évaluation de Lyon*, qui se prête complètement à la même interprétation. Il paraîtrait aussi par quelques passages du mémoire de M. Becquenel, que M. Barthez, son collègue à l'hôpital des Enfants, aurait vu un fait du même genre. Enfin, parmi les cas de fièvres cérébrales essentielles rapportés par les auteurs, on en trouve un petit nombre dans lesquels il y avait incontestablement absence complète de toute espèce de lésions dans l'encéphale. M. Gendrin en cite un exemple remarquable dans son traité des fièvres (2).

On trouve dans un journal étranger un travail du docteur Macs sur deux cas que l'auteur semble avoir pris pour une véritable méningite aiguë, et qui en réalité sont des exemples de fièvre cérébrale; celle-ci après avoir eu pendant quelques jours une forme continue, prit tout à-coup un caractère intermittent qui motiva de la part de l'auteur, et avec raison, l'administration du sulfate de quinine. Le lendemain les deux enfants entraient en convalescence.

L'appréciation des faits de ce genre n'a point échappé au docteur Deleour qui, dans ses recherches sur la méningo-encéphalite des enfants, reconnaît que les symptômes, qui d'ordinaire annoncent cette maladie, sont aussi quelquefois l'expression d'une névrose cérébrale ou d'une modifi-

(1) *Mémoire sur le diagnostic de la méningite chez les enfants, ses débilités et son importance dans la pratique*, dans le *Ann. de Méd. de Lyon*, août 1842.

(2) T. I, p. 103. Cette observation est une des plus intéressantes parmi celles que recueilli l'excellent ouvrage de M. Gendrin.

calien organique de l'encéphale inconnue dans sa nature. « Ces cas, dit l'auteur, qui offrent de l'analogie avec les fièvres intermittentes pernicieuses, s'offriront surtout, suivant quelques auteurs, chez les enfants à peau fine et blanche, à muscles grêles, qui tressaillent de peur pour la moindre cause, dont l'œil est souvent lugard, dont la face offre de remarquables alternatives de pâleur et de rougeur, dont le sommeil est entrecoupé par des sursauts; chez les enfants, en un mot, qui offrent tous les traits du tempérament nerveux et cet ensemble de conditions qui caractérisent, d'après Foumes, la convulsibilité (1). »

Il y a donc réellement des affections idiopathiques qui simulent la méningite et qui doivent être considérées comme des névroses ou, si l'on veut, comme des fièvres nerveuses, cérébrales, phrénétiques, ainsi que les appelaient les anciens. Il faut avouer que rien n'est plus difficile que de les distinguer des véritables méningites, non-seulement à leur début, mais aussi pendant tout leur cours, lorsque leur marche présente une certaine régularité analogue à celle des méningites. Le diagnostic sera moins difficile quand il y aura une grande irrégularité et des phénomènes ataxiques; mais comme on ne peut constater ces caractères qu'après quelques jours d'observation, le diagnostic sera nécessairement tardif. Si la fièvre cérébrale débute par un accès d'éclampsie, nous pensons que le praticien doit accorder une grande valeur à ce mode d'invasion qui est fort rare dans la méningite; la nature essentiellement nerveuse de la maladie ne peut alors être contestée.

Les cas de ce genre sont d'ailleurs d'un grand intérêt. C'est par leur interprétation rigoureuse que l'on arrive à se convaincre de la nécessité de conserver dans le cadre nosologique les fièvres cérébrales essentielles, que dans ces derniers temps on a cru devoir en retrancher. Arrêtons-nous donc un instant sur cette interprétation, et donnons celle qui nous paraît la plus en rapport avec les faits.

(1) *Gal. med.*, 1843, p. 755.

Dans les cas dont nous avons cité un exemple, nous constatons au début une attaque d'éclampsie; les jours suivants un état nerveux qui n'est sans doute que l'effet de l'ébranlement du système nerveux ou l'indice que la cause qui a déterminé l'éclampsie n'a pas épuisé son action. Si l'on croit alors à une méningite commençante, et qu'on emploie un traitement antiphlogistique, l'état nerveux, loin de diminuer, s'aggrave, l'excitabilité pathologique des centres nerveux s'exalte, et les accidents du début ou des accidents analogues tendent à reparaitre précisément sous l'influence des moyens qu'on croyait les plus propres à en conjurer le retour. Il est assez probable que si l'on combattait l'état nerveux par des antispasmodiques, des sédatifs, par de doux révulsifs, quelquefois même par des toniques, on emploierait une médication plus rationnelle et peut-être plus heureuse que la médication débilitante.

La source de l'erreur qu'il est si facile de commettre dans cette circonstance vient en partie de ce que l'éclampsie, qui a marqué le début, a laissé à sa suite un état fébrile qui ne paraît pouvoir être attribué qu'à une affection inflammatoire. Il n'en est rien cependant; cet état fébrile, qui d'ailleurs est encore peu marqué dans les premiers jours, est une fièvre nerveuse. Et comment l'éclampsie ne réagirait-elle pas sur la circulation de manière à troubler le rythme du pouls et à augmenter sa fréquence? Y a-t-il là d'autre effet que celui qui résulte d'une émotion morale? Toute dépression, comme toute agitation nerveuse grave, n'est-elle pas capable de jeter le trouble dans les mouvements du cœur et dans l'activité des calorifications? Dédaignons donc de cet état fébrile que nous voyons souvent succéder à l'éclampsie, et ne le regardons comme inflammatoire que lorsque l'éclampsie paraît elle-même être de cette nature; condition qui n'est rien moins que fréquente, surtout lorsqu'elle est subite et foudroyante et survient sans cause connue.

Si les accidents qu'on est tenté d'attribuer à la première période d'une méningite ne sont qu'un état nerveux lié à l'éclampsie antécédente, on concevra aisément comment

cet état, méconnu et combattu par les antiphlogistiques, doit nécessairement s'aggraver. Une autre cause tend encore à produire le même effet. Si, par exemple, la cause souvent ignorée et inappréciable de l'éclampsie n'a pas épuisé son action par la production des convulsions, si elle est de nature persistante, on conçoit très-bien comment, malgré l'expectation, malgré même un traitement antispasmodique général, l'état nerveux, loin de s'éteindre de lui-même, tend à augmenter et à reproduire soit de nouvelles attaques d'éclampsie, soit des accidents de même nature. Ceux-ci, malgré leur forme plus vague et leur intensité moindre en apparence, n'en sont pas moins graves, car ils annoncent cette fois l'atteinte irréparable portée à l'action du système nerveux.

Maintenant supposons qu'au début de ce genre d'affection il n'y a pas eu d'éclampsie, vous aurez une fièvre cérébrale ordinaire. Il suffit pour qu'il en soit ainsi que la cause pathogénique ait un peu moins d'énergie dans son action immédiate. Elle n'engendre pas moins pour cela un état nerveux, une fièvre nerveuse qui, combattue mal-à-propos par les moyens qu'on oppose à la méningite, tend à s'aggraver et peut devenir mortelle.

Prognostic.

La gravité de la méningite tuberculeuse n'est surpassée par celle d'aucune autre maladie. Les phthisies thoraciques et abdominales, bien qu'elles soient presque constamment mortelles, ont du moins une marche plus lente, une durée plus longue. On peut même admettre comme démontré qu'elles sont dans un petit nombre de cas susceptibles de guérison ou de rester stationnaires pendant des mois et des années. Il n'en est malheureusement pas ainsi dans la méningite tuberculeuse. Aussitôt que la cachexie a porté sur une certaine étendue des organes encéphaliques, une action suffisante pour réveiller un travail inflammatoire aigu, celui-ci fait explosion, se développe, s'étend et s'accroît sans être presque jamais modifié ni retardé par

aucun mode de traitement. La thérapeutique est ici doublement impuissante. Non-seulement elle n'a pas plus de prise sur l'élément tuberculeux de la méningite qu'elle n'en a sur la phthisie pulmonaire dans les pneumonies et les pleurésies qui en sont compliquées, mais elle ne réussit pas même à détruire l'élément phlegmasique et à enlever ainsi la complication qui s'ajoute aux lésions tuberculeuses de la pie-mère. Dans aucune maladie les efforts les plus énergiques et en apparence les plus rationnels n'échouent plus constamment.

S'il est vrai, comme nous croyons l'avoir démontré, que l'hydrocéphale aiguë soit le plus souvent de nature tuberculeuse, comment concevoir les assertions de tant d'auteurs et de praticiens qui affirment avoir guéri la plupart des malades qu'ils ont eu à traiter ? Ne craignons pas de dire que ces assertions sont évidemment dénuées de probabilité, et qu'elles montrent plutôt l'ignorance de ceux qui les émettent qu'elles ne témoignent en faveur de leurs succès. Sans doute on guérit beaucoup d'enfants atteints de symptômes cérébraux qui offrent quelque analogie avec ceux de la méningite aiguë. Peut-être aussi guérit-on le tiers ou la moitié de ceux chez lesquels on a pu établir par un diagnostic précis l'existence d'une méningite simple ; il est permis de le croire. Mais dans les cas où il s'agit d'une méningite tuberculeuse, on ne peut affirmer quelques succès qu'en les appuyant sur des preuves qui jusqu'ici n'ont jamais été articulées.

Tous ceux qui ont un peu approfondi l'étude de la méningite tuberculeuse ont positivement reconnu la déplorable gravité de cette affection. MM. Rufe, Gerhard, Piet, Constant, Green, Lecquerel, avouent que pas un de leurs malades n'a guéri. Les faits dont nous avons été témoin nous ont donné les mêmes résultats, et voici comment M. Guersent, dont l'expérience est si étendue s'exprime à cet égard : « La méningite tuberculeuse se terminerait quelquefois par la guérison, dans sa première période, si l'on pouvait s'en rapporter à quelques exemples cités par M. Charpentier dans son ouvrage, et à quelques autres que j'ai observés

moi-même, soit à l'hôpital des Enfants, soit dans ma pratique particulière. Mais ces cas sont toujours plus ou moins douteux, et nous paraissent devoir appartenir pour la plupart à la méningite simple. Dans la deuxième période, où le doute n'est plus possible, j'ai à peine vu s'échapper un enfant sur cent, et encore ont-ils succombé plus tard, ou à la même maladie aiguë, ou à la phthisie pulmonaire. Quant aux malades qui arrivent à la troisième période, je n'en ai jamais vu guérir même momentanément. La mortalité de cette maladie bien constatée est donc effrayante et vraiment désespérante pour l'art; mais maintenant que cette maladie est mieux connue, on conçoit plus facilement la cause de cette mortalité, puisqu'elle est le résultat d'une véritable affection tuberculeuse des méninges (1). —

M. Guersent a recherché quelle est la proportion de la mortalité de cette maladie dans la mortalité générale.

D'après des calculs basés sur des relevés de mortalité recueillis pendant plusieurs années à l'hôpital des Enfants, ce médecin pense que sur cinq à six cents enfants qui y succombent tous les ans, vingt ou vingt-cinq au plus (terme moyen) périssent victimes de la méningite tuberculeuse, ce qui donnerait la proportion d'un trentième ou d'un vingt-cinquième au plus dans la mortalité générale. Les relevés de M. Ecquerol et les nôtres tendraient à élever cette proportion; mais comme ils ont été basés sur des faits recueillis seulement pendant le semestre d'été, saison dans laquelle la maladie offre sa plus grande fréquence, ils ne sont pas rigoureusement concluants.

Traitement.

Nous avons dit ailleurs que l'existence de la phlogose comme élément essentiel et parfois même prépondérant dans l'hydrocéphale aigu tuberculeux, était la seule base

(1) *Ann. d. med.*, art. cit., p. 493.

des indications thérapeutiques. C'est ce qui établit la plus grande conformité entre le traitement de cette affection et celui de la méningite simple.

Les saignées générales et locales sont le premier moyen qui se présente pour arrêter la maladie dans sa marche. Elles ont d'autant plus de chances d'efficacité qu'on les emploie plus près du début. Elles ne conviennent déjà plus ou que très-rarement vers la fin de la seconde période et encore moins dans la dernière. On devra les pratiquer plus abondantes et les répéter plus souvent chez les sujets jusqu'alors bien portants, d'une constitution forte, d'un tempérament sanguin, et surtout lorsque les symptômes généraux et locaux annoncent un raptus sanguin très-prononcé vers l'encéphale. C'est par la phlébotomie qu'il faut débiter. C'est une erreur de croire qu'elle est impraticable chez la plupart des enfants très-jeunes; elle exige seulement un peu plus d'adresse et de patience. Peut-être emploie-t-on trop exclusivement de nos jours la saignée du bras; car nous avons toujours goûté les raisons qui ont fait préférer par quelques auteurs les saignées du pied ou du cou dans les maladies cérébrales hyperémiques et inflammatoires. L'ouverture de la jugulaire est certainement plus propre que celle d'aucune autre veine à dégorgier directement le système vasculaire de la tête, et celle des veines du pied l'emporte sur la saignée du bras par son action dérivative.

Les saignées locales par les sangsues ou les ventouses ne seront employées d'emblée que lorsque la phlébotomie sera impraticable ou que la marche de la maladie sera véritablement sub-aiguë et sans état fébrile bien prononcé. Dans les autres cas on les fera succéder à une ou plusieurs saignées générales. Comme pour celles-ci on tiendra compte de l'état général et local pour déterminer le nombre des sangsues ou des ventouses à appliquer et l'opportunité d'en répéter l'usage une ou plusieurs fois. Quant au lieu d'application, les praticiens sont généralement d'accord sur ce point: les saignées capillaires doivent être faites à l'anus ou aux extrémités inférieures chez les sujets très-irri-

tables, très-impressionnables à la douleur, qui ont la face vultueuse, la tête chaude, très-douloureuse et très-congestionnée. Chez les enfants qui offrent des conditions opposées, il est préférable d'apposer les sangines ou les ventouses scarifiées le plus près possible des organes malades, c'est-à-dire aux tempes, derrière les oreilles, à la nuque ou sur la convexité du crâne, le long du sinus longitudinal, suivant le siège principal de la céphalalgie. Quelques praticiens ont fortement préconisé l'application des sangines à l'intérieur des narines. « Cette pratique, dit M. Piet, est indiquée par le siège de la méningite à la base du crâne, par la grande vascularité des fosses nasales, par les succès qu'obtenait ainsi Chamusier sur des femmes en couches, contre des céphalalgies opiniâtres, enfin par les nombreux exemples de ces épistaxis qui amènent si souvent la solution de violents maux de tête (1). » Ce moyen que nous n'avons jamais vu employer doit malheureusement être d'une application difficile chez les jeunes enfants, et l'on ne peut y suppléer que très imparfaitement par des incisions faites sur les parties accessibles de la membrane pituitaire. M. Guersent dit avoir eu souvent recours à cette petite opération sans en avoir jamais retiré aucun avantage appréciable. Les sangines à l'intérieur des narines ont eu cependant de véritables succès dans des cas de méningite probablement simple, et nous paraissent dignes d'être recommandées d'une manière spéciale. Nous n'hésiterions pas, quant à nous, à les préférer chez des adultes et chez des enfants assez dociles, assez peu irritables pour se soumettre à ce mode de traitement.

La compression des carotides a été conseillée par M. Eland de Beaucaire, dans certains cas d'affections cérébrales. Ses avantages qui nous paraissent avoir été exagérés, n'ont été jusqu'ici constatés que d'une manière exceptionnelle. On peut bien admettre que la compression des artères de la tête ralentissant la circulation du cer-

(1) *Mémoire cité, Gaz. méd., 1877, p. 285.*

veau contribue à diminuer l'excitation de cet organe, mais il faut éviter que cette compression porte en même temps sur les veines jugulaires; d'ailleurs elle ne dégorge pas les vaisseaux et ne semble vraiment convenable que si les émissions sanguines ne sont plus possibles.

Les applications froides sont un des moyens les plus actifs que l'on puisse opposer à la méningite aiguë. De quelque manière qu'on les emploie, elles ont pour but d'opérer une sédation de l'excitation encéphalique. La constriction d'une certaine quantité de calorique et le resserrement des vaisseaux capillaires de la partie soumise à l'action du froid, peuvent enrayer le travail pathologique dont les organes intra-crâniens sont le siège, soit que cette double action se transmette directement à eux, soit qu'elle mette en jeu les connexions physiologiques des parties extérieures au crâne avec les organes de l'intérieur; de même qu'on voit des applications froides aux aines ou aux lombes, détruire une congestion ou une hémorrhagie utérine. Pour retirer des réfrigérants tous les avantages qu'ils peuvent avoir, il faut qu'ils modèrent et chassent la réaction sans l'éteindre tout-à-fait. Si elle n'a pas été préalablement un peu diminuée par les émissions sanguines, elle pourra résister aux réfrigérants; de là le conseil donné par tous les bons praticiens de débiter par les saignées. D'autre part, puis qu'il ne faut pas éteindre la puissance de réaction on doit n'essayer le froid que dans les premières périodes de la maladie et le proscrire toutes les fois qu'il y a collapsus, coma, affaissement extrême de l'innervation. Enfin, il faut tenir le plus grand compte des dispositions individuelles et toujours mesurer sur les forces du malade le degré de sédation qu'on veut produire. Si on la porte trop loin on risque d'amener un dangereux collapsus, et si elle est trop faible il peut s'en suivre une réaction plus forte. On peut dire qu'aucun moyen thérapeutique n'exige plus d'attention, plus de tact, et moins d'idées préconçues que celui dont il est question. Malgré les préceptes généraux que nous venons de formuler, le praticien est souvent réduit à procéder

par des lésions qui exigent au même temps une certaine hardiesse et beaucoup de prudence.

On préfère généralement les réfrigérants locaux aux généraux. Les premiers s'emploient de plusieurs manières, c'est-à-dire en applications, en affusions ou en irrigations.

Les applications se font avec des compresses pliées en plusieurs doubles placées autour du crâne, principalement sur le front et les tempes; avec de grosses éponges creusées en forme de calotte ou de bonnet pour envelopper la tête ou enfin, avec des vessies remplies d'un liquide réfrigérant. On renouvelle ces applications à mesure que le liquide s'échauffe, et comme cette élévation de température est parfois assez rapide, il en résulte, si le renouvellement n'est pas assez fréquent, une variation continuelle dans la température de la tête, qui favorise la réaction et entretient peut-être plutôt qu'elle ne calme l'excitation cérébrale.

Les affusions sur la tête offrent le même inconvénient; on ne peut l'éviter qu'autant qu'on les renouvelle assez souvent pour empêcher la réaction de s'établir. Elles ont aussi celui de produire un saisissement plus vif que quelques malades ne peuvent supporter.

Les irrigations sont bien préférables, suivant M. Guersent; elles ont d'abord l'avantage de pouvoir être employées le malade restant couché sur un lit de camp sans dossier, tandis que les affusions exigent chaque fois un déplacement désagréable et incommode; ensuite, l'irritation une fois établie, la température des liquides peut être constante, et n'éprouve pas de variation continuelle. L'irrigation a donc une action plus soutenue et plus uniforme; la sédation qu'elle opère est plus profonde et plus prolongée; mais il faut craindre de tomber dans l'excès et la suspendre avant qu'elle n'ait produit le collapsus, sauf à y revenir quand la réaction se réveille et tend à reprendre le dessus. Pour l'administrer convenablement on place un seau muni d'un robinet et plein d'eau froide, à une petite hauteur au-dessus de la tête du malade; le robinet étant très-peu ouvert, le filet d'eau est conduit à l'aide d'une corde

détordue ou de plusieurs rubans de fil jusqu'à la tête de l'enfant sur laquelle on les étale afin d'arroser simultanément tous les points de la surface du cuir chevelu; l'eau arrivant ainsi sans chute et sans choc, le malade n'éprouve point de surprise désagréable, et l'action du froid est également soutenue. L'enfant est couché à la renverse, la tête sur le haut du matelas qui offre une pente inclinée en arrière afin que la toile cirée placée sous l'enfant conduise naturellement le liquide qui ruisselle du front à l'occiput dans un vase placé à terre vers le haut du lit. Avec toutes ces précautions l'irrigation paraît à M. Guersent le meilleur de tous les réfrigérants dans la méningite aiguë, lorsqu'il y a toutefois assez d'énergie vitale et de chaleur pour qu'on puisse recourir à la sédation par le froid. Dans la méningite tuberculeuse elle-même où tous les moyens échouent, l'irrigation lui a paru encore utile en procurant du calme au malade et en éloignant les convulsions.

Quelle que soit celle de ces trois méthodes qu'on juge préférable, on doit donner aux réfrigérants une température d'autant plus basse que la sédation doit être plus forte. Il est toujours bon de commencer par un froid médiocre et de n'arriver que graduellement à l'eau glacée. Il est même des individus très-nerveux, faibles, impressionnables à l'action du froid, qui ne peuvent supporter le contact d'une eau à la température ordinaire, et chez lesquels l'eau tiède seule peut être employée. Quant à la durée totale de la médication ou à celle de chaque affusion, on doit toujours, pour la déterminer, se régler sur les effets obtenus.

Il est impossible de tracer à l'avance d'autres indications générales que celles que nous avons posées. Cependant on doit toujours prendre en considération l'effet immédiat du froid sur quelques-uns des symptômes, sur l'état du pouls, la chaleur de la peau, le délire, l'agitation, et surtout sur la céphalalgie. Celle-ci est ordinairement calmée avec assez de promptitude, et les malades éprouvent une diminution de leur malaise général. Ces changements

sont de bon augure ; mais s'ils sont de peu de durée, s'ils sont suivis d'un sentiment d'engourdissement et de froid dans la tête, si ce malaise est porté au point que les malades demandent à grands cris que la glace leur soit ôtée, si tous les autres phénomènes de collapsus se manifestent, il est le plus souvent nécessaire de suspendre cette médication.

L'application du froid à la surface de tout le corps a été préconisée par quelques praticiens, entre autres par M. Gendrin qui préfère cette méthode aux précédentes.

« Lorsqu'on agit sur toute la peau, dit ce médecin (1), la contraction générale du calorique est bien plus difficilement suivie de réaction nuisible que la sédation locale, effet du froid appliqué à une seule partie; ce serait cependant commettre une faute grave que de ne pas tempérer d'abord et préalablement le système circulatoire par des dépositions sanguines. Quant à l'application générale du froid, le moyen de l'opérer consiste à faire passer sur toute la surface du corps de l'eau fraîche à une température d'autant plus basse que l'on veut soustraire une plus grande quantité de calorique. On mesure sur les fesses du malade la température de l'eau et la durée de l'affusion; on portant trop loin la sédation on amènerait un dangereux collapsus; en n'allant pas assez loin on aurait une réaction trop forte qui ajouterait à la maladie; il vaut mieux cependant courir les risques de ce dernier inconvénient que de s'exposer à amener un collapsus trop grand et difficilement réparable, en prolongeant trop, ou portant trop loin la soustraction du calorique. Les affusions de 16 à 18 degrés pendant cinq à six minutes n'exposent point à cet inconvénient et sont presque toujours suffisantes; l'eau à cette température passant rapidement sur le corps à la surface duquel on la fait ruisseler en grande quantité, sans opérer aucune percussion, suffit pour enlever une grande masse de calorique. Il est cependant quelquefois utile, peut avoir un effet encore plus marqué, de diminuer la tem-

(1) Traité des Affections, 2^e édit., p. 216.

puration de l'eau, mais il me paraît inutile de descendre au-dessous de 10 à 12 degrés. » M. Gendrin rapporte quelques exemples de succès par cette méthode; mais il est probable qu'en est affaire à une méningite simple et non tuberculeuse, car les sujets n'étaient point des enfants.

Les purgatifs sont, pour ainsi dire, d'un emploi banal dans le traitement de la méningite aiguë, et le plus usité de tous est le calomel. Rien ne justifie cette préférence; non-seulement il est impuissant dans un très-grand nombre de cas à procurer des déjections alvines, mais encore, lorsque la constipation lui résiste, son séjour prolongé dans les voies digestives peut en compromettre l'intégrité; c'est du moins ce qu'ont pensé quelques praticiens. M. le professeur Forget, en particulier, n'en ayant retiré aucun avantage dans l'épidémie de maladies cérébrales qui a sévi en 1841 à Strasbourg, s'est efforcé de démontrer combien la réputation de ce médicament est usurpée. Le principal inconvénient que nous lui reconnaissons est d'occasionner la perte d'un temps précieux au début de la méningite. En effet, le praticien trop confiant le prescrit d'abord à une dose faible ou ordinaire, qu'il n'élève ensuite que graduellement; il se passe ainsi plusieurs jours sans qu'on obtienne aucune évacuation. Il faut agir autrement. Si le calomel paraît préférable à d'autres purgatifs, on doit dès le début le prescrire à dose double, triple et même quadruple de celle qu'on emploierait dans un cas de constipation ordinaire, et dès le lendemain, s'il n'y a pas de selles, on se rejette sur des purgatifs plus actifs. « Il faut y recourir franchement, dit M. Gendrin, et ne pas craindre d'irriter vivement le tube digestif, dont l'irritabilité est d'ailleurs si faible dans ces cas, qu'il est très-difficile de la mettre vivement en jeu par des drastiques violents, quand la maladie est arrivée à une certaine intensité (1). » Abercrombie recommande aussi les purgatifs les plus énergiques. « Mon expérience m'a prouvé,

(1) Traité Gen. d'Abercrombie, page 327.

dit-il, qu'un plus grand nombre de succès ont été obtenus dans les affections cérébrales de l'apparence la plus alarmante, par l'usage des purgatifs très-violents que par tout autre moyen de traitement. Le purgatif le plus convenable dans ces cas est l'huile de croton-tiglium (1). » On prescrivait donc rarement le calomel seul, mais on lui associait la rhubarbe et le jalap en poudre. Quand la constipation est peu opiniâtre l'huile de ricin peut remplacer avantageusement le calomel seul; si, au contraire, le ventre reste serré, on emploie la résine de jalap, le sirop de nerprun, les sels neutres et enfin l'huile de croton. Nous pensons que l'émétique en lavage serait également convenable malgré l'existence des vomissements et alors même que ce médicament n'agirait pas uniquement comme cathartique. Les purgatifs se donnent à toutes les périodes de la maladie. Dans les cas simples ils produisent en général plutôt moins que plus d'effets qu'en en attend, et il y a peu d'inconvénient à les employer avec énergie; mais ils peuvent à la rigueur être contre-indiqués par quelques complications du côté des voies digestives.

Il faut rapprocher des purgatifs les émétiques et les contre-stimulants. L'ipécaçuana et le tartre stibié donnés comme vomitifs, sont indiqués rarement et seulement dans les méningites non tuberculeuses auxquelles s'associe un état saburral des premières voies. Le tartre stibié à haute dose a été préconisé par Laennec, par M. Gendrin et d'autres praticiens. Les succès de Laennec paraissent s'être bornés à un seul, et quant à ceux de M. Gendrin, ils peuvent être l'objet de quelques remarques particulières. Ces faits sont relatés dans les notes que cet auteur a ajoutées à sa traduction d'Abercrombie. Le premier est relatif à un enfant de sept ans, affecté de pneumonie avec des accidents cérébraux dont l'ensemble ne caractérise point à nos yeux une véritable méningite; le tartre stibié n'a peut-être enlevé les accidents cérébraux qu'en

(1) *Maladies de l'encéphale*, trad. par Gendrin, p. 215.

guérissant la pneumonie. Chez le second malade, il s'agit d'un cas encore compliqué, appelé par l'auteur fièvre typhoïde compliquée d'affection cérébrale; c'était chez un adulte. Dans un troisième cas, un enfant âgé de cinq ans fut affecté de méningite à la suite de la rougeole; le tartre stibié amena les accidents, puis ceux-ci disparurent, et malgré une nouvelle administration du médicament le malade succomba. Il est impossible d'après ces faits de conclure positivement à l'efficacité de l'émétique à haute dose, et jusqu'à production de nouveaux faits nous la révoquerons en doute, surtout dans le cas de méningite tuberculeuse.

Alextrembie a donné quelques éloges aux frictions mercurielles également préconisées par un assez grand nombre de médecins. Il est malheureusement bien constaté qu'elles sont impuissantes contre la méningite tuberculeuse, mais dans la méningite simple elles sont une des médications les plus actives qu'on puisse opposer à cette maladie, et ont l'avantage de ne pas faire suspendre l'usage des autres moyens. Plus l'époque où on les emploie est rapprochée du début, plus elles peuvent être utiles. On les pratique sur le cou, sous les aisselles ou directement sur le cuir chevelu préalablement rasé, plusieurs fois par jour, de manière à employer au moins trente grammes d'onguent napolitain en vingt-quatre heures. Les frictions ne doivent être suspendues que si elles amènent une salivation abondante.

Les révulsifs cutanés ont plus d'inconvénients que d'avantages dans la première période de la méningite, à cause de la vive sensibilité de la peau et de l'état d'excitation générale qui ne peut qu'augmenter sous leur influence. Ils ne commencent à être indiqués que vers la fin de la seconde période et dans la troisième. On emploie d'abord les rubéfiants et les épispastiques aux extrémités; mais quand le coma est profond, le collapsus complet, il faut placer les vésicatoires sur le cuir chevelu, et si l'on veut en obtenir des effets plus prompts, on les applique avec le marteau de Mayor ou la pommade ammoniacale.

On a même conseillé de recourir à une cautérisation énergique avec le moxa ou le cautère potentiel. Ces moyens extrêmes ont pu réussir dans des cas désespérés. Les révulsifs cutanés sont particulièrement indiqués lorsque la maladie paraît avoir pour origine la rétrocession d'un impétigo, d'un eczéma de la face ou du cuir chevelu.

L'emploi des opiacés à l'intérieur est généralement rejeté. À l'extérieur, on peut, à l'exemple de M. Guersent, y recourir quelquefois. Ce médecin n'hésite pas dans la méningite tuberculeuse, lorsque les saignées et les réfrigérants n'ont pas calmé la céphalalgie, d'employer comme palliatifs les compresses imbibées d'une solution de cyanure de potassium sur le front ou sur le cuir chevelu, ou des mouches d'extrait de belladone et d'opium aux tempes, ou des sels de morphine par la méthode endermique.

Quant aux boissons, elles ont peu d'importance dans cette maladie, d'autant plus que la plupart des malades n'ont point soif et refusent de boire. Elles doivent être rafraîchissantes, froides, acides ou émulsionnées, délayantes ou légèrement laxatives.

La diète absolue est toujours nécessaire, excepté dans les méningites à marche subaiguë et presque chronique. On peut alors permettre des bouillons, du lait, de la gelée. Si ces aliments ne sont pas vomis, ils contribuent à prolonger les jours du malade.

Le traitement dont nous venons de tracer les règles principales convient également, avons-nous dit, à la méningite aiguë simple et à celle de nature tuberculeuse. Lorsque celle-ci s'éloigne un peu de la première par sa marche moins aiguë, le praticien doit être plus sobre des antiphlogistiques, des émissions sanguines surtout, et en général de tous les moyens débilitants. Les réfrigérants sont toujours indiqués, mais il faut prendre garde au collapsus qu'ils peuvent alors produire plus facilement. On insistera surtout sur les révulsifs cutanés, sur les frictions mercurielles et encore sur les purgatifs, quand rien ne fera présumer des lésions tuberculeuses avancées dans les voies digestives.

La nature de la maladie essentiellement liée au vice scrophuleux a conduit quelques médecins à penser que l'iode ou l'iodure de potassium pourrait avoir une certaine efficacité. Les faits cités par le docteur Seyffer ne sont malheureusement pas très-concluants, non plus que ceux du docteur Wooniger, de Hambourg (1). Cependant un médecin anglais, M. Fluder, dit avoir employé avec le plus grand succès l'iodure de potassium dans deux cas d'hydrocéphale aiguë qui déjà s'étaient compliqués d'épanchement et d'un état comateux, et contre lesquels on avait inutilement prescrit les mercuriaux et les autres moyens ordinairement usités en pareille circonstance. Il a donné 25 millig. de ce sel toutes les deux ou trois heures. Le seul effet visible fut une augmentation de la sécrétion urinaire, et, dans un cas, une salivation. Dans un troisième cas, chez un enfant âgé de quatorze mois, il y avait, à la suite d'une affection pyrétiq.ue traitée par des moyens énergiques, une paralysie de tout le côté droit, accompagnée de mouvements convulsifs du côté opposé. L'iodure potassique se montra non moins efficace que chez les autres sujets; il survint, en effet, une diurèse abondante et du ptyalisme (2).

Quant à nous, lorsque la maladie est une fois déclarée, nous pensons que l'élément tuberculeux ne peut être combattu directement par aucun moyen, et l'on ne parviendra à arrêter la localisation de la cachexie tuberculeuse dans les enveloppes de l'encéphale, que lorsqu'on aura découvert un traitement curatif véritablement efficace de la cachexie elle-même. Mais lorsque celle-ci existe encore seule, on peut s'opposer à cette localisation, ou plutôt la prévenir, en écartant toutes les causes occasionnelles et déterminantes des affections cérébrales. C'est en cela que consisterait le traitement prophylactique de la méningite tuberculeuse. D'un autre côté, le praticien doit combattre la cachexie aussitôt que des signes positifs ou seulement probables lui en révèlent l'existence, et ne pas

(1) *Gazette médicale*, 1845, pag. 350 et 691.

(2) *Gaz. des Hôp.*, 1842, p. 354.

attendre qu'elle ait déterminé dans les organes des altérations dont les suites sont constamment funestes.

ARTICLE III.

MÉNINGITE ET HYDROCÉPHALE CHRONIQUES.

La méningite chronique se prête aux mêmes remarques que la méningite aiguë sous le point de vue de sa fréquence dans l'enfance. Il faut distinguer celle qui est simple de celle dont le point de départ est une altération tuberculeuse. En effet, la première est véritablement rare, et c'est dans l'âge moyen de la vie qu'il faut spécialement l'étudier comme un caractère anatomique assez fréquent des aliénations mentales. Nous n'en avons recueilli jusqu'ici qu'un petit nombre de cas chez les enfants. C'étaient tous des sujets âgés de moins de deux ans, chez lesquels on avait vu le développement de l'intelligence s'arrêter dans le cours de la première année de la vie. Chez la plupart, les forces musculaires ne s'étaient point assez accrues pour permettre la station et la progression, mais il n'y avait pas de paralysie réelle. La sensibilité générale était peu altérée, mais les sens spéciaux étaient le plus souvent obtus et peu développés. Les enfants en général affaiblis et amaigris à l'époque où ils furent amenés à l'hôpital, y succombèrent après quelques jours ou quelques semaines sous l'influence de nouvelles maladies. A l'autopsie nous trouvâmes dans un cas un épanchement de sérosité teinte en rouge dans la grande cavité de l'arachnoïde avec d'autres traces de phlogose; dans les autres cas il y eut à la fois épanchement séreux limpide ou trouble dans l'arachnoïde et des feuillets pseudo-membraneux adhérents aux deux lames séreuses.

La méningite chronique tuberculeuse est plus fréquente. Elle résulte d'une inflammation lente provoquée par les tubercules déposés dans le tissu des enveloppes de l'encéphale ou dans l'épaisseur de cet organe lui-même. Elle

se borne à l'épaississement, à l'induration des méninges dans le voisinage des tubercules. On peut dire qu'ici l'inflammation est parfaitement en rapport avec la lésion tuberculeuse, tandis que dans la méningite aiguë la phlogose est souvent très-étendue et très-intense avec un petit nombre de granulations. Il en résulte que cette espèce de méningite doit être entièrement décrite à l'occasion des tubercules encéphaliques, ainsi que nous le ferons plus tard.

Beaucoup d'auteurs ont considéré l'hydrocéphale chronique comme une forme particulière de méningite. Lors même qu'il en serait ainsi, et nous sommes loin de le croire, le caractère inflammatoire de la maladie est trop latent ou s'efface trop après un certain temps pour qu'il y ait aucun avantage à se tenir à cette opinion; elle peut être vraie pour quelques cas, mais dans le plus grand nombre la maladie consiste certainement dans une hydropisie analogue à celle qu'on observe dans toutes les membranes séreuses et dans le tissu cellulaire.

Nous écarterons de ce que nous avons à dire dans cet article, tout ce qui concerne l'hydrocéphale chronique congénitale. Quelque peu avancé que l'on soit sur la nature de cette maladie, elle doit être complètement séparée de celle qui est acquise, et ce serait nous écarter de notre plan que d'y donner place à l'histoire d'une maladie qui consiste peut-être le plus souvent dans un arrêt de développement de l'axe cérébro-spinal. L'étude complète de cette affection, comme celle de l'hydromyélisme, est en dehors de notre cadre dont nous avons, comme on le sait, voulu éliminer tous les problèmes de l'organogénèse fœtale.

Dans beaucoup de cas l'hydrocéphale chronique est congénitale, bien qu'on ne s'aperçoive de son développement que quelques semaines, quelques mois peut-être après la naissance. Si à cette époque la tête n'a pas un volume extraordinaire, comme les fonctions de l'innervation sont trop peu développées pour être troublées d'une manière appréciable, on conçoit que la cavité crânienne

puisse contenir une quantité anormale de sérosité sans aucun signe apparent. Ce n'est que plus tard lorsque les sutures et les fontanelles encore ouvertes ont permis l'élargissement du crâne, au fur et à mesure que l'hydropisie augmente, que les parents alarmés du volume de la tête de l'enfant le présentent au médecin; l'examen de celui-ci étant le plus souvent tardif par la négligence des parents et surtout des nourrices, il devient difficile d'assigner l'époque du début de la maladie, et de déterminer s'il s'agit d'une hydrocephale acquise ou congénitale. Les erreurs sont probablement assez fréquentes à cet égard; nous pensons que la plupart des hydrocephales qui se développent avant l'occlusion des fontanelles et dans lesquelles l'écartement des sutures s'est fait de bonne heure et facilement, doivent être rangées dans la famille des hydrocephales congénitales.

D'après ces remarques nous nous croyons fondé à admettre que l'hydrocephale chronique acquise est une maladie rare, mais qui s'observe de préférence chez les enfants. Il ne se passe peut-être pas d'année sans qu'on en observe quelques cas à l'hôpital des Enfants-malades, mais toujours en petit nombre, et c'est moins par sa fréquence que par sa nature toujours grave que l'étude de cette maladie offre de l'intérêt.

Contractures anémiques.

L'hydropisie siège presque toujours dans les ventricules; plus rarement elle a lieu dans la grande cavité de l'arachnoïde.

Le crâne n'acquiert presque jamais des dimensions énormes comme dans l'hydrocephale congénitale, à moins que la maladie ne commence avant l'ossification des fontanelles, ou qu'elle ne dure un temps très-long. D'ailleurs l'augmentation de cette cavité se fait ordinairement sans disjoindre les sutures et par une véritable elongation des os en tous sens. On constate après la mort comme pendant

la vie, la saillie des loises pariétales, la prééminence du front; la circonférence horizontale du crâne dépasse de plusieurs centimètres les dimensions qu'elle offre à l'état normal; il en est de même de la demi-circonférence verticale supérieure, des diamètres antéro-postérieurs et transverses, pris à une certaine hauteur au-dessus de la base du crâne; les os offrent leur épaisseur ordinaire ou sont plus minces; la dure-mère est presque toujours saine ainsi que les autres membranes.

Que le liquide soit contenu dans la cavité de l'arachnoïde ou dans les ventricules, il offre presque toujours une limpidité parfaite et toutes les qualités du sérum à l'état physiologique. Les effets de l'épanchement sur l'encéphale se bornent à ceux d'une compression ordinaire; les circonvolutions sont aplaties, tassées, serrées les unes contre les autres, les anfractuosités sont effacées. La substance cérébrale est ordinairement pâle et contient peu de sang. Quand l'épanchement occupe les ventricules, ces cavités sont dilatées; quelquefois cette dilatation est énorme, mais il est bien rare qu'elle égale jamais celle qu'on remarque chez les enfants hydrocéphaliques de naissance; les parois ventriculaires étant écartées dans tous les sens, on trouve la couche de substance blanche, sur laquelle s'implantent toutes les circonvolutions, plus ou moins amincie; quelquefois même les parties blanches centrales, le septum et la voûte, sont déchirées par suite de la distension qu'elles ont éprouvée, et peut-être aussi par suite de l'action érosive prolongée du liquide. La dilatation existe ordinairement dans toutes les cavités encéphaliques, c'est-à-dire dans les ventricules latéraux aussi bien que dans le troisième et le quatrième; l'aqueduc de Sylvius est aussi toujours agrandi, et quelquefois on trouve dans le cinquième ventriculaire, entre les deux lames de la cloison transparente, une enlèvement de liquide et même plus. La quantité du liquide épanché varie de cent à mille grammes; il faut que la maladie ait duré très-longtemps pour trouver plus d'un litre de sérosité, ou bien qu'elle ait débuté avant la solidification du crâne.

Dans la plupart des cas celui-ci résiste assez pour qu'on ne trouve à l'autopsie guère plus d'un quart ou d'un demi-litre de sérum.

Tels sont les caractères anatomiques de l'hydrocéphale chronique acquise quand elle est simple et idiopathique. Mais ceci arrive assez rarement, et chez la plupart des sujets on constate d'autres lésions des méninges ou de la substance nerveuse dont l'hydropisie paraît n'être qu'un effet. Nous mentionnerons ces lésions en parlant des causes de la maladie.

Cause.

Il nous est difficile d'utiliser les données que les anciens nous ont laissées sur l'étiologie, à cause de la confusion qu'ils ont faite des diverses espèces d'hydrocéphale chronique. En effet, pour apprécier convenablement la manière d'agir des causes de cette affection, il ne suffit pas de distinguer celle qui est congénitale de celle qui est acquise, mais il faut encore subdiviser cette dernière, la seule dont nous nous occupons ici, en plusieurs espèces.

Elle est tantôt essentielle, idiopathique, analogue aux autres hydropisies essentielles, tantôt elle est symptomatique d'une autre maladie. La première paraît la plus rare des deux à en juger par toutes les observations que nous avons consultées et dont nous avons pu tirer des conséquences sous ce rapport, et nous pensons qu'on rétrécira de jour en jour davantage le cadre des hydropisies essentielles de la tête comme on l'a fait pour celles du thorax et de l'abdomen. Quant à la seconde, les altérations pathologiques capables de la produire sont très-nombreuses.

Il faut d'abord indiquer les lésions, soit du crâne, soit des méninges, soit des centres nerveux qui succèdent à des violences traumatiques, telles que des coups ou des chutes sur la tête; on en trouve plusieurs exemples dans les auteurs.

Les autres causes pathologiques sont extrêmement variables. Quelquefois on a trouvé les traces d'une méningite chronique externe ou ventriculaire, qui a paru même, chez quelques malades, être la terminaison et la consé-

quence d'une méningite aiguë. Toutefois nous ne pensons pas, comme quelques auteurs, et en particulier, comme Billard, que l'hydrocéphale chronique succède presque constamment à la méningite aiguë. On a vu des inflammations circonscrites, des ramollissements, des tumeurs hydatiques coïncider avec des épanchements chroniques. Mais la lésion organique qu'on a le plus souvent rencontrée est sans contredit la présence d'une ou plusieurs masses tuberculeuses en différents points de l'encéphale.

Les altérations pathologiques que nous venons d'énumérer, qu'elles soient de cause interne ou externe, agissent de deux manières sur la production de l'hydrocécipie. Ou bien cette manière d'agir est toute vitale et consiste dans une augmentation de l'exhalation séreuse; ou bien, au contraire, elle est en quelque sorte physique et mécanique; c'est ce qui arrive quand le cours du sang est gêné dans un ou plusieurs sinus. De ces deux modes d'action le premier paraît avoir lieu plus souvent; c'est celui qu'ont admis tous les auteurs qui n'ont varié dans leurs explications qu'en ce qu'ils ont rapporté l'hydrocécipie, tantôt au genre des hydrocécipies actives, tantôt à celui des hydrocécipies passives. Quant au second, il paraît avoir complètement échappé aux auteurs, comme le constate le passage suivant d'un article du *Dictionnaire de Médecine*, le plus récemment publié en France: « Il est certain que l'hydrocécipie chronique peut se montrer sous l'influence des mêmes causes que les autres espèces d'hydrocécipie. Toutefois il n'existe pas d'observation bien précise qui prouve qu'elle puisse survenir à la suite d'un obstacle à la circulation veineuse du crâne, tel que l'oblitération de quelque sinus, etc. (1). »

L'auteur de cet article qui a paru en 1841, n'avait sans doute pas eu connaissance du mémoire publié par nous en 1840 (2) sur les tumeurs tuberculeuses du cerveau compri-

(1) *Dict. des Dict. de méd.*, t. v, p. 54.

(2) *Gas. méd.*, p. 257.

ment le sinus droit et produisant l'hydrocéphale chronique ventriculaire. Nous croyons devoir reproduire ici les deux observations rapportées dans ce travail avec l'indication des recherches que nous fîmes à leur occasion dans les auteurs anciens et modernes. Nous les ferons suivre du récit d'un troisième fait qu'il nous a été donné d'observer plus récemment et qui vient parfaitement à l'appui de nos premières observations.

Aucun fait du genre de ceux que nous allons rapporter n'est consigné dans les nombreux ouvrages que nous avons consultés. Les traités classiques et élémentaires de pathologie, les articles des divers dictionnaires de médecine français et nos principaux recueils périodiques n'en font aucune mention. Cependant, parmi les nombreuses observations d'hydrocéphale chronique non congénitale que nous ont fournies les auteurs les plus recommandables, il est infiniment probable que quelques-unes appartiennent à l'espèce d'hydrocéphale qui dépend de la compression du sinus droit par des tumeurs tuberculeuses développées dans le cervelet. Tulpius, Wepfer, Bonet, Valisny, Lieutaud, avaient déjà observé que l'hydrocéphale chronique acquise se développe le plus souvent à l'âge de deux à sept ans. Or, c'est précisément à cette époque de la vie que les tubercules de l'encéphale offrent leur plus grande fréquence. Il a été reconnu que l'hydrocéphale chronique se remarque surtout chez les enfants d'une constitution faible et lymphatique, et l'on a observé souvent la coïncidence de diarrhées et de toux opiniâtres; autres circonstances semblables à celles qui prédisposent aux tubercules ou qui annoncent même leur présence. On a depuis longtemps noté comme causes de cette maladie certaines affections organiques de l'encéphale, telles que des tumeurs squirrheuses ou tuberculeuses, des collections enkystées, et autres produits morbides qui se forment dans la substance du cervelet et des autres centres nerveux. Des faits de ce genre sont rapportés dans le *Sepulchretum* de Bonet, dans les *Lettres* de Morgagni, dans l'*Historia anatomica* de Lieutaud et dans l'*Anatomie médicale* de Portal. Il est à

regretter que dans la plupart de ces faits on n'ait indiqué avec précision si le siège des tumeurs, si la saillie qu'elles faisaient à l'extérieur du cervelet, si elles étaient avec ou sans adhérence de la face inférieure de la tente cérébelleuse, si elles se prolongeaient vers la terminaison des veines de Galien dans le sinus droit. En un mot, il est évident que si quelques-unes de ces observations se rattachent à notre sujet, on a complètement méconnu la compression du sinus droit et le mode de formation tout-à-fait mécanique de l'hydrocéphale ventriculaire.

On trouve dans la lettre V de M. Lallemand (obs. 19) un fait emprunté à J. Hunter, relatif à un malade de dix-sept ans, à l'autopsie duquel on trouva huit à dix onces d'eau dans les ventricules avec coïncidence d'une dégénérescence fongueuse de la corne optique s'étendant jusqu'au bord inférieur et postérieur de la faux cérébrale. Il est possible que dans ce cas les veines de Galien aient été compromises par la maladie; mais l'auteur n'en dit mot. Dans la lettre VII (obs. 24), M. Lallemand donne l'histoire d'une femme de cinquante ans, qui mourut après un an de maladie, ayant eu des paroxysmes de céphalalgie avec délire, coma et quelquefois strabisme. A l'autopsie, on trouva un épanchement considérable dans les ventricules cérébraux, et à la partie supérieure du cervelet, entre les deux lobes, un kyste ferme et blanc qui contenait de l'albumine et du sang. Dans ce deuxième cas, il existait peut-être un certain degré de compression du sinus droit, mais si cela avait lieu l'auteur l'a complètement méconnu.

Dans le mémoire de Dance sur l'hydrocéphale aiguë (1) on trouve l'histoire d'une femme de soixante ans, qui mourut d'une hydrocéphale chronique acquise. A l'autopsie on trouva une tumeur de deux pouces de diamètre, logée entre les deux lobes du cervelet; supérieurement elle adhéraît fortement à la tente de cet organe.

(1) Arch. de méd., t. VII, p. 56.

On lit dans la *Gazette Médicale* (1) une observation de Constant dont voici le résumé : Un enfant contracte la rougeole à l'âge de treize mois. Un mois après apparaissent les premiers symptômes d'une hydrocéphale chronique qui devient par la suite très-considérable. La phthisie pulmonaire se développe et entraîne le malade à l'âge de vingt mois. A l'ouverture du cadavre, on trouve plusieurs tumeurs tuberculeuses dans l'encéphale, dont une dans le lobe médian du cervelet et une autre dont le siège est indiqué par les lignes suivantes que nous transcrivons textuellement : « L'hémisphère gauche du cerveau présente en arrière et au niveau de l'angle que forme la face cérébrale avec la tente du cervelet un tubercule volumineux adhérent à la dure-mère dont on peut le détacher et à la substance cérébrale correspondante. Il est du volume d'une grosse amande. La substance cérébrale environnante est ramollie, etc. » On pourrait présumer que cette tumeur avoisinait et touchait peut-être la base de la grande faux cérébrale; que, par conséquent, le sinus droit pouvait être comprimé ou bien le siège d'une inflammation propagée dans son intérieur par le voisinage de la tumeur, laquelle inflammation avait déterminé la coagulation du sang dans le sinus. Quant à la tumeur placée dans le lobe médian du cervelet, il ne paraît pas qu'elle eût un volume considérable, et l'on ignore si elle faisait au-dessus du cervelet une saillie assez forte pour comprimer le sinus droit.

On voit ainsi que dans tous les faits qui précèdent, de deux choses l'une : ou la tumeur du cervelet n'apportait aucun obstacle au cours du sang dans le sinus droit; ou si, au contraire, l'obstacle existait, le rapport de cette condition avec l'existence de l'épanchement ventriculaire a complètement échappé à l'attention des observateurs que nous avons cités. Nous n'avons pas voulu cependant terminer ces recherches historiques sans consulter le mémoire de Tonnelle sur les maladies des sinus de la dure-mère et le travail de Constant sur les tubercules encéphaliques.

(1) Année 1824 p. 104.

Le premier de ces auteurs a réuni un certain nombre d'observations, dans lesquelles ou seul ou plusieurs sinus se trouvaient oblitérés par des concrétions développées dans leurs cavités; mais dans aucun de ces faits on ne voit l'oblitération du sinus droit coïncider avec une hydrocéphale ventriculaire chronique. Cependant M. Toanclé n'a pas complètement méconnu l'influence que l'oblitération des sinus exerce sur l'exhalation séreuse de l'encéphale, puisqu'en parlant de leurs concrétions pseudo-membraneuses, il avance que les troubles qui résultent de leur présence sont ou une simple stase du sang dans les veines de la pie-mère et de la substance du cerveau, et un épanchement séreux dans les ventricules; ou une rupture de ces veines, etc. (1). Quant au travail de Constant (2), on y trouve une seule observation dans laquelle il y avait deux tubercules volumineux dans le corrélet avec coïncidence d'un épanchement dans les ventricules. Mais on ne s'assura pas s'il y avait réellement compression du sinus droit. En résumé, nous ne sommes parvenu à découvrir dans les auteurs qui nous ont précédé, aucun fait semblable à ceux que nous allons rapporter.

27^e obs. — Un petit garçon, âgé de trois ans, nommé Planson, atteint d'hydrocéphale chronique, est admis à l'hôpital des Enfants-malades, le 30 juin 1828.

Sa mère, d'un tempérament nerveux très-prononcé, avait éprouvé pendant sa grossesse beaucoup de souffrances physiques et morales. Après sa naissance, l'enfant fut confié à une nourrice qui ne lui donna qu'un mauvais lait et des soins très-grossiers. Sevré à l'âge de quinze mois, il fut placé dans un logement humide, et la misère de ses parents les empêcha de lui donner les soins et la bonne nourriture que son âge et sa faible constitution rendaient si nécessaires. Les parents ont eu deux autres enfants qui sont morts, l'un à l'âge de cinq semaines,

(1) Mémoire lu à l'Académie de médecine en 1829; voir le *liv. des Arch. gén. de méd.*

(2) *Gar. méd.*, année 1826, p. 481.

L'enfant après quatre ans d'existence, sans avoir présenté d'accidents qui aient pu faire présumer une maladie quelconque du système nerveux, mais ayant toujours eu une constitution faible et chétive. Les parents disent qu'ils sont morts de langueur. Il ne paraît pas d'ailleurs que dans la famille il ait existé aucun individu atteint d'hydrocéphale congénitale ou acquise.

Cet enfant a toujours eu la tête volumineuse, relativement aux autres enfants de son âge; cependant ce n'est que depuis six mois qu'elle a pris des dimensions véritablement anormales. C'est depuis le même temps que la sensibilité cutanée a paru exagérée au point de rendre quelquefois douloureuse une compression légère ou même un simple contact. L'intelligence, qui jusqu'à cette époque avait paru se développer comme à l'ordinaire, a diminué considérablement, et la parole a perdu ce qu'elle avait acquis déjà par un exercice de quelques mois. Il n'y a jamais eu apparence de délire, ni aucun accident convulsif. Il paraît qu'il y a eu un strabisme très-prononcé dans le commencement; mais depuis trois mois il a diminué en même temps que diminuait aussi l'exagération de la sensibilité. Le sens de l'ouïe a toujours été intact. Le système musculaire n'a jamais acquis la force nécessaire à la station debout et à la progression, soit que cette faiblesse ait été un des premiers symptômes de la maladie encéphalique, soit, ce qui est plus probable, qu'elle ait été le résultat du rachitisme général dont le malade a été affecté depuis quinze à dix-huit mois. Au commencement, c'est-à-dire il y a six mois, l'enfant a paru éprouver de violents maux de tête pendant une quinzaine de jours. Les parents parlent aussi d'une chute sur la tête; mais elle a été évidemment postérieure de deux ou trois semaines au début des premiers symptômes.

État du malade à son entrée à l'hôpital. — Nous remarquons une constitution faible et un amaigrissement très-prononcé; les os longs sont atteints de rachitisme, leurs extrémités articulaires sont volumineuses. Le crâne appelle fortement notre attention par sa conformation

anormale ; le front est proéminent et fait paraître les yeux très-enfoncés dans les orbites ; les bosses pariétales sont extraordinairement saillantes. On ne sent toutefois ni les fontanelles, ni l'écartement des sutures. La comparaison du volume du crâne avec celui de la face rappelle tout de suite l'idée de l'existence d'une hydrocéphale (Voyez plus loin les dimensions du crâne prises à l'autopsie). Le poids de la tête paraît si considérable et la faiblesse des muscles telle que le malade ne peut la soutenir droite ; il la laisse tomber en avant ou en arrière, à droite ou à gauche, suivant le sens dans lequel le centre de gravité l'entraîne. La parole n'est point abolie ; le malade articule quelques mots ; il demande à manger et à boire, répond oui ou non à quelques-unes des questions qu'on lui adresse ; au demeurant, son intelligence est peu développée. Il n'accuse aucune douleur ; les sens sont intacts, excepté celui du tact général dont la sensibilité paraît encore un peu exagérée. On présume même que là réside la cause des cris et des signes de souffrance que donne le petit malade quand on le change de place dans son lit. Il n'y a pas de paralysie, mais une faiblesse considérable, comme une espèce d'atonie dans tout le système musculaire ; le malade est habituellement dans l'immobilité et dans un état d'assoupissement qui rend ses sens étrangers à l'action des corps extérieurs. Rien de particulier ne s'observe aux organes génitaux. Quant aux fonctions de la vie organique, elles s'accomplissent bien, si ce n'est qu'il y a un peu de constipation. Autrefois l'enfant avertissait quand il avait des besoins à satisfaire ; maintenant, il laisse aller sous lui les urines et les matières fécales.

Jusqu'au 21 juillet, jour auquel ce malade succombe, il ne survient aucune modification notable dans les symptômes de la maladie de l'encéphale. On remarque seulement que le malade toussé un peu, que la respiration n'est pas bien vériculaire dans toute l'étendue de la poitrine, et que l'amaigrissement continue à augmenter. Bientôt se déclare une ophthalmie purulente très-grave qui entraîne en peu de jours la fonte des globes oculaires et leur suppo-

ration prolongée. La fièvre s'allume sous cette influence; la toux augmente un peu. Enfin, le malade, réduit au marasme le plus avancé, expire vingt-un jours après son entrée.

EXAMEN DU CADAVRE. — Les viscères de l'abdomen ne présentent rien de remarquable, sauf l'accumulation de matières dures dans le gros intestin. Quelques tubercules crus se rencontrent dans les deux poumons. Les ganglions interbronchiques et ceux du médiastin sont le siège de tumeurs tuberculeuses d'un volume très-considérable.

Tête. — Tous les os du crâne sont ossifiés. Les sutures et les fontanelles sont complètement fermées. L'épaisseur des os est normale. Le crâne présente les dimensions suivantes :

La plus grande circonférence horizontale a 52 cent.

Le diamètre antéro-postérieur, mesuré à la hauteur de 3 centimètres au-dessous de la racine du nez, et au niveau de la ligne courbe occipitale supérieure, est de 17 centim.

L'écartement des deux bosses pariétales est de 15 centimètres.

La grande cavité de l'arachnoïde est humide, mais sans épanchement. Les circonvolutions sont aplaties, tassées, serrées les unes contre les autres, et tendent à faire hernie à travers l'incision de la dure-mère. En écartant les deux hémisphères, on voit la surface supérieure du corps calleux rendue très-convexe par le liquide accumulé dans les ventricules. Ceux-ci étant ouverts, il s'écoule près de 250 grammes d'une sérosité pure et transparente. La dilatation des ventricules latéraux et moyen est énorme; leurs parois sont saines, sans ramollissement, mais parcourues par des rameaux veineux plus dilatés et plus gorgés de sang qu'à l'ordinaire. Les veines de Galien, logées dans la toile choroïdienne, sont volumineuses et pleines de sang. D'ailleurs, la substance propre du cerveau est parfaitement saine et ne contient pas un seul tubercule.

Après l'ablation des hémisphères, on remarque que la tente du cervelet est fortement soulevée par cet organe, et, quand on veut l'en détacher, on reconnaît que le mi-

lieu de sa face inférieure adhère au lobe médian. Ce lobe est presque entièrement converti en une masse tuberculeuse, du volume d'un gros œuf de poule, qui refoule les lobes latéraux et adhère si intimement avec leurs lames qu'il est impossible de reconnaître les limites précises du lobe médian. Ce refoulement des lobes latéraux devait, sans aucun doute, produire un certain degré de compression de la totalité du cerveau. D'autre part, la saillie de la tumeur, vers le point correspondant à la base de la faux cérébrale, et le prolongement qui en part en avant et en haut, pour atteindre les tubercules quadrijumeaux, déterminaient une compression assez forte, soit du sinus droit, soit de la terminaison des veines de Galien dans ce sinus. Le caillot contenu dans ce sinus n'est point organisé, ni adhérent; mais il est blanchâtre, ferme et solide, et, par conséquent, n'est pas de formation très-récente.

La masse tuberculeuse est à l'état de crudité. Elle présente à l'intérieur l'aspect d'un marron cru, d'un jaune terne, tirant sur le verdâtre. A sa circonférence, il n'y a pas de kyste bien distinct, mais seulement une membrane mince, rougeâtre, vasculaire, se continuant avec les feuillets de la plèvre, qui l'avoisinent.

55^e cas. — Le nommé Ferrie Edouard, âgé de cinq ans et demi, est admis à l'hôpital des Enfants au mois d'avril 1835. Né de parents bien portants, ayant quatre frères en bonne santé, et trois autres morts très-jeunes, par des causes ignorées, il a joui d'une santé assez bonne jusqu'à l'âge de quatre ans et demi; toutefois il n'était pas d'une forte constitution. Il y a un an qu'il fut atteint d'une fièvre éruptive (probablement la rougeole), qui suivit son cours sans offrir rien d'extraordinaire. Seulement, à la suite de cette maladie, la constitution de cet enfant s'affaiblit; l'embonpoint se revint pas; les membres restèrent grêles, et les articulations devinrent volumineuses. Il y a maintenant trois mois et demi que l'enfant commença à se plaindre d'une céphalalgie occipitale de plus en plus intense, qui ne s'accompagna d'abord d'aucun autre accident. Mais, après une quinzaine de jours, il

survint du strabisme, qui depuis n'a jamais complètement cessé, et en même temps des accès de convulsions, avec perte presque complète de connaissance durant environ dix à quinze minutes, revenant le plus ordinairement trois les jours et quelquefois même deux fois par jour. A la même époque, la faiblesse musculaire s'accrut au point de rendre la marche à peu près impossible. L'enfant perdit toute sa gaieté et tomba dans une espèce d'apathie et d'indifférence telle qu'on le voyait demeurer couché sur le dos plusieurs heures de suite sans chercher à changer de position. L'intelligence s'affaiblit aussi : le malade ne répondait plus aux questions que par monosyllabes, et il n'adressait jamais le premier la parole à quelqu'un. A part le strabisme, les sens conservèrent leur intégrité. On n'a jamais remarqué une expiration dans la sensibilité cutanée, ni rien d'anormal vers les organes de la génération. Peu à peu les accidents convulsifs ont diminué et disparu ; mais, d'un autre côté, la tête a notablement augmenté de volume.

Cet enfant admis à l'hôpital des Enfants malades, le 6 avril 1838, y succomba le 14 mai suivant.

Dans cet intervalle, on observa que la céphalalgie occipitale, d'abord très-intense, diminua après quelques jours, et disparut ensuite tout-à-fait pour reparaitre seulement dans les quatre derniers jours de la vie. Le strabisme était double, convergent, et presque habituel. Les sens restèrent intacts. Il n'y eut point d'accidents convulsifs ni de paralysie proprement dite, mais le système musculaire jouissait de très-pen d'énergie ; tous les mouvements s'exécutaient sans vigueur. La marche était presque impossible. Quand on faisait lever le malade et qu'on lui disait de marcher, ses jambes vacillaient sous le poids du corps et ne pouvaient le soutenir sans l'aide des mains qui cherchaient un point d'appui sur les corps environnants. L'intelligence était peu développée, cependant les réponses étaient justes. Le malade était silencieux, apathique, indifférent pour tout ce qui l'entourait. Il affectait une immobilité telle qu'il fallait lui faire changer de posi-

tion dans son lit pour prévenir la formation d'escarres au sacrum par suite du décubitus dorsal prolongé. Malgré ces précautions, cet accident survint. La diarrhée se manifesta à plusieurs reprises alternativement avec la constipation. Enfin elle s'établit avec plus d'intensité vers le commencement du mois de mai; un peu de fièvre s'alluma, la céphalalgie occipitale reparut, le marasme fit des progrès rapides, et la mort survint.

La conformation de la tête avait fixé votre attention. En effet, le front était très-saillant; les globes oculaires étaient fortement poussés en avant et en bas, comme si la paroi supérieure de l'orbite eût été déprimée et rapprochée de l'inférieure. Le crâne avait un volume évidemment supérieur à celui qu'il présente à cet âge de la vie. Les bosses pariétales étaient très-saillantes; on ne trouvait d'ailleurs ni l'écartement des sutures, ni la persistance des fontanelles. Relativement au crâne, le face offrait un petit volume. En un mot, le faciès était hydrocéphalique.

À l'ouverture du cadavre, notre premier soin fut de mesurer le crâne. Nous trouvâmes qu'après l'ablation du cuir cheveu la circonférence horizontale mesurée au niveau des bosses frontales et occipitales supérieures, en passant un peu au-dessous de la partie la plus saillante des bosses pariétales, avait une longueur de 53 centimètres. Nous constatâmes ensuite les circonstances que voici: Les os du crâne ont une épaisseur ordinaire. La dure-mère est fortement tendue sur le cerveau; à travers son incision, le cerveau fait hernie. Les circonvolutions sont très-aplaties et serrées les unes contre les autres; leurs anfractuosités sont effacées. Le corps calleux, très-convoxe par sa face supérieure, est profondément sillonné sur la ligne médiane par la faux cérébrale dont le bord tranchant s'oppose au soulèvement du centre ovale. L'ouverture des ventricules latéraux donne issue à 550 grammes environ d'une sérosité limpide. Ces cavités sont énormément dilatées, ainsi que le ventricule moyen et même le cinquième qui contient au moins une cuillerée à café de sérosité. Il n'y a d'ailleurs aucune altération de struc-

ture dans les parois ventriculaires; seulement les veines qui rampent à leur surface sont volumineuses et pleines de sang. Les veines de Galien sont également dilatées par du sang à demi coagulé. Les plexus choroïdes ont une couleur rouge foncé.

Les hémisphères cérébraux sont enlevés par la section de leurs pédicules au-dessus de l'isthme; aussitôt l'on remarque que la tente du cervelet est fortement soulevée dans sa partie moyenne et latérale droite; on l'excise, et immédiatement le cervelet fait hernie; cet organe, mis largement à découvert, nous paraît très-volumineux. Cette augmentation de volume porte surtout sur le lobe droit, quoique le lobe gauche soit aussi lui-même plus volumineux que chez la plupart des enfants de cinq à six ans. Elle est due à deux causes; la première est la présence d'une tumeur tuberculeuse, du volume d'un œuf de pigeon, à l'état cru, placée dans le centre médullaire du lobe latéral droit et dans le lobe médian. Cette tumeur rend le vermisiformis supérieur très-saillant, et à son niveau la dure-mère adhère d'une manière très-intime avec la méninge viscérale. On constate par la dissection qu'au niveau de cette adhérence la tumeur atteint la superficie de l'œgne, ayant détruit ou refoulé les lames cérébelleuses. Elle comprimait nécessairement le sinus droit, et comme elle se prolongeait vers les tubercules quadrijumeaux, il est probable qu'elle comprimait aussi à un certain degré les veines de Galien, au voisinage de leur embouchure dans le sinus droit. Une autre altération explique encore le volume anormal du cervelet; c'est une véritable hypertrophie de son centre médullaire, surtout de la partie qui appartient au lobe droit; car ce noyau, comparé à celui du lobe gauche qui est aussi lui-même un peu hypertrophié, présente un volume presque double, malgré la perte qu'il a subie par le voisinage de la tumeur tuberculeuse qui empiète sur sa partie interne; il n'y a d'ailleurs aucune autre altération de structure dans le cervelet, ni dans le cerveau, et on n'y trouve aucun autre tubercule.

Dans les autres organes on ne trouve rien autre d'important à indiquer ici sinon des tubercules crus dans les poumons et dans les ganglions des bronches et du médiastin, et quelques traces d'entérite.

Nous ferons remarquer tout de suite que ce cas se rapproche de celui observé par Constant, et que nous avons cité plus haut, en ce que la maladie a paru se développer consécutivement à la rougeole. Robert Whytt a vu aussi l'hydrocéphale chronique commencer chez un enfant pendant la convalescence de la rougeole.

Nous devons à l'obligeance de notre ami le docteur Lacour, d'avoir observé un troisième fait du même genre que les précédents, sur un jeune sujet admis dans le service de M. Monfalcon à l'hospice de la Charité de Lyon. Quoique les détails que nous a communiqués notre confrère ne soient pas très-complets, nous croyons devoir reproduire cette observation à la suite et à l'appui des deux premières.

22^e Observation. — Amédée Marius Colbs, âgé de quatre ans, entre le 18 février 1842 à l'hospice de la Charité, salle saint Vincent de Paule. Il est d'un tempérament lymphatique et nerveux. Sa constitution ne paraît pas trop mauvaise. Il a eu, en nourrice, de violentes convulsions à la suite desquelles il est resté strabique.

Sa mère raconte qu'il fit, il y a six mois, une chute d'un lias assez élevé, que depuis cette époque la progression devint chancelante et s'accompagnait de douleurs lombaires.

Les fonctions digestives s'exécutent bien. Les facultés intellectuelles sont peu développées et ne concordent pas avec la physionomie qui ne manque pas d'expression. Depuis quelque temps les douleurs lombaires ont disparu, mais la faiblesse musculaire a augmenté. Les membres inférieurs sont incapables d'exercer des mouvements.

Le malade sort dans le même état le 8 mars, et rentre le 19 du même mois.

Il y a de l'amaigrissement; la résolution des membres inférieurs est complète; décubitus dorsal; nulle réponse aux questions; immobilité continuelle; appétit diminué.

Le malade sort le 20 avril et rentre le 4 juillet.

Son état est beaucoup plus grave. Il est très-maigre, a perdu l'appétit; il tombe depuis quelque temps. Peau sèche, ridée; toujours décubitus dorsal. Plusieurs fois par jour, l'enfant pousse des cris très-aigus, et si on lui demande ce qu'il a, il ne répond rien. La nuit pas de sommeil, cris fréquents. Rien autre qui ressemble au délire. Résolution complète des membres inférieurs, faiblesse des supérieurs. Point de convulsions.

Mort le 16 juillet. Ouverture le lendemain.

Marasme extrême. Matité à la percussion sous la clavicule gauche.

Poumon. — Tubercules crus, nombreux, dans les deux poumons. Caverne à l'apex une noix dans le sommet gauche. Masses tuberculeuses très-volumineuses dans le médiastin et à la racine des bronches.

Abdomen. — Tubercules nombreux et à tous les degrés dans l'intestin grêle et dans le bout du gros intestin. Ulcères nombreux et perforations. Traces de péritonite aiguë récente; il y avait des gaz dans la cavité du péritoine, et l'on y trouve un peu de matière stercorale liquide mêlée à de la sérosité et à du pus. Les ganglions mésentériques sont tuberculeux.

Tête. — On ne mesure pas ses dimensions qui n'ont en apparence rien d'extraordinaire. Aucune lésion dans les enveloppes, ni à la surface du cerveau; seulement les circonvolutions sont aplaties et tassées. Épanchement ventriculaire très-abondant; on recueille plus de 200 grammes de sérosité, et il s'en est bien perdu au moins 100 autres grammes. Le liquide est parfaitement limpide. Les ventricules latéraux et le moyen sont extrêmement dilatés; des rameaux veineux contenant du sang saignent sur leurs parois. Rien autre d'anormal. On enlève le cerveau en coupant ses pédoncles au-dessus de la protubérance, et l'on aperçoit la tente cérébelleuse très-convexe et comme renflée en haut par le cervelet sous-jacent. On enlève cet organe avec le mésocéphale et le bulbe, et l'on trouve à la place de son lobe médian une énorme masse tuberculeuse du volume d'un œuf de poule, un peu ramollie au

centre. Le noyau blanc de l'hémisphère cérébelleux droit est ramalli dans le voisinage de la tumeur. Quelques lamés du lobe médian existent encore, mais sont atrophiés. Presque partout la substance qui environne la tumeur est saine. L'aqueduc de Sylvius et le quatrième ventricule sont dilatés. La tumeur n'était point adhérente à la tente du cervelet. Le sinus droit est vide de sang et très-étroit. La moelle et ses enveloppes sont saines.

Nous ferons un peu plus loin l'analyse de ces observations sous le rapport symptomatologique : qu'il nous suffise ici de les présenter comme une preuve de l'existence des hydrocéphales par cause mécanique, qui jusqu'ici a été mise en doute. C'est une analogie de plus entre l'hydrocécie de la tête et celles de la plèvre et du péritoine qui ne sont que très-rarement idiopathiques, et nous ne doutons pas que de nouvelles observations ne viennent confirmer celles que nous venons de rapporter.

Quant aux conditions anatomiques qui expliquent la formation de cette espèce d'hydrocéphale, il faut évidemment : 1° que la tumeur tuberculeuse occupe le lobe médian du cervelet ; 2° qu'elle fasse à sa surface supérieure une saillie assez considérable pour refouler en haut la tente cérébelleuse et comprimer le sinus droit. D'autres conditions favorables au même résultat pourraient encore se rencontrer. En effet, il peut arriver que l'inflammation fasse adhérer la tumeur avec la tente du cervelet, et qu'en se propageant de proche en proche jusque dans l'intérieur du sinus, elle y détermine la formation d'un caillot qui s'oppose au cours du sang que les veines de Gallien rapportent des ventricules cérébraux. Il peut arriver aussi que les veines de Gallien soient comprimées à leur sortie du canal de Richat. D'ailleurs, il est évident que l'obstruction de ces veines, aussi bien que celle du sinus droit, ne peut déterminer qu'une espèce d'hydrocéphale, celle qui a son siège dans les ventricules, puisque les veines qui tirent leur origine des parois de ces cavités forment un système à part, qui paraît sans communication avec les autres veines de l'encéphale.

On trouve, dans les auteurs, un grand nombre d'observations de tumeurs tuberculeuses du cervelet, sans coïncidence d'hydrocéphale ventriculaire; mais, dans celles qui sont rapportées avec quelques détails, on voit que la tumeur siégeait, ou dans les lobes latéraux, ou à la face inférieure du cervelet: que si elle siégeait dans le lobe médian, elle ne faisait point à sa partie supérieure une saillie assez considérable pour comprimer le sinus droit. C'est ce qui a eu lieu, entre autres exemples, chez un enfant dont l'histoire a été donnée (1) par M. Bell, alors interne à l'hôpital des Enfants malades. La tumeur tuberculeuse siégeait dans le lobe médian du cervelet, et quoiqu'elle eût le volume d'un noix, elle ne faisait aucune saillie à la place de l'éminence vermineuse supérieure. Il n'y avait point d'adhérence entre le cervelet et la dure-mère qui le recouvre: les ventricules cérébraux n'étaient point dilatés par une quantité anormale de liquide séreux.

Dans un autre cas rapporté par Constant (2), il existait dans le centre du cervelet un tubercule ayant le volume d'un marron. Les ventricules ne contenaient que cent vingt-cinq grammes de sérosité, et la malade, âgée de 3 ans, avait succombé à une méningite aiguë. Ici l'hydrocéphale était récente et pouvait s'expliquer autrement que par la présence de la tumeur, d'autant plus qu'on ne dit point dans l'observation qu'elle fût préexistente à la face supérieure du cervelet ni adhérente à la tente: en un mot, il est douteux que le sinus droit fût comprimé.

Beaucoup d'autres observations nous fourniraient des remarques analogues; mais leur analyse nous entraînerait trop loin. Disons seulement que nous avons été frappé de la fréquence des lésions du cervelet dans les observations d'hydrocéphale les plus complètes que nous avons pu consulter.

(1) *Arch. de méd.*, année, 1854.

(2) *Gaz. méd.*, 1855, p. 505.

Symptômes.

C'est presque toujours par des troubles dans les fonctions du système nerveux que s'annoncent les premiers symptômes de la maladie. La sensibilité générale et spéciale, l'intelligence, la locomotion sont toutes compromises, mais non toujours au même degré.

Le strabisme est à peu près constant, mais la direction des yeux varie beaucoup suivant les sujets. Chez la plupart ils se dirigent en haut, chez d'autres en bas ou dans d'autres sens; quelquefois ils vacillent dans l'orbite. Les pupilles se dilatent de plus en plus, à mesure que la compression du cerveau augmente. Souvent aussi la vue s'affaiblit graduellement et finit par s'éteindre; dans quelques cas elle se conserve jusqu'à la fin. Dans les commencements le nez est le siège d'un picotement douloureux; plus tard la pituitaire devient sèche et insensible aux odeurs. L'ouïe, délicate dans la première période, perd peu à peu sa sensibilité. Quand la maladie est ancienne les malades n'entendent que des bruits très-forts, et finissent même par ne plus rien entendre. Le goût se conserve toujours plus longtemps, et parfois même reste presque intact jusqu'aux derniers jours. Quant à la sensibilité cutanée, elle est comme les autres sens peu diminuée au début; plus tard elle va aussi en s'affaiblissant.

L'intelligence peut rester saine pendant quelque temps, lorsque la dilatation facile du crâne empêche la compression de l'encéphale d'être forte dès le commencement; quelquefois même elle paraît plus développée et annonce une attractivité du cerveau. Au bout d'un certain temps on s'aperçoit qu'elle n'augmente plus en raison des progrès de l'âge; elle devient stationnaire et enfin elle rétrograde. L'enfant présente l'aspect d'un idiot. Il oublie et ne sait plus prononcer les mots qu'il savait articuler auparavant, il ne comprend plus ce qu'on lui demande, répond mal ou point du tout; parfois il répète le même mot à plusieurs reprises, et ne peut achever une phrase

commencée. Il ne peut plus exprimer ses sensations, ni ses besoins. Vers la fin la parole devient de plus en plus embarrassée, le petit malade ne prononce plus que quelques syllabes ou quelques sons à peu près incompréhensibles, ou même ne fait plus entendre qu'une sorte de gromement. Il reste plongé dans le coma et dans une immobilité permanente que rien ne peut troubler.

La locomotion est ordinairement plus tôt compromise que les autres fonctions de relation. A une époque encore peu avancée les malades ont moins de force dans leurs mouvements, la marche et la station sont mal assurées et chancelantes. Pour marcher ils mettent les pieds l'un devant l'autre en croisant les jambes et en tournant la pointe des pieds en dedans, ce qui les fait trébucher et tomber : aussi cherchent-ils toujours un point d'appui sur les corps environnants. Peu à peu les mouvements des quatre membres deviennent tremblants et très-faibles, les malades sont obligés de rester couchés. Leurs muscles s'atrophient. Quelquefois ils ont des convulsions générales ou partielles. A une période plus avancée ils ne peuvent pas même être assis sur leur lit sans qu'il se survienne des douleurs de tête, des vertiges, des convulsions, des nausées et des vomissements. Enfin la résolution des quatre membres devient complète ; la paralysie gagne même les muscles du pharynx et gêne la déglutition ; l'affaiblissement des muscles abdominaux amène la rétention d'urine et la constipation, si ce n'est tout-à-fait dans la dernière phase de la maladie ; car alors les sphincters se paralysent et n'opposent plus de résistance à la sortie des matières.

La circulation et la respiration restent saines pendant un certain temps ; il en est de même de la digestion. Beaucoup de malades ont un appétit vorace et digèrent bien en apparence, quoique déjà la nutrition souffre et qu'il y ait de l'amaigrissement. Quelques sujets ont des vomissements plus ou moins répétés. Plus tard toutes les fonctions de la vie végétative languissent. Le pouls perd sa force et devient petit ; la calcification diminue ; la

peu reste sèche et terreuse. Il survient de la dyspnée et quelquefois des accès d'étouffement. L'appétit diminue, les malades mangent et boivent sans aridité le peu d'aliments qu'on leur donne. Le marasme fait des progrès. Enfin le malade, privé de l'exercice des fonctions de relation, est réduit à la vie végétative qui à son tour s'éteint graduellement.

Telle est la marche de la maladie; mais outre les symptômes que nous venons de décrire, il en est d'autres fort importants: ce sont les changements qui s'observent dans le volume et la forme de la tête.

Ces changements s'opèrent d'autant plus facilement, toutes choses égales d'ailleurs, que l'enfant est plus jeune, et ils sont d'autant plus considérables que la maladie dure depuis plus longtemps. Dans un certain nombre de cas le crâne résiste à la pression excentrique du liquide, et les malades succombent n'ayant offert que les symptômes rationnels de l'hydrocéphale, qui alors a une marche nécessairement plus rapide.

Dans la plupart des cas on constate, peu de temps après le début de ces symptômes, une augmentation du volume de la tête plus rapide qu'elle ne doit être en raison de la croissance ordinaire du corps. Les mères, les nourrices s'aperçoivent que les coiffures de l'enfant lui desussent trop étroites dans l'espace de quelques jours; bientôt on est frappé de la saillie du front et des bosses pariétales. Si l'enfant est encore très-jeune, on reconnaît en palpant le crâne que les fontanelles sont agrandies et les sutures disjointes; mais cela n'arrive jamais ou presque jamais chez les enfants qui ont atteint l'âge d'un ou deux ans; chez eux la tête n'acquiert que très-rarement le volume énorme que lui donne l'hydrocéphale congénitale.

La face reste étrangère à ce développement anormal qui la fait paraître de plus en plus petite relativement au crâne. L'élargissement du front lui donne une forme triangulaire dont la base correspond aux paupières et le sommet au menton; elle n'est plus ovale comme à l'état normal. Si l'on joint à cet aspect la proéminence du front,

l'état particulier des yeux, l'expression d'hébétérite et d'idiotie empreinte sur le visage, on aura l'ensemble des traits qui constituent ce faciès caractéristique connu sous le nom de *faciès hydrocéphalique*.

Le diagnostic est ordinairement facile lorsqu'il y a augmentation du volume de la tête; il l'est surtout lorsque la séparation des sutures et des fontanelles permet de constater la fluctuation au-dessous des membranes. Ces signes, réunis à l'absence de battements sensibles au toucher, seront toujours distinguer la maladie de l'encéphalocèle et de toutes les autres affections de la tête. Le diagnostic devient beaucoup plus embarrassant lorsque l'hydrocéphale s'est développée sans augmenter le volume du crâne. On ne peut alors s'éclaircir que par l'analyse attentive de tous les troubles fonctionnels que nous avons décrits, parmi lesquels M. Brochet regarde comme signes les plus certains la vacillation des muscles volontaires, l'impuissance de tenir le corps en équilibre, celle de soutenir la tête qui s'incline dans le sens vers lequel son poids l'entraîne.

Est-il possible de distinguer l'hydrocéphale essentielle de celle qui s'accompagne d'une autre maladie, et en particulier de celle qui a lieu par compression du sinus droit? Au lit des malades cette distinction est extrêmement difficile; voici cependant les remarques qu'on peut faire à cet égard. Les maladies qui causent ou compliquent l'hydrocéphale sont telles que tantôt elles compromettent l'action de tout l'encéphale, tantôt d'une partie seulement. Les premières, telles qu'une méningite générale arachnoïdienne ou ventriculaire, confondent presque toujours leurs effets avec ceux de l'hydrocécie, et la distinction sera impossible. Les autres au contraire peuvent déterminer quelques désordres partiels du mouvement et du sentiment, qui ne sont pas éclipés par les troubles généraux produits par la compression hydrocéphalique. C'est ainsi que la paralysie d'un membre précédant l'époque de la résolution générale, et une céphalalgie limitée à une région du crâne, peuvent faire présumer l'existence de

quelque tumeur ou de toute autre lésion organique d'une moitié latérale de l'encéphale. Les tumeurs que l'on rencontre le plus souvent dans l'enfance sont de nature tuberculeuse, et comme elles existent rarement sans tubercules dans les organes thoraciques ou abdominaux, on comprend aisément la valeur des données que le diagnostic est susceptible d'emprunter de cette coïncidence.

C'est ici que nous allons revenir sur l'analyse de nos trois observations d'hydrocéphale due à la compression du sinus droit par une tumeur tuberculeuse du cervelet, et faire ressortir les principales circonstances qui dans des cas semblables sont propres à éclairer le diagnostic. Nos deux premières observations étant beaucoup plus complètes que la troisième, c'est sur elles d'abord que nous ramènerons notre attention.

Leur comparaison nous fait découvrir d'assez grandes différences dans les symptômes. En effet, si la céphalalgie occipitale a certainement existé dans un cas, son existence n'a été que probable dans l'autre, l'âge trop peu avancé du malade n'ayant pas permis de la constater d'une manière positive. Dans les deux cas, il y a eu du strabisme; mais dans l'un, ce symptôme a été passager, persistant dans l'autre. Chez l'enfant de cinq ans, la sensibilité cutanée n'a pas été notablement altérée; chez celui de trois ans, au contraire, elle a été fortement exagérée dans les premiers temps de la maladie. Chez nos deux malades, il y a eu diminution des facultés de l'intelligence et de la myotilité, et comme une espèce d'engourdissement de toutes les fonctions encéphaliques. Il n'y a eu d'accidents convulsifs généraux que chez le plus âgé de nos deux malades. Chez l'un et l'autre, la tête avait un volume assez considérable. Quelque la réunion des sutures et l'ossification des fontanelles fussent complètes, l'extensibilité du tissu osseux, qui est très-prononcée dans un âge si tendre, a permis au crâne d'acquies des dimensions anormales dans un espace de temps assez court.

Si, dans chacune de ces observations, on cherche ensuite à distinguer les symptômes qui appartiennent à la

tumeur du cervelet de ceux qui dépendent de l'hydrocéphale, on voit que cette distinction n'est point facile. En effet, à part la céphalalgie occipitale, tous les autres symptômes peuvent aussi bien appartenir à l'hydrocéphale qu'à l'affection du cervelet. Pour ceux qui ont admis certaines théories sur les fonctions du cervelet, l'exagération de la sensibilité cutanée dans un cas, la vacillation de la marche dans l'autre, seraient peut-être des signes caractéristiques de l'affection du cervelet; mais il reste encore trop d'obscurité sur les fonctions de cet organe pour qu'on puisse, avec quelque certitude, établir le diagnostic de ses maladies. Dans nos deux observations, l'ensemble des symptômes a été assez caractéristique pour qu'on ait bien reconnu pendant la vie l'existence de l'hydrocéphale; mais celle des tubercules ne fut que présumée, et leur siège ne put être rigoureusement déterminé. On conçoit cependant la possibilité d'établir, dans des cas semblables, un diagnostic assez précis, si, d'une part, il existe des signes de cachexie tuberculeuse; si, d'autre part, à une céphalalgie occipitale se joignent quelques-uns de ces troubles dans les fonctions de l'encéphale qu'on a regardés avec plus ou moins de raison comme propres aux affections du cervelet. Peut-être alors serait-on fondé à admettre que l'hydrocéphale chronique dépend de la compression du sinus droit par des tubercules développés dans le cervelet. Mais ce diagnostic reposera plutôt sur une probabilité que sur une véritable certitude.

La troisième observation que nous avons donnée n'a pas été recueillie avec assez de détails pour être sûr qu'aucun des symptômes principaux n'a échappé. On ignore s'il a existé ou non une céphalalgie occipitale; on n'a pas exactement noté l'état de la sensibilité cutanée. La seule chose importante qui ait été constatée, c'est la vacillation des membres qui s'est montrée dès le début de la maladie pour faire place plus tard à une résolution complète. La phthisie pulmonaire, assez avancée pour fournir des signes physiques, aurait pu être reconnue et faire soupçonner une affection tuberculeuse des centres nerveux.

Une autre particularité importante de ce fait, c'est que le volume de la tête n'avait point attiré l'attention pendant la vie; probablement il était peu augmenté, peut-être ne l'était-il point malgré l'abondance de l'épanchement que nous avons vu être de plus d'un quart de litre. Nous regrettons vivement d'avoir omis de peser exactement les mesures du crâne sur le cadavre.

Quelle que soit la nature de l'hydrocéphale, c'est une maladie des plus graves et constamment mortelle. Celle qui est congénitale permet à quelques sujets de vivre quelques années; un petit nombre ont pu dépasser même l'âge moyen. Mais l'hydrocéphale acquise, celle qui rencontre dans l'ossification du crâne une grande résistance à son développement et qui par conséquent produit une compression nécessairement très-forte sur le cerveau, est ordinairement mortelle dans l'espace de quelques mois. Celle qui résulte d'une tumeur tuberculeuse est doublement grave par elle-même et par la nature de sa cause. L'hydrocéphale sans lésion organique paraît à priori susceptible de guérison; mais l'expérience n'a que bien rarement constaté cette heureuse terminaison.

Traitement.

Plusieurs méthodes de traitement ont été conseillées contre l'hydrocéphale chronique et également appliquées aux cas où cette maladie est acquise et à ceux où elle est congénitale, en exceptant cependant de ces derniers ceux dans lesquels il est au moins probable que le cerveau n'est point désorganisé; car s'il est détruit ou s'il manque en partie ou en totalité, tous les moyens de l'art sont inutiles.

Ces moyens sont médicaux ou chirurgicaux, et tous analogues à ceux qu'on dirige contre les autres hydropisies. Ainsi on a employé les diurétiques, les sudorifiques, les purgatifs et les révulsifs cutanés. De tous les purgatifs c'est le calomel qui a été le plus généralement préconisé, peut-

être à cause de l'effet altérant qui s'ajoute à son action sur le tube intestinal. Aussi joint-on généralement à son usage celui des frictions mercurielles, soit sur le crâne préalablement rasé, soit sur toute autre région du corps. Celles à beaucoup préconisé cette médication. Il pratique les frictions sur la tête qu'il tient ensuite couverte d'un bonnet de laine propre à irriter le cuir chevelu. Ce médecin pense que cette méthode convient à tous les sujets et à tous les âges ; qu'elle peut être administrée comme curative dans les premiers temps et plus tard comme palliative, quelles que soient les complications, le ventrout excepté.

Un praticien anglais, M. Reid Clanny, a eu recours à l'emploi du calomel à très-haute dose, et a soutenu que cette médication employée avec toute l'énergie possible est extrêmement efficace. Il est vrai que ce médecin ne néglige pas les évacuations sanguines au moyen des sangues et des ventouses, ni l'application des vésicatoires et des sinapismes. Il prescrit le calomel à la dose de vingt-cinq à trente centigrammes, à prendre toutes les quatre ou cinq heures, et continue cette médication nuit et jour jusqu'à ce que les geacives s'affaiblissent et que les intestins et les reins sécrètent une grande quantité de liquide. « Dans quelques cas, dit M. Clanny, une à trois semaines s'écoulèrent sans qu'il y eût d'amélioration. La sécrétion abondante d'une bile jaune était toujours pour moi un signe qui me faisait espérer le rétablissement du malade. Graduellement les excrétions et les sécrétions se faisaient régulièrement. Le tact, l'usage des membres et la vue se rétablissaient et prouvaient que le cerveau était parfaitement dégagé. Le protochlorure de mercure était continué jusqu'à guérison complète, tout en ayant soin d'en modifier les doses et les intervalles, suivant les circonstances. S'il y a des remèdes en médecine qui méritent le nom de spécifiques, j'ose affirmer que le protochlorure de mercure est tel dans le traitement de l'hydrocéphale. Environ quatorze malades dans les différentes périodes de la maladie, ont été guéris par l'emploi des doses héroïques ; et depuis que j'ai adopté

ce mode de traitement, je n'ai pas perdu un seul malade atteint de cette affection (1). — Il est difficile de croire complètement aux succès de M. Clanny qui, pour les rendre plus vraisemblables, aurait dû publier des observations détaillées.

El fait rapprocher des préparations mercurielles, l'iode qui paraît aussi avoir réussi dans quelques cas. La coïncidence assez fréquente de l'hydrocéphale avec la diathèse scrophuleuse et rachitique, que l'on peut jusqu'à un certain point considérer dans ces cas-là comme la cause prochaine du mal, rend assez facilement compte des succès obtenus par l'iode et d'autres médicaments antiscrophuleux, tels que l'huile de foie de morue, etc.

Des topiques nombreux et très-divers ont été conseillés par les auteurs; la plupart ne méritent aucune mention vu le peu d'activité dont ils sont doués. Les aromatiques et les spiritueux peuvent à la rigueur rendre quelques services, mais on ne peut compter que sur des irritants énergiques, tels que les ventouses scarifiées, les vésicatoires et la caustification avec la potasse, le maza ou le fer incandescent. En insistant longtemps sur ces moyens, surtout sur les larges vésicatoires, en les employant avec vigueur, on parviendra dans quelques cas à ralentir la marche du mal, à l'arrêter, peut-être même à procurer une guérison véritable.

La compression a été mise en usage par quelques praticiens. M. Jadicovs pense qu'elle est toujours nuisible et insuffisante (2). Cependant plusieurs médecins américains ont cité des cas d'hydrocéphale guérie par la compression (3). Le docteur Engelman, de Kreunach, dit avoir réussi par l'emploi de cette méthode dans dix cas dont il a donné les observations dans un journal allemand. Deux

(1) Voir le *Journal des connaissances médicales*, février 1857, p. 36.

(2) *Thèse inaugurale*, Paris, 1810, page 52.

(3) Voir la thèse pour l'agrégation de M. Ducrest : *De la compression dans le traitement des méningites aiguës*.

d'entre elles ont été reproduites par la *Gazette médicale* (1). Ce médecin fait la compression avec des bandelettes de diachylon assez longues pour faire plusieurs fois le tour de la tête préalablement rasée. La compression est faite d'abord avec modération. On change les bandelettes au bout d'un mois, on les serre davantage, et on les renouvelle à des intervalles plus ou moins rapprochés, suivant qu'elles sont plus ou moins relâchées.

L'analogie qui existe entre l'Hydrocéphale et les autres hydropisies a conduit les chirurgiens, dès la plus haute antiquité, à traiter cette maladie par la ponction. Cette opération avait été condamnée jusqu'à ces derniers temps par les chirurgiens les plus capables de faire autorité. En France, Boyer l'avait formellement rejetée, et les essais toujours infructueux de Dupuytren et de M. Breschet n'avaient servi qu'à confirmer ce jugement défavorable.

Cependant parmi les sujets qui ont été soumis à ce traitement, on en voit quelques-uns chez lesquels il n'a point amené la mort aussi promptement qu'on aurait pu le craindre, et enfin on a cité des exemples authentiques de succès. Un des plus remarquables est dû à M. Bédos, de Troyes. « L'enfant avait quatorze mois, la ponction fut pratiquée neuf fois. La première, faite le 13 septembre 1827, donna issue à un litre de sérosité limpide, et fut suivie de la cessation du strabisme et de la diminution des autres symptômes de compression, tels que l'affaissement, la somnolence et l'hémiplégie à gauche, avec rétraction de la cuisse de ce côté. Les autres ponctions, faites à des intervalles plus ou ou moins éloignés, fournirent une moindre quantité de liquide et amenèrent chaque fois une amélioration sensible. Enfin, la dernière ponction qui fut pratiquée quatre mois après la première, laissa l'enfant dans un état très-satisfaisant. Plus d'un an après, il mourut d'une pneumonie aiguë. L'examen du crâne montra un développement plus grand du ventricule droit avec amincissement du paroi. La supérieure formait un infundibulum,

au fond duquel existaient trois points, fistuleux, traces évidentes des ponctions (1). »

En 1838, un chirurgien de Londres, M. Conquest, publia dix-neuf observations de sujets chez lesquels il avait pratiqué la ponction. Neuf malades étaient morts, dix avaient été guéris.

M. Malgaigne, qui a récemment pratiqué cette opération, mais avec peu de succès, a démontré que dans les cas cités par M. Conquest et quelques autres chirurgiens, il y avait eu plutôt suspension de la marche croissante du mal que guérison véritable. En effet, la structure osseuse et fibreuse des parois crâniennes ne leur permet pas de revenir complètement sur elles-mêmes. Tout ce qu'on peut espérer de l'opération, c'est de voir le volume de la tête rester stationnaire et le cerveau s'accoutumer peu à peu à la présence du liquide, de manière à recouvrer l'exercice de ses fonctions. On ne peut espérer davantage que chez les très-jeunes sujets. Néanmoins M. Malgaigne pense que l'opération peut être tentée dans les deux circonstances suivantes :

« 1^{re} Quand le sujet a moins de trois à quatre mois, lors même que l'hydrocéphale paraîtrait stationnaire ;

2^{re} Au-delà de quatre mois, et sans autres limites que l'ossification du crâne, lorsque l'hydrocéphale s'accroît sensiblement, et menace ainsi la vie générale ou la vie de relation de l'individu (2). »

La ponction se pratique ordinairement à travers la fontanelle antérieure. M. Malgaigne pense qu'elle serait préférable sur le trajet de la suture fronto-pariétale, à la hauteur de vingt millimètres au-dessus de l'arcade zygomatique, en dirigeant le trocart horizontalement et tout-à-fait transversalement. De cette manière on n'a à craindre ni le sinus longitudinal supérieur, ni le tronc de l'artère méningée moyenne, et l'on a le double avantage d'avoir toute facilité pour diriger le canal et le jet du liquide

(1) *Dict. de Méd. de Félée*, t. 1, p. 11.

(2) *Bulletin de Médecine*, 1840, t. 1, p. 355.

pendant l'opération, et de permettre à l'enfant de se coucher sur l'occiput ou sur la tempe opposée à la piqûre. D'ailleurs on se sert d'un trepan à hydrocèle ordinaire, plutôt que d'un instrument trop fin, comme l'ont fait Grube, et Congest. Pendant et après l'opération, on comprime modérément le crâne, et il vaut mieux la répéter plusieurs fois que d'extraire d'un seul coup tout le liquide, surtout quand il existe en quantité considérable.

Il est évident que la ponction ne peut être employée que lorsque les fontanelles existent ou que les suturez sont écartées. Comme cette disposition ne se rencontre presque jamais dans l'hydrocéphale qui ne date pas des premiers mois de la vie, on conçoit que celle qui résulte d'une tumeur tuberculeuse soit généralement inaccessible à ce mode opératoire, les tubercules de l'encéphale étant très-rare avant l'âge d'un à deux ans. D'ailleurs, en supposant que cette espèce d'hydrocéphale pût être diagnostiquée, la nature de sa cause, qui la rend essentiellement incurable, ne permettrait pas de recourir à une opération dont le meilleur effet ne pourrait être que palliatif.

CHAPITRE III.

TUBERCULES DES CENTRES NERVEUX.

Les tubercules de l'encéphale sont encore une de ces maladies dont la fréquence dans le jeune âge a été remarquée par tous les observateurs. Une observation prolongée pendant deux ou trois ans seulement dans un hôpital d'enfants en fournit facilement un plus grand nombre de cas qu'une longue pratique chez des sujets adultes. Ainsi ceux qui ont écrit sur ce sujet sans avoir étudié quelques temps dans les hôpitaux consacrés à l'enfance, ne se sont point fait pour la plupart une idée juste de la fréquence de cette maladie.

Les détails que nous avons donnés ailleurs sur la ca-

cième dont les tubercules cérébraux, comme ceux du thorax et de l'abdomen, ne sont qu'un effet, sur la méningite tuberculeuse, sur l'hydrocéphale chronique par cause mécanique, nous conduiront à ne faire entrer dans notre description que les particularités qui n'ont pu trouver leur place dans d'autres chapitres et qu'il fallait réserver pour celui-ci.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

L'affection tuberculeuse, lorsqu'elle se localise dans les organes de la cavité encéphalique ou rachidienne, s'y manifeste sous deux formes qui n'annoncent aucune différence dans sa nature, et ne sont que des variétés dans le mode de développement de la production morbide. Chez certains sujets la première jetée tuberculeuse s'opérant sur une certaine étendue des méninges, un grand nombre de tubercules naissant dans le même moment, la vitalité des tissus est si profondément modifiée qu'une phlegmasie se développe presque nécessairement; c'est alors qu'on a affaire à une méningite tuberculeuse aiguë primitive, très-peu différente par ses symptômes et sa marche d'une méningite ordinaire. Les jeunes sujets chez lesquels la phlogose aiguë ne se développe point dans de pareilles circonstances, sont peu nombreux, et parmi ceux-ci, il en est chez lesquels il se développe au moins une espèce de méningite chronique, tandis que chez d'autres des granulations et de petits tubercules existent pendant quelque temps dans un état parfait de simplicité.

Dans d'autres cas la première jetée tuberculeuse a peu d'énergie et n'aboutit qu'à un dépôt d'un très-petit nombre de tubercules. Ceux-ci n'excitant point assez la susceptibilité des organes encéphaliques pour qu'il en résulte une inflammation aiguë, peuvent se développer, s'accroître et acquiescer un volume parfois considérable. Il existe alors ce qu'on peut appeler des tumeurs ou masses tuberculeuses dans les centres nerveux. Ces tumeurs peuvent amener la mort par elles-mêmes, c'est-à-dire sans aucunes

complications et par leur marche naturelle ; ou bien la mort arrive par les progrès de la tuberculisation dans les organes du thorax et de l'abdomen. Enfin il peut se faire que pendant l'accroissement des tumeurs tuberculeuses, une nouvelle éruption de tubercules, plus forte que la première, ait lieu et détermine cette fois l'explosion d'une phlogose. C'est alors qu'on a affaire à une méningite tuberculeuse aiguë secondaire.

Par suite de ces remarques, il est évident que tout ce qui concerne la tuberculisation aiguë de l'encéphale et de ses enveloppes, a dû être rapporté, comme nous l'avons fait, à cette espèce de méningite aiguë que nous avons nommée tuberculeuse. Il ne peut être ici question que de la tuberculisation chronique des organes encéphalo-rachidiens.

Nous savons que les granulations qui caractérisent la tuberculisation à marche aiguë n'appartiennent qu'aux enveloppes des centres nerveux, à la pie-mère surtout, et non à la pulpe nerveuse elle-même. Il en est à peu près de même de la tuberculisation chronique. Elle a lieu presque exclusivement dans les mélanges, très-rarement dans l'épaisseur du tissu encéphalique. Cette détermination du siège précis des tubercules est généralement facile tant qu'ils sont peu volumineux ; on voit alors clairement qu'ils ont été déposés dans le canevas cellulo-vasculaire de la pie-mère. A mesure qu'ils augmentent de volume, on les voit déprimer la substance corticale, s'y enfoncer et s'en entourer, excepté par un point qui reste adhérent à la méninge. Déjà dans cet état il faut un examen attentif pour ne pas reconnaître la conorsion du tubercule avec la pie-mère, et pour ne pas le croire développé dans l'épaisseur même des substances corticale ou médullaire. Cette méprise devient plus facile encore quand le tubercule forme une masse ou tumeur volumineuse comme une noix, par exemple, ou même plus ; mais nous dirons que, même dans ce cas, une exploration minutieuse nous a presque constamment démontré que la tumeur avait des adhérences avec les méninges, qu'elle

n'avait fait que refouler le tissu propre du cerveau ou du cervelet de dehors en dedans et n'y avait point pris naissance. Aussi notre opinion bien arrêtée est que la plupart des tumeurs tuberculeuses qui semblent siéger dans les centres nerveux ont eu leur point de départ dans les méninges.

Cependant nous avons vu dans quelques cas des tubercules plus ou moins volumineux, entourés complètement de substance nerveuse, et n'ayant certainement jamais eu aucune connexion avec les membranes d'enveloppe. Ainsi nous avons trouvé un tubercule gros comme un pois dans l'épaisseur du septum lucidum, un autre gros comme une noix dans l'épaisseur de la protubérance et du pédoncule cérébral droit. Les fibres nerveuses étaient étalées à sa surface, l'entouraient de toutes parts, et l'empêchaient d'avoir aucun rapport avec la pie-mère. Enfin, dans la substance grise ou blanche des circonvolutions, dans le centre ovale, dans le corps strié et la couche optique, il nous est arrivé de rencontrer quelques tubercules complètement enveloppés de pulpe nerveuse.

Le siège précis des tubercules étant déterminé, voyons cependant auquel des organes encéphaliques ils ont été le plus souvent rapportés, du cerveau, du cervelet ou du mésoencéphale. Or, il est digne de remarque que le cervelet, dont le volume est si inférieur à celui du cerveau, est plus souvent que celui-ci le siège des tubercules. En réunissant les vingt-deux faits que nous avons recueillis, six rapportés par Constant (1), cinq indiqués par M. Boquerel (2), cinq autres rapportés par Abercrombie (3), et enfin un dernier dû à M. Bertou (4), nous avons treute-neuf cas dans lesquels le siège des tubercules a été clairement indiqué. Le cervelet en a seul présenté dans dix-huit cas; le cerveau seul dans treize; le cerveau et le cervelet en contenaient simultanément dans sept cas. Dans un des faits que nous

(1) *Gal. anal.*, 1834, p. 101; 1835, p. 898; 1836, p. 231 et suiv.

(2) *Recherches cliniques sur la meningite des enfants*, p. 50.

(3) *Obs.*, 1830, 1831, 1832, 1833 et 1834.

(4) *Traité des Maladies des enfants*, p. 392, art. 10.

avons recueillis, la masse tuberculeuse siégeait dans le mésoencéphale, c'est-à-dire dans l'épaisseur du pédoncule cérébral droit, à son émergence du pont de Varole.

D'après ce relevé, le cervelet ayant été seul ou en même temps que le cerveau le siège des tubercules dans vingt-cinq cas, nous en trouvons sept dans lesquels le lobe médian seul était affecté; dans les autres les tubercules étaient à peu près également répartis entre l'hémisphère gauche et le droit. Sur vingt cas où le cerveau a été affecté nous en trouvons treize où les tubercules existaient uniquement ou principalement à droite, et sept à gauche seulement. Chez le plus grand nombre de ces vingt enfants les tubercules étaient en rapport avec les parties superficielles des hémisphères, c'est-à-dire avec les circonvolutions; chez quelques-uns ils étaient placés dans l'épaisseur ou dans le voisinage de la couche optique ou du corps strié. Nous avons dit avoir trouvé une fois un tubercule gros comme un pois dans la cloison des ventricles; il faisait saillie dans le ventricule droit, et n'était séparé de la sérosité que par la membrane ventriculaire. Autour de lui des tissus étaient sains. Ce fait qui a été vu chez un enfant de trois ans et demi, est extrêmement rare, puisque, suivant M. Andral, on n'a jamais observé jusqu'à présent de tubercules dans les parties blanches centrales (1).

Nous ne croyons pas devoir décrire ici les caractères des granulations et des tubercules naissants, parce que nous les avons indiqués à l'occasion de la méningite tuberculeuse, et que d'ailleurs ils sont les mêmes que dans tous les autres organes. Arrêtons-nous seulement un instant sur ceux des masses ou tumeurs tuberculeuses proprement dites.

Leur nombre varie : assez souvent elles sont uniques. Seize fois sur trente-neuf cas il n'y en avait qu'une seule, soit dans le cerveau, soit dans le cervelet. Dans la plupart des vingt-trois autres cas il n'y en avait pas plus de deux ou trois, abstraction faite des tubercules naissants qu'une

(1) *Cours de pathologie*, leçon recueillie par A. Lamoignon, t. iv, p. 142.

nouvelle éruption avait produits vers la fin de la vie dans les cas de *méningite* aiguë secondaire.

Le volume n'est pas moins variable; souvent il atteint celui d'une noix, d'un œuf de poule; dans quelques cas il est encore plus considérable.

Très-souvent les masses tuberculeuses sont encore à l'état cru au moment de la mort. Elles ont une grande consistance, une couleur blanc-jaunâtre ou verdâtre, dont la coupe ressemble à celle d'un marron d'Inde. Elles se sont pas sans analogie par leur aspect avec les tumeurs squirrheuses, au premier abord du moins, quoique leur structure en diffère sensiblement, et nous pensons que beaucoup d'exemples cités par les auteurs, de squirrhes et de tumeurs lardacées de l'encéphale, chez les enfants, se rapportent aux tubercules. Ceux-ci sont formés d'une manière homogène, moins friable en général que celle des tubercules du pommou ou des ganglions lymphatiques; sa ressemblance avec un morceau de fromage de gruyère est frappante. Quelquefois au centre des tumeurs les plus anciennes on trouve un peu de ramollissement, mais il est rare de les voir complètement fondus par la suppuration. Leur forme générale est sphéroïdale, mais leur surface offre des saillies globuleuses inégales, bien qu'on ne trouve au dedans aucune cloison cellulo-fibreuse qui puisse faire croire à leur multiplicité primitive. Le plus souvent elles donnent l'idée d'un tubercule unique, qui s'est accru irrégulièrement par les différents points de sa périphérie.

Quelques anatomo-pathologistes ont admis que les tubercules encéphaliques sont toujours entourés d'un kyste. Si l'on entend par là que la masse tuberculeuse offre à sa périphérie une ou plusieurs lamelles celluluses qui l'empêchent d'être en contact immédiat avec la pulpe nerveuse, on a raison; mais ces lamelles, ordinairement minces et difficiles à isoler, soit de la matière tuberculeuse, soit des fibres nerveuses, ne constituent presque jamais un kyste distinct, épais, analogue à ceux qu'on trouve dans les ganglions lymphatiques tuberculisés. Elles ne sont, pour ainsi dire, dans la plupart des cas, que la pie-mère elle-même au

milieu des arêtes de laquelle le tubercule s'est développé. Quand celui-ci a réellement pris naissance au sein même de la pulpe nerveuse, on trouve autour de lui quelques feuillets cellulaires, mais très-rarement un véritable kyste solidement organisé. Ainsi l'encapsulation des masses tuberculeuses, quoique facile, n'a presque jamais lieu sans entraîner une couche de substance cérébrale adhérente à leur surface. Les rudiments membraneux dont nous parlons ne s'organisent en un kyste évident et solide que dans les tumeurs les plus anciennes qui se ramollissent et suppurent à l'intérieur; l'inflammation qui accompagne ce travail paraît nécessaire à l'organisation du kyste.

La substance nerveuse qui entoure la masse tuberculeuse est souvent parfaitement saine ainsi que les portions de méninge qui l'avoisinent. C'est ce qui arrive surtout quand la maladie succombe aux progrès de la tuberculisation dans d'autres organes, ou à des maladies intercurrentes, en un mot, toutes les fois que la mort interrompt la marche de la maladie encéphalique. D'autres fois les méninges ou la substance nerveuse présentent des altérations notables de nature inflammatoire et dues à l'irritation produite par les corps étrangers.

Ainsi dans les méninges on constate l'épaississement de la pie-mère et du feuillet adjacent de l'arachnoïde, la présence dans les espaces sous-arachnoïdiens d'un liquide séreux, quelquefois limpide, souvent brèche, opaque, blanchâtre, presque puriforme, ou même celle de quelques produits pseudo-membraneux ou d'un véritable pus. Toutes ces lésions indiquent une méningite chronique. Pour peu qu'elles soient étendues, elles sont de nature à produire quelques symptômes pendant la vie. Si, au contraire, elles sont très-circoscrites et n'existent que dans un ou deux points de l'encéphale, leurs symptômes sont tels ou se confondent avec ceux des tubercules eux-mêmes.

Les effets de la présence des tubercules sur la substance nerveuse qui les avoient et les entoure, sont très-variables. Les plus simples sont l'hypertrophie et l'atrophie. La première est plus rare; mais elle a réellement lieu dans

quelques cas, de telle sorte que la tumeur étant enlevée, on trouve la portion de l'organe en contact avec elle plus développée, plus pesante qu'à l'état normal; c'est ce qui était évident dans le cas que nous avons rapporté page 451. Les deux hémisphères cérébelleux, le droit surtout, étaient hypertrophiés sous l'influence d'une tumeur tuberculeuse développée principalement dans le lobe médian. Une nutrition plus active de l'organe peut donc accompagner la présence de la matière tuberculeuse dans son épaisseur, surtout quand la tumeur est elle-même en voie d'accroissement.

Toutefois l'atrophie est plus fréquente. Souvent une partie du cerveau ou du cervelet a disparu, absorbée, pour ainsi dire, par la tumeur qui en occupe la place. Dans d'autres cas elle est encore reconnaissable, mais diminuée de volume, pourvue de peu de vaisseaux, indurée et comme racornie. C'est ce qu'on voit souvent sur les circonvolutions cérébrales et sur les lames cérébelleuses. Comprimées et atteintes dans leur nutrition par le voisinage du tubercule, elles sont réduites à des feuillets blanchâtres, minces, qui ne rappellent que grossièrement leur disposition primitive.

Des altérations plus graves peuvent se rencontrer. La plus importante est le ramollissement inflammatoire. Souvent borné à la couche de substance adjacente à la tumeur, d'autres fois étendu plus loin, il varie dans son aspect et présente toutes les nuances que comprennent les deux formes admises de ramollissement rouge et de ramollissement blanc, trop bien connues d'ailleurs pour que nous nous arrêtions à les décrire ici. C'est au point de vue symptomatologique que ces ramollissements ont le plus de valeur.

Enfin l'épanchement ventriculaire accompagne assez souvent les tubercules intra-crâniens. Nous avons parlé des différents modes d'action par lesquels ils amènent ce résultat en traitant de l'hydrocéphale chronique. Quelquefois, en l'absence de toute autre lésion propre à la méningite aiguë, l'épanchement se forme rapidement et fait

succomber le malade. C'est un mode de terminaison sur lequel nous reviendrons dans un instant.

Terminons ce qui concerne l'anatomie pathologique en disant que les tubercules encéphaliques coïncident toujours avec les lésions thoraciques et abdominales propres à la maladie tuberculeuse; que chez certains sujets c'est par elles que la mort survient, tandis que chez d'autres ce sont principalement les tubercules de la tête qui amènent cette issue funeste.

CASIS.

Il est parfaitement inutile de nous étendre ici longuement sur l'étiologie de cette maladie. Tout a été déjà dit, soit quand nous avons étudié la maladie tuberculeuse en général (t. 1), soit quand la description de la méningite tuberculeuse nous a amené à rechercher les conditions qui favorisent la localisation de l'affection cachectique dans les organes de l'innervation. Nous nous bornerons ici à présenter quelques données statistiques sur l'influence de l'âge; nous allons voir qu'elle est à peu près la même que pour la méningite tuberculeuse.

Sur trente-quatre cas que nous avons analysés, dans lesquels l'âge des sujets a été exactement indiqué, nous trouvons seize chez des enfants âgés de moins de cinq ans, treize chez des enfants de cinq à dix ans, cinq seulement chez ceux de dix à quinze ans. Il semble par là que la tuberculisalion des centres nerveux est plus précoce que celle des organes du thorax et de l'abdomen, puisque les affections tuberculeuses considérées en général et sans distinction de siège offrent, ainsi que nous l'avons montré ailleurs (t. 1, p. 473), leur maximum de fréquence de de cinq à onze ans, et non point dans les cinq premières années de l'enfance. Les relevés numériques que nous avons produits à l'occasion de la méningite tuberculeuse faisaient déjà pressentir cette conclusion qui devient ici plus évidente.

Symptômes.

La symptomatologie des tubercules encéphaliques est encore peu avancée. La première source de cette imperfection vient de ce que ces productions pathologiques peuvent acquérir un volume considérable, parfois même exister en grand nombre sans entraîner aucune perturbation fonctionnelle apparente ou caractéristique. Plus leur développement est lent, plus la substance nerveuse s'accoutume à leur présence et élude facilement la surprise qu'elle en éprouve. Généralement les symptômes sont plus en rapport avec les altérations secondaires des méninges ou de la substance cérébrale qu'avec la maladie primitive. Cependant parmi les sujets qui à l'autopsie présentent des tubercules volumineux, un grand nombre n'ont point succombé sans avoir offert quelques symptômes de la présence de ces corps étrangers. Leurs effets portent tantôt isolément, tantôt simultanément sur les diverses fonctions de l'innervation. Nous allons passer les principaux en revue.

La céphalalgie se manifeste fréquemment. Générale ou locale, elle se déclare ordinairement assez longtemps avant tous les autres symptômes, et persiste avec opiniâtreté jusqu'à la mort ou au moins jusqu'à un degré très-avancé de la maladie. Quand elle est locale, elle ne correspond pas toujours, mais assez souvent, au siège du mal. Le plus souvent elle est à peu près continue avec des rémissions et des accès parfois très-violents; rarement elle est complètement intermittente, si ce n'est dans les commencements. Plus tard elle perd ce caractère. Enfin chez quelques malades elles ne survient qu'à une époque avancée, lorsque des altérations se produisent dans le voisinage des masses tuberculeuses.

La sensibilité cutanée reste le plus communément intacte ou n'est que peu altérée. Parfois elle est augmentée, et s'affaiblit au fur et à mesure que la désorganisation s'étend à une plus grande étendue des organes encéphaliques,

Les modifications de la sensibilité en plus ou en moins appartiennent plus spécialement aux lésions tuberculeuses du cervelet et du bulbe, et à celles qui compromettent l'intégrité des nerfs du sentiment. C'est ainsi que dans un cas observé par M. Lacour, la paralysie du trifacial du côté droit se montra en rapport avec l'existence de tubercules agglomérés à la face inférieure de l'hémisphère cérébral du même côté et comprimant le nerf de la cinquième paire à son passage sur le rocher.

L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, peuvent également être affaiblis ou abolis par suite de la compression des nerfs de chacun de ces sens ou de la désorganisation des parties médullaires qui leur donnent naissance.

Les désordres de l'intelligence sont rarement très manifestes tant que la maladie reste à l'état simple. Chez un certain nombre d'enfants on voit le caractère changer et devenir irritable, surtout lorsqu'il y a céphalalgie ; chez d'autres, la vivacité naturelle de l'esprit fait place à la nonchalance, à l'apathie, à la lenteur. Ils deviennent indifférents à toute espèce de jeu, se concentrent en eux-mêmes, parlent peu et aiment la solitude. La morosité et la tristesse se peignent sur leur physionomie. Lorsque tous ces symptômes existent à un certain degré ils annoncent souvent que les tubercules sont en grand nombre, qu'ils ont déterminé dans plusieurs points les lésions propres à la méningite chronique, lésions qui compromettent toujours l'intégrité de l'intelligence ; enfin ils peuvent aussi correspondre à un commencement d'épanchement séreux ventriculaire. Celui-ci en augmentant amène des symptômes comateux qui résultent rarement d'une manière directe des tubercules eux-mêmes.

Les désordres du mouvement sont assez fréquents, mais variables. Un certain nombre d'enfants ont des convulsions qui reviennent par accès plus ou moins fréquents, et sous les différentes formes que nous avons étudiées dans un chapitre spécial. Dans la plupart des cas, l'influence des tubercules n'explique pas le développement des accidents convulsifs et n'en est pas la cause prochaine. Un tubercule

qui occupe une région latérale et circonscrite de l'axe cérébro-rachidien, ne peut déterminer des convulsions générales que par l'intermédiaire d'une modification fonctionnelle de tout l'encéphale, bien distincte de l'action locale et circonscrite qu'exerce la tumeur sur les fibres nerveuses avec lesquelles elle est en contact immédiat. Ce n'est que lorsque les tubercules sont disséminés en grand nombre dans toute l'étendue des organes de l'innervation musculaire, ou lorsqu'ils occupent une portion médiane et centrale, qu'ils paraissent capables d'exciter directement des convulsions générales, et encore la forme intermittente de celles-ci suppose-t-elle que l'affection convulsive conserve quelque chose de la nature des névroses.

Une lésion du mouvement plus directement en rapport avec la présence d'une ou plusieurs tumeurs tuberculeuses est la contracture. Celle-ci manque cependant dans un grand nombre de cas, et peut-être ne se manifeste-t-elle que lorsque le tissu cérébral se ramollit autour de la masse tuberculeuse. Cependant cette condition n'est certainement point indispensable; en son absence, le tissu nerveux, simplement surexcité par le voisinage de la tumeur, ou devenu le siège d'une induration phlegmasique qui précède le ramollissement, peut être perverti dans son action de manière à ce qu'il survienne des contractures. Celles-ci ont généralement une marche chronique, siègent dans un seul ou dans les deux membres d'un même côté du corps, plus rarement dans les deux membres, soit supérieurs, soit inférieurs. La contracture qui n'est, pour ainsi dire, qu'une forme de la paralysie, a beaucoup plus de valeur que les convulsions comme symptôme de l'affection. Au bout d'un certain temps elle fait place assez souvent à une paralysie de plus en plus complète, à mesure que les lésions de la substance nerveuse, autour des masses tuberculeuses, deviennent plus étendues et plus profondes.

Quant aux symptômes éloignés, les plus importants sont la constipation, les vomissements surtout, et quelques irrégularités de la circulation. Les vomissements s'observent de temps à autre, coïncident particulièrement avec

les crises de douleur, de céphalalgie, et avec l'apparition des phénomènes de stupor et de coma. La constipation est quelquefois opiniâtre, mais le plus souvent elle manque ou cède assez facilement. Quant à la circulation, elle est irrégulière; tantôt le pouls est plus lent, tantôt plus vite qu'à l'état normal, il est souvent inégal; il se développe parfois un mouvement fébrile fogare qui reparait à des intervalles irréguliers. Ces dérangements des fonctions digestives et circulatoires sont en général d'autant plus prononcés que les désordres inflammatoires qui résultent des tubercules encéphaliques sont plus étendus, plus profonds et plus rapides dans leur marche.

Nous n'avons pas besoin d'indiquer tous les symptômes dont la coïncidence des tubercules thoraciques et abdominaux peut être le point de départ. Disons seulement que cette coïncidence, aussi bien que celle des affections scrophuleuses externes, a une grande valeur pour le diagnostic; c'est elle principalement qui peut nous mettre sur la voie de la nature de la maladie encéphalique qui trop souvent ne se révèle que par des symptômes obscurs.

La marche de cette affection offre assez souvent deux périodes distinctes : la première, marquée par des intermittences, par une succession lente des accidents et par leur accroissement graduel; la seconde, dans laquelle les symptômes deviennent continus et d'une intensité plus rapidement croissante. C'est pendant la première de ces deux périodes que la tuberculisation est véritablement lente et rarement reconnue. Souvent on ne constate que des accès céphalalgiques avec vomissements qu'il est facile de prendre pour une simple migraine, et qui en réalité dépendent de la congestion sanguine que provoquent les tumeurs dans les organes au milieu desquels elles séjournent. Fort à peu ces crises se rapprochent, et enfin la souffrance devient à peu près continue. Lorsque les caractères du mal ont ainsi cessé d'être équivoques, il est ordinairement très-avancé et une terminaison funeste n'est pas éloignée. Dans d'autres cas la maladie a une marche plus régulière, plus continue, dès le début jusqu'à la fin.

Rien n'est plus difficile à déterminer que la durée des tubercules encéphaliques. Ils sont si souvent latents, leurs premiers effets sont si souvent équivoques qu'il n'est pas possible d'assigner l'époque de leurs premiers développements. Les mêmes difficultés se retrouvent ici que dans les phthisies thoraciques et abdominales. D'ailleurs la mort arrive souvent, par l'effet de complications diverses, avant que la phthisie encéphalique ait parcouru toutes ses phases. Ce sont ces divers modes de terminaison que nous allons maintenant étudier.

Dans plus de la moitié des cas, on voit la marche essentiellement chronique de la maladie faire tout-à-coup à des symptômes de méningite aiguë qui entraînent le malade et dans lesquels se fondent les symptômes de l'affection primitive. La méningite aiguë qui survient alors est celle que nous avons décrite sous le nom de tuberculeuse; elle mérite ce nom soit à cause de l'affection chronique sur laquelle elle vient s'ajouter, soit surtout parce qu'elle est presque constamment liée à une nouvelle éruption de tubercules dans les méninges, à un nouvel effort localisateur suscité dans ces membranes par la cachexie, effort qui cette fois est assez énergique pour constituer une phlogose plus ou moins aiguë. Dans quelques cas de cette espèce la réaction un peu moins vive n'entraîne pas des altérations inflammatoires aussi tranchées, mais imprime seulement à l'exhalation ventriculaire une activité anormale. C'est alors que les sujets succombent à ce qu'on pourrait appeler une hydrocéphale aiguë tuberculeuse, maladie qui d'ailleurs se confond entièrement, par ses symptômes, avec la méningite tuberculeuse.

Dans d'autres cas les tumeurs déterminent une hydrocéphale chronique qui devient la cause principale de la mort; c'est surtout lorsqu'elles compriment quelque sinus et apportent un obstacle mécanique au retour du sang veineux. Nous avons cité trois faits de ce genre à l'occasion de l'hydrocéphale chronique.

Chez un grand nombre de malades, c'est aux progrès des affections tuberculeuses développées dans les organes

respiratoires ou digestifs qu'est due la mort qui arrive plus ou moins longtemps avant que les tubercules encéphaliques aient acquis un développement considérable.

Enfin le plus petit nombre des sujets succombent aux seuls progrès de la phtisie encéphalique, laquelle, outre ses effets locaux, agit sur l'organisme tout entier à la manière des autres phtisies, c'est-à-dire en affaiblissant la constitution, en appauvrissant le sang, en ruinant les forces, et entraînant les malades au plus haut degré de marasme et de lémaciation.

Diagnose.

La variabilité que nous avons notée dans les symptômes a dû nous faire présenter toutes les difficultés du diagnostic. « Dans l'état actuel de la science, dit M. Guérin, il est encore impossible de déterminer d'une manière précise les symptômes qui indiquent le développement et la présence des tubercules dans le cerveau; on peut cependant, en réunissant toutes les circonstances que présentent la plupart des sujets affectés de cette maladie, arriver à un diagnostic probable. Les principales de ces circonstances sont relatives aux renseignements commémoratifs sur les symptômes actuels, à la présence de tubercules dans d'autres organes, à une affection scrophuleuse ancienne, à la prédisposition héréditaire à ces affections, etc.; telles sont les données commémoratives qui rendent probable l'existence de tubercules encéphaliques. Les symptômes qui ont existé chez tous ceux qui ont été atteints de ces tumeurs, sont principalement la céphalalgie, soit continue, soit intermittente et irrégulière dans ses retours, fréquemment fixée à une partie circonscrite de la tête. Les malades sont en même temps frappés d'un dépérissement remarquable dont on est souvent porté à chercher inutilement la cause dans une lésion organique des poumons. Lorsque l'on observe ces accidents, si surtout ils se prolongent après s'être successivement développés sans cause immédiate évidente, et si des phénomènes de par-

lysis viennent à se manifester, on est fondé à présumer qu'il existe dans le cerveau une maladie organique de la nature de celle qui nous occupe. On est encore plus en droit d'admettre cette lésion, si l'on voit la paralysie se circoncrire dans une partie peu étendue, ce qui ne laisse pas de doute que la cause organique qui agit sur le cerveau ne soit immédiatement limitée à une partie très-circonscrite du cerveau, comme le sont ordinairement ces tumeurs (1). »

Si l'on parvient à diagnostiquer une tumeur des centres nerveux chez les enfants, sa nature tuberculeuse est rendue infiniment probable par ce seul fait que les tumeurs d'une autre espèce sont beaucoup plus rares dans le premier âge. « Pendant quatre années de recherches à l'hôpital des Enfants, dit Constant, nous n'avons rencontré que trois sortes de tumeurs dans l'encéphale : le tubercule, le cancer, et l'acéphalocyste. Les deux dernières ne se sont offertes qu'une fois à notre observation, la première a été rencontrée quarante fois. Le tubercule du cerveau chez les enfants, d'après nos recherches du moins, serait donc au cancer et à l'acéphalocyste comme 40 : 1 (2). » L'âge est donc une circonstance sur laquelle on peut se fonder pour aider au diagnostic.

Celui-ci devient encore plus épintux lorsqu'il s'agit de connaître le siège précis d'une tumeur dont l'existence est admise dans les centres nerveux. Dans certains cas le siège de la céphalalgie n'est pas sans valeur ; c'est ainsi que dans la plupart des cas de tumeur cérébelleuse avec céphalalgie, celle-ci a occupé la région occipitale. Dans quelques-uns de ces mêmes cas on a noté, soit une exaltation de la sensibilité cutanée, soit la vacillation des membres et la perte de la faculté d'équilibration des mouvements, soit peut-être aussi des phénomènes spéciaux vers les organes génitaux. Mais les observations de ce genre ne sont encore ni assez nombreuses, ni en général accompagnées de dé-

(1) Notes de la val. d'Abercrombie, p. 264, 2^e édit.

(2) *Gaz. méd.*, 1856, p. 492.

taux suffisants pour en tirer des conclusions quant au diagnostic. Ceux-là seuls qui ont voulu défendre des hypothèses sur les fonctions du cervelet, ont torturé les faits en faveur de leurs idées.

Il serait plus facile, sans doute, de ne pas rapporter à l'un des centres encéphaliques une tumeur tuberculeuse qui siègerait dans la moelle : mais ici de nouvelles difficultés naissent de la possibilité de rapporter à la moelle une affection siégeant dans ses enveloppes membraneuses ou osseuses.

Prognostic.

Le pronostic de la phthisie cérébrale est extrêmement grave, puisqu'elle se termine toujours par la mort. La durée de la maladie seule varie, et quand sa marche paraît lente, on peut considérer le pronostic comme un peu moins fâcheux. Malheureusement une méningite aiguë peut se déclarer au moment où l'on s'y attend le moins ; et ici plus souvent encore que dans les autres phthisies, la durée est abrégée par des accidents intercurrents plus ou moins dépendants de l'affection primitive, mais dont il est toujours impossible de prédire l'invasion.

Sans doute l' incurabilité de la tuberculisation encéphalique n'est pas absolue. On conçoit que la maladie encore peu avancée puisse s'arrêter, et les produits morbides subir des transformations ou une absorption qui rende nulle leur action sur le système nerveux. Le premier mode de terminaison a été constaté par une observation très-intéressante de M. Leguillon (1), relative à une jeune fille qui mourut quatre ans après avoir offert des symptômes de tubercules dans l'encéphale ; ceux-ci étaient passés à l'état calcaire. Si l'on citait d'autres faits analogues, on pourrait sans doute admettre quelques exceptions à cette opinion, savoir : que les tubercules cérébraux amènent toujours la mort ; mais elles sont certainement très-rares.

(1) *Ann. méd. des Sc. et Inst. méd.*, 1835, t. II, p. 25.

Tissotement.

La thérapeutique n'offre pas de ressources plus puissantes contre les tubercules encéphaliques que contre ceux de la poitrine ou du ventre. Une fois qu'ils sont développés, et surtout lorsqu'ils ont déjà un certain volume, on ne peut espérer autre chose que de ralentir leur marche et de pallier quelques-uns de leurs effets, la céphalalgie par exemple, qui en est le plus pénible.

A l'état simple, les tumeurs tuberculeuses réclament des révulsifs cutanés énergiques, appliqués autour de la tête. Ces moyens peuvent ralentir leur développement ou retarder leur ramollissement et celui des parties environnantes. Les esuaires ont aussi l'avantage d'être indiqués contre la méningite chronique qui les accompagne quelquefois. « C'est dans ce cas, dit M. Gendrin, qu'il nous paraît bien établi que les esuaires-dérivatifs doivent être appliqués avec hardiesse. Si l'on craint d'agir activement, il ne faut compter sur aucun résultat avantageux de ce traitement dans les maladies chroniques, surtout lorsqu'elles occupent les organes profonds du crâne. Dans ces cas, nous appliquons de larges moxas, de profondes fontanelles aux tempes, derrière les oreilles, à la nuque, etc. Nous n'avons jamais remarqué aucun accident par l'effet de cette médication, et nous sommes fondé à penser que, dans bien des cas où l'on n'obtient aucun effet utile de leur action, c'est parce qu'on a recours à leur emploi avec une trop grande timidité (1). »

Les moyens dont nous venons de parler nous paraissent contre-indiqués dans les cas où se montrent des symptômes de congestion cérébrale. C'est alors qu'il ne faut pas craindre d'avoir recours à une saignée, en général peu copieuse et toujours proportionnée à l'état des forces. On emploiera de préférence la saignée du pied si elle est possible, ou les sangsues, soit aux malléoles, soit autour de

[1] Notes de la trad. d'Algeronville, page 744.

l'anus. De cette manière l'émission sanguine sera plus dérivative que spoliative. Pour remplir le même but, on prescrira des purgatifs si le tube digestif est sain, ou mieux encore, des applications vésicantes aux membres inférieurs, des bains de pied et des sinapismes. Lorsque ces moyens ne suffiront point pour conjurer une congestion cérébrale menaçante, on ouvrira la veine jugulaire, ou l'on fera porter des sangsues aux tempes, derrière les oreilles, ou sur la région qui est le siège spécial de la céphalalgie.

Si la congestion résiste, elle passe presque inévitablement à l'état de phlogose, et alors la conduite à tenir est de tous points identique à celle que réclame la méningite aiguë, et que nous avons déjà exposée ailleurs.

Lorsque les tumeurs tuberculeuses s'accompagnent d'hydrocéphale chronique, on cherche à ralentir l'exhalation séreuse en stimulant la sécrétion des reins, celle des intestins et de la peau, par des moyens appropriés. Mais l'emploi de ces moyens et de tous les médicaments internes en général, ne doit être tenté qu'autant que les viscères peuvent en supporter l'action. Si par exemple, le tube digestif était lui-même envahi par la cachexie tuberculeuse, il serait impuissant de recourir aux purgatifs. Les frictions mercurielles n'auraient pas le même inconvénient; mais rarement aussi elles seraient capables de modifier l'épanchement ventriculaire. A plus forte raison, si cette hydrophise n'est qu'un effet mécanique de la compression et de l'oblitération du sinus droit par une tumeur du cerveau, tous les moyens de traitement sont impuissants.

Enfin, dans presque tous les cas, le médecin aura à remplir les diverses indications que fournissent soit la diathèse tuberculeuse, soit les affections dues à sa localisation dans les organes internes ou externes. Ces indications variables suivant leur siège, leur degré, leur période, etc., ont été assez complètement étudiées ailleurs, pour que nous n'ayons point ici à y revenir.

QUATRIÈME PARTIE.

MALADIES DES ORGANES DES SENS.

SECTION I.

MALADIES DE LA PEAU.

Avec la plupart des pathologistes, nous plaçons les fièvres éruptives dans la classe des maladies de la peau, tout en reconnaissant que ces fièvres ne peuvent nullement être considérées comme constituées par les altérations qu'elles produisent à la surface des téguments. Ces altérations n'en sont qu'un élément, le moins important peut-être quant à leur nature, mais le plus caractéristique au point de vue de la symptomatologie. Nous nous servons donc de cette classification sans y attacher plus de valeur qu'elle n'en a, et sans prétendre le moins du monde localiser des maladies qui sont essentiellement générales. Dans le chapitre que nous consacrerons aux fièvres éruptives, nous comprendrons la rougeole, la scarlatine et les affections varéoleuses.

Quant aux autres maladies de la peau, soit aiguës, soit chroniques, elles sévissent aussi sur un grand nombre d'enfants. Les teignes, par exemple, sont des maladies véritablement propres à l'enfance par leur extrême fréquence. Mais leur histoire, pour être complète, comporterait des développements que peuvent seuls donner des traités de dermatologie, et qui nous feraient sortir des limites d'un ouvrage dans lequel nous avons eu principalement en vue les maladies du domaine de la pathologie interne propre-

ment dites. Il serait parfaitement inutile d'élargir notre cadre pour reproduire longuement des descriptions auxquelles nous n'aurions rien de spécial à ajouter. Nous nous contenterons de faire une exposition résumée des maladies de la peau qui offrent le plus d'importance dans le premier âge.

CHAPITRE I.

FIÈVRES ÉRUPTIVES.

Par leur fréquence, par leur nature encore peu connue, par la constitution complexe de leurs éléments et la multiplicité des complications qui en dépendent, par la difficulté et l'importance de leur diagnostic dans certains cas, par la part qu'elles ont à la mortalité du premier âge, les fièvres éruptives dans l'enfance méritent de notre part un examen sérieux et complet. Différentes dans leurs effets locaux sur l'organisme, mais analogues par leur propriété essentiellement contagieuse et par la manière générale dont elles se comportent, elles se prêtent facilement à des aperçus généraux, à des vues d'ensemble qui rendent leur étude simultanée très-avantageuse. Aussi croyons-nous pouvoir les rassembler dans le même chapitre, afin de faire entre elles tous les rapprochements dont elles sont susceptibles; la division et l'exposition de leurs caractères individuels n'auront point à en souffrir.

Anatomie pathologique.

Les membranes tégumentaires externes et internes sont le siège des fièvres éruptives en ce sens que c'est sur elles que ces maladies portent principalement leur action; mais les lésions caractéristiques qu'elles y déterminent ne sont pas en réalité le point de départ de tous les phéno-

mères morbides. Il faut remonter plus haut et chercher ce point de départ dans un des systèmes qui lient tous les autres sous leur dépendance, c'est-à-dire dans le système circulatoire ou dans le système nerveux. Déjà les observations de chimie pathologique ont fourni sur ce point quelques données; mais ce sont l'analyse des faits cliniques et les inductions légitimes qu'on en peut tirer, ce sont surtout les résultats de l'inoculation qui nous mettent sur la voie d'une altération du sang, comme état morbide primitif à tout ce qui plus tard apparaît à nos sens dans les exanthèmes fébriles. Ces maladies sont donc des fièvres vasculaires. Nous n'aborderons point ici une démonstration qu'il faut chercher dans les ouvrages consacrés à la pathologie générale des fièvres : qu'il nous suffise de dire que nous l'acceptons, et que c'est à ce point de vue que nous tâcherons de rester placé dans le cours de la description que nous allons faire.

On trouve dans les fièvres éruptives un exanthème cutané et un exanthème muqueux ; le premier occupe ordinairement toutes les régions de la peau ; le second, au contraire, est souvent borné à une certaine étendue de la muqueuse gastro-pulmonaire, ou, s'il occupe la totalité de cette membrane, il paraît au moins prédominant dans ses portions oculaire, nasale, bucco-pharyngienne, et laryngo-bronchique. Quant à sa nature, l'exanthème est constitué par un érythème dans la rougeole et la scarlatine, par des pustules dans la variole.

L'examen des taches des deux premières, fait pendant la vie et après la mort, prouve qu'elles résultent de l'injection disséminée du corps réticulaire de la peau ; à leur niveau l'épiderme offre moins d'adhérence, et au-dessous du derme le tissu cellulaire est plus humide et comme infiltré par une petite quantité de sérosité. L'exanthème muqueux qui accompagne ces maladies offre tous les caractères des inflammations ordinaires. Dans la rougeole, on trouve presque toujours dans la bouche, principalement autour du collet des dents, de petits flocons blanchâtres, analogues à de l'albumine coagulée, et qui sont dus à la coagu-

lation du mucus ou à des rudiments pseudo-membraneux. Dans des cas compliqués, l'écanthème se change en diphtérie ou même en inflammation gangréneuse dont les traces sur le cadavre ont été décrites ailleurs.

Les caractères anatomiques de la variole exigent plus de détails. Examinons d'abord ceux de la pustule cutanée. Dans les premiers temps de sa formation, elle ne consiste encore que dans une simple tache à peine proéminente, due à l'injection sanguine des corps muqueux de Malpighi, mais bientôt une matière particulière est sécrétée au-dessous de l'épiderme. Examinée au moment où la suppuration va avoir lieu, la pustule encore récente présente les caractères suivants : « L'épiderme qui la couvre n'est pas épais et s'enlève assez facilement, en laissant à découvert une surface blanchâtre, lisse, déprimée au centre. Cette surface est formée par un petit disque, formé lui-même par une exsudation coagulable à la face externe du derme. Au-dessous de ce petit disque, l'intérieur de la pustule est divisé par une foule de cloisons qui s'étendent du centre à la circonférence, et laissent entre elles un nombre indéfini de petites loges ou alvéoles qui contiennent le virus variolique (1). » Comme ces cellules ne communiquent point entre elles, on s'explique pourquoi la pustule ne se vide pas quand on la pique dans un seul point. En outre, la résistance des brides qui unissent le disque coagulé avec le fond de la pustule étant plus grande au centre, il en résulte la forme ombilicée que présentent la plupart, mais non la totalité des boutons varioliques. Le liquide qui remplit les cellules est séreux jusqu'au moment de la suppuration. Lorsque à cette époque il se change en pus, il s'insinue entre l'épiderme et le disque coagulé; la cavité qui le contenait est fermée en dehors par l'épiderme, en dedans par le disque appliqué sur le derme, et comme elle est dès lors uniloculaire, il suffit de piquer l'épiderme dans un seul point pour la vider de tout le liquide qu'elle contenait. Mais si, après avoir enlevé convenablement l'épi-

(1) Boucquet, Traité de la variole et des éruptions varioliques, p. 122.

derme, on examine le fond de la pustule, on y retrouve le disque cornéux dont l'ablation laisse voir une rougeur plus ou moins vive à la surface excavée du derme, et quelquefois même du pus.

Dans la variole l'exanthème muqueux n'a souvent aucun autre caractère que ceux d'une inflammation ordinaire. Mais dans quelques cas, dans presque toutes les variolées continentales surtout, on trouve sur les portions supérieures de la muqueuse gastro-pulmonaire, des pustules qui sont moins ombiliquées que celles de la peau, qui se déchirent de très-bonne heure, et qui, soit dans leur état d'intégrité, soit après la déchirure de l'épithélium, laissent voir pour la plupart une couche cornéuse analogue à celle de la pustule cutanée. Beaucoup d'auteurs ont nié, à tort suivant nous, la présence de véritables pustules varioliques sur les muqueuses internes. Elles sont effectivement rares au-dessous du pharynx et de la trachée, mais on les y rencontre parfois, et si elles n'y présentent qu'une partie de leurs caractères on se l'explique parfaitement par l'absence de l'épithélium. Dans l'œsophage où cette membrane est très-prononcée, il nous est arrivé de voir des pustules varioliques bien ombiliquées et offrant tous les caractères de celles de la peau.

On trouve parfois, dans les organes internes, de petits abcès en nombre infini et à un état plus ou moins avancé. Ces abcès, qui ont pu quelquefois être pris par erreur pour des pustules développées à la surface des membranes séreuses ou dans des organes parenchymateux comme le poulmon et le foie, s'observent surtout dans les cas où l'éruption de la peau a été incomplète, languissante, et a disparu par méfistisme.

Dans des variolées graves on a trouvé au sang une grande froidité; les solides en étaient imbibés et ramollis. Souvent il s'était épanché par suffusion ou par infiltration dans les poulmons, le cœur, le foie, les parois de l'estomac et de l'intestin; dans l'épaisseur de la peau, etc. Dans ce cas l'altération du sang est évidente; l'observation directe montre la perte de cohésion de ses molécules.

Causes.

Le jeune âge est essentiellement favorable au développement des fièvres éruptives ; mais il ne suffit pas d'énoncer ce fait d'une manière aussi générale, il faut l'analyser, et par des remarques de détails en déterminer la valeur réelle.

Les fièvres éruptives présentent un caractère qu'on peut considérer comme essentiel, car les exceptions sont rares ; c'est de n'affecter un sujet qu'une fois dans sa vie. Leur développement, à quelque âge qu'il ait lieu, détruit pour l'avenir la disposition à les contracter de nouveau. On comprend dès-lors que si un grand nombre d'adultes s'exposent impunément à la contagion, c'est qu'ils ont eu ces maladies dans leur enfance. Pour établir d'une manière irréfutable la prédisposition de cet âge, il faudrait, sur un nombre égal d'enfants et d'adultes n'ayant jamais eu aucune de ces maladies, et qui seraient soumis à l'action des causes capables de les développer, c'est-à-dire à la contagion ou à l'infection, il faudrait voir, disons-nous, laquelle de ces deux catégories de sujets fournirait le plus de malades. Il est à regretter que la statistique n'ait jamais été appliquée de cette manière. Il est vrai que cette application n'est pas sans difficulté, mais il est bien certain qu'elle seule pourrait donner la preuve directe du fait qu'il s'agit de démontrer. Ce n'est que par une observation approximative et par induction que l'on peut admettre une prédisposition aux fièvres éruptives plus grande dans l'enfance qu'aux autres âges. Nous ne répéterons point à cet égard ce que nous avons dit ailleurs au sujet de la coqueluche (Voyez t. 1, p. 133). L'application peut en être faite de tout point au sujet qui nous occupe en ce moment.

Peut-être arrivera-t-on aussi à démontrer que la prédisposition n'est pas égale à toutes les époques de l'enfance. Elle paraît moindre chez les enfants à la mamelle que chez ceux d'un à quinze ans. On ne voit en effet presque jamais à l'hôpital des Enfants-trouvés, les fièvres érup-

lives se propager à un grand nombre d'enfants nouveaux-nés, comme il arrive à l'hôpital des Enfants malades. Qu'un sujet atteint d'un exanthème y soit admis, parmi les autres enfants couchés dans la même salle, ceux qui n'ont pas encore acquis l'immunité contractent bientôt la même maladie. Ailleurs que dans les hôpitaux, on peut en partie expliquer la rareté des fièvres éruptives chez les plus jeunes enfants, par la seule différence des conditions hygiéniques dans lesquelles ils sont placés. Ils restent plus constamment sous les yeux de leurs mères, et ont moins facilement quelque contact avec des personnes qui sont dans des conditions propres à transmettre les fièvres éruptives ; enfin ils sont moins exposés à être transportés dans des lieux où ces maladies sévissent sous la forme épidémique, et où l'atmosphère est infectée par les miasmes contagieux.

D'après les résultats de notre observation à l'hôpital des Enfants malades, il nous a paru évident que chez les enfants d'un à quinze ans, la fréquence des fièvres éruptives va en diminuant à mesure qu'on se rapproche de la puberté. Ainsi, sur soixante quinze enfants atteints de ces maladies, nous en comptons quarante-cinq compris dans la période d'un à huit ans, et trente seulement dans celle de huit à quinze. Mais la différence qui est assez tranchée, comme on le voit, pour les fièvres éruptives considérées en général, n'est plus la même pour chacune d'elles en particulier. En effet, nous avons trouvé la rougeole beaucoup plus fréquente avant qu'après huit ans, dans la proportion de 2 : 1 ; il y a eu une différence analogue mais moins forte pour la scarlatine, tandis qu'elle a été nulle pour la variole. Comme, parmi les sujets variolés, plusieurs avaient été vaccinés, le résultat que nous venons d'indiquer est un indice en faveur de l'opinion qui admet l'affaiblissement de l'action préservatrice de la vaccine.

Nous terminerons ce qui est relatif à l'influence de l'âge en parlant de ces faits curieux, mais rares, dans lesquels on voit des enfants malades présenter les traces d'une

fièvre éruptive développée dans le sein de la mère. Ces faits sont incontestables pour la variolo, et ici il est arrivé tantôt que la mère avait eu cette maladie pendant le cours de sa grossesse, tantôt qu'elle n'en avait nullement été affectée. Rosen et Vogel ont observé la rougeole chez des enfants nouveau-nés, mais ils ne s'expliquent pas sur la santé de la mère. M. Guersant, au contraire, qui l'a vue chez un enfant naissant, n'a pas osé de remarquer que cet enfant l'avait gagnée de sa mère (1). Des faits analogues ne paraissent pas avoir été observés à l'égard de la scarlatine.

Il n'y a rien à dire de particulier relativement à l'influence que le sexe, le tempérament, la constitution, exercent dans l'enfance sur le développement des fièvres éruptives. Notons seulement qu'en vertu de certaines idiosyncrasies on voit des sujets s'exposer impunément à la contagion des fièvres éruptives, et d'autres qui les contractent avec une facilité étonnante, quoiqu'ils n'aient eu que des rapports indirects avec des sujets qui en étaient atteints. La disposition latente de l'organisme qui est nécessaire pour que la cause externe miasmatique ait son effet, est donc plus ou moins prononcée suivant les sujets, et pour le développement de ces maladies il y a ordinairement des conditions d'opportunité tout individuelles.

Les fièvres éruptives sont contagieuses. Ce principe qu'il n'est pas possible de contester, n'entraîne pas nécessairement la conséquence qu'en on tire habituellement, savoir, que ces fièvres ne se développent que par contagion. Il est incontestable pour nous, et de l'avis d'auteurs très-judicieux, qu'elles peuvent naître spontanément chez des sujets qui n'ont eu aucunes communications directes ni indirectes avec des sujets récemment affectés. Dans les grandes épidémies l'infection a sans doute plus de part à la propagation du mal que la contagion elle-même, tandis que dans les fièvres éruptives sporadiques, on constate

(1) *Dict. de méd.* 3^{me} édit., t. VIII, p. 513.

que la plupart des malades ont été en rapport médiate ou immédiat avec d'autres personnes affectées avant eux.

Il y a encore beaucoup d'incertitude sur la question de savoir quel est le véhicule du principe ou de l'agent contagieux. Est-ce l'air expiré? sont-ce plutôt les produits sécrétés par les muqueuses? ou enfin sont-ce les débris d'épiderme, les croûtes qui se détachent de la surface cutanée, ou seulement le liquide de la transpiration? On ne peut faire aucune réponse exclusive, et il est possible que ces différentes matières s'imprègnent toutes du principe délétère. Les inoculations ont en effet démontré que le pus, et par conséquent les croûtes des pustules varioliques transmettent la variole. Alex. Monro et Looke ont inoculé la rougeole avec l'humeur lacrymale et la salive recueillies sur des individus atteints de la maladie. F. Horn et Speranza ont établi par des expériences qu'elle pouvait même se transmettre par l'inoculation du sang des personnes qui en sont affectées. Petit-Radel n'a pu inoculer la scarlatine au moyen des écailles épidermiques insérées sous la peau de personnes qui n'en avaient point encore été atteintes; mais Stoll paraît y avoir réussi. Toutefois nous devons dire que des tentatives faites plus récemment pour inoculer la rougeole et la scarlatine, n'ont été suivies d'aucun résultat, et que jusqu'à présent l'inoculation de la variole est la seule mise hors de doute. On connaît le virus variolique, il est saisissable, tandis que l'agent propagateur de la rougeole et de la scarlatine n'a point encore été parfaitement déterminé.

Le contact de la peau d'un sujet affecté, surtout dans les périodes de desquamation, est un moyen de transmission qu'on observe très-souvent. Ce mode de propagation étant parfaitement démontré, on conçoit facilement que les produits de la sécrétion ou de la desquamation cutanée, puissent être transportés au moyen des vêtements, des couvertures et des draps de lit, et transmettre aux individus qui les touchent le principe contagieux dont ils sont imprégnés. Il faut que ce principe jouisse, dans certaines conditions au moins, d'une inaltérabilité remarquable, puisqu'on cite des cas où il paraît n'avoir

rien perdu de son action après des semaines et même des mois entiers. Un des faits les plus curieux est celui rapporté par Hildenbrand. « Un habit noir que j'avais en visitant une malade atteinte de scarlatine, dit ce médecin, et que je portais de Vicence en Podolie, sans l'avoir mis depuis plus d'un an et demi, me communiqua, dès que je fus arrivé, cette maladie contagieuse, que je répandis ensuite dans cette province, où elle était jusqu'alors presque inconnue. » Ce fait cesse de paraître extraordinaire lorsqu'on se rappelle que le vaccin desséché peut conserver très-longtemps toutes ses propriétés.

La propagation par l'haleine du malade n'a pas été l'objet d'expérimentations directes; mais elle nous paraît très-probable. Dans combien de familles ne voit-on pas, malgré l'isolement dans lequel on place le premier malade, la maladie attaquer les autres parents qui ne se sont point exposés à toucher le malade, ni aucun de ses vêtements, ni la personne qui se met en rapport avec lui pour le soigner? Ne peut-on pas admettre alors que le développement du mal tient à ce que le souffle du malade infecte et empoisonne l'air qu'il respire en commun avec les autres habitants de la maison?

Quel que soit leur mode de propagation, on voit presque toujours les fièvres éruptives atteindre successivement plusieurs sujets dans la même famille, dans la même maison, dans la même localité. Il s'écoule toujours un certain temps entre le moment où l'action infectieuse ou contagieuse a lieu et le début de l'éruption. Cet intervalle qui n'est ordinairement que de quelques jours, se nomme période d'incubation.

On observe les fièvres éruptives dans tous les pays, à toutes les latitudes, dans l'intérieur des terres aussi bien que sur les bords de la mer, et dans les îles. Peut-être ces lieux ne sont-ils pas également exposés à ces maladies, mais aucun n'en est exempt.

À l'état sporadique on les observe dans toutes les saisons. À l'état épidémique, celles-ci ont au contraire une influence très-marquée, quoiqu'elle ne soit pas constamment la même. Nous allons résumer ici l'histoire des

épidémies les plus importantes qui ont été décrites. Nous y verrons tout à la fois l'influence des saisons, et, de qui est plus important, nous connaîtrons le génie de chacune de ces épidémies.

« Celles de rougeole, dit M. Andral, règnent le plus souvent vers la fin de l'hiver et au printemps. M. Rayer qui a étudié dans les histoires des principales épidémies les circonstances particulières qu'elles ont présentées, est arrivé aux résultats suivants :

« L'épidémie de rougeole observée en 1671, à Londres, par Sydenham, et celle qui régna à Upsal, en 1762, décrite par Rosen, furent bénignes. Des rougeoles annales et malignes régnèrent à Londres, en 1674. L'épidémie observée en 1741, à Plymouth, par Huxham, était souvent compliquée de pneumonie. Waston a vu dans l'hôpital des Enfants-trouvés, à Londres, en 1762 et 1768, deux épidémies de rougeoles putrides. Des rougeoles très-graves, compliquées de miliaire, furent observées à Vire et décrites par de Palinière et par Le Pecq de la Cloture, en 1772 et 1773. Les rougeoles qui régnaient à Paris, en l'an VI, étaient compliquées d'affections abdominales ; en l'an VII elles étaient quelquefois associées à la scarlatine. Dans une épidémie de rougeole observée à la fin de 1800 et au commencement de 1801, par Constrak, quelques enfants furent atteints de fièvres morbillieuses sans éruption. Ils avaient une fièvre violente avec tous les symptômes catarrhaux qui accompagnent la rougeole, puis il survenait une éruption à peine visible, qui disparaissait rapidement, ou seulement une sueur abondante, ou une diarrhée, ou une évacuation extraordinaire d'urine. En étudiant ces épidémies et un grand nombre d'autres, dont l'histoire nous a été laissée, on voit que la plupart ont offert un caractère particulier de bénignité ou de malignité, et que presque toutes ont été précédées d'affections catarrhales, de coqueluches, de gripes ou d'influenza, maladies anciennement indiquées comme les préludes des constitutions morbillieuses. Enfin elles ont quelquefois succédé à des épidémies de variole. Dans l'année 1835, continue M. Rayer,

nous avons observé à Paris cette succession signalée par Storck et de Haen. J'ai vu plusieurs enfants qui, après avoir éprouvé pendant quinze jours une véritable toux fébrile, ont ensuite été atteints de rougeole (1). —

Les épidémies de scarlatine se montrent surtout aux équinoxes, pendant l'hiver, lors des changements atmosphériques, pendant les temps humides, froids et nébuleux, après des pluies abondantes immédiatement suivies d'une grande chaleur (Andral). D'ailleurs, comme celles de rougeole, elles présentent de grandes différences entre elles.

Rosen a décrit l'épidémie qui se déclara à Upsal, dans l'hiver de 1741, et celle de Stockholm, en 1762, qui ayant commencé en été, continua en automne, cessa en novembre, décembre, et janvier 1764, pour recommencer en février. Ces deux épidémies que Rosen a réunies et pour ainsi dire confondues dans sa description, furent remarquables par l'intensité des phénomènes d'affection catarrhale et l'abondante expectoration de phlegmes qui avait lieu vers le quatrième ou cinquième jour; presque tous les malades prenaient le hoquet. Fréquemment on observait comme complications consécutives des engorgements amaxillaires et des hydropisies; c'est par celles-ci que beaucoup de sujets moururent.

Une des plus violentes épidémies de scarlatine fut celle qui régna en Champagne, en 1751, et qui fut décrite par Navier. Elle parut au printemps à la suite des petites vérolas et des rougeoles qui s'étaient montrés en 1750 et au commencement de 1751. On observa une grande intensité dans les phénomènes locaux et généraux de l'éruption, des leucophléngasies énormes et des angines gangréneuses qui firent périr beaucoup de malades.

Angelo Zulati a décrit l'épidémie qui régna en 1762 dans l'île de Céphalonie. Après un hiver long, peu froid, mais très-humide, le printemps fut si sec, que pendant quatre mois on ne vit pas de pluie; les rosées mêmes manquèrent

(1) Andral, *Léçons recueillies par A. Armand*, t. II, p. 177.

totalement. A la fin de mai, il survint tout à coup une chaleur étouffante; dès-lors la scarlatine se déclara dans la ville de Céphalonie et dans les environs; elle attaquait seulement les enfants. Elle fut souvent compliquée d'accidents cérébraux, d'autres fois de troubles abdominaux parmi lesquels la constipation fut plus grave que la diarrhée. Quelques malades rendirent beaucoup de vers; presque tous eurent les parotides tuméfiées et douloureuses. On eut à se louer de l'emploi des purgatifs contre les accidents abdominaux, de la saignée quand la fièvre était très-forte, et des vésicatoires dans les cas de complication d'affections soporeuses.

Franck nous a laissé l'histoire d'une épidémie qui régna à Essen en 1769; elle commença en juillet, alla en augmentant jusqu'en octobre, et ne s'amenda que vers le mois de décembre. Les symptômes argineux furent intenses, l'éruption compliquée de miliaire. Souvent il y eut de graves accidents cérébraux, et pendant la convalescence une encéphalite qui se jouait par une diarrhée. L'éruption se montrant dès le deuxième jour, au lieu de ne paraître qu'au troisième ou au quatrième, était d'un mauvais augure. Le vomissement et la diarrhée se montrant dès le commencement avec les urines et le pouls naturel, étaient mortels le quatrième jour. Le traitement antiphlogistique modéré fut celui qui réussit le mieux, vu que la maladie présentait tous les symptômes de l'inflammation.

Le Pecq de la Clôture a signalé plusieurs épidémies scarlatineuses, entre autres celle qui fut observée à Harcourt en mai 1774. Elle fut peu grave.

Jean-Gabriel Zimmermann, médecin russe, a donné la note de l'épidémie qui se déclara à Heidelberg en 1775. Elle commença au mois de juillet après un hiver et un printemps humides, pluvieux et tempérés; elle fut d'abord modérée, s'aggrava vers l'équinoxe d'automne, et dura jusqu'au mois de mai de l'année suivante. En général, la maladie fut simple et facile à traiter, mais lorsque les symptômes, tels que le mal de gorge, étaient intenses,

on avait recouru à la saignée et aux sangsues au cou ; et le troisième jour, si la déglutition était libre , on administrait un émétique. Les hydropisies ne survinrent que chez les malades qui s'exposèrent intempestivement à l'action de l'air et furent combattues par les décoctions de racines apéritives , animées avec de la terre filée de tartre et la rhubarbe.

L'épidémie de Gènes en 1784, survint dans l'automne et dura jusqu'au printemps suivant. En général elle fut bénigne , quoique très-souvent suivie d'hydropisie. Dans quelques cas, des angines d'aspect gangréneux , accompagnées de tout l'appareil des symptômes typhoïdes, entraînaient les malades dès le troisième jour et au plus tard avant le septième. Dans ces cas graves la saignée ne convenait qu'au début et il ne fallait pas en abuser. On la faisait suivre d'un émète-cathartique ; on donnait ensuite quelques purgatifs, des diurétiques ; on faisait boire des gargarismes détersifs, si le mal de gorge était violent, et l'on mettait des vésicatoires à la nuque. Contre la gangrène on mit du quinquina, de la serpentaire et d'un vin généreux.

L'épidémie de 1777 à Copenhague, racontée par Eiselhel, fut accompagnée de symptômes putrides et gangréneux. Au contraire celle de 1787 fut sans gravité.

Dans l'épidémie de 1800, observée à Langres par Robert, quelques sujets moururent en vingt-quatre heures après l'invasion, d'autres le troisième jour, et plusieurs à différentes époques, par suite des accidents successifs, tels que l'œdème, les dépôts aux glandes du cou, la fièvre lente, la péripneumonie latente. Le traitement n'offrit rien de particulier.

Une épidémie parut dans le comté de Caithness en Angleterre, à la fin de 1849. L'angine cornueuse, dite gangréneuse, en fut la principale complication. Le docteur Torrence employa des ablutions demi-froides sur soixante-cinq malades; on les pratiquait en plaçant le malade sur une chaise basse au milieu d'une cuve, et en lui versant sur la tête et les épaules deux gallons d'eau de mer à la fois, après quoi on l'enveloppait bien et on le mettait au lit;

l'effet de ces affusions que l'on porta rarement au delà de deux, fut l'abaissement de la fièvre, de la douleur de tête et des membres, et un sommeil paisible. On n'administrerait ce moyen que dans la chaleur fébrile et lorsqu'il n'y avait point de sueur; les épithèmes stimulants et même les résineux sur la gorge, et quelques évacuants, constitueraient presque seuls la méthode de traitement, avec les affusions et l'inhalation des vapeurs d'eau bouillante et de vinaigre. L'œdème, plus fréquent à la suite des cas légers que des cas graves, cédait facilement à quelques doses de calomel et de jalap.

Enfin une épidémie se manifesta au mois de juin 1809 dans la commune d'Entrecasteaux, près de Brignoles, département du Var; elle y dura jusqu'en septembre sans se répandre dans les pays voisins. La maladie offrit quatre variétés, savoir : 1^{re} scarlatine simple avec mal de gorge et presque sans fièvre; 2^e avec angine inflammatoire, fièvre et éruption le troisième jour; 3^e avec angine tonsillaire et ulcères blancs sans apparence de gangrène; éruption cutanée le quatrième ou le cinquième jour; 4^e avec angine ulcéreuse et fièvre typhoïde. Dans les deux premières variétés le traitement fut simple. Dans le troisième, le tartre stibié, comme vomitif, et ensuite en lavage, lavements, limonade avec la crème de tartre, ou boisson aiguisée avec le sulfate de magnésie, et même un doux laxatif, et enfin des gargarismes astringents avec l'acide sulfurique. Dans la quatrième, le traitement des fièvres adynamiques et les gargarismes avec le quinquina et l'acide sulfurique (1).

La varicelle survient dans toutes les saisons et dans tous les climats. A l'état sporadique, on en observe quelques exemples à toutes les époques de l'année. Malgré l'extension de la vaccine il ne se passe pas d'année sans qu'un certain nombre de sujets varicelleux ne soient admis dans les hôpitaux de Paris; c'est celui des Enfants malades qui

(1) V. *Revue médicale des maladies épidémiques*, par L.-A.-C. Oroni, t. III, p. 551 et suiv., 3^e 1810.

en fournit le plus de cas. Souvent aussi la variole régné épidémiquement. Le plus ordinairement elle commence au printemps, continue pendant l'été et l'automne, et disparaît pendant l'hiver.

Limitées dans leurs ravages par les bienfaits de la vaccine, ces épidémies ne sont nullement comparables à celles d'autrefois, si nombreuses et si dévastatrices, dont nos devanciers nous ont laissé les histoires. Il devient donc moins intéressant pour nous d'en reproduire un résumé comme nous l'avons fait pour la rougeole et la scarlatine, puisqu'il nous est permis d'espérer qu'en propageant de plus en plus la vaccine, on finira par rendre la variole très-rare, et cette maladie ne conservera plus guère pour le pathologiste qu'un intérêt purement historique. Nous ferons observer seulement avec Orsini « que les épidémies de variole ont toujours été plus fréquentes dans les climats chauds, un peu moins dans ceux tempérés, et plus rares au nord de l'Europe : ce qui s'explique facilement, parce que le virus variolique s'introduit plus difficilement dans le système dermique chez lequel l'inhalation est réprimée par le froid. Eric Pontopidan (*Hist. nat. de la Norvège*) dit que dans le nord de ce pays la petite vérole ne sévit que tous les 12 ou 16 ans, mais toujours avec furue. En 1740, elle fit périr à Bergen cinq cent vingt-huit enfants et jeunes gens. Inconnue dans le Groënland, elle y fut apportée en 1733 par un Groënlandais revenant du Danemark (1). »

Symptômes.

Quoiqu'il y ait dans l'ensemble de leurs symptômes et dans leur marche beaucoup d'analogies entre les diverses fièvres éruptives, il est cependant convenable, pour plus de clarté et de précision, d'en séparer la description.

Symptômes et marche de la rougeole. — La première période est celle de l'invasion. Elle s'annonce par des trou-

(1) Orsini *ibid.*, t. II, p. 411.

Mes généraux et locaux. Ainsi on observe des frissons, du malaise, l'abattement des forces, un sentiment de courbature générale, de la céphalalgie, surtout dans les régions aux-orbitaires, la perte d'appétit, un peu de soif, etc. À ces phénomènes généraux qui n'offrent encore rien de bien spécial, s'en joignent d'autres dus à des congestions sur les muqueuses supérieures, et le plus souvent assez bien caractérisés pour que leur présence puisse faire prédire presque à coup sûr l'invasion de la maladie. Ces congestions ont lieu sur la muqueuse oculaire, sur celle des fosses nasales et sur celle des bronches. La muqueuse bucco-pharyngienne est presque toujours aussi injectée, par plaques d'abord et ensuite d'une manière diffuse, mais le mal de gorge est généralement moins prononcé que le larmoiement, la rougeur des conjonctives et les éternuements. Tous ces symptômes vont en augmentant; aux frissons succède une fièvre continue, la peau devient chaude, la surface de la langue blanchit, ses bords et sa pointe rougissent, la soif est vive, des nausées et des vomissements se déclarent quelquefois; quelques malades ont l'épigastre douloureux. Les yeux deviennent de plus en plus sensibles à la lumière et enflammés, les paupières et leurs bords libres sont tuméfiés; la toux est sèche, fréquente, et offre un timbre particulier, une certaine raucité qui lui a fait donner le nom de toux *ferine*, et qui parfois offre une grande analogie avec celle du pseudo-croup; il y a enrouement et dyspnée; on entend des râles sibilants, sonores, muqueux, plus ou moins étendus. Chez un grand nombre d'enfants les symptômes cérébraux vont jusqu'à produire le délire, un assoupissement très-prononcé, ou même des convulsions.

C'est en général le quatrième ou cinquième jour que commence la seconde période, celle d'éruption ou d'élat. De petites taches rouges, distinctes les unes des autres, presque circulaires, peu proéminentes, n'ayant que quelques millimètres de largeur, se montrent à la face d'abord, puis sur le cou, la poitrine, l'abdomen et les membres. Le nombre de ces taches augmente, les plus rapprochées

se réunissent par leurs bords et produisent ainsi des taches plus grandes, mais jamais elles ne sont assez confluentes pour former des plaques d'une étendue de plus de deux ou trois centimètres; ce n'est guères qu'à la face qu'elles peuvent se confondre par leurs bords, et encore la teinte rouge générale qu'elles donnent aux joues n'est jamais aussi uniforme que celle de la scarlatine confluyente; elle a aussi une nuance un peu plus vicieuse et veineuse. L'éruption atteint son plus haut degré et s'achève dans l'espace d'un jour ou un jour et demi. La tuméfaction de la peau, très-sensible à la face et aux paupières, gêne la vision. Après deux ou trois jours la rougeur et l'enflure diminuent graduellement, d'abord à la face, puis sur le tronc et sur les membres, dans le même ordre qu'elles ont suivi à leur apparition. La plupart des phénomènes généraux et locaux propres à la période d'invasion, suivent l'éruption dans ses phases, diminuent et disparaissent peu à peu avec elle. Dans quelques cas leur disparition a lieu plus tôt; dans d'autres, au contraire, elle est plus tardive. Vers le quatrième jour de l'éruption, le septième environ de la maladie, les taches sont déjà pâles et deviennent jaunâtres; elles disparaissent, et à leur place l'épiderme tombe en desquamation forfuracée. C'est la période de déclin ou de desquamation pendant laquelle surviennent souvent des flux critiques, c'est-à-dire des sueurs, des urines abondantes et sédimenteuses, et surtout des selles diarrhéiques. Les phénomènes fébriles ont presque toujours complètement disparu à cette époque. La toux persiste encore plusieurs jours chez quelques sujets et s'accompagne d'une expectoration parfois abondante et muqueuse.

Telle est la rougeole ordinaire. Mais elle offre de nombreuses variétés, en rapport, les unes avec l'intensité du mal, d'autres avec l'irrégularité de ses phénomènes et de sa marche, les autres enfin avec les complications qui s'y ajoutent.

La rougeole peut être dite intense lorsque la fièvre est violente, que les taches sont nombreuses, d'un rouge très-

vif, et que la durée des deux premières périodes rémises dépasse sept à huit jours. La rougeole est légère dans des conditions opposées.

La rougeole est irrégulière de plusieurs manières : 1^{re} par l'absence de quelques-uns de ses éléments symptomatologiques, 2^e par des anomalies dans leur mode d'apparition et de succession, 3^e par les caractères particuliers de l'éruption. Au premier chef se rapportent les cas incontestables de rougeole sans catarrhe, de rougeole sans fièvre, et de fièvre scarlatineuse sans éruption qui se rencontrent surtout en temps d'épidémie.

La rougeole est encore irrégulière lorsque ses divers stades sont pervertis, quand, par exemple, la période d'incubation se prolonge au-delà de ses limites ; quand celle d'éruption n'a pas été convenablement préparée, quand elle est trop rapide et trop précipitée, quand elle débute par une partie du corps autre que le visage, quand elle est tardive et trop lente ; et enfin quand, au lieu de se prolonger trois à cinq jours, elle dure plus ou moins.

L'éruption n'a pas toujours les caractères que nous lui avons assignés, qui sont ceux d'un érythème disséminé dont la rougeur disparaît sous le doigt pour reparaître immédiatement. Willan a donné le nom de *rubeola nigra* à une forme insolite de la rougeole, qui a lieu aux environs du septième ou du huitième jour, lorsque l'éruption devient tout-à-coup livide avec le mélange d'une couleur jaunâtre. M. Rayer dit avoir ainsi observé cette variété qui paraît se rencontrer de préférence chez les enfants très-faibles, en proie à des maladies chroniques. Dans quelques cas de dyspnée intense due à une pneumonie coïncidente, nous avons vu l'éruption revêtir ces caractères qui nous ont alors paru résulter simplement de la stase sanguine dans les capillaires veineux de la peau, laquelle n'avait pas d'autre cause que l'affection dyspnéique.

La rougeole peut être compliquée par un grand nombre d'affections, les unes locales, c'est-à-dire cutanées, telles que la miliaire, qui cependant est rare, par des taches de

purpura, ou quelques autres éruptions qui obscurcissent les caractères de l'éruption morbillieuse; les autres sont des inflammations des muqueuses et des organes internes sur lesquelles nous insistons plus loin. C'est à leur présence qu'est due toute la gravité de la rougeole que dans ces cas-là on a coutume d'appeler maligne. Cette dénomination nous paraît mal appliquée et doit être réservée aux cas assez rares d'ailleurs, dans lesquels les phénomènes graves ne dépendent pas seulement des affections locales; mais révèlent une profonde perversion des forces, c'est-à-dire un état véritable d'ataxie.

Symptômes et marche de la scarlatine. — Cette affection se partage aussi en trois périodes.

Les phénomènes d'incubation ont généralement une marche rapide. Au bout de quelques heures seulement, après des frissons, du malaise, la fièvre est déjà très-prononcée; le pouls est fréquent et la peau très-chaude. Le malade accuse de l'abattement, du mal de tête, des douleurs continues dans le tronc et les membres, un mal de gorge ordinairement très-prononcé; la muqueuse bucco-pharyngienne rougit, la déglutition est gênée; les muqueuses de l'œil, du nez, des bronches sont en général peu affectées ou même intarctes; il y a des nausées, de l'anorexie, quelquefois des vomissements. Cette période dure rarement plus d'un jour, quelquefois même, l'éruption paraît au bout de quelques heures; dans le plus petit nombre de cas elle n'apparaît que le troisième ou le quatrième jour.

Le plus ordinairement la scarlatine se montre d'abord au cou et à la face, quelquefois c'est au tronc, aux mains ou aux pieds qu'elle débute pour s'étendre ensuite au reste du corps. Elle met ordinairement un à deux jours avant de se répandre ainsi sur toute la surface cutanée. Les taches qui la forment sont très-petites, mais tellement rapprochées qu'elles se réunissent bientôt et donnent à la peau une teinte analogue à celle duérysipèle par son uniformité. Il est rare que cette coloration ait lieu sur toute l'étendue de la peau; on la rencontre spécialement à la face, vers le pli des articulations, en haut et en dedans

des cuisses, vers les aisselles et les plis du bras. Dans d'autres points les taches sont séparées par des intervalles où la peau est pâle, et avec lesquels elles se fondent insensiblement sur leurs bords. Dans les points où l'éruption est confluyente elle est d'un rouge écarlate framboisé très-vif. Dans ceux, au contraire, où elle est discrète elle est en général moins colorée. Dans tous les cas la rougeur disparaît momentanément sous la pression du doigt. La peau est sèche, brûlante; elle se tuméfie, surtout dans les points où l'éruption est confluyente; elle est le siège d'une vive démangeaison, et d'un sentiment d'ardeur très-pénible. En même temps la langue, la bouche et la gorge, la surface interne des paupières et des narines sont injectées et d'un rouge vil. Souvent la langue est d'abord couverte d'un enduit blanchâtre qui cache sa rougeur, mais elle s'en dépouille bientôt pour se montrer avec une teinte violescente tout-à-fait caractéristique. Tous les symptômes fébriles se maintiennent dans la seconde période et suivent absolument la même marche que l'éruption, augmentent et diminuent comme elle. Le mal de gorge est souvent le symptôme dominant. Dans d'autres cas il y a des vomissements, des boquets, de la toux, des épistaxis, beaucoup d'agitation, de l'anxiété, du délire, et même des convulsions. Cette période dure rarement moins de quatre à cinq jours, et souvent elle en dure six ou huit.

Dans la troisième période la desquamation s'opère dans le même ordre que l'éruption, commençant dans les points primitivement envahis, alors que d'autres sont encore en pleine efflorescence. L'épiderme se détache sous forme de farine, de petites écailles ou de squames très-larges; souvent il forme des lambeaux très-étendus, surtout aux membres, aux doigts et aux orteils. A mesure que la desquamation succède à l'éruption dans une plus grande étendue, les troubles généraux s'apaisent, la fièvre tombe, le mal de gorge se dissipe, la soif cesse, l'appétit revient. Quelquefois une sueur abondante, un épistaxis, la diarrhée, des urines sédimenteuses coïncident avec la terminaison et paraissent agir comme de véritables crises; mais

souvent aussi ces flux manquent ou sont à peine prononcés.

La scarlatine présente des variétés analogues à celles que nous avons admises pour la rougeole. Elle varie d'abord dans son degré d'intensité. L'éruption peut être, comme nous l'avons vu, discrète ou conflamée, avoir une durée variable; la fièvre et tous les troubles généraux sont plus ou moins caractérisés.

Des irrégularités nombreuses se font aussi remarquer dans cette maladie. La première est celle dans laquelle on constate la fièvre, l'état de la gorge, et les autres troubles fonctionnels, sans aucune éruption, chez des sujets qui ont été exposés à la contagion ou à l'infection. C'est ce qu'on a appelé scarlatine ou plutôt *fièvre scarlatineuse sans exanthème*. Des faits de ce genre ont été observés par une foule d'auteurs recommandables. Il est des malades chez lesquels ce sont les autres éléments de la scarlatine qui manquent. Ainsi l'angine est quelquefois si légère qu'elle passe inaperçue; d'autres fois la fièvre et les troubles généraux sont si peu prononcés que des parents négligents laissent passer la maladie sans s'en douter. Mais plus tard l'anasarque, les parotides ou d'autres accidents révèlent la nature de l'éruption qui a pu être complètement méconnue ou prise pour quelque variété d'érythème simple.

D'autres variétés sont relatives à la forme de l'éruption. Rien n'est plus ordinaire, surtout dans les cas où l'éruption est très-active, que de voir sur le fond rouge de la peau de petits points saillants formés par des vésicules transparentes, puis opalines et blanchâtres, souvent en très-grand nombre; c'est une éruption miliaire. Quant aux papules et aux pustules que quelques auteurs disent avoir observées conjointement avec l'éruption scarlatineuse, elles nous ont paru excessivement rares.

Les variétés les plus importantes sont celles qui dépendent des complications. L'angine qui accompagne la maladie peut être assez intense et recéler des caractères assez graves pour devenir plus qu'un élément de l'affection générale; elle en est une complication et lui fait donner le nom de scarlatine angineuse. Très-souvent encore

la maladie laisse à sa suite des parotides, une hydropisie, des inflammations de tel ou tel organe. Nous reviendrons plus tard sur ces diverses complications.

Enfin il y a des scarlatines malignes, c'est-à-dire dans lesquelles les altérations des organes appréciables, soit pendant la vie, soit après la mort, ne suffisent pas pour rendre compte des accidents qu'on observe. Nous ne donnons point ce nom à la scarlatine compliquée par telle ou telle maladie.

Symptômes et marche de la variole. — Nous retrouvons dans la période d'invasion les mêmes symptômes que nous ont déjà montrés les autres fièvres éruptives, c'est-à-dire des phénomènes généraux caractérisés par des frissons, de la fièvre, une lassitude générale, un malaise de tout le corps, des douleurs dans les membres, à l'épigastre, dans le dos ou dans les lombes, de la céphalalgie, des nausées, des vomissements, de la somnolence ou de l'agitation, parfois même du délire et des convulsions; on remarque la tumescence de la face, le coryza, le larmoiement, la rougeur des yeux, un mal de gorge, de la dyspnée, de la toux, de l'enrouement, etc. Tous ces phénomènes ont quelquefois une grande intensité, et peuvent facilement faire croire à l'existence d'une maladie locale comme la méningite, la gastrite, la pneumonie, etc., jusqu'au moment où l'éruption apparaît.

Parmi ces prodromes, les troubles de l'estomac et la douleur dorso-lombaire ont, par leur fréquence et leur intensité, une assez grande valeur comme circonstances propres à faire prévoir l'éruption variolense, surtout chez des sujets qui n'ont eu antérieurement ni variole ni vaccine.

Mais il y a plusieurs autres symptômes du début, tels que le frisson, la douleur lombaire, la courbature générale, la céphalalgie, qu'il est très-difficile, impossible même de constater chez les très-jeunes enfants. Souvent les seuls symptômes appréciables sont les vomissements et la fièvre. Il en est un autre qui a une grande importance, c'est l'éclampsie. Suivant M. Trousseau, on peut estimer, autant

qu'il est permis de le faire, lorsqu'on n'a pas exactement complé, que sur six enfants en très bas-âge, pris de variole, un, peut-être, est pris de convulsions dans le premier stade de la maladie ; l'on peut considérer l'éclampsie comme un accident corrélatif à la violente céphalalgie qui, chez l'adulte, se remarque au début de la variole, et l'analogie doit faire supposer qu'elle se dissipera de même lorsque l'éruption apparaîtra. L'importance de ce prodrome épiphénoménique avait été déjà très-bien appréciée par Stoll, et vertout par Sydenham qui, en le voyant survenir chez des enfants dont la dentition était achevée, soupçonnait aussitôt l'invasion de la variole.

La durée de la première période est en général d'au moins deux jours, le plus souvent de trois ou de quatre. Enfin dans quelques cas elle est beaucoup plus longue. M. Guersent l'a vue durer de quinze à vingt jours. — Dans ce cas, dit-il, ne songeant pas à la variole parce que l'enfant portait des traces évidentes de vaccine, et voyant qu'il existait de la fièvre, de l'assoupissement et des vomissements, je crus d'abord à l'imminence d'une inflammation vers le cerveau, et j'eus recours aux antiphlogistiques. Mais les symptômes persistant, et l'idée d'une petite vérole m'étant venue enfin, j'employai quelques excitants, et je vis bientôt paraître une éruption varioleuse qui se termina d'une manière favorable (1). — On comprend de quelle obscurité le diagnostic est entouré dans ces cas extraordinaires, et les graves conséquences qu'il en peut résulter pour le traitement.

L'éruption paraît en premier lieu à la face, puis au cou, au tronc, et enfin aux membres. Cette propagation à toutes les régions du corps a ordinairement lieu dans l'espace de deux à vingt-quatre heures. L'éruption consiste en de petites taches rouges, assez nettement circonscrites, qui bientôt se convertissent en de petites éminences, caractère en général assez prononcé au bout de quelques heures pour différencier la maladie d'avec la rougeole.

(1) *Dict. de med.*, 5^e édit., t. XI, p. 331.

L'éruption est donc primitivement papuleuse. En continuant ses progrès, la papule soulève l'épiderme, et déjà une matière demi-liquide est interposée à cette membrane et au corps muqueux de la peau. Bientôt cette espèce de vésicule devient plus élevée en même temps que sa base s'élargit, elle s'acmûne, ensuite se déprime à son centre, et devient ombiliquée. Quand il a acquis tout son volume, le bouton variolique varie depuis celui d'une grosse tête d'épingle jusqu'à celui d'un pois. En général, les boutons les plus volumineux sont ceux de la poitrine et des membres. Pendant leur accroissement la peau rosigit autour d'eux, se gonfle et se tend.

Dans une seconde phase que nous rattacherons toujours à la seconde période, le bouton variolique devient une pustule; la matière en partie liquide et transparente qui soulève l'épiderme se convertit en pus. Chaque pustule représente un petit abcès sous-épidermique, mais elle en diffère en ce qu'elle a beaucoup moins de tendance à s'ouvrir au dehors, à la manière des abcès, qu'à se terminer par desiccation et résorption, comme nous le verrons bientôt en décrivant la troisième période. A mesure que cette suppuration disséminée s'opère à la surface de la peau, les portions de cette membrane qui entourent la pustule sont de plus en plus rouges, tendues, gonflées, et participent au travail inflammatoire qui s'accomplit à la surface du corps muqueux. Ce gonflement est souvent ordonné à la face et aux paupières surtout, qui ne peuvent s'ouvrir et cachent le globe de l'œil. Les pustules perdent enfin leur forme ombiliquée et deviennent exactement rondes, blanches, opaques; elles jaunissent ensuite à mesure qu'elles approchent du moment où elles vont se dessécher et se convertir en croûtes.

Les phénomènes généraux présentent une marche fort remarquable dans le cours de la période d'éruption. Ordinairement ils cessent à peu près complètement dès le premier jour de l'éruption, la fièvre disparaît, les désordres quelquefois très-graves de la période d'invasion s'évanouissent comme par enchantement, toutes les grandes foie-

riens s'accomplissent régulièrement, l'appétit même revient et l'estomac peut digérer les aliments. Dans le cas cependant où l'éruption pustuleuse s'étend aux muqueuses des yeux, du nez, de la bouche, de la gorge et du larynx, on comprend que l'inflammation de ces membranes empêche les effets de la maladie d'être uniquement concentrés à la surface de la peau. D'ailleurs ces pustules n'offrent pas les mêmes caractères que celles de la peste. La structure différente des membranes muqueuses leur ôte la forme ombiliquée et fait qu'elles s'ulcèrent de très-bonne heure; mais la surface de ces ulcérations, qui semble n'avoir détruit que l'épithélium, est couverte d'une matière comme coquecine ou puillacée, analogue à celle qu'on trouve à la surface du corps muqueux dans la pustule cutanée. Enfin, outre les symptômes ordinaires de cette inflammation des muqueuses des sens et des voies bucco-pharyngiennes, on constate souvent une salivation abondante.

Les symptômes généraux, comme nous l'avons vu, cessent aussitôt que l'éruption a commencé sur tout le corps. Lorsque le moment de la suppuration approche, on voit la fièvre se relever; un frisson plus ou moins violent en marque le début, bientôt le pouls s'accélère, se développe, la peau est chaude, et tous les autres troubles fonctionnels inséparables de l'état fébrile, ne tardent pas à se manifester. Ces éboulements généraux précèdent toujours de quelques heures au moins la transformation en pus de la matière séropuillacée contenue dans les boutons varioliques. Ils augmentent jusqu'à ce que la suppuration soit bien complétée, puis diminuent au moment où la dessiccation va avoir lieu.

Celle-ci marque la troisième période qui commence du dixième au douzième jour de la maladie. La tuméfaction de la face diminue et disparaît, pendant que les mains et les pieds sont encore gonflés, parce que l'éruption n'y est qu'à la période de suppuration. Les pustules les plus anciennes sont en effet celles qui se dessèchent les premières. Elles deviennent fauves; l'épiderme qui couvre le pus se ride et se flétrit, soit que le liquide se dessèche et occupe moins de place, soit qu'il s'échappe par exsudation

à travers l'épiderme ; d'autres fois celui-ci se déchire et laisse écouler le liquide. Dans tous les cas, le pus se concrète sur la peau comme de la cire, forme des croûtes jaunes qui se dessèchent et durcissent au contact de l'air. La plupart de ces croûtes restent adhérentes à la peau pendant quelques jours, puis se détachent d'une seule pièce, spontanément ou arrachées par les doigts du malade qu'une vive démangeaison porte à se gratter; d'autres se réduisent en fragments furfuracés et se détachent insensiblement. La chute des croûtes est ordinairement complète avant le vingtième jour, au moins chez les enfants, car chez les adultes elle se prolonge souvent jusqu'au vingt-cinquième. A leur place la peau présente des dépressions rougeâtres, qui peu à peu perdent cette couleur, mais qui ne s'effacent presque jamais complètement. Dans cette dernière période, les inflammations érythémateuses ou pustuleuses des muqueuses supérieures se terminent rapidement par résolution ou par cicatrisation. Quant aux phénomènes généraux, ils ont souvent disparu complètement, quoiqu'il reste encore des pustules en suppuration aux extrémités; à plus forte raison ils ont tout-à-fait cessé lorsque la dessiccation s'opère partout.

Les variétés de la maladie sont très-nombreuses. Parlons d'abord de celles qui résultent des caractères de l'éruption elle-même. La variole est *discrete* quand les pustules sont peu ou médiocrement nombreuses, et presque toutes séparées les unes des autres par des intervalles d'une certaine étendue. Elle est dite *confluente* quand les pustules existent en si grand nombre qu'elles se touchent presque toutes, et l'on conçoit qu'entre les degrés extrêmes de ces deux formes, il y en ait une foule d'intermédiaires. Beaucoup de varioles sont en même temps confluentes à la face et discrètes sur les membres. Dans la variole confluente, le travail pathologique est plus intense non seulement à la peau, mais aussi sur les muqueuses, et tous les symptômes généraux ont une plus grande violence. Les prodromes sont plus graves, l'éruption plus précoce, plus rapide dans sa marche, la fièvre ne tombe pas toujours au commencement de

la seconde période, et celle de suppuration est très-intense. Dans beaucoup de cas, sans qu'il existe aucune complication viscérale proprement dite, autre que les inflammations pustuleuses de la bouche et des voies pharyngo-laryngiennes, la puissance vitale paraît trop faible pour que l'éruption s'accomplisse complètement; la suppuration n'arrive pas à maturité, les pustules restent stériles, cristallines, le poids faiblit, la peau est sans chaleur, et la faiblesse amène la mort avant que la maladie soit arrivée à sa dernière phase.

Par opposition aux variolés confluentes il en existe d'autres dans lesquelles l'éruption est si discrète, c'est-à-dire composée d'un si petit nombre de papules, les symptômes généraux si peu intenses, qu'on a eu désir en faire des affections distinctes, sous les noms de *varioloïdes*, *fausses variolés*, *variolés bilardes*, *variolettes*, etc. Nous ne voyons là que des variétés d'une même affection qui ne diffère dans tous ces cas que par son intensité et non point par sa nature. Nous n'entamerons aucune discussion pour établir la consanguinité de toutes ces formes pathologiques; nous dirons seulement que nous la croyons réelle et que toutes les raisons données contre cette opinion nous paraissent faibles et peu concluantes. Nous n'admettons également aucune différence de nature entre une première et une seconde variolée, entre celle qui survient chez un sujet non vacciné et celle qui attaque une personne ayant eu une vaccine légitime, ni enfin entre une variolée spontanée et une variolée inoculée. Quant à la varicelle, maladie dans laquelle l'éruption appartient à la classe des vésicales, nous n'avons garde de la confondre avec les affections variolées dont elle se distingue par ses caractères locaux et généraux, par sa non-susceptibilité d'être transmise par l'inoculation et de se transformer alors en véritable variolée.

On a admis dans les affections variolées plusieurs variétés en rapport avec l'aspect particulier des pustules ou avec des éruptions cutanées d'une autre nature qui peuvent les accompagner. Ainsi on appelle variolée *cristalline*

celle dont les pustules , au lieu de renfermer du pus vers la fin de la seconde période , se remplissent seulement de sérosité. Ce caractère est de mauvais augure : il révèle la faiblesse de l'organisme ou du moins il annonce que le travail dont la peau est le siège n'est pas assez actif pour parfaire la suppuration. La variole est *verruqueuse* ou *cornée* lorsque les pustules se durcissent et se détachent sans se rompre. On appelle *pemphigéide* celle dont les pustules sont très-larges et ressemblent aux bulles du pemphigus ; si elles ne passent pas à l'état de suppuration , ce que nous avons dit de la forme cristalline est applicable à la forme pemphigéide ; mais si la suppuration a lieu , la terminaison peut en être aussi heureuse que dans la variole ordinaire , à cela près que la dessiccation est moins régulière. Dans quelques pustules la matière purulente rendue plus liquide par l'abondance du sérum , ne se concrète point , ramollit et rompt l'épiderme et s'écoule sans former de croûtes. On a appelé *variole sanguine* celle dont les pustules contiennent du sang ou du moins un liquide sanguinolent.

Parmi les complications de la variole nous ne ferons que mentionner ici la rougeole , la scarlatine , l'ecthyma , le purpura hemorrhagica , l'érysipèle , les furoncles , les abcès sous-cutanés. M. Guersent dit avoir vu plusieurs fois les cupules du favos se développer à la suite des pustules varioliques. De ces diverses éruptions la rougeole , la scarlatine et le purpura sont en général les plus graves. Elles impriment à la marche des symptômes une grande irrégularité non-seulement par rapport au développement de l'éruption , mais encore par rapport aux désordres fonctionnels qui s'annoncent vers les grands viscères. Il semble que les deux virus se disputent une scène trop étroite et reportent une partie de leurs effets sur les organes nobles.

Les autres complications sont : 1^o les inflammations érythémateuses ou pustuleuses des muqueuses oralo-palébrale , nasale , bucco-pharyngienne , laryngo-bronchique , ou des organes profonds , tels que l'estomac , l'intes-

tin, le poulmon, les membranes séreuses du thorax, de l'abdomen, de la tête, l'encéphale lui-même; 2° les hémorrhagies par les surfaces muqueuses; 3° les convulsions et d'autres accidents nerveux à forme ataxique ou adynamique qui constituent la forme maligne proprement dite.

Complications.

Pour qu'une maladie quelconque puisse être considérée comme une complication des fièvres éruptives, il faut: 1° qu'elle se soit développée à l'époque où l'organisme est placé sous l'influence de ces fièvres; 2° qu'elle ait par sa nature et son siège quelques rapports avec la nature et le siège de l'affection primitive. La première condition existe toutes les fois que la complication survient avant la terminaison de la période de desquamation et de dessiccation. La seconde, pour être bien comprise dans sa réalisation, exige quelques développements dans lesquels nous allons entrer sur la constitution élémentaire des fièvres exanthématisques.

Ce qui nous frappe le plus au premier abord dans ces maladies, c'est l'éruption cutanée qui n'en forme point l'essence, mais qui en est un élément secondaire important. En second lieu nous y voyons les téguments internes affectés de lésions analogues, sinon identiques, à celles dont la peau est le siège; et ce second élément est presque aussi caractéristique que le premier. Le troisième élément inséparable des fièvres éruptives est le mouvement fébrile lui-même; il précède la manifestation des deux autres, et leur est plutôt antérieur que consécutif. D'après l'ordre de filiation qu'il est permis de saisir entre les phénomènes pathologiques, la fièvre tient véritablement sous sa dépendance l'exanthème cutané et muqueux, et ne lui est subordonnée que d'une manière secondaire lorsque le travail exanthématique acquiert trop d'intensité, comme on le voit au moment de la suppuration des pustules varioliques. Enfin, en remontant aussi haut que peuvent aller

conduire l'observation et l'induction, nous trouvons dans les fièvres éruptives un élément primordial qui en forme l'essence, mais sur la nature duquel nos connaissances sont encore trop peu avancées pour le définir dans des termes précis. Nous savons que c'est une altération spéciale du sang sans pouvoir dire en quoi elle consiste; la chimie organique seule pourra nous fournir les données qui nous manquent encore. En attendant ces progrès, et en restant au point de vue rationnel de la pathologie, nous concevons l'altération du sang comme le point de départ de tous les phénomènes des fièvres éruptives. C'est elle qui suscite dans l'organisme ce mouvement général que les anciens comparaient à une fermentation, c'est-à-dire la fièvre, et que nous nous bornons à considérer comme un effort réactionnel qui prépare l'élimination du principe étranger introduit dans le liquide nourricier. Enfin cette élimination s'accomplit par un travail spécial dont les membranes tégumentaires sont le siège. Ainsi une fièvre éruptive n'est en définitive qu'un travail de dépuración qui s'accomplit dans l'organisme au moyen d'actions complexes, les unes générales comme la fièvre, les autres locales comme l'exanthème cutané et l'exanthème muqueux. Que ces actions générales ou locales soient soumises à une cause quelconque de perturbation, elles n'opèrent plus une dépuración convenable, et dès-lors, il se manifeste de nouveaux actes morbides, soit dans les organes primitivement destinés à servir d'émonctoires, soit dans ceux qui d'ordinaire restent étrangers à cet office; c'est alors que les fièvres éruptives se compliquent.

Il est facile de pressentir combien de circonstances diverses peuvent intervenir dans le développement de ces complications. Tout ce qui tient aux prédispositions, c'est-à-dire l'âge, le sexe, le tempérament, la constitution, l'idiosyncrasie, l'état antérieur de la santé, peuvent imprimer une activité insuffisante ou exagérée, soit à l'élément phlogistique général, à la fièvre, soit aux éléments phlogistiques locaux, c'est-à-dire aux exanthèmes de la peau et des muqueuses. Toutes les causes d'origine externe

sont capables de produire les mêmes effets. Toutes les fois que ces causes ne font qu'exagérer un ou plusieurs des actes pathologiques élémentaires de la fièvre éruptive, cette exagération devient une complication directe. Mais si, au contraire, elles diminuent intempestivement l'énergie de ces actes, c'est-à-dire de la fièvre et de l'éruption, la même force qui les produisait tend à en susciter de nouveaux, différents des premiers, et dès-lors irréguliers et anormaux. Ces complications naissent alors d'une manière indirecte, c'est-à-dire par suite d'une réaction secondaire de la force vitale.

Mais faut-il admettre que les complications ne reconnaissent jamais d'autres causes que celles dont il vient d'être question? Ne peuvent-elles pas résulter aussi de la lésion primordiale due à l'altération du sang? Oui, sans doute, cette altération peut exister à un degré tel que les actes dépurateurs ordinaires, c'est-à-dire la fièvre et l'éruption, deviennent insuffisants, et l'on conçoit très-bien que des modifications pathologiques puissent alors s'établir dans des organes autres que la peau et les muqueuses, alors même que le travail dont ces membranes sont le siège n'a été ni exagéré ni déplacé. Dans ce cas les complications surviennent simplement par suite d'une localisation plus vaste en rapport avec l'énergie de la cause pathogénique; elles ne sont que l'effet supplémentaire de la réaction éliminatoire, et ne réclament l'usage des moyens thérapeutiques que lorsqu'elles peuvent compromettre une fonction importante.

En résumé, toutes les complications des fièvres éruptives résultent, soit de l'exagération des lésions élémentaires qui leur sont propres, soit de la localisation du travail dépurateur dans des organes autres que les membranes tégumentaires. C'est en les rapportant à ces deux chefs que nous allons en aborder l'examen.

Les maladies que l'on peut regarder comme des complications de l'élément cutané ont peu d'importance en général. Le plus souvent elles indiquent une activité prépondérante dans le travail éruptif proprement dit qui a

plus d'avantages que d'inconvénients. Ainsi, aux taches érythémateuses de la rougeole et de la scarlatine se joignent souvent des éruptions vésiculeuses, des sudamina, la miliaire, quelquefois même des papules. Dans la variole il n'est pas très-rare de voir les pustules repaître sur un fond érysipélateux, ou bien se compliquer de quelques autres formes d'inflammation de la peau. Quelquefois les pustules crement en profondeur et pénétrant jusque dans le tissu cellulaire, on s'accompagne d'abcès sous-cutanés; dans ces deux cas la suppuration au-dessous du derme est une véritable complication, aussi bien que celle des ganglions lymphatiques des régions extérieures du corps. Enfin la mortification de la peau, les eschares sont aussi quelquefois la conséquence d'un excès de phlogose ou de l'action septique du virus exanthématique.

Une complication fort grave, qui révèle en partie ses effets sur la peau, est le purpura hémorrhagica. Cette maladie, assez rare dans la rougeole, est plus commune dans la scarlatine et dans la variole. Lorsque les taches hémorrhagiques sont peu nombreuses et ne coïncident avec aucune hémorrhagie viciérale, elles offrent peu d'importance, et n'impriment souvent à la maladie aucune tendance fâcheuse; mais lorsqu'elles sont nombreuses, accompagnées d'hémorrhagies par les voies aériennes ou digestives, elles doivent toujours faire porter un pronostic grave. Presque tous les médecins ont vu dans la coïncidence de ces accidents avec les fièvres éruptives la preuve de l'existence d'un principe malin dans ces maladies. Sydenham, au contraire, sans leur ôter néanmoins leurs caractères alarmants, les attribuait simplement à un excès d'inflammation. Cette opinion ne nous paraît nullement fondée pour la généralité des cas au moins; tout porte à croire que ces phénomènes sont dus à une viciation profonde du sang. Nous reviendrons bientôt sur cette manière de voir.

Si nous passons aux organes qui avec la peau sont le siège des lésions locales exanthématiques, nous trouverons d'abord la muqueuse oculaire. L'inflammation de cette membrane est ordinairement plus prononcée dans la rou-

grole que dans la scarlatine; érythémateuse dans ces deux maladies, elle peut s'accroître, persister malgré le déclin de l'éruption cutanée et devenir une ophthalmie catarrhale intense, purulente même, et s'accompagner des déviations les plus graves vers la corne. Dans la variole il se joint ordinairement à l'érythème de la conjonctive, des pustules qui offrent peu de dangers si elles n'affectent que les paupières, mais qui peuvent siéger sur la cornée, y produire des ulcérations, des taies et autres accidents plus graves encore, surtout dans les variolées confluentes.

Le coryza de la rougeole devient rarement la source d'une complication importante; il en est de même dans la scarlatine. Cependant quelquefois, surtout dans cette dernière maladie, il a une grande intensité, s'accompagne d'une sécrétion couenneuse et mérite une attention spéciale. Dans la variole l'orifice des fosses nasales est souvent couvert de pustules qui peuvent même siéger sur toute la muqueuse pituitaire. Le gonflement de cette membrane rétrécit singulièrement le passage de l'air, gêne la respiration; l'inflammation par son intensité peut mener la désquamation de quelques points des parois de la cavité nasale, d'où résultent des caries et des nécroses consécutives.

L'inflammation bucco-pharyngienne qui existe dans toutes les fièvres éruptives est souvent la source de complications plus ou moins graves. Ordinairement érythémateuse, mais quelquefois pseudo-membraneuse dans la rougeole et dans la scarlatine, elle est pustuleuse dans la variole. Sous la forme érythémateuse elle ne devient grave que lorsqu'elle est très-intense, qu'elle rend la déglutition douloureuse, difficile, et parait entretenir ou augmenter l'état fébrile. La muqueuse des parois buccales, de la langue et de la gorge est alors remarquable par sa rougeur vive, sa sécheresse, l'érection des papilles, le gonflement des tonsilles, qui peut aller jusqu'à oblitérer presque complètement l'isthme du gosier. L'inflammation s'étend au tissu cellulaire et aux ganglions lymphatiques du voisinage; des abcès peuvent en être la conséquence. La terminaison de cette inflammation bucco-pharyngienne est variable; tan-

tôt elle a lieu par résolution, d'autres fois par des abcès cervicaux et sous-maxillaires, quelquefois enfin par l'ulcération et la gangrène. Nous avons fait l'histoire de ce dernier mode de terminaison en traitant de la stomatite ulcéreuse et gangréneuse; nous n'y reviendrons point ici.

C'est dans la scarlatine que l'inflammation des voies bucco-pharyngiennes a le plus de tendance à devenir costueuse; c'est alors qu'elle prend le nom d'angine de Fothergill, dont nous avons décrit ailleurs les caractères. Cette angine est toujours grave par elle-même, et la coïncidence d'un coryza pseudo-membraneux la rend encore plus fâcheuse. Nous avons vu dans un cas de ce genre l'asphyxie résulter de la gêne apportée au passage de l'air par le gonflement des amygdales d'une part, et par le rétrécissement des fosses nasales de l'autre. C'est aussi dans la scarlatine qu'on observe assez souvent des parotides.

Dans la variole les pustules qui naissent à l'intérieur de la bouche et de la gorge occasionnent toujours de vives souffrances et de la gêne dans la déglutition. Accompagnées d'un excès d'inflammation, elles peuvent avoir les mêmes suites que les autres formes de stomatite et d'angine que nous venons d'indiquer. Il s'y joint aussi, mais moins souvent chez les enfants que chez les adultes, une surexcitation des glandes salivaires qui sécrètent une salive abondante. Cette salivation se présente même dans quelques cas où la muqueuse bucco-pharyngienne est exempte de pustules et de toute phlogose.

L'inflammation de la muqueuse aérienne existe, comme nous le savons, à un certain degré dans toutes les fièvres éruptives, surtout dans la rougeole, dont elle est pour ainsi dire un élément prépondérant. Elle prend le caractère de complication lorsqu'elle occupe une grande étendue de l'arbre aérière, lorsqu'elle a une intensité considérable, et enfin lorsqu'elle survit à la période de l'éruption. Elle peut être simplement catarrhale, c'est-à-dire occuper spécialement les follicules muqueux, et tendre, comme tous les catarrhes en général, à laisser dominer la lésion de sécrétion, à mesure que la phlogose proprement dite dimi-

me et s'éteint. C'est dans la rougeole qu'elle garde le plus ordinairement ces caractères. Dans la scarlatine elle a plus de tendance à rester sèche, elle semble occuper le tissu muqueux en entier, et non principalement ses glandes mucipères. D'ailleurs, dans ces deux maladies, elle peut accidentellement, par l'effet d'une constitution épidémique spéciale ou plutôt par suite de sa violence seule, devenir pseudo-membraneuse. Elle a une autre tendance non moins fâcheuse, c'est de se propager facilement de proche en proche jusqu'aux dernières ramifications bronchiques, et de déterminer alors tous les accidents propres aux bronchites capillaires. Elle est en général d'autant plus grave sous ces divers rapports qu'elle se développe à une époque plus rapprochée de la fièvre éruptive. Lorsque celle-ci a parcouru convenablement ses deux premières périodes, et que la complication survient dans le cours et non au commencement de la desquamation, elle est d'ordinaire plus lente dans son développement. L'inflammation des voies aériennes qui accompagne la variole doit ordinairement sa gravité à la présence de pustules plus ou moins nombreuses dans le larynx et la trachée, qui deviennent rapidement autant d'ulcérations et entraînent toutes les suites des laryngites graves, c'est-à-dire des douleurs et des angoisses très-vives, l'aphonie, la toux, la gêne de la respiration, et des symptômes analogues jusqu'à un certain point à ceux du croup.

Des bronches, l'inflammation gagne souvent le poulmon. Dans la rougeole, la pneumonie affecte presque constamment la forme lobulaire, parce que la bronchite qui la précède présente toutes les conditions qui favorisent sa propagation aux lobules, d'abord d'une manière disséminée. Dans la scarlatine et la variole, où la pneumonie est d'ailleurs plus rare, la phlogose des bronches, moins essentiellement catarrhale, se transmet plus facilement en masse à une certaine étendue du poulmon; ou du moins si, restant sous le poulmon, elle se rapproche encore beaucoup par son mode de développement de la pneumonie lobulaire, elle en perd plus rapidement l'aspect, se généralise

promptement et prend cette forme que nous avons appelée ailleurs pseudo-lobaire. Nous ne reviendrons point ici sur l'enchaînement de toutes ces circonstances ; nous l'avons longuement exposé dans une autre partie de cet ouvrage , et nous en avons déduit toutes les conséquences utiles.

Les complications qui surviennent vers les organes digestifs , se rattachent aussi à la lésion élémentaire que les fièvres éruptives déterminent en se localisant dans la muqueuse gastro-intestinale. Cette lésion s'annonce dans les cas simples par tous les symptômes propres aux hyperémies du tube alimentaire, savoir, l'anorexie, la soif, quelques vomissements, une douleur abdominale peu intense, un peu de météorisme et la diarrhée. Lorsqu'elle s'exagère, elle engendre des états morbides analogues à ceux que nous avons indiqués dans les muqueuses des yeux, du nez, de la bouche, de la gorge et des conduits aériens. Ainsi ce sont tantôt de véritables gastrites ou entérites, sans aucun caractère spécifique; tantôt ces inflammations s'accompagnent de productions coqueuses, ou se terminent par la gangrène. Dans la rougeole l'inflammation agit de préférence sur le gros intestin, elle y affecte presque exclusivement la forme catarrhale et se rapproche beaucoup plus des lésions de sécrétion, sur lesquelles nous avons tant insisté en traitant des diacries, que des phlegmones franches. Ce catarrhe du gros intestin se montre à toutes les époques de la maladie. Il peut, à la rigueur, n'être point considéré comme une complication tant qu'il est d'une intensité médiocre. A plus forte raison, lorsqu'il survient pendant la desquamation, sans symptômes d'inflammation violente, s'il tend à diminuer et à disparaître spontanément après une courte durée, on doit le regarder comme avantageux, car il joue alors le rôle d'une véritable crise, c'est-à-dire qu'il contribue pour sa part à accomplir le travail dépuratoire auquel les autres organes n'ont pu suffire.

Le catarrhe intestinal critique se rencontre également, mais moins souvent peut-être, dans la scarlatine, quoique dans cette maladie l'inflammation ait souvent pour siège l'intestin grêle, et spécialement l'appareil des

folliculaires agminés. Cette phlogose des plaques de Peyer, bien qu'elle rappelle au premier abord celle qui caractérise la fièvre typhoïde, présente généralement quelques différences au point de vue anatomique; elle s'en distingue par l'absence de la matière sous-muqueuse qui constitue les plaques dures, par la coloration vive, le gonflement considérable, qui indiquent une phlogose plus intense que celle qui d'ordinaire a lieu dans la dothiéntérie; par sa tendance moindre à l'ulcération. Quant aux symptômes, ce sont d'abord ceux d'une entérite grave, et ensuite des troubles généraux qui rappellent ceux de la dothiéntérie véritable, mais qui dépendent sans doute moins de la lésion locale de l'intestin, que de la maladie générale elle-même.

Enfin dans la varioloïde, la muqueuse gastrique est assez souvent le siège principal de la phlogose. La soif vive, les vomissements, la douleur épigastrique en sont les symptômes principaux. La diarrhée est fréquente chez les enfants, et beaucoup moins grave en général chez eux que chez les adultes, qui de leur côté sont plus souvent affectés de salivation.

En général, dans tous les cas d'inflammation violente et profonde de l'estomac ou de l'intestin, la muqueuse buccopharyngienne présente également des signes de phlogose, ou du moins cette rougeur, cette sécheresse, qui, à la langue, désignent assez fidèlement l'état des autres portions du tube digestif.

Les fièvres éruptives portent toujours une partie de leur action sur la muqueuse génito-urinaire, mais cet effet est en général si léger qu'il passe inaperçu. Dans la période d'invasion et d'éruption, la muqueuse du gland, du prépuce, de la valve, présente un état d'hyperémie et quelques lambeaux d'une concrétion blanchâtre, analogue à du blanc d'œuf coagulé, qui paraît due à la coagulation du mucus, comme celle qu'on trouve dans la bouche autour du collet des dents. Cela se rencontre spécialement dans la rougeole. Dans ces conditions, la phlogose s'étend probablement aux parties internes de la muqueuse génito-urinaire, mais n'est point une complication. Il ar-

rière quelquefois qu'elle prend un caractère tout-à-fait catarrhal, ainsi que nous l'avons dit à propos de la leucorrhée des petites filles. Mais elle devient un accident beaucoup plus grave lorsqu'elle détermine les ulcérations ou même la gangrène de la vulve, comme on en connaît quelques exemples.

Outre les inflammations de diverse nature dont les muqueuses deviennent le siège sous l'influence des fièvres éruptives, on voit dans quelques cas ces membranes fournir des hémorrhagies plus ou moins graves qui coïncident presque toujours avec des taches pourprées à la peau, c'est alors à un purpura grave qu'on a affaire, c'est-à-dire à une diathèse hémorrhagique due à la même cause qui a produit la fièvre éruptive. Les vaisseaux capillaires incomplètement excités par l'abord d'un sang profondément vicié dans sa composition, perdent leur tonicité, et laissent transsuder à travers leurs parois le liquide qui les traverse. Alors celui-ci s'épanche à la surface des muqueuses, s'infiltre dans leur épaisseur, dans celle de la peau, dans le tissu cellulaire et dans le parenchyme des divers organes. C'est là une des complications les plus graves qui puissent s'ajouter aux fièvres éruptives. Le danger immédiat consiste sans doute dans l'hémorrhagie elle-même, qui peut être funeste par son abondance; mais le plus ordinairement la mort arrive moins par le fait des hémorrhagies, que par suite de l'état ataxique et des symptômes de malignité proprement dite, qui paraissent liés à l'altération profonde du sang. Souvent, chez les sujets qui succombent, on ne trouve pas des lésions locales suffisantes pour rendre compte de la mort. Il est vrai que dans d'autres circonstances elle s'explique par des hémorrhagies interstitielles que l'on retrouve dans les tuniques de l'estomac, dans le poumon ou dans les centres nerveux, et qui ont nécessairement porté une atteinte grave aux fonctions de ces organes essentiels à la vie. C'est la muqueuse pituitaire qui est le siège le plus fréquent de ces hémorrhagies, puis la tunique interne de l'estomac et de l'intestin; les hémoptysies et les hématuries sont plus rares.

Les membranes tégumentaires ne sont pas le siège de toutes les complications susceptibles de se développer sous l'influence des fièvres éruptives. Nous avons admis que dans ces maladies l'effort dépurateur de l'organisme peut se fixer sur un organe quelconque, et y engendrer un travail pathologique. C'est ainsi qu'on observe des hydropisies externes et internes, des inflammations de tissu cellulaire, des membranes séreuses et synoviales, des muscles, du tissu fibreux, du péricoste et du tissu osseux lui-même, aussi bien que des différents organes contenus dans le crâne, le thorax et l'abdomen. Toutefois la plupart de ces maladies sont plus rares que celles qui se rattachent aux lésions exanthématisques élémentaires.

Enfin, un mauvais état dynamique, c'est-à-dire l'adynamie et l'astaxie, peuvent être regardées comme une véritable complication des fièvres éruptives. C'est ici le lieu de s'élever contre l'abus que les anciens ont fait du mot de malignité dans ces maladies. La malignité proprement dite n'existe point par cela seul que la marche de l'éruption est entravée et rendue désordonnée par une complication locale, telle qu'une phlogose viscérale; ici les effets sont en rapport avec une cause parfaitement connue. Mais lorsque l'absence de toute lésion anatomique appréciable vers les viscéres, ou bien lorsque le peu d'importance de cette lésion ne rend pas compte des désordres fonctionnels qu'on observe, lorsque ces désordres indiquent une atteinte profonde portée au système général des forces et à l'innervation, on peut alors donner à la maladie le nom de maligne, c'est-à-dire lui reconnaître un génie particulier auquel se subordonnent tous les phénomènes. D'ailleurs, cette influence maligne s'étend à un bon nombre de cas dans lesquels il existe des lésions locales, et rend mieux compte que celles-ci de ces horripilations, de ces anxiétés précordiales, de ces angoisses, de ces accidents névralgiques ou convulsifs, de ce lombago, etc., qui se présentent au début et dans le cours des fièvres éruptives.

Si nous cherchons maintenant à grouper les nombreuses complications dont nous venons de parcourir le cercle, au-

tour de chacune des fièvres éruptives, nous verrons qu'à la rougeole appartiennent spécialement des affections catarrhales des yeux, du nez, du gros intestin, des bronches, et l'inflammation lobulaire du poumon; à la scarlatine, des phlegmasies muqueuses remarquables par leur intensité ou leur forme couenneuse, siégeant spécialement sur les muqueuses du nez, de la gorge et de l'intestin grêle; c'est encore à la scarlatine qu'appartiennent de préférence les parotides et les hydropisies consécutives. Quant à la variole, les abcès sous-cutanés, les inflammations pustuleuses des yeux, du nez, de la bouche, de la gorge, du larynx, de la trachée, une salivation abondante, la gastrite et la gastro-entérite, les hémorrhagies interstitielles de la peau et des autres organes, celles par exhalation des tumeurs muqueuses, voilà les accidents dont elle tend à se compliquer plus souvent que la rougeole et la scarlatine. Les états ataxique et adynamique peuvent se rencontrer dans toutes ces maladies.

Diagnostic.

Le diagnostic des fièvres éruptives offre plus d'une fois de véritables difficultés. Dans leur première période le problème consiste : 1^o à distinguer si l'on a affaire à une fièvre éruptive ou à toute autre affection aiguë; 2^o à déterminer si cette fièvre sera la rougeole, la scarlatine, ou la variole. Dans la plupart des cas il est possible, sinon d'acquiescer une certitude, au moins de réunir un grand nombre de probabilités propres à résoudre ces questions.

Le médecin appelé auprès d'un enfant en proie depuis peu de temps aux symptômes locaux et généraux d'une maladie aiguë, ne doit jamais omettre de s'informer si cet enfant a déjà eu la rougeole, la scarlatine, la variole ou la vaccine. L'existence antérieure de ces maladies est déjà une forte présomption contre une récursive, bien que celle-ci s'observe quelquefois.

Le second point sur lequel il faut porter son attention est de voir jusqu'à quel point les symptômes locaux

constituent une maladie capable de développer la fièvre ordinairement intense qu'on observe. Si l'état local seul s'explique pas l'état général, il est probable que celui-ci est primitif, et il faut s'attendre à le voir se démasquer par un travail de localisation sur la surface de la peau.

Enfin la nature même des symptômes locaux de la période d'évasion fournit en général des indices peu trompeurs. Ainsi la prédominance d'un état catarrhal vers les conjonctives, la pituitaire et la muqueuse bronchique, caractérisé par la rougeur, le larmoiement, les éternuements, la toux sèche, l'enrouement, etc., la coïncidence d'un catarrhe moins prononcé vers la muqueuse laryngo-pharyngienne, le dévoiement et un dérangement général, mais d'ordinaire peu violent, des fonctions digestives; toutes ces circonstances réunies, disons-nous, doivent faire prévoir la rougeole. Lorsqu'il se passe plus de trois ou quatre jours sans que l'éruption paraisse, il est permis de croire qu'on a affaire à une fièvre catarrhale ordinaire. Dans la première période de la scarlatine les phénomènes de catarrhe sont en général moins prononcés, mais l'inflammation de la gorge est plus intense, et d'ailleurs la durée de cette période n'étant que d'un à deux jours, l'éruption ne permet pas de rester bien longtemps dans le doute. Dans la variole ce sont les vomissements et la douleur lombaire qui paraissent avoir le plus de valeur; mais il faut toujours les supposer réunis à la fièvre et aux autres désordres qui ont lieu vers les muqueuses de l'œil, du nez, de la bouche, de la gorge et même des bronches. Dans cette maladie la première période s'accompagne encore assez souvent de convulsions ou d'autres accidents nerveux qui se rencontrent plus rarement dans la rougeole et dans la scarlatine. Cet épiphénomène accompagne aussi quelquefois le début d'une phlegmasie aiguë quelconque, de la pneumonie, par exemple; mais ce qui au début des fièvres éruptives lui conserve sa valeur au point de vue du diagnostic, c'est qu'il est sous la dépendance de l'état fébrile et ne s'allie à aucune affection locale assez grave pour en expliquer le développement.

Dans la seconde période le diagnostic est rarement obscur. Cependant les caractères de l'éruption ne sont pas toujours tellement tranchés qu'il ne faille une certaine habitude pour les distinguer. Voici dans quelles circonstances ces difficultés se rencontrent. La rougeole peut être confondue avec la scarlatine et avec l'éruption varioleuse dans les premières heures de son apparition. Quant à la scarlatine et à la variole, elles ne nous paraissent pas susceptibles d'être prises l'une pour l'autre; car les taches de la première ne font aucune saillie appréciable, tandis que celles de la variole sont prédominantes dès le début.

Le caractère de la prédominance n'est pas constant dans la rougeole, et c'est seulement lorsqu'il manque qu'on peut la confondre avec la scarlatine; mais il faut encore pour cela que la scarlatine soit discrète, car celle qui est manifestement confluyente ne simule point la rougeole dont les taches sont toujours discrètes. Il n'y a donc de méprise possible qu'entre une rougeole non prédominante et une scarlatine discrète. M. Starber, de Strasbourg, a donné le nom de scarlatine rubéoleuse à une variété de la scarlatine qui effectivement n'est pas sans ressemblance avec la rougeole. Nous sommes persuadé comme lui qu'elle donne lieu à de fréquentes méprises, et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire la description qu'il a donnée de cette maladie.

« La scarlatine rubéoleuse, dit-il, est caractérisée par une éruption de taches rosées, larges de deux à dix millimètres, irrégulières, séparées par des intervalles de couleur naturelle. Ces taches se manifestent surtout au tronc et aux membres, mais moins abondamment à la face. Elles sont plus larges et plus pâles que celles de la rougeole, n'en ont pas la forme, et d'ordinaire ne sont pas prédominantes au-dessus du niveau de la peau; dans quelques épidémies cependant, on a vu ces taches recouvertes chacune d'une ou plusieurs vésicules, non cristallines et plus petites que les sudamina. Les taches persistent pendant trois à cinq jours et sont suivies d'une desquamation en partie furfuracée, en partie lamelleuse; l'épiderme

s'élève par lambeaux assez larges, surtout aux mains. L'éruption est précédée pendant quelques heures ou un à deux jours, d'une fièvre ordinairement légère, quelquefois cependant très-vive, et qui persiste durant les premiers jours de l'éruption. En outre, la maladie est accompagnée d'une angine peu intense, assez légère quelquefois pour que les enfants ne s'en plaignent pas; lorsqu'on examine l'arrière-bouche on y trouve de la rougeur et souvent une légère tuméfaction des amygdales. La langue est blanchâtre, pointillée de rouge. La maladie suit en général une marche bénigne, et les enfants sont quelquefois difficilement réveillés dans leur lit. Mais fréquemment il se développe pendant la convalescence, ou même durant la maladie, une anasarque et surtout des parotides qui peuvent devenir très-graves (1).

Suivant M. Stœber, la scarlatine rubéoleuse a été confondue avec la roséole par les dermatologues français, tandis que les Allemands la décrivent sous le nom de *rubella*, *rubéole* (terme qu'il faut se garder de traduire par rougeole, que les Allemands nomment *maum*, *maubell*). Ces derniers auteurs sont cependant loin d'être d'accord sur la nature de cet exanthème. Wichmann le considère comme une variété de la rougeole; Marcin, Haselund, Horn, Jahn prétendent que c'est une espèce de scarlatine; Hildebrand soutient que la rubéole est le produit de la scarlatine et de la rougeole réunies; pour Kreyzig et Wagner enfin elle est une maladie exanthématique spéciale.

Nous partageons complètement l'opinion de M. Stœber, que cet exanthème n'est qu'une variété de la scarlatine; car nous avons remarqué comme lui que les deux maladies règnent en même temps; que la variété existe quelquefois sur une région du corps en même temps que d'autres parties sont affectées de scarlatine pure et confluyente, caractère important pour le diagnostic; qu'elle s'accompagne d'angine, est suivie de parotides et d'hydropisie aiguë, et enfin paraît pouvoir se transmettre d'un individu à un

(1) *Le Clinique des maladies des enfants* de la Faculté de Strasbourg, p. 16, in-8, 1851.

autre et produire chez les uns cette même éruption, chez d'autres, au contraire, la scarlatine ordinaire.

Nous savons que les taches de la rougeole sont le plus souvent un peu élevées au-dessus du niveau de la peau. Dans quelques cas cette proéminence est très-marquée, et la rougeole, qui alors mériterait le nom de boutonneuse, peut faire croire à l'éruption commençante d'une variole. Cette méprise ne peut durer que quelques heures, car, même avant le second jour, les vésicules plates qui plus tard deviendront des pustules varioliques, sont très-distinctes, et quelquefois la forme ombiliquée est déjà sensible sur un petit nombre d'entre elles. Enfin, en tenant compte des symptômes observés pendant la période d'invasion, le diagnostic différentiel peut être établi sur de très-grandes probabilités.

Nous avons dit que nous n'admettions aucune différence essentielle entre la variole et la varioloïde, et que celle-ci n'était pour nous qu'une variole discrète ordinairement affaiblie par le développement antérieur de la variole ou de la vaccine. La varicelle, au contraire, bien qu'elle se rapproche encore sous beaucoup de rapports des affections varioleuses, puisqu'elle est aussi contagieuse et n'atteint, en général, un sujet qu'une fois dans sa vie, en diffère notablement par sa marche. Ainsi la fièvre qui précède l'éruption est beaucoup plus courte, ne dure qu'un jour et même moins ; l'éruption des boutons est irrégulière. Dans la variole, ils paraissent tous dès le premier jour, en sorte qu'ils ne seront plus tard ni plus ni moins nombreux qu'au début de l'éruption. Dans la varicelle, au contraire, l'éruption est successive et peut durer plusieurs jours, en sorte qu'à côté de boutons datant de trois ou quatre jours et déjà en suppuration, on en voit d'autres naissants. Ensuite chaque bouton arrive plus rapidement à suppuration et à dessiccation. D'ailleurs dans la varicelle il y a souvent quelques pustules parfaitement ombiliquées, mais le plus grand nombre ne le sont point. Enfin les deux maladies diffèrent en ce que la varicelle atteint les enfants vaccinés et ceux qui ont eu la variole, aussi aisément que

les autres; il n'en est pas de même des affections varioleuses proprement dites.

Le cas où le diagnostic offre le plus de difficultés est celui où manque l'un des trois éléments qui caractérisent les fièvres éruptives régulières. On sait en effet qu'il existe des fièvres morbillieuses, scarlatineuses, variolieuses, sans éruption cutanée. On ne peut alors admettre l'existence de ces maladies qu'autant que les sujets ont été évidemment soumis à l'infection ou à la contagion, que l'exanthème muqueux et l'état fébrile suivent la marche et ont les caractères ordinaires de cette classe d'affections. Des faits de ce genre constatés par beaucoup d'auteurs ont été mis hors de doute par des observations récentes (1), et nous-même croyons avoir observé dans l'hiver de 1842 un cas d'angine scarlatineuse sans éruption, chez un père de famille dont les deux enfants étaient atteints depuis plusieurs jours de la scarlatine ordinaire. Il y a deux variétés à admettre dans les fièvres éruptives sans exanthème cutané, l'une dans laquelle on observe une desquamation épidermique, bien qu'il n'y ait eu aucune éruption antérieure, et l'autre dans laquelle tout manque, éruption et desquamation.

Dans un second ordre de faits, c'est l'exanthème muqueux qui fait défaut ou qui est très-peu prononcé; ainsi il y a des rougeoles sans catarrhe, des scarlatines sans angine. C'est alors en se guidant sur la marche et les caractères des autres éléments, c'est-à-dire de l'éruption cutanée et de la fièvre, aussi bien que sur les circonstances étiologiques qui entourent le malade, que l'on arrivera à formuler le diagnostic.

Enfin il est des affections éruptives qui entraînent avec elles si peu de troubles du côté de la circulation et des grandes fonctions qu'on est tenté de croire à l'absence de l'élément fébrile. Cette absence nous paraît devoir être rarement complète, mais nous sommes persuadé que le dé-

(1) Voir la thèse de M. Tiquia, reproduite dans le *Sémin. des Consc. méd.*, vol. 10, octobre 1839, p. 387.

rangement général de la santé est plus d'une fois très-léger, et si par malheur dans ce cas l'éruption est elle-même peu prononcée, elle passe inaperçue, et la nature de la maladie reste inconnue. Nous avons déjà rencontré plusieurs faits de cette espèce, et en face de certaines pneumonies lobulaires, de quelques hydrophésies aiguës, etc., nous avons eu plus d'une fois de fortes présomptions sur l'existence antérieure d'une rougeole ou d'une scarlatine chez des enfants que leurs parents n'avaient cru atteints dans le principe que d'une indisposition légère.

Telles sont les principales difficultés que présente le diagnostic des fièvres éruptives à l'état simple. Quand il existe des complications on comprend que l'étude du diagnostic doit s'étendre à chacune des maladies qui viennent s'ajouter à l'affection primitive. C'est un sujet sur lequel ce n'est point ici le moment d'insister.

Pronostic.

Lorsqu'on embrasse toutes les variétés des fièvres éruptives, il est difficile de formuler leur pronostic d'une manière générale, et, pour l'établir en particulier dans chacune de ces variétés, il faudrait descendre à des détails que nous sommes forcé de nous interdire. D'ailleurs, il n'est point de maladies qui soient plus susceptibles d'être modifiées dans leur marche et leur terminaison par des circonstances imprévues et souvent inappréciables. La rougeole la plus simple et la plus régulière peut tout-à-coup, au moindre contretemps atmosphérique, se compliquer d'une pneumonie grave. Telle épidémie est sans gravité, telle autre sévit avec rigueur sur les populations. Telle série de faits observés au printemps, ne sera en rien confirmée par une autre série de faits rassemblés dans l'automne de la même année. Enfin, parmi les enfants de la même famille, soumis au même régime, jouissant d'une bonne santé antérieure, entourés des mêmes soins, l'un aura une fièvre éruptive simple, normale; chez l'autre elle sera irrégulière, anormale dans sa marche; chez

l'autre enfin, compliquée d'accidents graves. En un mot, le médecin ne possède le plus souvent aucunes données sur lesquelles il puisse baser son pronostic et prévoir la terminaison de la maladie.

Toutefois on peut affirmer qu'une fièvre éruptive, tant qu'elle est simple, n'offre aucun danger. La varielle seule n'en est pas exempte lorsque l'éruption est confluentes. Dans ce cas, sans aucune complication vicérale, la suppuration devant se faire sur une très-grande étendue, peut épuiser les forces du malade et le faire succomber. Aussi le traitement peut et doit dans cette occasion avoir pour but de diminuer l'énergie du travail inflammatoire et suppuratif dont la peau est le siège.

Nous avons quelles sont les complications les plus à craindre dans chacune des fièvres éruptives que nous avons étudiées. Elles sont d'autant plus graves, qu'elles compromettent des organes dont l'intégrité est plus nécessaire à la vie. Ainsi les pneumonies et les laryngites d'apparence crepale, les angines très-intenses, surtout celles de nature pseudo-membraneuse, les phlegmasies intenses des muqueuses profondes, les gangrènes de la bouche, de la gorge, de la vulve, les hydropisies et les inflammations des membranes séreuses, les hémorrhagies des voies digestives, respiratoires, urinaires, jointes au purpura, enfin les accidents cérébraux de nature nerveuse ou inflammatoire, l'état ataxique, sont autant de complications qui rendent le pronostic toujours sérieux, et parfois très-grave. Toutes les maladies que nous venons d'énumérer ont d'abord la gravité qu'on leur connaît dans les circonstances ordinaires, c'est-à-dire quand elles sont franches, primitives, indépendantes d'un agent spécifique; mais ici leur nature particulière leur imprime une tendance plus forte encore vers une terminaison funeste.

Parmi les résultats fâcheux des fièvres éruptives, et outre les maladies dont le développement, ayant lieu dans le cours même de ces fièvres, en constitue les complications immédiates, il ne faut pas omettre l'influence qu'elles exercent sur les affections tuberculeuses et scrophuleuses.

Nous nous sommes assez étendu ailleurs sur les différentes manières de concevoir cette influence pour n'y pas revenir ici; nous reproduirons seulement les conclusions auxquelles cette étude nous a conduit, savoir : 1^o que les fièvres éruptives augmentent la prédisposition tuberculeuse, lorsqu'elle existe, soit en affaiblissant l'organisme, soit en altérant les humeurs; 2^o qu'elles favorisent et hâtent l'explosion de la cachexie chez les sujets qui en sont atteints encore à un faible degré; 3^o qu'enfin, dans des cas rares et exceptionnels, elles paraissent susceptibles de faire naître la cachexie tuberculeuse chez des sujets exempts de prédisposition.

Traitement.

Le traitement des fièvres éruptives est susceptible d'un grand nombre de modifications, que nous allons nous efforcer de ramener à quelques principes généraux et aux mêmes divisions que nous avons suivies dans la description des symptômes et des complications de ces maladies. Ainsi nous parlerons successivement du traitement qui convient : 1^o dans les fièvres éruptives normales, c'est-à-dire dans celles que nous avons prises pour types de notre description; 2^o dans les différentes variétés de ces maladies.

Les cas de la première catégorie n'exigent en général aucune médication active, mais une simple expectation, c'est-à-dire la diète, les boissons mucilagineuses et tous les autres moyens simples employés dans les maladies aiguës légères. Le séjour au lit est indispensable; le malade doit être tenu chaudement, mais non surchargé de couvertures; l'air extérieur doit avoir une chaleur douce et être renouvelé avec toutes les précautions nécessaires pour prévenir le refroidissement. On rend les boissons légèrement diaphorétiques, en les donnant chaudes ou en remplaçant les tisanes simplement mucilagineuses par les infusions de bourrache, de tilleul, de saureau, etc. Les boissons acides, les limonades sont généralement proscrites. Ces moyens ont pour principal but d'entretenir l'éruption

culanée. Si l'on croit devoir agir un peu plus énergiquement dans le même sens, on promène sur les membres des topiques faiblement irritants, tels que la farine de monarde mêlée avec celle de graines de lin; on peut aussi envelopper les pieds et les jambes dans du coton cardé et de la toile cirée.

Les inflammations légères de l'œil, du nez, de la gorge, ne réclament que des collyres, des injections ou fustigations, et des gargarismes mucilagineux; le plus souvent même on ne les met point en usage, la souffrance qui résulte de ces inflammations étant supportée sans trop de peine par la plupart des malades. Dans la rougeole où la photophobie est ordinairement très-grande, on se borne à préserver les yeux du contact d'une lumière vive. Quand la toux est intense et très-fatigante, on peut essayer de la diminuer en donnant les préparations de laitue ou même les opiacés, mais, avant de le faire, il faut être bien sûr que la toux a un caractère nerveux et ne résulte pas d'un état catarrhal prépondérant; il faut aussi que la fièvre soit modérée et le cerveau exempt de toute congestion. Sans ces conditions, les narcotiques ont toujours des inconvénients, aussi vaut-il mieux s'en passer ou attendre la fin de la seconde période pour les prescrire. On donne en attendant des potions gommeuses et héchiques. S'il y a de la constipation on tient le ventre libre à l'aide des lavements émollients.

Pendant tout le cours de la maladie, les plus grandes précautions sont nécessaires pour mettre l'enfant à l'abri du froid et prévenir les répercussions qu'il pourrait amener. On doit les continuer longtemps encore après la disparition de l'éruption; car la desquamation dure fort longtemps et, jusqu'à ce qu'elle soit achevée, l'action de l'air extérieur peut être nuisible. Dès que les enfants ne gardent plus le lit, on doit les couvrir de flanelle, même dans les saisons chaudes, leur faire garder la chambre encore quinze ou vingt jours au moins, lors même que leur santé paraît parfaite, et favoriser l'achèvement de la rénovation épidermique par des frictions stimulantes.

sèches, aromatiques ou spiritueuses, pratiquées soir et matin sur toute la surface du corps. Vers la fin de la seconde période on permet aux enfants un peu de lait ou de bouillon coupé, et quand la fièvre est complètement tombée, on leur rend graduellement des aliments, d'abord doux et légers, ensuite plus nourrissants.

Nous pensons que le rôle du médecin doit se borner aux soins que nous venons d'indiquer, toutes les fois que la marche de la maladie est telle que le travail de dépuración qui la constitue s'accomplit régulièrement, sans entraves, dans certaines limites d'intensité, et tend évidemment de lui-même vers une terminaison heureuse. Mais si le médecin doit agir peu, il faut qu'il observe avec attention, qu'il se tienne sans cesse en garde contre les changements inattendus qui peuvent survenir dans la marche du mal, contre les accidents qui peuvent en résulter; en un mot, qu'il soit prêt à modérer ou ranimer, suivant les cas, le travail local qui s'accomplit à la surface de la peau et des muqueuses, aussi bien que le mouvement fébrile ou général qui tient les exanthèmes sous sa dépendance.

Cependant beaucoup de médecins ont pensé que l'intervention de l'art doit être plus active, même dans les cas les plus simples, et ont conseillé soit les antiphlogistiques, soit les excitants généraux et locaux. Mais ces médications ne conviennent évidemment que dans des circonstances où il existe ce qui pour nous constitue des irrégularités ou des complications, et que nous allons maintenant étudier. Il est bien entendu, d'ailleurs, que parmi les nombreuses variétés de fièvres éruptives que nous avons admises, nous ne reviendrons ici que sur celles qui doivent faire apporter des modifications à la thérapeutique de ces affections.

Un excès d'intensité, soit dans le mouvement fébrile, soit dans les éruptions cutanées et muqueuses, peut motiver l'emploi des antiphlogistiques. Ainsi, dans la période d'invasion, si la fièvre est très-considérable et fait craindre un raptus sanguin vers quelque organe important, si surtout l'éruption ne se montre pas à l'époque voulue, on se

doit pas hésiter à pratiquer une émission sanguine. Souvent l'espèce de détente qui en résulte est immédiatement suivie de l'apparition de l'exanthème, et tous les symptômes graves disparaissent. Toutelois nous recommandons en pareille circonstance une précaution qui nous paraît d'une extrême importance, c'est d'agir sur la peau par des irritants, pour y appeler la fluxion éruptive; sans cette précaution, si la chute des forces due à la saignée dépassait certaines limites, l'éruption pourrait ne pas s'accomplir, et la saignée aurait alors un effet véritablement nuisible. Dans la seconde période de la scarlatine et de la rougeole, la fièvre seule n'est plus un motif suffisant pour saigner; car elle est nécessaire à l'accomplissement de l'éruption et des autres phénomènes de dépuration, et les émissions sanguines générales ou locales ne seroient indiquées que dans le cas de complications inflammatoires. Dans la variole, au contraire, la saignée doit avoir pour but non seulement de favoriser l'éruption quand l'exoïs de la fièvre la rend tardive, mais encore de prévenir la phlogose cutanée qui aura lieu au moment de la suppuration, et qui offre par elle-même de grands dangers dans les variolles confluentes. Dans cette forme de la maladie, la saignée n'est dangereuse que si on l'emploie trop tard; si par exemple il existe déjà du pus dans les pustules, elle favorise la résorption de la matière purulente et devient mortelle; mais, au début, quand on l'emploie dans les limites convenables, elle est toujours sans inconvénients.

L'intensité de la phlogose cutanée, dans la scarlatine, paraît être dans quelques cas la source d'une aggravation sensible dans l'état du malade, et par cela seul mérite d'être combattue. Telle est du moins la pratique généralement suivie par les médecins de la Grande-Bretagne, tandis qu'en France on a pour principe de respecter la marche de l'éruption, et de n'employer aucuns moyens externes ni internes capables de la modifier énergiquement. Les Anglais cherchent à remplir le but qu'ils se proposent par deux ordres de moyens, savoir : les affusions froides et les purgatifs.

La méthode des affusions froides est peu connue en France, et l'on ne trouve pas assez nettement posée, dans les auteurs anglais, l'indication des conditions qui doivent la faire appliquer ou rejeter. Nous pensons que l'existence évidente d'une phlogénasie interne doit la contre-indiquer, et qu'il faut la réserver pour les cas où la réaction générale et l'éruption locale sont intenses et tendent par cela seul à produire des accidents, tels que des congestions vers le cerveau. Le froid, en opérant la constriction d'une certaine quantité de calorique, diminue le sentiment d'ardeur que les malades éprouvent à la peau, ralentit et déprime le pouls, fait cesser le délire, et amène un calme et un sentiment de bien-être très-prononcés. Il agit absolument ici comme dans les fièvres ardentes, et plus la physiologie générale de la scarlatine se rapproche de celle de ces maladies, plus les réfrigérants nous paraissent devoir être utiles. On peut, au lieu d'affusions ordinaires, prescrire, à l'exemple de Bateman, des lotions avec de l'eau et du vinaigre sur une partie plus ou moins étendue de la peau, répétées plus ou moins fréquemment, en prenant pour guide la violence de la chaleur. Bateman conseille aussi l'usage des bains simples dont M. Guersent paraît également s'être bien trouvé. Ces bains doivent être tièdes ou presque froids, et assez prolongés pour opérer une sédation sensible de la chaleur cutanée et de la fièvre. On les renouvelle à mesure que la réaction tend à reprendre le dessus.

C'est encore dans le but de diminuer l'intensité des phénomènes éruptifs et de la fièvre que les purgatifs et les laxatifs ont été préconisés. Il est certain qu'en étendant le mouvement fluxionnaire à la surface intestinale, on doit diminuer l'activité de celui qui s'opère sur d'autres points de l'économie, et qu'en provoquant des évacuations alvines, on rend les actes critiques de la dépuración plus complets, plus parfaits. On peut espérer de se mettre par là plus sûrement à l'abri des complications consécutives qui, dans beaucoup de cas, dépendent évidemment de l'absence de phénomènes critiques vers la fin de la mala-

die. De tous les purgatifs le calomel est celui que préfèrent les Anglais, sans doute à cause de la propriété excitante et diaphorétique qu'il réunit à l'action laxative. Willan le conseille, à la dose de dix à quinze centigrammes, mélangés avec parties égales de poudre d'antimoine, et nous apprenons que cette combinaison était administrée sans aucune crainte par un médecin, à Ipswich, en 1772, à des doses plus fortes; et de trois cents malades traités de cette manière aucun ne mourut. — Le docteur Binn, dit encore Estrenas, reconnaît avec franchise les obligations qu'il a à un de ses amis, pour avoir détruit les préjugés dont il était imbu contre les laxatifs administrés dans le commencement de la maladie. Il a reconnu par la suite que, bien loin d'être nuisibles, les laxatifs tendent au contraire à prévenir la diarrhée dont il redoutait les suites (1). —

L'emploi du froid est peu convenable dans la rougeole et la variole. Dans la première la prédominance de l'élément catarrhal dans la muqueuse aérienne est évidemment une contre-indication. Dans la variole, Currie et quelques autres médecins ont conseillé les affusions, les bains froids, les lotions avec de l'eau fraîche; mais cette pratique n'a jamais été généralement adoptée. Elle est presque aussi fortement contre-indiquée que dans la rougeole, et ne peut convenir que dans des cas particuliers. La localisation plus spéciale de la scarlatine à la peau et sur la muqueuse digestive rend compte des avantages plus sûrs et des inconvénients moindres que l'emploi du froid paraît avoir dans cette maladie. Quant aux purgatifs, ils ont été également préconisés dans la rougeole et dans la variole. Ils peuvent avoir des avantages réels quand rien ne les contre-indique; toutefois finons qu'en France on en est généralement sobre, qu'on ne les prescrit que dans certains cas de complications, ou bien seulement vers la fin des fièvres éruptives qui ne sont point accompagnées

(1) Estrenas, *Médecine prat. des mal. de la peau*, trad. Littré, t. 7, p. 145.

de diarrhée, afin de suppléer à cette sécrétion qui paraît si souvent opérer une crise favorable.

Dans la variole il se présente une raison spéciale pour diminuer la violence de la phlogose suppurative dont la peau est le siège, c'est la difformité qui résulte des cicatrices consécutives à la guérison de l'éruption. Après les variolés très-discrètes, après les varioloïdes dont les boutons suppurent faiblement, les cicatrices sont si peu apparentes que généralement on ne songe pas à les prévenir. Mais dans les variolés plus ou moins confluentes, il est convenable de faire avorter autant que possible les pustules, sinon sur tout le corps, au moins à la face, où les cicatrices sont toujours plus profondes et plus désagréables à la vue. Quelques médecins pensent même que le traitement abortif pourrait être employé sur toute l'étendue de la peau, dans le but principal de prévenir la violence de la fièvre de suppuration et tous les accidents qu'elle entraîne à sa suite. Mais jusqu'ici les vieilles doctrines de l'humorisme ont encore prévalu dans l'esprit de la plupart des praticiens, qui continuent à voir dans les fièvres éruptives, et en particulier dans l'éruption variolense, un travail médiateur par lequel l'organisme se débarrasse d'un levain morbide. Nous parlerons plus loin des tentatives que M. Briquet a faites en opposition à ces idées, et dont il a fait le sujet d'un mémoire publié dans les *Archives générales de médecine* (1).

Malgré les doctrines généralement admises sur la nature de la variole et sur la nécessité de respecter le travail pathologique qui s'opère à la surface de la peau, plusieurs anciens ont conseillé l'emploi des topiques pour faire avorter les pustules varioliques. Déjà au xvi^e siècle Baillou signale les merveilleux effets de l'emplâtre de Vigo et des onctions mercurielles dans les variolés malignes ; mais son exemple ne trouva qu'un petit nombre d'imitateurs, et il fallut de nouveaux faits pour que l'utilité du mercure fût

(1) N^o de septembre et octobre 1828.

suspectée par Zimmermann (1). Nonobstant cette nouvelle autorité, le traitement abortif de la variole fut très-peu usité. Ce n'est que dans ces dernières années que MM. Serres et Garici ont fait sur les mercuriaux en topiques un certain nombre d'expériences qui leur ont permis de constater l'avortement des pustules varioliques.

Si l'application est faite la veille ou le jour de l'éruption, les boutons ne se développent point; si elle a lieu du quatrième au sixième jour, elle fait rétrograder l'éruption. Cette suppression du travail suppuratif, bornée à la face est trop limitée pour rendre la maladie dangereuse. A l'aide d'observations comparatives, les mêmes expérimentateurs ont pu s'assurer qu'aucune autre substance ne produisit le même effet. Ainsi s'est trouvée réfutée l'opinion qui admet que le simple abri de l'air et de la lumière amène ces résultats. M. Nonat, à Paris, et M. Pétrequin, à Lyon, ont étudié les effets simultanés de l'emplâtre de Vigo, du diapnoïde et du diachylon, et ils ont vu que jamais ces deux dernières applications n'empêchaient aux pustules de parcourir toutes leurs phases (2). Avant d'employer

(1) *Traité de l'Expérience*, t. II, p. 125.

« On a remarqué, dit-il, qu'une dame ayant péri pour de bonnes raisons au emplâtre de Vigo sur certain endroit, après une ébullition, est venue la petite vérole, et que tout son corps, excepté l'endroit qui était débondé par le mâtasse que l'emplâtre y avait soulevé, avait été couvert de l'éruption de cette maladie. » Zimmermann cite quelques tentatives faites avec quelque succès par Rieu et Henri Salzer. Mais la méthode abortive resta négligée par la plupart des praticiens, quoiqu'on vît bien les services qu'elle pouvait rendre. « Cette invention, ajoute notre auteur, paraît d'autant plus importante pour les femmes, qu'elles aimeraient mieux perdre la vie que leur beauté. »

(2) Dans son mémoire inédit dont il a bien voulu nous communiquer les conclusions, M. Pétrequin établit que les applications mercurielles arrêtent la marche de la pustule variolique à quelque époque qu'on les mette en usage; qu'employées tardivement, elles ont encore des effets avantageux appréciables; enfin, si on a vu des pustules se convertir en ulcérations dont la résolution était ensuite difficile, c'est que les applications mercurielles n'avaient pas été continuées assez longtemps; de là le

l'emplâtre de Vigo, il faut avoir soin de le ramollir à l'aide d'une douce chaleur, et de l'appliquer seulement lorsqu'il adhère fortement aux doigts.

Lorsqu'on se sert de l'onguent napolitain, on l'emploie à la dose de huit grammes matin et soir; on fait des frictions cinq minutes chaque fois pendant trois ou quatre jours. Les pustules ainsi traitées diminuent progressivement de volume, s'acuminent et disparaissent pour faire place à de petits tubercules qui s'usent peu à peu par exfoliation de l'épiderme. M. Briquet ne conteste de prévenir les cicatrices varioliques à la face par ce mode de traitement, a essayé de recouvrir une vaste partie du corps, afin de rendre l'éruption presque nulle et d'amender ainsi considérablement les phénomènes généraux. Cette tentative n'a pas été exempte d'inconvénient, et l'on ne saurait encore la donner comme bonne à imiter.

Avant la pratique de l'inoculation et la découverte de la vaccine, les mercuriaux à l'intérieur ont été proposés sinon comme prophylactiques de la variole, du moins pour la rendre plus bénigne. M. Duxinériis qui a publié un mémoire remarquable sur ce sujet, croit qu'il serait bon de revenir à ce traitement. Suivant lui « la manière la plus convenable d'administrer le mercure dans la variole serait de donner, à l'exemple de Lettsom et de Reil, le calomel ou l'éthiops minéral à l'intérieur, et de faire des onctions mercurielles à la face et d'y appliquer soit l'emplâtre de Vigo, soit quelque pommade mercurielle appropriée (1). »

M. Bectonneau et Serres font aussi avorter les pustules varioliques en les cautérisant à leur début avec le nitrate d'argent. Il y a deux manières de procéder : ou on cautérise individuellement, alors on enlève le sommet des pustules et on les touche avec la pierre infernale; ou bien on cautérise en masse avec un pinceau trempé dans une solution de nitrate d'argent. La dernière méthode échoue

précipité de ne les suspendre qu'un certain temps après l'époque de la suppuration.

(1) L'Expérience, t. II, p. 552.

sauvées. Pour que la première ait des chances de réussite il faut l'employer le premier ou le deuxième jour de l'éruption; son exécution est du reste longue, difficile, douloureuse et peut amener une réaction phlegmatisque à la face d'une certaine intensité.

Enfin, on a préconisé les pédiluvés irritants, les cataplasmes sinapiés afin d'attirer l'éruption vers les extrémités inférieures et de la rendre discrète et régulière à la face. Il n'est guère probable qu'on arrive à ce but, mais cette modification a l'avantage de favoriser la sortie de l'exanthème.

Lorsque la période de suppuration est déclarée, quelques auteurs, imitant les Arabes, surcraient les pustules varioliques pour les débarrasser du pus qu'elles contiennent, et font ensuite des lotions émollientes. Cette pratique a pour but d'éviter les inconvénients de la suppuration. Voici d'après M. Fiorry, qui a cherché à populariser cette méthode, comment on doit agir. Lorsque la transformation purulente des pustules a eu lieu, on met le malade dans un bain tiède, puis quand l'épiderme qui recouvre les petits abcès est suffisamment ramolli, on le déchire avec un linge rude qui entraîne en même temps l'épiderme et la matière purulente. Les petites plaies sont lavées dans l'eau du bain et le malade est remis dans son lit. Le lendemain et les jours suivants on répète les bains et on achève de rompre les pustules qui avaient été négligées. Si la varicelle est confluenta on trouve au-dessous de l'épiderme des surfaces d'une certaine étendue qu'il faut passer avec du céral ou que l'on enduit d'une couche d'ichtyocolle très-épaisse.

Noas avons admis dans les fièvres éruptives plusieurs variétés dues à l'absence de quelques-uns de leurs éléments pathologiques. Le plus souvent cette absence n'entraîne aucune modification essentielle dans le traitement, à moins qu'il n'existe d'autres circonstances d'une nature particulière. Quand c'est l'éruption cutanée qui manque, il est bon de la provoquer ou plutôt d'y suppléer par la rubéfaction ou la vésication des téguments, surtout si

l'exanthème muqueux offre quelque gravité, ou si l'on a lieu de craindre une complication vers les organes splanchiques, mais il ne peut jamais être nécessaire de provoquer le catarrhe ou l'angine dans la rougeole sans toux et dans la scarlatine sans mal de gorge. Il faut, au contraire, concentrer le plus possible le travail exanthématique sur la peau. Quant aux fièvres éruptives dans lesquelles la fièvre et les autres symptômes généraux sont peu prononcés et semblent manquer, rien n'exige qu'on agisse autrement que dans des affections locales de la peau; seulement il est utile de prendre quelques précautions à cause des suites qui quelquefois sont les mêmes que dans les fièvres éruptives complètes. Nous ne doutons point de la possibilité de voir survenir des anasarques ou des catarrhes pulmonaires ou intestinaux, à la suite de certaines scarlatines ou rougeoles qui ne semblent être autre chose que des érythèmes.

Les variétés que présentent les fièvres éruptives dans leur durée totale ou dans celle de chacune de leurs périodes, dans le mode souvent anormal suivant lequel ces périodes se succèdent, dans l'apparition de l'éruption qui est tantôt prématurée et rapide, tantôt tardive et lente, dans la manière dont elle parcourt successivement toutes les régions du corps, toutes ces variétés, disons-nous, ne sont par elles-mêmes la source d'aucune indication thérapeutique spéciale. Il suffit de remarquer que ces irrégularités doivent plus souvent faire craindre des complications qu'une marche régulière et un ensemble de caractères conformes aux types de nos descriptions. Nous ne trouvons également la source d'aucune indication dans certains caractères locaux que l'éruption cutanée peut présenter. Ainsi la rougeole noire doit seulement faire craindre quelque complication viscérale aiguë ou chronique; la présence de la miliaire avec les taches morbillieuses ou scarlatineuses n'a aucune valeur; la scarlatine rubéoleuse ne diffère en rien de la scarlatine ordinaire. Dans la variole, l'apparence cristalline des pustules au moment de la suppuration, doit seulement nous conduire à chercher la cause

qui s'oppose à la maturation des pustules, à voir si la faiblesse du travail local dépend de la débilité générale ou de la dérivation produite par une pléguasie interne.

Dans l'ensemble des phénomènes propres aux fièvres éruptives il en est que le praticien ne doit jamais perdre de vue dans le traitement de ces maladies, ce sont les phénomènes critiques dont l'importance exagérée par les auteurs antérieurs à notre époque, a été ensuite abaissée et niée à tort par un grand nombre de médecins de notre temps. De ces deux manières de voir il serait difficile de décider laquelle offre le plus de dangers; mais on ne peut avoir fait une étude spéciale des fièvres éruptives, on ne peut avoir reconnu les lois qui régissent leur marche et leur terminaison, sans rester convaincu qu'il y a beaucoup à conserver de la doctrine des crises dans cette branche de la pathologie, surtout au point de vue de la thérapeutique. Les anciens avaient admirablement reconnu la nature du travail pathologique dont l'exanthème cutané et l'exanthème muqueux ne sont qu'un des effets ou des éléments, et ils avaient bien vu que ces exanthèmes opèrent la dépuration préparée par la fièvre. Mais remarquant ensuite que la dépuration paraissait d'autant plus complète qu'aux exanthèmes se joignaient des flux par la peau, par les reins et par les voies digestives, ils admettaient que dans toute fièvre éruptive ces flux étaient indispensables pour accomplir l'élimination du principe morbide, et dès-lors ils se faisaient une règle de les provoquer dans tous les cas. Guidés par une idée juste ils en avaient exagéré les conséquences, en étendant à tous les cas ce qui n'est réellement nécessaire que dans quelques-uns. Ainsi nous sommes persuadé que lorsque la cause pathogénique a agi faiblement, l'éruption cutanée et muqueuse, sans sueurs ni diarrhée abondante, peut suffire à la dépuration de l'organisme. Mais on n'a en pratique aucune garantie de cette suffisance, et l'absence de toute espèce de flux pendant le cours ou vers la fin d'une fièvre éruptive nous paraît un motif parfaitement légitime de provoquer des flux artificiels. Cette conduite nous paraît rationnelle dans les

cas surtout où, avec une éruption et une fièvre intense, l'effet dépurateur n'aura cependant amené aucune crise par les sueurs, les urines ou les selles. C'est alors que suivant les cas on excitera la sécrétion de l'intestin, celle des reins ou celle de la peau. Dans le choix qu'on devra faire entre les purgatifs, les diurétiques et les diaphorétiques, on fera toujours intervenir les indications tirées de l'état général et de l'état local, aussi bien que de la tendance qu'affecte chaque fièvre éruptive à se terminer par telle espèce de flux plutôt que par tel autre. Ainsi les diaphorétiques internes et externes conviendront à la chute seulement de l'érythème inflammatoire général et local; les diurétiques employés plus tôt pourraient aussi avoir des inconvénients et doivent être réservés pour la troisième période. Quant aux purgatifs, si l'état local, c'est-à-dire celui du tube digestif ne les contre-indique pas, ils peuvent, comme nous l'avons déjà vu, être employés dès les premières périodes comme moyens capables de diminuer l'intensité alarmante de l'éruption cutanée. Mais si leur usage n'a d'autre but que d'amener un flux critique, nous pensons qu'il vaut mieux attendre la fin de la maladie, c'est-à-dire la période de desquamation ou de dessiccation. On sait que Sydenham ne manquait jamais de purger après les varioles confluentes, et cette pratique étendue aux autres fièvres éruptives est généralement reconnue pour être avantageuse.

Il nous est impossible d'exposer en détail le traitement qui convient à chacune des nombreuses maladies susceptibles de compliquer les fièvres éruptives. Cette description nous entraînerait à répéter ce que nous avons dit dans d'autres chapitres. Notre tâche en ce moment doit se borner à l'étude des modifications qu'il est nécessaire d'apporter au traitement de ces maladies, par suite de la dépendance plus ou moins étroite dans laquelle elles se trouvent par rapport aux fièvres éruptives qu'elles compliquent. Ce sont donc des préceptes généraux que nous avons à formuler et non des règles spéciales pour chacun des cas individuels que nous avons en vue.

Lorsque le praticien a diagnostiqué l'existence d'une

complication, c'est-à-dire d'un état morbide général ou local qui n'est plus un élément de la fièvre éruptive, mais qui devient capable par sa marche naturelle d'amener des accidents qui lui sont propres, dans ce cas, disons-nous, le praticien doit aussitôt diriger son attention vers l'influence que cette complication exerce sur les lésions élémentaires de la pyrexie éanthématique. Si la complication que nous supposons d'abord locale, entraîne vers l'organe affecté une telle concentration des forces que l'évanthème cutané et marqueux en soit affaibli et marche avec peine vers sa terminaison, si l'éruption pâlit et s'affaiblit au lieu de rougir et de se développer, à plus forte raison si elle cède à la dérivation au point de disparaître, l'indication positive est d'exciter vivement la peau à l'aide des rubéfiants et des épispastiques. Ces excitants locaux n'offrent jamais d'inconvénients si ce n'est peut-être dans les cas où il existe un éréthisme nerveux très-prononcé qu'ils pourraient alors augmenter par la douleur qui suit leur emploi. C'est au praticien de choisir alors parmi les irritants de la peau ceux qui sont les moins douloureux, et de modifier leur mode d'application de manière à produire des congestions et des sécrétions morbides avec le moins de douleur possible.

Dans ce qui précède nous venons de supposer que c'est le développement d'une complication qui a contrarié la marche de l'élément cutané. Mais il peut aussi se faire que celui-ci ait été primitivement entravé, arrêté, supprimé par une sédation intestinale, comme on produit le froid par exemple, c'est alors la répercussion de l'évanthème qui a influé sur le développement de la complication viscérale. Or, dans ce cas encore, le premier soin du praticien sera de rappeler vers la peau la fluxion dont elle était le siège, et de lui rendre l'activité nécessaire à la régularisation de la marche de la maladie.

L'influence réciproque des complications sur l'élément fébrile et dynamique, et de celui-ci sur les complications, est aussi la source de données utiles en pratique. Ainsi, l'exagération du mouvement fébrile, qu'elle paraisse la

cause ou l'effet de la complication qu'on observe, doit être directement combattu par les émissions sanguines générales ou locales suivant les cas. Que si, au lieu d'être exagérée, la fièvre était moindre qu'il ne convient pour l'accomplissement des actes dépurateurs, circonstance qui se présente dans certains cas où la maladie revêt une forme adynamique ou ataxique, il faudrait alors augmenter la réaction par les excitants généraux, parmi lesquels le vin et les spiritueux, l'ammóniaque et quelques-uns de ses composés, la cannelle, la camomille, la menthe, la serpentaire de Virginie, le quinquina, la poudre de Dover, etc., méritent la préférence.

Ces moyens échauffants étaient peut-être trop employés par les anciens; car on leur a souvent reproché d'en avoir abusé. Mais cela tenait à ce que leurs moyens incomplets de diagnostic ne leur permettaient pas de toujours reconnaître les inflammations internes qui jetaient le désordre dans les phénomènes de la maladie. Dès-lors, ce désordre était pour eux l'indice d'une malignité qu'ils ne savaient combattre qu'en exaltant les forces réactives, et souvent ils employaient les excitants et les toniques dans des cas qui réclamaient des antiphlogistiques et des débilitants. Il est donc essentiel de distinguer l'oppression des forces que peut produire une simple complication inflammatoire vers les viscères, de la dépression des forces, primitive et indépendante des états locaux, et c'est dans ce dernier cas seulement que les excitants généraux peuvent être avantageux.

Le mauvais état des forces qui, dans toutes les maladies, est pour le praticien un élément important, acquiert une haute portée dans les maladies qui, comme les fièvres éruptives, réclament pour leur terminaison heureuse l'association de toutes les parties de l'organisme au travail de dépurations qui en constitue l'essence. Ce mauvais état dynamique prend tantôt le cachet de l'adynamie, tantôt celui de l'ataxie ou de la malignité. Ces deux états, le second surtout, recourent fréquemment avec la diarrhée hémorrhagique dont nous avons placé la cause prochaine

dans le plus haut degré de l'altération du sang propre aux fièvres éruptives. C'est ici que l'ignorance où nous sommes encore sur la nature de cette altération laisse à la thérapeutique une impuissance déplorable. Ni la théorie, ni l'expérience ne nous ont encore révélé le genre de traitement vraiment convenable dans ces circonstances fâcheuses. Ce que dit M. Beyer à propos de la scarlatine, et que nous allons reproduire, s'applique pareillement aux autres fièvres éruptives.

« Dans la scarlatine maligne, dit cet honorable médecin, que peut-on opposer avec succès au délire, aux suffusions sanguines dans l'estomac, dans les plexes, les méninges, etc. ? La saignée échoue presque constamment ; le pouls se déprime avec une promptitude désespérante, comme dans les diphthéritiques graves, dont on retrouve quelquefois à l'ouverture du corps les lésions intestinales. D'un autre côté, les médecins qui ont le plus préconisé les lotions et les aspersions froides, déclarent que dans cette variété elles ne sont point avantageuses. L'ipécaçuana et le tartre stibié provoquent le vomissement, expulsent le mucus sanieux accumulé dans l'arrière-gorge, et ont quelquefois semblé rallier la maladie à une marche plus régulière ; les fumigations vinaigrées et les décoctions de quinquina et de contrayerva acidulées avec l'oxymel ou l'acide mariatique, ou aiguës avec du chlorure de chaux, ou légèrement alcoolisées, sont généralement conseillées en gargarismes ou en lotions. Les vésicatoires volants et les sinapismes autour du cou sont également recommandés. On assure que les purgatifs, et spécialement le calomel à la dose de 40 à 50 centigr., ont été plus souvent salutaires qu'aucun autre moyen (1). »

Outre les moyens dont il vient d'être question, et les excitants généraux que nous avons mentionnés plus haut, nous pensons qu'il serait convenable d'essayer, dans le cas surtout de phénomènes ataxiques, le camphre, les éthers, le musc et le castoreum.

(1) *Traité de méd. et pharm. théor. et prat.*, 8^e édit. par. 1, t. 1, p. 316 et 317.

Après avoir montré quelles indications thérapeutiques découlent des connexions qui unissent les complications des fièvres éruptives avec leurs éléments généraux et locaux, il nous faudrait passer en revue chacune de ces complications, pour poser les indications spéciales qu'elles réclament. Mais comme ces indications sont à peu près les mêmes que dans les cas ordinaires, on n'a qu'à se reporter à ce qui concerne chacune des maladies que nous avons énumérées comme susceptibles de compliquer les fièvres éruptives. Ainsi, nous n'avons rien à dire ici qui n'ait été exposé ailleurs ou qui ne doive l'être plus tard, sur le traitement des phlegmasies de l'œil, du nez, des voies aériennes, du poulmon et de son enveloppe, de la muqueuse bucco-pharyngienne, du canal gastro-intestinal, sur celui des hydropisies si fréquentes après la scarlatine. Revenons seulement en quelques mots sur les accidents nerveux qui se présentent au début ou dans le cours des fièvres éruptives, de la variole surtout.

Les convulsions que nous savons n'être point rares au début ne réclament pas toujours le même traitement. Nous avons dit ailleurs que l'expectation, dans le cas d'éclampsie, s'applique surtout à celle qui s'observe au début des fièvres éruptives, et en général à celle qui se déclare au commencement d'une affection fébrile quelconque. Mais rien n'est plus difficile que de bien appliquer ce précepte dans la pratique. M. Trousseau a sans doute raison de poser en principe « que les émissions sanguines qui tiennent le premier rang dans le traitement des convulsions, ne sont pas sans de grands inconvénients au début de la variole discrète et de la rougeole; Sydenham est formel sur ce point : *ab his praei abstinendum ! Namque, institutis phlebotomiis super, paulo post eruptionem, ex improvisis variolae quaei repercutitur delinquent.* Ce précepte est d'autant plus grave dans la bouche de Sydenham, qu'il était grand partisan de la saignée dans la première période de la variole confluente..... Je me résume dans cette proposition pratique : pas de traitement actif dans les convulsions initia-

les (4). » Nous pensons que cette règle est formulée d'une manière trop absolue. Car dans les cas où il faudrait l'appliquer le diagnostic n'est ordinairement qu'une prévision et dès lors entouré d'incertitude. Il vaut mieux, suivant nous, tout en admettant la probabilité d'une éruption prochaine, prendre pour guide l'état actuel du malade, c'est-à-dire, la forme des symptômes qu'il présente. Si, par exemple, la fièvre est intense, il est probable que les phénomènes nerveux dépendent de l'hyperémie du cerveau; ils doivent alors être combattus par la saignée générale ou locale, sans oser d'attirer la fluxion éruptive vers la peau par les lavants. Si, au contraire, la fièvre est peu développée, il est probable que les désordres de l'innervation tiennent au caractère malin ou atonique de la maladie, peut-être simplement à une prédisposition individuelle; dès lors il faut proscrire les émissions sanguines, qui ne feraient qu'accroître la fâcheuse tendance du mal en entravant l'éruption; il faut agir seulement par des antispasmodiques sur le système nerveux, et surtout couvrir la peau d'irritants énergiques pour y appeler l'éruption dont le développement ne manquera pas de faire tomber les accidents nerveux. Sydenham faisait un grand usage des opiacés pour calmer l'agitation, l'angoisse et les douleurs vives qui accompagnent les varioles confluentes; mais, outre qu'il n'en commençait l'usage que vers le dixième jour, il ne l'a préconisé que pour les adultes; et comme si aucune remarque pratique ne devait échapper à ce grand médecin, il n'a pas manqué de reconnaître que chez les enfants les opiacés ont moins d'avantages et plus d'inconvénients que chez les adultes. Seulement il s'est peut-être trompé dans les raisons qu'il donne de cette différence, et que ce n'est pas ici le lieu de discuter.

Un point capital dans le traitement des fièvres éruptives lorsqu'elles règnent d'une manière épidémique, c'est d'apprendre à connaître le plus tôt possible le genre

(4) *Gen. des Érupt.*, 1812, p. 535.

particulier à chaque épidémie, et les modifications qu'il doit imprimer à la thérapeutique. Malheureusement chaque médecin, livré à ses forces individuelles, n'arrive que lentement à cette connaissance. Combien ne doit-on pas regretter qu'il y ait si peu d'accord entre les membres du corps médical, et des moyens d'association si insuffisants que le fruit de leurs efforts soit presque toujours perdu au milieu des circonstances les plus compromettantes pour la santé publique ! De quelle utilité sont pour la pratique des publications ou des discussions dans le sein des sociétés savantes, lorsque l'épidémie qui en est l'objet tire déjà à sa fin ou a complètement disparu !

Pour terminer ce qui regarde le traitement des fièvres éruptives nous n'avons plus qu'à parler du traitement préservatif.

Pour la rougeole nous ne connaissons encore d'autre moyen que l'isolement, c'est-à-dire l'éloignement des foyers d'infection et de contagion. Lorsque cet isolement est impossible et que la maladie règne épidémiquement, on a conseillé de l'avoiser pour la rendre moins grave. Mais jusqu'ici les tentatives de ce genre n'ont pas été assez nombreuses ni assez satisfaisantes pour croire à leur efficacité.

Contre la scarlatine l'isolement est aussi le seul moyen qui puisse inspirer une sécurité complète. Cependant l'usage de la belladone a été préconisé, en Allemagne surtout, comme propre à préserver de la scarlatine les sujets soumis au contagium. Si l'on en croit quelques médecins, cette propriété aurait été constatée dans un grand nombre d'épidémies en Allemagne et en Suisse ; mais nous devons dire qu'en France cette opinion est encore peu partagée, soit que l'on n'ait pas assez expérimenté, soit que les expérimentations n'aient pas été concluantes. Quoi qu'il en soit, comme ces tentatives méritent réellement d'être répétées, nous dirons que la belladone s'administre en teinture, à la dose de huit à dix gouttes par jour pour les enfants de dix ans. On augmente ou on diminue cette dose suivant l'âge. On en continue l'usage pendant une

dixaine de jours pour cesser et reprendre ensuite. Quelques médecins prétendent que si la maladie n'est pas empêchée, elle est du moins plus bénigne.

Le moyen préservatif de la variole est la vaccine, et s'il n'est pas infallible, son efficacité n'est pas douteuse presque dans l'universalité des cas. Les exemples pour nous bien réels de varioles développées chez des sujets antérieurement atteints d'une variole ou d'une vaccine légitime, nous paraissent de nature à motiver la pratique des retaccisations. Nous croyons que l'opinion générale des médecins en France a tort de la rejeter, et nous ne désespérons pas de voir les principes profonds en Allemagne sur ce point, bientôt suivis par les praticiens de notre pays.

CHAPITRE II.

MALADIES DIVERSES DE LA PEAU.

Les maladies de la peau, autres que les fièvres éruptives, affectent aussi très-fréquemment les jeunes sujets. Les unes ont généralement une marche aiguë, les autres une marche chronique. C'est en suivant cette division que nous allons consigner ici quelques remarques générales dont ces affections peuvent être l'objet dans l'enfance.

Les maladies aiguës de la peau, telles que sont en général plusieurs variétés d'érythème, la roséole, l'urticaire, l'érysipèle, certaines éruptions vésiculeuses et le purpura, sont tantôt simples et locales, tantôt accompagnées de fièvre et d'autres troubles généraux de l'économie. Dans ce dernier cas elles présentent souvent dans leur marche une grande analogie avec les fièvres éruptives; elles doivent, comme celles-ci, être attribuées à un état morbide général qui ne peut disparaître qu'en se localisant, et dès-lors toutes les inductions thérapeutiques qui se présentent

dans les fièvres éruptives leur sont applicables. Il nous suffit d'énoncer ce principe, car dans le chapitre précédent nous en avons déduit les conséquences pour la pratique avec assez de soin et de détail pour que nous puissions ici nous borner à des indications sommaires.

Parmi les maladies aiguës de la peau, l'érythème, l'érysipèle, la miliaire, la varicelle, la vaccine, le purpura hemorrhagica, les pustules et le pemphigus des nouveau-nés, sont les seules qui réclament de notre part une description résumée ou au moins quelques courtes considérations. Les cas de roséole et d'urticaire que nous avons observés chez les enfants ne nous ont rien appris de spécial. Nous ne dirons rien non plus des herpès que nous avons vus, tantôt sous la forme d'éruptions critiques marquant le déclin d'une fièvre inflammatoire simple ou de certaines phlegmasies aiguës, tantôt comme affections locales et idiopathiques.

Les maladies chroniques de la peau, que l'on désigne ordinairement sous les noms de *dartres* et de *teignes*, sont fréquentes chez les enfants. On doit mentionner surtout l'eczéma, la gale, l'ecthyma, l'impetigo, le porrigo, le prurigo, la lèpre vulgaire, le pityriasis et le lupus scrophuleux. La plupart de ces maladies, lorsqu'elles siègent sur le tronc ou sur les membres, n'offrent rien de particulier à l'enfance; mais celles qui siègent à la tête, c'est-à-dire les teignes, sont plus spéciales à cet âge. Pour rester fidèle au plan de cet ouvrage, nous exposerons succinctement l'histoire de l'eczéma, de l'impetigo, du favus et du pityriasis.

Avant d'entrer dans l'étude particulière de chacune de ces maladies, nous devons dire quelques mots d'une question qui s'applique à toutes les affections cutanées et surtout à celles du cuir chevelu; c'est celle des accidents consécutifs à la disparition d'une maladie de la peau.

« Lorsqu'on interroge avec soin, disent MM. Rilliet et Barthéz, les faits cités comme preuves des dangers de la répercussion, on en trouve un bon nombre qui ne peuvent pas supporter l'analyse. Le plus souvent, en effet, l'on n'a pas tenu un compte exact de l'état de la santé générale

avant la disparition de la phlegmasie cutanée, en sorte qu'il est difficile de déterminer si le développement de l'affection interne est l'effet ou la cause de la disparition de la maladie externe. Nous avons pu, d'un autre côté, nous assurer, d'après un grand nombre de faits qui ont passé sous nos yeux, qu'en réalité la phlegmasie interne était presque toujours antérieure à l'autre. Nous sommes donc portés à restreindre l'influence que l'on accorde généralement à la rétrocession des dartres et des exanthèmes, laquelle d'âge en âge et d'école en école, a constitué la pierre angulaire de l'édifice des causes pathologiques. (1) »

Avec les auteurs que nous venons de citer, nous pensons que les accidents dont il est ici question ne présentent souvent avec la maladie cutanée qu'un rapport de coïncidence ou de succession. D'autres fois le rapport de causalité est plus direct, mais très-différent de ce qu'on entend par rétrocession. Ainsi du pus accumulé sous des croûtes résultant d'une dartre peut être résorbé ; ou bien, dans le cas de teignes, les vésicules qui font communiquer l'extérieur et l'intérieur du crâne ont propagé l'inflammation aux méninges ; ou bien enfin les topiques chauds ou irritants, appliqués sur le cuir chevelu, peuvent développer une congestion de l'encéphale.

Néanmoins nous nous garderons bien de rejeter complètement la théorie de la rétrocession, et quand il semblerait vrai que ce n'est là qu'un préjugé, il est si fortement enraciné dans l'esprit du vulgaire que le praticien risque sa réputation s'il veut le braver ouvertement. Il doit donc s'entourer ici de toutes les mesures indiquées par la prudence pour empêcher la guérison des gommures d'être suivie de tout effet fâcheux ; voici à quel point de vue il doit se placer. Les gommures et les fièvres éruptives ont entre elles une grande analogie. Les unes et les autres pouvant être considérées comme un véritable effort de l'organisme pour éliminer et chasser en dehors certaines substances qu'un sang altéré peut seul fournir, on doit se borner à

(1) *Essai clin. et teor. des mal. des enfants*, t. 1, p. 702.

modérer ce travail lorsqu'il s'accompagne d'un excès d'activité et lorsqu'il est dans sa période d'augment. Mais lorsque les lésions locales semblent survivre à l'action de la cause interne, probablement épuisée, il ne peut y avoir aucun inconvénient à les faire disparaître. Seulement, comme cette appréciation n'est pas le résultat d'une observation directe et sûre, il est nécessaire de considérer et de combattre la cause interne comme toujours existante, au moins à un certain degré. C'est pour cela qu'autant un traitement topique seul peut être dangereux, autant il peut être inoffensif et efficace quand on y joint l'usage des médications internes dites dépuratives, et qu'on le continue quelque temps encore après la disparition des gournes.

ARTICLE I.

érythème.

Des différentes variétés d'érythème auxquelles on a donné les noms d'érythème, 1^o diffusif, 2^o maculeux, 3^o marginatum ou papuleux, 4^o nodosum, la dernière est peut-être la plus fréquente chez les enfants et la plus digne de remarque. On l'observe surtout à la partie antérieure des jambes, sous la forme de taches rouges élevées au-dessus du niveau de la peau et formant de véritables nodosités. Après deux ou trois jours elles forment des espèces de tumeurs qui sont corps avec la peau et le tissu cellulaire, et dont le volume varie entre celui d'une monnaie et d'un petit œuf. Leur couleur devient peu à peu plus foncée, puis jaunit comme les ecchymoses en voie de résorption. Cette circonstance réunie à la sensation d'une espèce de fluctuation que fournit le toucher, permet de croire que l'érythème s'accompagne probablement d'une infiltration sanguine de la peau et du tissu cellulaire sous-jacent. La maladie disparaît par résolution après une ou deux semaines. Elle est le plus ordinairement précédée, pendant quelques jours, de malaise, d'un peu d'abattement

et d'un mouvement fébrile. Dans quelques cas on a vu des accidents plus graves, de forme typhoïde, précéder l'éruption et disparaître lors de son apparition. Il est rare que des moyens actifs soient nécessaires pour la cure de cette maladie. Les bains rafraîchissants et les topiques résolutifs suffisent ordinairement pour hâter un peu la guérison. Dans des cas de phtisie et de symptômes généraux inflammatoires, les émissions sanguines peuvent être utiles. Souvent aussi les laxatifs paraissent avantageux.

On sait que les enfants à la mamelle sont très-sujets à cette variété d'érythème qu'on appelle *intertrigo*, et qui résulte du frottement de deux surfaces contiguës. On le remarque surtout aux plis des fesses, des cuisses, du cou, etc., chez les enfants qui ont beaucoup d'embonpoint. Il suffit pour la guérison de suspendre les points érythémateux avec le lycopode et de redoubler les soins de propreté.

On trouve encore dans la délicatesse de la peau et dans l'acte de rénovation épidermique qui s'y accomplit peu de temps après la naissance, la source de cet érythème des fesses et des régions voisines, qui est si fréquent chez les enfants nouveau-nés, et qui dépend aussi en partie de l'insuffisance des soins de propreté. C'est en les employant avec plus d'attention, en évitant le contact de linges durs et grossiers, et en ayant recours à des lotions émollientes et résolutives qu'on empêchera l'aggravation de cet érythème qui se termine quelquefois par ulcération et par gangrène, surtout chez les enfants atteints de muguet, ainsi que nous l'avons dit ailleurs.

ARTICLE II.

SYPHILIS DES NOUVEAU-NÉS.

L'érysipèle, étudié dans l'enfance, n'offre des caractères spéciaux que chez les enfants à la mamelle, et surtout pen-

dant les deux premiers mois de la vie. A cette époque il mérite, à cause de sa marche et surtout à cause de son extrême gravité, une mention particulière que l'insuffisance de notre observation et le silence de la plupart des auteurs modernes nous avaient fait omettre dans notre première édition. Nous devons ici réparer cette omission : puisque, grâce aux recherches récentes de M. le professeur Trousseau (1), il n'est plus permis de dire que l'érysipèle chez les enfants n'a rien de spécial.

Et d'abord la cause la plus ordinaire de cette maladie chez l'enfant à la mamelle se trouve dans une circonstance qui appartient exclusivement au commencement de l'enfance, puisque ce n'est autre chose que l'inflammation et la suppuration de l'ombilic, souvent accompagnée d'une phlegmasie latente dans le tissu cellulaire environnant, ou même d'une plébite ombilicale. Outre cette cause, il faut aussi admettre que les plaies de la peau qui s'irritent et s'enflamment si facilement chez les jeunes enfants, au cou, à l'aîne, à l'aisselle, au poignet, au pézail, peuvent être le point de départ de l'érysipèle. Dans d'autres circonstances, c'est l'irritation produite par l'urine sur les fesses, sur les hanches ou sur les grandes lèvres, sur les cuisses, qui s'exalte et se transforme en inflammation érysipélateuse.

M. Trousseau pense que le point de départ de la maladie se trouve constamment dans quelque-une des lésions locales qui viennent d'être mentionnées, même dans le cas où elle se développe à quelque distance du point où existe la lésion locale primitive, et, pour appuyer cette manière de voir, il invoque l'analogie suivante : « Il suffit, dit-il, de considérer ce qui se passe lorsque la maladie est causée par un coryza chronique, ou par toute autre affection des fosses nasales ; ne voyons-nous pas alors l'érysipèle débiter par le milieu de la joue, par une paupière, et pourtant l'érysipèle se se reproduire plus dès que l'on fait disparaître la cause prédisposante. Alors il deviendra plus facile de comprendre l'influence que l'irritation de l'ombilic

(1) *Ann. de méd.*, janvier, 1844.

pourra exercer sur le développement d'un érysipèle qui pourtant commencera par le puits. »

Mais les causes extérieures et locales ne sont pas les seules à mentionner. Dans une leçon clinique récente, M. Trousseau a lui-même reconnu que l'érysipèle des nouveau-nés semble être parfois la manifestation d'un état général peu appréciable dans son intimité, mais sans doute très-analogue à celui qui, dans certaines circonstances, favorise la fréquence et la gravité des maladies suites de couches. En effet, les épidémies de fièvres puerpérales coïncident très-souvent avec des maladies plus ou moins graves des nouveau-nés, telles que le muguet, les ophthalmies, la phlébite ombilicale, la péritonite, l'érysipèle, etc.

L'opinion de M. Trousseau, sur l'étiologie de la maladie, est assez conforme à celle de M. Richard, de Nancy, qui reconnaît dans l'érysipèle des nouveau-nés deux espèces distinctes : tantôt il est simple, de nature franchement inflammatoire, et ne reconnaît ordinairement que des causes directes ; tantôt il résulte d'une influence miasmatique : c'est celui qu'on remarque surtout dans les hôpitaux et les maisons d'enfants trouvés. Il faut l'attribuer à l'air corrompu qui remplit les salles encombrées de quelques hospices, surtout quand cet air est humide et froid (1).

Le docteur Martin, professeur à Léna, signale, parmi les causes les plus ordinaires de l'érysipèle chez les enfants, une rougeole antécédente, la vaccination avec de la lympho prise sur des enfants scrophuleux ou dartreux, le défaut de soins, et surtout une constipation épidémique (2).

L'érysipèle des enfants à la mamelle débute ordinairement sans fièvre préalable, sans troubles généraux. Ce n'est d'abord qu'une inflammation locale. On voit que très-souvent, au contraire, chez l'adulte, l'érysipèle est précédé de fièvre et de troubles dans les fonctions des viscères. Bientôt la maladie prend une marche plus rapide et se

(1) Richard de Nancy, *Traité prat. des mal. des enfants*, p. 524.

(2) *Gas. méd.*, 1845, p. 679.

propage de proche en proche à une grande distance du point primitivement envahi. « Ainsi, parti du pubis, il gagne le ventre, les lombes, les fesses, en même temps que les cuisses et les jambes. Du ventre il remonte à la poitrine, envahit les épaules, et de là descend d'un côté sous les bras, de l'autre peut remonter à la face et à la tête. Or, à mesure qu'il se généralise, il semble perdre quelque chose de son caractère inflammatoire ; de sorte que si, au début, la peau était tendue, gonflée et d'un rouge corusc, plus tard elle est à peine tuméfiée, si ce n'est aux mains, aux pieds et aux paupières, mais presque invariablement la rougeur est notablement moindre.

« Il arrive quelquefois que l'érysipèle, parti du pubis, descend seulement vers les extrémités inférieures, où il semble devoir épuiser son action ; déjà l'on croit être à la fin de la maladie quand tout-à-coup le tronc est envahi à son tour, et l'inflammation gagne les parties supérieures. Mais à mesure que le mal s'étend d'un côté, il abandonne la partie voisine, de sorte que lorsque, par exemple, la poitrine est occupée, le ventre et le pubis cessent de l'être. Il en résulte qu'en même temps les bras et les jambes peuvent être rouges et tuméfiés. Il semble alors, au premier abord, que l'érysipèle soit multiple ; car si, comme il arrive le plus souvent, l'inflammation n'a laissé aucune trace de son passage, pas même de la desquamation ou de l'astème, et qu'on voie l'enfant à la période de la maladie que je supposeis tout-à-l'heure, on sera tenté de croire que l'érysipèle a commencé simultanément par les quatre extrémités, ce qui n'arrive presque jamais.

« Quo si, pendant la première période de l'érysipèle, le mal marche en s'étendant de proche en proche, il n'en est pas de même lorsqu'il s'est une fois généralisé. Alors, en effet, il reparait par petits foyers répandus sur toute la surface du corps, lesquels deviennent à leur tour l'origine de nouveaux érysipèles. Aussi ne peut-on regarder un enfant comme guéri que si déjà, depuis plusieurs jours, toute rougeur a complètement disparu. » (Trousseau, loc. cit.)

Les symptômes généraux qui manquent au début de

L'affection survenant aussitôt que l'inflammation occupe une certaine étendue des téguments; la réaction, quelquefois très-vive, est caractérisée par une soif ardente, la fréquence du pouls et la chaleur de la peau. Mais cela n'est point constant et, dans des cas même très-graves, l'enfant continue de téter et ne présente presque aucun troubles fonctionnels. Plus tard, qu'il y ait eu réaction ou non, on remarque chez tous les enfants une décoloration de la face, de l'agitation, des cris incessants, de l'insomnie et quelquefois des vomissements, de la diarrhée, et enfin des convulsions. En même temps le pouls est ordinairement d'une fréquence et d'une faiblesse extrême. A ce point la mort ne tarde pas à survenir.

Les complications de l'érysipèle sont l'induration du tissu cellulaire, les abcès sous-cutanés, le muguet, l'entérite, la péritonite, enfin des inflammations bronchiques et pulmonaires. Ces maladies peuvent être méconnues pendant la vie et seulement constatées à l'ouverture des cadavres.

La durée de la maladie varie, d'après l'observation de M. Trouseau, de quatre jours à cinq semaines.

Quant au pronostic, il est extrêmement grave, surtout dans les hôpitaux et en temps d'épidémie. Selon beaucoup de médecins et d'après M. Trouseau lui-même, sa terminaison est moins souvent funeste dans les familles. L'âge exerce aussi une influence importante. « Je n'ai, dit ce professeur, jamais vu guérir d'enfants âgés de moins d'un mois; j'en ai vu guérir plusieurs de trois mois à un an. » Au-delà de cet âge l'érysipèle diffère peu de ce qu'il est chez l'adulte, par sa forme, ses caractères et sa terminaison.

Le traitement semble avoir peu d'influence sur l'issue de la maladie. M. Trouseau a essayé sans succès les émoullients sous toutes les formes. Les fomentations, les lotions, les bains, les pommades avec le sulfate de fer ne lui ont pas mieux réussi. « J'ai essayé, dit-il, d'envelopper tout le corps, tous les membres avec une bande de vésicatoire; l'érysipèle a franchi cet obstacle. J'ai, sans succès, appli-

qué des vésicatoires sur les surfaces déjà envahies par l'inflammation. Je n'ai retiré aucun avantage des pomma-
des mercurielles et des bains de sublimé ; enfin, en déses-
poir de cause, j'ai voulu user du moyen que les vétérinaires
emploient pour borner les inflammations phlegmoneuses
de mauvais caractère ; j'ai, avec le fer rouge, fait de nom-
breuses ostions sur le point où l'érysipèle prenait nais-
sance, et la marche de la maladie n'en a pas paru modifiée.
Il me semblait encore que, lorsque le mal envahissait
spécialement les membres, il pourrait être utile de faire
une compression méthodique ; j'empêchais par là la tumé-
faction ; mais l'érysipèle s'échappait de dessous mes bandes
et venait envahir le tronc où il défiait un moyen désormais
inapplicable (*loc. cit.*). —

Le traitement que préfère M. Martin, d'Éléa, consiste
dans l'application du coëon cardé sur la peau ; des émol-
lions d'amandes à l'intérieur ; en cas de forte fièvre et
d'inflammation de l'ombilic, de petites doses de tartre sti-
bié ou de calomel, et dans quelques cas des sangues.

M. Richard, de Nancy, qui, comme nous l'avons vu, ad-
met deux espèces d'érysipèle chez le nouveau-né, dit
n'avoir prescrit, dans la première, d'autres moyens que
d'envelopper l'enfant dans des linges de fil doux et usés, et
saupoudrés, chaque demi-heure, de farine de seigle dont
le contact doux et réfrigérant calmait le prurit et la cha-
leur pénible de la maladie. Mais il insiste avec raison sur
les précautions à prendre pour prévenir le développement
du mal que favorise l'extrême susceptibilité de la peau
chez les enfants. Ainsi on doit éviter, au moment de leur
naissance, de les laisser exposés au froid, ou de les appro-
cher d'un foyer trop ardent. On doit s'abstenir le plus
possible, en cas de maladie, des applications de moutarde
et même des cataplasmes émollients, qui, appliqués sur
la peau rubéfiée, sur des vésicatoires ou des boutons de
vaccine, favorisent l'extension de l'érysipèle ou même en
déterminent le développement.

Dans l'érysipèle de mauvaise nature ou gangréneux, le
même praticien préconise des lotions avec l'eau-de-vie

campêrée, avec la liqueur de Labarraque affaiblie par cinq fois son volume d'eau ; les tologiques avec le quinquina et des substances aromatiques, déjà conseillées par Underwood, sont des moyens non moins rationnels. Mais le seul qui ait une efficacité incontestable, c'est de soustraire l'enfant aux émanations viciées au milieu desquelles il est plongé dans l'hôpital. A quelque degré qu'un enfant soit menacé dans son existence par un érysipèle, si l'on peut déterminer une nourrice à s'en charger, on voit souvent l'air pur de la campagne remplacer avantageusement toutes les autres ressources de la thérapeutique.

ARTICLE III.

MILIAIRE.

Cette affection a une certaine importance, mais sa fréquence n'est pas assez grande pour que nous ayons pu recueillir les éléments d'une description complète de cette maladie chez les enfants. Nous avons seulement remarqué, soit à l'hôpital, soit dans notre pratique particulière, qu'on rencontre, tous les étés, quelques enfants atteints de symptômes fébriles, en général fort légers, avec sueurs abondantes, et bientôt apparition d'un grand nombre de vésicules stercorées entourées d'une petite auréole rouge. Cette éruption miliaire dure un petit nombre de jours et se termine par la santé. Cette maladie rappelle à un faible degré la suette épidémique qu'on observe dans quelques localités; mais à l'état sporadique elle est presque constamment sans gravité. Cependant nous avons observé à l'hôpital des Enfants-malades un petit garçon âgé de deux ans, chez lequel des sueurs excessivement abondantes avec éruption miliaire rouge, furent précédées et accompagnées de symptômes ataxiques et adynamiques très-graves qui amenèrent la mort. Cette affection ne laissa point sur le cadavre des lésions qui pussent rendre compte des symptômes. La seule altération

qui fut constatée consistait dans une foule de petites taches hyperémiques et quelquefois hémorrhagiques à la surface des plèvres, au dessous d'elles et même dans l'épaisseur du poumon. La fièvre miliaire maligne, dont ce cas était un exemple, réclame les mêmes modes de traitement que les fièvres éruptives graves. Quant à la miliaire bénigne, des rafraichissans locaux et généraux nous ont toujours réussi.

ARTICLE IV.

VARICELLE.

La varicelle ou variolette, vérolette, petite vérole volante, etc., est une affection fébrile caractérisée par une éruption de vésicules quelquefois pustuleuses dont la dessiccation a lieu du cinquième au septième ou huitième jour.

L'enfance est plus exposée à cette maladie que les autres âges. On l'observe plus souvent au printemps qu'aux autres époques de l'année. On la rencontre surtout pendant les temps d'épidémie varicélique, et il est assez ordinaire alors de voir sa fréquence augmenter à mesure que la variole commence à décroître. Elle atteint de préférence les sujets qui ont été antérieurement variolés ou vaccinés.

La contagion a été niée par plusieurs auteurs. Il est vrai que l'inoculation est beaucoup plus souvent sans effets que dans le cas de variole ; mais, comme on l'a vue réussir entre les mains de quelques praticiens recommandables, on ne saurait nier le caractère contagieux de la varicelle. Seulement il est prouvé qu'il existe dans cette maladie à un degré moindre que dans la variole.

La varicelle se présente sous plusieurs formes ou variétés qui sont : la varicelle vésiculeuse, la varicelle pustuleuse, la varicelle papuleuse et la fièvre varicelleuse sans éruption. Ces quatre variétés ont des symptômes généraux analoges à ceux de toutes les fièvres éruptives et qui précèdent

l'éruption d'un à deux ou trois jours. Ce sont : un malaise général, de l'abattement, de la fièvre avec soif, inappétence, céphalalgie, etc. Souvent il y a des tousses, quelquefois même des vomissements et des douleurs épigastriques; la peau est chaude, la face injectée, le pouls accéléré, etc. Assez ordinairement ces accidents généraux ne cessent pas lors de l'éruption, et continuent jusqu'à la période de dessiccation des boutons, ou du moins jusqu'à ce que soit achevée la dernière des éruptions successives par lesquelles la maladie se manifeste. En général, plus le caractère pustuleux est prononcé dans les boutons, plus les symptômes généraux ont d'intensité.

La varicelle vésiculeuse (*chicken-pox*, *vérole de poulet*, des Anglais) débute par de légers points rouges qui forment bientôt des vésicules contenant un fluide séreux, d'abord blanc, puis jaunâtre, et entourées d'une auréole légèrement enflammée; le quatrième jour elles se vident, se rident, et présentent une croûte qui s'est formée dans leur centre; cette croûte devient noirâtre, dore, et se détache vers le septième jour; la peau reste maculée pendant quelques semaines. Dans la varicelle pustuleuse (*swine-pox*, *vérole de porc*, des Anglais), les boutons ont une forme conoïde ou globuleuse, ne sont jamais complètement transparents, même dès le début, et contiennent un liquide laiteux, puriforme. Leur base est plus enflammée que dans la varicelle vésiculeuse, et ce caractère, joint à l'opacité du liquide, rapproche jusqu'à un certain point cette maladie de la variole. Cependant il est très-rare d'y rencontrer des pustoles ombiliquées. Du sixième au huitième jour, la dessiccation s'opère et marche rapidement. C'est dans cette variété que s'observent surtout les éruptions successives qui distinguent complètement la maladie des affections varioleuses, et auxquelles on peut s'attendre tant que les symptômes fébriles n'ont pas disparu. La varicelle papuleuse ne diffère des autres variétés qu'en ce que la plupart des élevures s'affaissent sans être suivies de croûtes et ne contiennent dans leur intérieur ni sérosité ni matière pseudo-membraneuse ou purulente. Souvent

elles sont entremêlées de vésicules ou de pustules appartenant aux autres variétés. Quant à la fièvre varicelleuse sans éruption, admise par M. Eichorn et M. Rayer, son existence n'est pas généralement admise. Son nom indique d'ailleurs en quoi elle consiste, et c'est dans le cas d'épidémie varicelleuse qu'elle doit surtout se rencontrer.

Après l'examen des diverses opinions formulées sur la nature de la varicelle, et l'observation des faits que nous avons rencontrés dans notre pratique, nous pensons que cette affection s'éloigne beaucoup des affections varioleuses, mais qu'il y a néanmoins de la variole confluentes à la varioloïde, et de celle-ci à la varicelle, trop de nuances graduées et presque insensibles pour qu'on puisse admettre une différence radicale de nature entre les maladies varioleuses et la varicelle. Dans celle-ci, il paraît prouvé 1° que le caractère contagieux s'est affaibli au point de disparaître, 2° que la vaccine ou une variole antérieure a peu d'influence sur son développement, 3° que la varicelle n'a ni la gravité, ni la régularité qui appartiennent aux éruptions varioleuses.

Le traitement de la varicelle est d'ailleurs fort simple : c'est celui que nous avons recommandé dans les fièvres éruptives simples et légères. Il exige le repos au lit, la diète, des boissons émollientes ou mucilagineuses, quelques pédiluves et des lavements simples.

ARTICLE V.

VACCINE.

Notre intention n'est pas de faire ici une description complète et détaillée de la vaccine, ni surtout de traiter de la question au point de vue historique. Nous nous bornerons à un résumé pratique sur cette intéressante maladie.

La vaccine est caractérisée par des pustoles vésiculeuses argentines, larges, aplaties, multiloculaires, déprimées au

centre, entourée d'une auréole inflammatoire, donnant lieu à une croûte brunâtre qui commence à se former vers le dixième jour, pour tomber au vingtième ou vingt-cinquième jour. Elle se développe, soit accidentellement, comme il arrive aux filles et garçons de basse-cour qui traient les vaches affectées du *cor-pur* (vérole de vache) ayant des écorchures aux mains; soit artificiellement, au moyen des procédés employés par l'art dont nous parlerons plus loin.

L'éruption des pustules est précédée d'une période d'incubation pendant laquelle il ne s'accomplit aucun changement dans la partie sur laquelle le virus a été porté. La petite plaie produite par l'inoculation se cicatrise de la même manière que si elle avait été faite avec un instrument non chargé de vaccin. C'est le troisième ou le quatrième jour que le début de la période inflammatoire s'annonce par une élévation de la peau accompagnée de rougeur. Bientôt, à mesure que l'une et l'autre augmentent, des démangeaisons se font sentir. Vers le sixième jour, la teinte rouge s'éclaircit, l'élévation circulaire s'élargit et augmente, et la cicatrice résultant de la piqûre paraît déprimée; la base du bouton devient rouge. Le septième et le huitième jour ces caractères se prononcent de plus en plus. La matière sécrétée sous l'épiderme le soulève et l'écarte du derme, excepté dans le centre; le bouton offre un aspect argenté dû au liquide qu'il renferme, l'auréole inflammatoire de la base s'étend et devient plus vive. Jusqu'au onzième jour inclusivement l'inflammation va en augmentant et ressemble à une plaque érysipélateuse-phlegmoneuse qui fait parfois le tour du bras. Le malade éprouve une démangeaison vive, une chaleur mordicante, de la pesanteur dans les bras, si ces membres sont le siège de la vaccine, et quelquefois une douleur dans l'aisselle. A cet état local se joignent quelquefois des nausées, des vomissements, du malaise et même un peu de fièvre. Vers le douzième jour commence la troisième période, celle de dessiccation; la dépression centrale prend l'apparence d'une croûte; le liquide sous-épidermique

prend une teinte trouble et opaline, et l'aurole s'efface tout en conservant une teinte légèrement pourprée. Si l'on pique le bouton, le liquide qui en sort est puriforme, et non pas séreux comme les jours précédents. Plus tard, la croûte, solide, dure, polie et douce au toucher, prend une couleur très-foncée; elle tombe ordinairement du vingt-quatrième au vingt-septième jour, et est quelquefois remplacée par une autre, de couleur légèrement jaune, mais le plus souvent laisse à nu une cicatrice profonde, semblable aux dépressions que laisse après elle la petite vérole. Cette cicatrice est gaufrée, parsemée de petits points noirs. Plus elle est récente, plus elle est marquée; au contraire, plus elle est ancienne et plus elle se confond avec les téguments, mais elle ne s'efface jamais complètement.

Les principales variétés ou anomalies de la vaccine sont les suivantes : 1° il ne se déclare quelquefois qu'une ou deux pustules à la suite d'un plus grand nombre de piqûres; 2° la période d'incubation peut se prolonger pendant trois ou quatre semaines ou ne durer qu'un ou deux jours; 3° la réunion accidentelle de deux pustules trop rapprochées donne quelquefois lieu à une pustule d'une forme irrégulière et, en apparence, anormale; 4° l'insertion du virus vaccin peut produire sur un même individu la vaccine vraie et une fausse vaccine; 5° des pustules vaccinales peuvent se déclarer sur des points du corps où l'inoculation n'a pas été pratiquée, soit que le vacciné ait transporté le virus, après avoir gratté les pustules, sur des parties extérieures, soit qu'il se produise une éruption secondaire analogue à celle qui a lieu plus souvent après l'inoculation de la variole; 6° quelquefois la vaccination développe des symptômes généraux sans éruption. Quoique cette forme de la vaccine paraisse également préservative de la variole, il est prudent de tenter une nouvelle vaccination.

La fausse vaccine débute dès le premier ou le second jour de la vaccination et marche très-rapidement. Sa durée est de sept ou huit jours au plus; elle finit à l'époque où la

véritables vaccins est dans toute sa force. Outre ces différences dans la marche des deux affections, on remarque dans la lésion vaccinale l'absence de dépression centrale, d'éclat argenté, de bourrelet à la base du bouton qui s'élève rapidement en pointe dont le sommet se creève et laisse échapper une matière jaundée qui, en séchant, ressemble à de la gomme.

Un excès d'inflammation accompagne parfois la vaccine, surtout lorsque le virus provient des pustules d'une vache affectée de cow-pox, ou qu'il n'a pas été affaibli par un grand nombre de transmissions successives. C'est dans ces circonstances que l'on voit survenir un gonflement érythémateux ou même phlegmoneux du membre. La peau ainsi enflammée peut se couvrir de vésicules ou de pustoles qui d'ailleurs n'ont rien de commun par leur nature avec celles de la vaccine, et l'extension de l'irritation peut produire un gonflement des glandes axillaires. D'autres fois il se développe un état fébrile assez intense. Mais, de toutes les complications de la vaccine, la plus remarquable est la variole. On l'observe surtout pendant les épidémies de petite vérole, ou chez des sujets qui ont été exposés à la contagion varioleuse. On voit alors les deux maladies suivre leur marche aussi régulièrement que si elles existaient chez deux sujets séparés l'une de l'autre. Le virus des pustoles vaccinales inocule la vaccine comme à l'ordinaire, de même que le virus des pustoles varioleuses inocule la variole. Cependant on a obtenu quelquefois des résultats différents, et le pus des boutons varioleux a donné lieu par l'inoculation à des pustules vaccinales. Il y a plus : « Qu'on mêle ensemble les deux virus, dit M. Bousquet, et qu'on inocule ce mélange, au lieu de se neutraliser et de s'altérer, ils développeront deux éruptions conformes à leur double origine. » Cette expérience a été répétée plusieurs fois; elle prouve que la variole et la vaccine ne sont point identiques.

Le traitement de la vaccine est fort simple et se borne à l'expectation. Il suffit de tenir les enfants à une température douce, de diminuer un peu leur alimentation. Si

les pustules s'accompagnent d'érysipèle ou de gonflement phlegmoneux, on emploie les émollients ou de légers astringents, tels que l'eau vinaigrée ou la solution d'acétate de plomb. Il est rare que les émissions sanguines deviennent nécessaires.

Nous allons brièvement décrire les procédés d'inoculation généralement suivis de nos jours : ce sont l'incision et la piqûre. Pour inoculer par incision on embrasse avec la main gauche le bras de l'enfant, de manière à tendre en sens inverse, avec le pouce et l'indicateur, la peau de la face externe du membre; de la droite, le chirurgien tient sa lancette, la lame en ligne avec le manche, le tranchant perpendiculairement dirigé contre la peau; il divise celle-ci très-superficiellement, dans l'étendue de cinq millimètres, de manière à n'intéresser que le corps muqueux, et l'opération est faite. Autrefois on plaçait dans la petite plaie des fils imbibés de vaccin, ou des croûtes vaccinales réduites en poudre. Mais le passage de l'instrument chargé de virus suffit pour déterminer l'inoculation.

Pour inoculer par piqûre on peut se servir de tout instrument aigu et assez bien affilé pour diviser nettement l'épiderme. C'est la lancette ordinaire qu'on préfère en général. Le médecin saisit le bras, comme pour pratiquer l'incision; de l'autre main il tient la lancette préalablement chargée, il en glisse la pointe à plat sous l'épiderme, obliquement de haut en bas, à la profondeur d'une demi-ligne ou d'une ligne. Cela fait, il la retire doucement en sens inverse de celui où elle a été introduite. Il n'est pas nécessaire d'appliquer le pouce sur la pointe de l'instrument, comme pour l'essuyer contre les lèvres de la plaie, ni de le retourner plusieurs fois sens dessus dessous avant de le retirer; mais il est utile de le laisser quelques secondes en place, afin de faciliter l'absorption du virus, surtout quand on emploie un vaccin épais, consistant, desséché ou fortement adhérent à l'instrument. Il est encore deux précautions indispensables au succès de l'opération : la première consiste à bien tendre la peau, afin que les lèvres de la petite plaie, en revenant sur elles-

mêmes, retiennent le virus; la seconde, à tenir l'instrument la pointe en bas, afin que le fluide ne reflue pas vers la base de la lame au lieu de s'insinuer dans la plaie.

On fait généralement trois ou quatre piqûres à chaque bras. Il est très-probable qu'une seule pustule suffit pour préserver de la variole, mais il n'y a pas d'inconvénient à en produire plusieurs que quelques médecins croient nécessaires pour être à l'abri de l'infection varioleuse pendant plus longtemps et plus sûrement.

L'enfance est plus favorable qu'un âge avancé au succès de la vaccination. Cependant les enfants nouveau-nés font exception. Chez eux elle manque deux fois sur trois, dit M. Bayet; tandis qu'elle réussit presque constamment un ou deux mois après la naissance. Les chaleurs de l'été favorisent le développement de la vaccine et hâtent sa marche, tandis que les froûds rigoureux la retardent.

Les individus sains ne demandent aucune préparation avant d'être vaccinés. Néanmoins, chez les adultes et les vieillards, il convient quelquefois de combattre la rigidité de la peau par des bains, des lotions, des cataplasmes émollients, la veille de l'insertion du vaccin. Chez les enfants faibles, il faut frotter la peau avec une serviette un peu rude, afin d'y exciter une certaine irritation qui, en augmentant ses propriétés vitales, favorise l'absorption. On est ainsi parvenu à insérer le vaccin à des individus chez lesquels on avait déjà pratiqué plusieurs fois inutilement la vaccination.

Quant aux revaccinations, nous sommes de ceux qui les croient utiles. Nous pensons, comme d'autres médecins, qu'une seule vaccine n'épuise pas chez tous les sujets l'appétitude à contracter la variole; que chez d'autres sa vertu préservatrice n'est que temporaire. La prudence autorise donc la répétition d'une petite opération, innocente par elle-même, et dont le bienfait peut être considérable.

ARTICLE VI.

PURPURA.

Cette maladie qui est souvent grave chez les enfants, mais qui heureusement n'est pas très-fréquente, tantôt existe comme maladie simple, tantôt se joint aux fièvres éruptives, à la variole surtout, dont elle est une complication des plus fâcheuses. Sous sa forme la plus légère, on peut, sans inconvénient pour le praticien, la considérer comme une affection locale de la peau, quoiqu'il soit plus rationnel d'y voir l'effet d'une cause interne dont l'action est heureusement trop faible pour troubler les grandes fonctions. Mais sous sa forme grave, c'est-à-dire accompagnée de fièvre, d'hémorrhagies par les muqueuses, et de symptômes ataxiques, il est impossible de ne pas la faire consister dans une altération profonde du fluide sanguin.

Son caractère anatomique essentiel consiste dans des taches rouges, pourprées ou livides, de dimensions variables, provenant d'une effusion de sang entre le derme et l'épiderme. Toute tache de la peau provenant de cette cause est une tache pourprée, une pétéchie, une espèce d'ecchymose si l'on veut. On voit dès-lors la différence qui sépare ces taches des taches roses lenticulaires de la fièvre typhoïde que quelques auteurs, même de nos jours, nomment si improprement pétéchies. Les véritables pétéchies sont rares dans les dothinentéries ordinaires et ne se rencontrent guères que dans les plus graves, qui se rapprochent alors beaucoup du véritable typhos.

La maladie pourprée est très-connue sous le nom de *maladie tachetée hémorrhagique* de Werlhof; Pierquin l'appelle *hémorélinose*, Alibert, *pétiote*, etc. Les deux principales variétés peuvent être décrites à part.

Le *purpura simplex* est une maladie légère, dont la durée, quelquefois très-longue, est le seul inconvénient sérieux. Tous les auteurs ont noté sa fréquence chez les

enfants dont la prédisposition semble résulter, soit directement de l'âge, soit de ce que la finesse et la délicatesse de la peau favorisent les hémorrhagies interstitielles de cette membrane. Le tempérament lymphatique, la faiblesse de la constitution, un régime débilitant, le froid humide, sont les conditions les plus ordinaires au milieu desquelles survient la maladie qui se déclare aussi quelquefois dans des circonstances opposées, sous l'influence de causes difficiles à déterminer.

Le purpura simplex attaque surtout les membres inférieurs. Quand il devient général, c'est presque toujours par les jambes qu'il débute, pour envahir ensuite les bras, et le tronc en dernier lieu.

Dans les cas les plus simples, l'éruption se fait d'emblée sans être précédée de troubles généraux notables. D'autres fois on constate un peu de malaise, d'anorexie, de faiblesse, de lassitude dans les membres; nous avons vu dans quelques cas un mouvement fébrile peu intense. L'éruption varie beaucoup dans son mode d'apparition et dans sa marche ultérieure. S'accomplissant dans l'espace de quelques heures, elle peut ensuite diminuer, disparaître graduellement, après une ou deux semaines, pour ne plus revenir. Chez d'autres malades, à mesure que les premières taches s'effacent, d'autres leur succèdent, de telle manière que l'enchaînement de ces éruptions successives donne à la maladie une durée parfois très-longue. Il arrive aussi que les éruptions successives sont séparées par des intervalles plus ou moins considérables. Ainsi le purpura présente tantôt une marche aiguë, tantôt une marche chronique.

Considérée en elle-même la tache pourprée est d'un rouge violacé plus ou moins foncé suivant l'activité de la circulation. Au bout de quelques jours elle prend une teinte plus sombre, puis jaunit et disparaît à la manière de l'ecchymose. Son caractère le plus important, en ce qu'il la distingue de toute espèce d'érythème, est de conserver sa couleur sous le doigt qui la comprime. D'ailleurs elle ne fait aucune saillie appréciable, présente générale-

ment une forme arrondie et les dimensions d'une lentille; elle est toujours séparée des taches qui l'avoisinent par des intervalles de peau saine.

Jusqu'ici le purpura simplex chronique nous a paru moins fréquent chez les enfants que chez les adultes. Chez les premiers, la maladie est plus souvent aiguë.

Le pronostic n'est jamais grave.

Le traitement varie suivant les conditions étiologiques. Quand il y a débilité, on prescrit un régime analeptique, des vins cordiaux et généreux, des tisanes amères et des préparations ferrugineuses. Les bains froids et les bains aromatiques agissant comme toniques généraux et locaux doivent être mis en usage. Quand le purpura paraît au contraire tenir à un état sthénique, il ne faut pas craindre d'employer les émissions sanguines, les bains entiers tièdes ou froids, les boissons fraîches, acidulées, le repos, un régime doux, etc.

Les causes du purpura grave sont restées jusqu'ici fort obscures. Toutes celles dont on peut apprécier l'action ne sont généralement qu'occasionnelles et par conséquent variables. Quant à celle qui détermine l'altération spéciale du sang, incontestable dans cette maladie, nous ne la connaissons nullement; de même que nous ignorons ainsi en quoi consiste cette altération.

Outre tous les caractères locaux que nous avons signalés dans le purpura simple, on en constate d'autres dans le purpura grave. Presque constamment il y a deux espèces de taches, les unes sous-épidermiques sont celles que nous avons déjà décrites; les autres sont beaucoup plus foncées, noires dès les premiers instants de leur formation et souvent assez étendues; on reconnaît à l'autopsie qu'elles sont dues à des infiltrations sanguines au-dessous de la peau. La structure lâche du tissu cellulaire permet au sang de former une couche plus épaisse et comme une espèce de caillot qui dès-lors a une couleur noire que n'offrent presque jamais les taches sous-épidermiques dues à une couche de sang excessivement mince. Dans quelques cas, les taches sous-cutanées deviennent de vastes ecchy-

masses diffuses. Les deux espèces de taches du purpura grave se montrent ordinairement sur tout le corps et n'ont pas une préférence bien marquée pour les membres inférieurs.

C'est surtout à la coïncidence d'autres hémorrhagies que le purpura doit sa gravité. Elles ont lieu par les diverses régions de la membrane tégumentaire interne, mais surtout par la muqueuse nasale, par celle de l'estomac et de l'intestin. Chez les enfants, on observe plus rarement les hémorrhagies des voies respiratoires et de la muqueuse génito-urinaire. Ces hémorrhagies internes sont plus ou moins abondantes, se prolongent souvent, résistent à tous les moyens de l'art et deviennent la cause de la mort. Non-seulement elles s'opèrent par exhalation à la surface des muqueuses, mais presque constamment on trouve à l'autopsie des hémorrhagies interstitielles au-dessous et dans l'épaisseur de ces membranes. On en trouve également dans le parenchyme de certains organes comme le poulmon, le foie, les reins, le cerveau, dans les muscles, sous le périoste, et dans les différentes régions de tissu cellulaire superficiel et profond. Rien ne dénote niens la profonde décomposition du sang et le caractère d'une maladie générale que cette dissémination des lésions hémorrhagiques dans tous les organes.

Aussi les désordres fonctionnels qui accompagnent cette affection sont généralement très-graves. Latham les a exactement décrits. « Cette singulière maladie, dit-il, est accompagnée d'une extrême débilité et d'une grande prostration des forces; le pouls est ordinairement faible et quelquefois fréquent; la chaleur, la rougeur, la sueur et les autres symptômes caractéristiques d'une légère irritation fébrile ont lieu, comme dans les paratyphes de la fièvre hectique. Chez quelques malades, des douleurs profondes se font sentir à la région précordiale, à la poitrine, aux lombes ou dans l'abdomen; chez d'autres, une toux forte se manifeste ou bien l'épigastre et les hypochondres sont proéminents et tendus, sensibles à la pression; il y a constipation, ou les fonctions intestinales se

sont d'une manière irrégulière ; mais dans plusieurs cas, il n'y a pas de fièvre, et les fonctions des intestins ne sont point dérangées. Quelquefois de fréquentes syncopes ont lieu. Lorsque la maladie a duré quelque temps, le teint du malade devient pâle et plombé. L'émaciation fait des progrès ; les extrémités s'ordonnent, et ces ordèmes s'étendent par la suite sur les autres parties du corps (1). « Le tableau tracé par Boerhaave s'applique aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Nous ajouterons que l'on constate souvent du délire, une agitation vive, des anxiétés presque continuelles, une altération profonde du faciès, tous symptômes qui, réunis au mauvais état des forces et de la circulation, donnent à la maladie un caractère véritablement ataxique et malin.

Le purpura que nous venons de décrire est souvent une maladie mortelle. Quelquefois il paraît sans danger au début, mais revêt ensuite des caractères alarmants. Ceux-ci dépendent, soit des hémorrhagies internes, soit des symptômes ataxiques. Nous avons vu des enfants succomber en peu de jours à cette affection, qui n'est jamais plus grave que lorsqu'elle complique les fièvres éruptives, ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs.

Les auteurs ont admis que le purpura se déclarant quelquefois chez des sujets sains et pléthoriques, pouvait réclamer un traitement antiphlogistique. Sans contredire cette assertion, qui est peut-être plus applicable aux adultes qu'aux enfants, nous dirons que chez ceux-ci les conditions de l'état sthénique ne se sont jamais présentées à notre observation. C'est donc bien certainement à d'autres médicaments qu'aux antiphlogistiques qu'il faut s'adresser au moins dans la plupart des cas. Il faut préférer les toniques, les astringents et les réfrigérants. Ces divers moyens nous paraissent devoir être combinés et simultanément employés dans tous les cas graves ; car les toniques demandant un certain temps pour agir, des hémorrhagies abondantes pourraient, avant leur effet, emporter le ma-

(1) *Abregeé prat. des malad. de la peau*, traduct. française, p. 147.

lade. On pense d'ailleurs que les toniques sont contre-indiqués dans les cas de douleurs internes et profondes signalées par Bateman. A part les cas de ce genre, on prescrit comme toniques, et généralement à haute dose, les vins généreux, l'extract de quinquina aiguisé avec l'eau de Rabel, et les ferrugineux. On y joint un régime succulent quand les circonstances le permettent, c'est-à-dire quand il n'y a ni fièvre, ni troubles généraux graves de l'économie. De tous les astringents, c'est la racine de ratanhia qui paraît avoir le plus d'avantages d'après les faits de guérison rapportés par MM. Brochet, Wielt et Gibert. On la donne à haute dose, en extract sous forme de bols, ou en boisson sous forme de décoction aiguisée avec l'eau de Rabel. Contre les hémorrhagies des surfaces muqueuses, on prescrit les lotions ou injections d'eau à la glace, acidulées et rendues styptiques. Si l'abondance de l'hémorrhagie est alarmante, on pratique le tamponnement quand il est possible, et il faut alors le faire avec beaucoup de soin, parce que le sang a perdu sa coagulabilité ordinaire. Suivant MM. Carenave et Schedel, les ablutions d'eau froide sur tout le corps ont paru quelquefois très-utiles, et peut-être des bains de pluie froids ne seraient-ils pas moins avantageux. Les douleurs qui existent dans différentes parties du corps ne peuvent guère être combattues que par l'opium. Dans la convalescence, on fait respirer un bon air, habiter un endroit frais et sec, suivre un régime doux, composé de gelées animales, d'un peu de viandes blanches rôties, de bon vin étendu d'eau, etc. Enfin, on continue quelques toniques, surtout les boissons ferrugineuses.

ARTICLE VII.

FEMELLES ET VENEREUS DES NOUVEAUX-NÉS.

Avant de décrire les dartres et les teignes, qui s'observent le plus fréquemment aux diverses époques de l'enfance, nous devons dire quelques mots de deux maladies

qu'en remarque chez les enfants nouveau-nés, et qui offrent un certain intérêt sous ce rapport qu'elles ont été pendant longtemps confondues avec certaines formes de syphilide. Ces deux maladies sont les pustules et le pœmpygn. C'est à M. Valleix que nous devons d'avoir démontré qu'en l'absence d'autres symptômes syphilitiques, ces maladies cutanées sont essentiellement simples et peu graves.

« Les enfants nouveau-nés, dit M. Valleix, présentent très-fréquemment, sur les différentes parties du corps, des pustules dont je n'ai pas trouvé de bonnes descriptions dans les ouvrages spécialement consacrés aux maladies de la peau (1). » Elles sont formées par un soulèvement de l'épiderme, de forme lenticulaire, d'une étendue variant entre un demi-millimètre et trois ou quatre millimètres; la couleur de cette élévation est d'un blanc plus ou moins éclatant. Le plus souvent autour d'elle existe une aréole rouge. Quand on perce l'épiderme avec une épingle, on voit s'écouler un liquide peu épais et louche chez quelques sujets, un peu plus épais et tout-à-fait blanc chez d'autres. Après l'écoulement du liquide et la séparation de l'épiderme, le derme est rouge, humide, mais non excorié, ni épaisi, en sorte qu'il n'y a ni ulcération de la peau, ni saillie dure à la base de la pustule. A côté des pustules que nous venons de décrire, on trouve quelquefois de petites rougeurs peu vives, très-légèrement saillantes, sur lesquelles l'épiderme ne se décolle pas; cette lésion n'est que le commencement de la première. La terminaison a lieu de deux manières: si l'épiderme a été rompu, soit par une piqure, soit par le frottement, il ne se forme pas de croûte; l'épiderme se détache, et le derme, d'abord rouge, un peu humide, et ensuite sec, reprend bientôt son aspect ordinaire. Si, au contraire, l'épiderme est resté intact, le pus se dessèche; il se forme une légère croûte brune, qui, au bout d'un jour ou deux, tombe et laisse à nu le derme sec et seulement un peu rouge. Ces pustules siègent à peu près indifféremment sur tous les points du corps. Elles ne sont,

(1) *Clinique des Maladies des enf. nouveu-nés.* p. 664.

d'ailleurs, accompagnées d'aucun symptôme local, ni d'aucun trouble notable de la santé. On les rencontre également chez des sujets forts, bien constitués, exempts de toute autre maladie, et chez ceux qui sont faibles ou affectés du muguet, d'ordone ou de pneumonie. Cette éruption se termine d'elle-même en peu de jours. On ne peut la confondre avec les pustules d'ecthyma qui s'accompagnent d'induration du derme à leur base, et souvent même d'ulcération qui persiste un certain temps. L'ecthyma infantile de Willan ne se manifeste que chez les enfants cachectiques, qui ont déjà passé l'âge d'un ou deux ans. Quant au traitement, l'affection n'est point assez importante pour en exiger un. Il est dès-lors bien inutile et dangereux, dans les hôpitaux d'enfants-tremiers, de faire séjourner les enfants qui en sont atteints dans les infirmeries, où ils contractent si facilement d'autres maladies plus graves. Cette affection qu'on a tort de considérer comme suspecte en l'absence de tout autre symptôme de syphilis, n'est pas un motif suffisant pour retarder le transport de l'enfant à la campagne et pour différer de lui donner une nourrice.

Les mêmes réflexions sont applicables au pemphigus, qui par lui seul ne trouble jamais la santé d'une manière notable et ne réclame aucun traitement. Si l'on a admis le contraire, c'est qu'on a méconnu la coïncidence d'autres maladies graves. D'ailleurs le pemphigus se reconnaît à des bulles arrondies, jaunâtres, saillantes de deux à cinq millimètres, ayant l'étendue d'un ou deux centimètres carrés, entourées d'une aréole rouge, et dues à l'épiderme soulevé par une accumulation de sérosité jaunâtre qui s'écoule rapidement dès qu'on le perce. Au-dessous de l'épiderme on trouve le derme humide et rouge, sans altération appréciable. Si on laisse l'épiderme en place, il se forme une croûte qui tombe après quelques jours, ne laissant d'autres traces qu'une légère rougeur qui disparaît bientôt. Ce mode de disparition et l'absence de tout autre symptôme de syphilis prouve que le pemphigus n'est point un effet de cette maladie.

ARTICLE VIII.

DARTRES ET TEIGNES.

Les maladies chroniques de la peau ou *dartres* sont fréquentes chez les enfants. Nous mentionnerons surtout l'eczéma chronique, la gale, l'ecthyma, l'impétigo, le porrigo, le prurigo, la lèpre vulgaire, le pityriasis et le lusus scrophuleux. La plupart de ces maladies, lorsqu'elles siègent sur le tronc ou sur les membres, n'offrent rien de particulier à l'enfance; mais celles qui siègent à la tête et qui ont reçu le nom de *teignes*, sont plus spéciales à cet âge. Celles-ci se distinguent en fausses et en vraies. Les premières se rapportent aux genres eczéma, impétigo, pityriasis; les secondes au genre favus ou porrigo. Ces maladies ne diffèrent des dartres ordinaires que par leur siège, et l'on s'explique la prédisposition du cuir chevelu à en être affecté dans l'enfance par la vitalité active et le développement prépondérant des organes céphaliques à cette époque de la vie. Après l'âge, on trouve comme causes prédisposantes ou occasionnelles, l'hérédité, une constitution faible, un tempérament lymphatique, un mauvais régime, la misère, la malpropreté et autres mauvaises conditions hygiéniques. Le vice humoral qui préside au développement des dartres peut encore moins être contesté pour celui des teignes. Quant à la contagion, elle n'existe que pour le favus; les fausses teignes ne sont point contagieuses.

Eczéma. — Cette maladie est caractérisée par des vésicules très-petites, peu saillantes, ordinairement confluentes, qui se vident rapidement du fluide qu'elles renferment et donnent lieu à une légère desquamation épidermique ou à un suintement séreux abondant qui se concrète en croûtes lamelleuses plus ou moins épaisses et reposant sur un fond rouge et enflammé. Lorsque la suppuration est tarie, les croûtes cessent de se former, se détachent bientôt, et ne laissent après elles qu'une teinte rouge antécédant

la persistance d'une inflammation chronique qu'il est important d'achever de guérir pour prévenir la récurrence de l'eczéma. Les variétés que cette maladie peut présenter sont très-nombreuses ; nous ne parlerons ici que de celles qui sont plus spéciales à l'enfance, c'est-à-dire de l'eczéma de la face et de celui du cuir chevelu.

L'eczéma de la face présente des vésicules, en général petites à voir, qui débuteent surtout sur les joues ou sur le front, et envahissent le reste de la face plus ou moins rapidement. En même temps la peau rougit et le visage se tuméfié. Bientôt les vésicules crèvent et laissent suinter un fluide séreux, abondant, qui se concrète rapidement et forme des lamelles peu épaisses. A mesure que la maladie fait des progrès, la peau de la face devient plus rouge, plus chaude, plus tuméfiée; elle paraît brillante et amincie. Lorsque l'inflammation marche à la guérison, on voit le suintement séreux diminuer et tarir, les croûtes se détacher, la rougeur diminuer. Ce dernier phénomène ne disparaît complètement que très-tard.

L'eczéma du cuir chevelu (*teigne vésiculaire* et *spahi-manne*) occupe une étendue variable de la tête. Les vésicules, d'abord disséminées, forment des croûtes minces qui deviennent plus épaisses à mesure que le suintement continue. Ces croûtes sont lamelleuses, jaunes ou brunes. L'eczéma s'étend graduellement et s'accompagne souvent d'un état inflammatoire très-prononcé. Au-dessous des croûtes le cuir chevelu est rouge, gonflé, tendu, et le siège d'une démangeaison extrêmement vive qui redouble lorsque la tête est découverte et exposée à l'air, et qui pousse les enfants d'une manière irrésistible à se gratter avec violence, si on leur laisse les mains en liberté. Les croûtes de l'eczéma présentent en général des caractères qui, alors même que la présence des vésicules est difficile à constater, permettent de reconnaître la nature de la maladie. Elles ne sont jamais très-épaisses; leur surface n'est pas inégale, irrégulière, comme celle des croûtes d'impétigo; les cheveux qu'elles enveloppent ne sont pas hérissés de concrétions grâtres que l'on observe dans certaines va-

riétés de teigne pustuleuse. Une variété curieuse, mais assez rare, de la teigne eczémateuse est celle qu'Alibert a nommée *amiantacée*, et dans laquelle la matière fournie par les vésicules forme des écailles micacées, luisantes, argentines, qui unissent les cheveux par mèches et ressemblent à l'amiant.

L'irritation du cuir chevelu ou de la face peut amener la formation de quelques abcès, et surtout le gonflement inflammatoire des ganglions cervicaux ou sous-maxillaires. La maladie est souvent accompagnée d'une odeur fétide et du développement d'un grand nombre de poux. Enfin des ophthalmies aiguës ou chroniques, des otites, sont quelquefois la conséquence de l'extension de l'inflammation aux organes des sens.

Impétigo. — L'impétigo, maladie commune chez les enfants, présente deux variétés principales. L'une est l'impétigo larvalis (teigne mugueuse, croûtes de lait des auteurs, galeuse du vulgaire), qui peut sécher simultanément ou isolément, soit à la face, soit au cuir chevelu. L'autre variété est l'impétigo granulosa (teigne granulueuse d'Alibert, galeux du vulgaire), qui ne se rencontre qu'au cuir chevelu.

Le début de l'impétigo larvalis s'annonce par un prurit bientôt suivi d'une éruption de petites pustules séro-purulentes, dont le liquide rompant l'épiderme se coagré en croûtes épaisses, d'un jaune doré, molles, humides, et peu adhérentes. Lorsqu'on les laisse s'accumuler, elles deviennent très-épaisses, se touchent toutes et exhalent une odeur nauséabonde. Au-dessous d'elles la peau est rouge et superficiellement ulcérée. A la tête, ces croûtes embrassent les cheveux dans leur épaisseur et les collent ensemble. A la face, la confluence des pustules couvre principalement le front et les joues de croûtes épaisses qui forment une espèce de masque, et dont la couleur jaune est souvent brunie par le sang qui s'écoule lorsque les enfants se grattent et détachent les croûtes des surfaces ulcérées. Quand la maladie décroît, les croûtes se fendent et se détachent facilement; celles qui les remplacent sont plus

mides, comme squameuses. Enfin, plus tard il ne reste que des plaques d'un rouge pâle, couvertes d'une desquamation farfuracée. Si, au contraire, la maladie s'accompagne d'un excès d'inflammation, le tissu cellulaire sous-cutané devient le siège de petits phlegmons qui suppurent; il en est de même des ganglions lymphatiques du voisinage.

L'impétigo larvalis a une marche aiguë ou chronique. Dans le premier cas on voit, après une ou deux semaines, les croûtes se détacher partiellement, et au-dessous d'elles la peau rouge paraît amincie et recouverte d'un épiderme légèrement ridé; ou bien la surface reste encore humide et soignée pendant quelque temps, puis la rougeur disparaît insensiblement. Quand la maladie suit une marche chronique, les premières croûtes, au lieu de se détacher, s'épaississent à leur face profonde par la sécrétion d'une nouvelle quantité de liquide. Souvent elles deviennent brunes ou noires par suite d'une exsudation sanguine spontanée ou provoquée par l'arrachement que le prurit porte les enfants à opérer avec violence, et l'aspect de ces croûtes donne alors au visage quelque chose de hideux et d'analogue au faciès de certains varioliques. Souvent l'impétigo respecte le nez et les paupières; d'autres fois il envahit ces parties, l'œil est alors fermé, et une croûte noire semble remplacer les paupières. « Lorsque l'impétigo chronique occupe une des joues, par exemple, il forme quelquefois une surface bosselée, plus saillante à son centre que sur ses bords, et qui ressemble, sauf la teinte et les inégalités de sa surface, à une coquille d'huitre (Rilliet et Barthez). »

Tandis que l'impétigo larvalis attaque surtout les jeunes sujets à l'époque de la première dentition, l'impétigo granuleux est plus fréquent de trois à six ou huit ans. Il ne s'étend jamais à des parties non couvertes de poils; car c'est à ceux-ci qu'il doit l'aspect particulier de ses croûtes, qui sont irrégulières, de couleur brune, deviennent très-friables en se desséchant, et se détachent par fragments inégaux, bosselés, anguleux, qu'on prendrait pour

du mortier grossièrement léisé. La consistance de ces croûtes est parfois très-dure, et les cataplasmes ne peuvent les ramollir; on les voit collées et, pour ainsi dire, suspendues à la partie moyenne des cheveux ou à leur extrémité.

Lorsque, par les topiques, on a fait tomber les croûtes de l'impétigo, on voit une surface d'un rouge vif, luisante, humide, fournissant un suintement purulent abondant; la peau épaissie, tendue, est quelquefois excoriée, mais présente rarement de profondes ulcérations. Lorsque la maladie est depuis longtemps fixée sur le cuir chevelu, et surtout si elle est mal soignée, l'inflammation ayant gagné les bulbes pilifères, produit une alopecie partielle ou générale qui n'est pas toutefois aussi incurable que celle qui succède au favus.

A quelque variété d'impétigo qu'on ait affaire, et quel que soit son siège, on remarque constamment une démangeaison poussée quelquefois au plus haut degré et qui ne laisse pas au malade un instant de repos. L'odeur exhalée par les surfaces malades est seulement fade quand la maladie est récente; mais, quand elle est ancienne, quand des croûtes larges et épaisses couvrent tout le cuir chevelu et s'accompagnent d'un suintement abondant, l'odeur est extrêmement fétide et repoussante. L'inflammation des ganglions lymphatiques du cou est un phénomène non moins fréquent, et leur suppuration même s'observe quelquefois. Enfin la nature du mal et le défaut de soins favorisent singulièrement le développement des pox.

L'ophtalmie accompagne fréquemment l'impétigo. Elle est parfois due au contact du liquide irritant sécrété par les excoriations impétigineuses, d'autres fois elle alterne avec l'impétigo, en sorte que les deux maladies se balancent et l'emportent alternativement en intensité l'une sur l'autre.

L'impétigo ne s'accompagne presque jamais de fièvre ni de troubles sérieux vers les grandes fonctions. C'est, en général, une maladie légère, pourvu qu'elle ne soit pas négligée ou combattue par des moyens intempestifs.

Favus. — Le favus (teigne favuse, véritable teigne) se montre plus souvent de six à dix ou douze ans qu'avant cette époque. Les deux sexes y paraissent également exposés. Quoi qu'on l'observe assez souvent chez des enfants d'une constitution forte et saine d'ailleurs, cependant nous ne pouvons considérer comme étrangère à son développement la circonstance d'une constitution plus ou moins faible et plus ou moins entachée d'un vice humoral et surtout de la diathèse scrophuleuse. Quoi qu'il n'y ait pas toujours réunion chez le même sujet du favus avec d'autres lésions évidemment scrophuleuses, il y a trop souvent entre ces affections des rapports de succession, de métastase et de balancement, d'hérédité, etc., pour qu'on n'admette pas entre elles une certaine affinité. Sous ce rapport le favus nous paraît en général dans les mêmes conditions que les autres dermatoses. Toutefois, comme le favus reconnaît souvent la contagion pour cause, on comprend qu'alors il peut atteindre des sujets complètement exempts de traces de scrophules. La contagion peut se produire d'une manière directe de la peau malade à la peau saine; elle peut aussi être transmise par les linges, les peignes, les broises et autres instruments qui servent à la toilette.

Le favus siège assez rarement ailleurs que sur le cuir chevelu. Cependant nous en avons déjà observé plusieurs cas aux membres inférieurs. Les pustules favuses sont plus ou moins confondues : tantôt elles sont groupées sans aucun ordre régulier, tantôt elles forment par leur agglomération des cercles et des demi-cercles. Dans tous les cas la lésion élémentaire est la même, et lorsqu'on étudie la maladie à son début, on voit qu'elle consiste dans de petites pustules à peine saillantes, dont le liquide se concrète rapidement et forme une petite croûte d'un jaune paille. Suivant M. Baudelocque, la matière favuse est déposée dans la cavité des follicules pileux. D'autres placent le siège du favus dans les follicules sébacés ou dans les bulbes des cheveux et des poils. Dans ces derniers temps, M. Gruby a été conduit par l'examen microscopique à placer le siège du favus dans les cellules de l'épiderme, et à le considérer

comme un véritable végétal parasite. Quoi qu'il en soit, la favus continuant ses progrès, la croûte augmente d'étendue, puis se déprime à son centre en même temps que ses bords se relèvent; alors elle est fortement enclavée dans la peau. Sa partie centrale est ordinairement traversée par un cheveu. Si la croûte est enlevée, on trouve dans le point où elle existait une cavité plus ou moins large qui correspond à un mamelon que présente la face profonde de la croûte. Cette cavité s'efface bientôt si la maladie doit guérir; dans le cas contraire, elle se remplit d'une nouvelle quantité de matière favine. Cette cavité dilatée est celle du follicule dont le goullet a été distendu outre mesure par la matière accumulée dans son intérieur. M. Baidolouque explique la dépression du godet de la croûte favine par l'adhérence du noyau favin central uni à l'épiderme au niveau du collet du follicule et par la dilatation du follicule et le soulèvement de l'épiderme à son pourtour, résultat de l'accroissement de la sécrétion.

La croûte favine souvent traversée par un poil ou un cheveu, acquiert un volume variable suivant qu'elle reste isolée ou qu'elle se réunit aux croûtes voisines; sèche, adhérente, elle est enclavée dans le tissu de la peau; on ne peut l'enlever sans causer de la douleur et un écoulement de sang; au-dessous d'elle la peau est rouge, excoriée et souvent même creusée à une certaine profondeur. L'humeur qui forme les croûtes exhale une odeur nauséabonde, *si gæseris*, comparable à l'odeur de souris. Les bulbes des poils sont altérés dans leur structure, les cheveux deviennent grêles, décolorés, lanugineux, et tombent. Souvent les ganglions lymphatiques de la nuque et des régions latérales du haut du cou s'engorgent, et des abcès sous-ostéens se développent.

Deux complications se présentent souvent dans la teigne favine. La première est due au développement d'une grande quantité de peaux qui ne font qu'augmenter les accidents de la maladie primitive; la seconde est l'alopecie qui est ici constamment mortelle, tandis qu'à la suite

des autres teignes les cheveux repoussent souvent très-bien.

On a admis deux variétés principales de favus : le *favus areolaris* et le *favus scutiformis*. Le premier est le plus commun et le plus facile à reconnaître. La couleur des croûtes qui est d'un jaune soufre, leur forme en godet, leur aspect tout-à-fait comparable à celui des alvéoles d'une ruche à miel, sont très-caractéristiques. Dans la seconde variété, les croûtes ont la même couleur, mais ne sont plus aussi manifestement déprimées en godet, et offrent l'aspect de plaques nummulaires.

Le favus, quelle que soit sa forme, est souvent une maladie grave, non-seulement par l'inflammation qu'il entretient et qui peut s'étendre aux yeux et à toute la face, mais encore par l'arrêt de développement dont il est la cause chez quelques enfants, comme on en connaît des exemples. C'est toujours une maladie difficile et longue à guérir. Quelques auteurs ont même pensé que la guérison du favus ne devait pas être tentée, dans la crainte de voir survenir des affections plus graves dans un autre organe, et ont en quelque sorte condamné le malade à subir pendant toute sa vie les fâcheuses conséquences d'une maladie dont le moindre inconvénient est d'inspirer une extrême répugnance. Mais à cet égard, le favus est à peu près dans les mêmes conditions que la plupart des dermatoses et se prête à l'application des mêmes principes de thérapeutique. C'est tout à la fois à cause de leur nature diathésique et de leur ancienneté souvent considérable, que les dermatoses ne doivent pas être combattues de manière à ce que leur disparition soit prompte et sans des moyens généraux dirigés contre le vice humoral. On peut dire qu'en général un traitement fondé sur ces principes et entouré des précautions qu'ils commandent, n'est presque jamais suivi d'accidents.

Pityriasis. — Le pityriasis (*teigne farfarisée*, *crasse laiteuse*) est spécial aux enfants à la mamelle et aux vieillards. On la reconnaît à de petites écailles accompagnées d'une démangeaison rarement bien prononcée, au-dessus des-

quelles la peau n'est point enflammée. Ces écailles sont formées par des lamelles épidermiques très-minces, blanches, sèches, le plus souvent adhérentes par une extrémité, libres par l'autre. Chez la plupart des enfants de simples soins de propreté font disparaître cette affection légère que le plus souvent on ne cherche même pas à combattre.

Traitement des dartres et des teignes. — Nous ramènerons à quelques points de vue principaux les considérations générales que nous avons à émettre ici sur le traitement des dermatoses. Nous renvoyons le lecteur pour les indications plus détaillées aux ouvrages spéciaux de dermatologie et en particulier au traité de M. Duchesne-Duparc, sur les gourmes chez les enfants.

La première chose à considérer dans les dartres et les teignes, est le degré auquel y existe l'inflammation. Dans la plupart des cas cet élément pathologique revêt une forme tout-à-fait chronique, ne modifie en rien la lésion dartreuse proprement dite, et n'a par conséquent aucune importance ou thérapeutique. Dans d'autres circonstances il acquiert une certaine intensité et parfois même une prépondérance qui doit attirer les premiers soins du praticien. C'est ce que nous avons indiqué en décrivant l'eczéma et l'impétigo qui revêtent assez souvent des caractères vraiment inflammatoires et exigent l'emploi des émissions sanguines, à moins que la maladie ne soit très-limitée, ou n'existe chez un enfant très-jeune et d'une constitution chétive ou affaiblie par des maladies antérieures. On y aura donc recours chez les enfants forts, pléthoriques, lorsque la maladie occupe une région étendue et s'y accompagne de douleur, de vives démangeaisons, de gonflement, de tension et d'une rougeur intense au pourtour des points enflammés. En règle générale on doit éviter d'appliquer les saignées au voisinage de la partie malade parce que l'irritation qu'elles produisent congestionne les tissus, et les petites plaies, en s'enflammant par le contact de l'ichor dartreux, peuvent donner naissance à des furoncles ou à de nouvelles éruptions.

écroussées et impétigineuses. Autant que possible on placera les sangsues à l'anus ou à la partie interne des cuisses.

Les bains simples à 35° centigr. sont souvent très-utiles pour abattre un excès d'inflammation. On peut augmenter leur action émolliente en y ajoutant une forte décoction de guimauve ou de mauve, ou bien 250 à 500 grammes de gélaline, ou une certaine quantité de décoction de san, etc. Si le mal occupe la face ou le cuir chevelu, on a soin que l'enfant plonge à plusieurs reprises la tête dans l'eau de la baignoire, et l'on pratique des lotions avec un linge ou une éponge fine. Enfin, lorsque les bains et les lotions ne suffisent pas pour ramollir et détacher les croûtes, ni pour éteindre la phlogose, on applique d'une manière permanente des topiques émollients, tels que des compressees trempées dans des décoctions de mauve, de guimauve, ou dans du lait. Quand les démangeaisons sont vives, on fait bouillir avec la guimauve une tête de pavot, ou bien on ajoute au lait 12 à 20 grammes d'eau de laurier-cerise. Les cataplasmes, plus faciles à tenir appliqués sur le cuir chevelu que sur les joues, seront faits avec la farine de lin, du pain cuit dans du lait, ou de la fécule; ils doivent être très-humides, pas trop chauds et toujours enveloppés d'une gaze ou d'un linge fin. Comme les topiques émollients, en détachant les croûtes, mettent ainsi à nu des surfaces qui étaient auparavant à l'abri du contact de l'air, il en résulte quelquefois une douleur et une réaction vive qui peut être dangereuse quand la surface dénudée est très-étendue. Si, par exemple, l'inflammation a envahi tout le cuir chevelu, il ne faut jamais appliquer un cataplasme qui couvre toute la tête et mette à nu brusquement toute la surface enflammée. « Voici, disent avec raison MM. Rilliet et Barthet, comment on agira en cas pareil. On divisera la surface du cuir chevelu en deux ou trois zones; sur la première on appliquera un cataplasme de fécule, on renouvellera cette application à plusieurs reprises, et ce ne sera que lorsqu'en aura obtenu la chute de toutes les croûtes et agi par des moyens topiques sur la

surface enflammée, que l'on attaquera la seconde aine, puis la troisième, par les mêmes moyens (3. L. p. 713). »

D'ailleurs, pour les topiques que nous venons d'indiquer, comme pour ceux dont il va être question, il faut avoir la précaution de tenir les cheveux coupés très courts ou même rasés, si c'est possible, lorsque la maladie siège sur le cuir chevelu.

Les topiques dits spécifiques, mais qui ne le sont pas tous au même degré, et dont plusieurs même ont une manière d'agir qu'on peut ramener aux lois connues de la physiologie pathologique; ces topiques, disons-nous, sont fort nombreux; mais nous n'indiquerons que les plus marchés, les plus commodes dans leur emploi et les plus efficaces.

Ceux qui réclament l'eczéma et l'impétigo sont souvent assez simples. Lorsque ces maladies sont primitivement chroniques, ou après qu'elles ont été ramenées à cet état par les antiphlogistiques, il faut, après la chute des croûtes, recourir à des moyens propres à combattre l'inflammation chronique, soit directement, soit indirectement par substitution. Si la surface est excoriée, on fait des frictions avec la pommade au calomélas (axonge 70 gram., calomélas 4), ou celle d'oxyde de zinc péconisée par Henke (beurre frais 2 gram., fleur de zinc 2, opium finement pulvérisé 0,03). Lorsque le suintement a diminué, que la peau est seulement rouge et tendue, on prescrit des lotions avec une solution hydrosulfureuse (sulfure de potassium 2 gram., eau 500), ou alcaline (sous-carbonate de soude ou de potasse 4 gram., eau 500), ou un mélange d'eau de chaux et d'huile d'amandes douces (parties égales). Ces différentes lotions doivent être renouvelées deux ou trois fois par jour sur tous les points au niveau desquels il n'existe pas de croûtes. Si la guérison se fait attendre, on peut recourir à la pommade de goudron (axonge 50 gram., goudron 8, laudanum de Sydenham 2). Quand la surface impétigineuse ou eczémateuse est très-limitée, lorsque la maladie est très-chronique, on peut toucher les points enflammés avec le nitrate d'argent; mais cette cautérisation serait dangereuse si on la pratiquait sur une grande étendue de la face

ou du cuir chevelu. Les autres topiques qu'on peut prescrire quand la maladie résiste aux premiers indiqués sont : la pommade sulfureo-alkaline (axonge 30 gram., soufre sublimé 5, carbonate de potasse 4), la pommade citrine (axonge 30 gram., mercure 1, acide nitrique 5), celle d'iodure de mercure (axonge 30 gram., iodure de mercure 5), celle d'iodure de soufre (axonge 30 gram., iodure de soufre 5), etc. Enfin quand la maladie occupe le tronc ou les membres, les bains alcalins (sous-carbonate de soude 100 à 150 gram., eau 100 litres) et surtout les bains sulfureux (sulfure de potasse concret 125 gram., eau 100 litres) sont d'une efficacité incontestable. L'action plus ou moins irritante de ces bains peut être atténuée, suivant les cas, par l'addition de 250 à 500 gram. de gélatine.

Le traitement local du faveux n'exige jamais ou presque jamais l'emploi des antiphlogistiques. Les topiques émollients ne sont nécessaires que dans le but de ramollir et de détacher les croûtes. Aussitôt qu'elles sont tombées on a recours aux topiques spécifiques, parmi lesquels les lotions, les poudres et les pommades épilatoires tiennent le premier rang. On emploie dans ce but une pommade contenant 4 gram. de sous-carbonate de potasse dans 30 gram. d'axonge, ou bien des lotions avec une solution de 8 gram. de sous-carbonate de potasse dans 500 gram. d'eau. Cette pratique est celle des frères Mahon, à qui l'administration des hôpitaux de Paris a confié le traitement des enfants atteints de faveux; mais la composition des pommades et des poudres épilatoires dont ils se servent n'est pas connue. Voici la description de leur procédé, d'après M. Bayet et MM. Rilliet et Barthéz : « Ils commencent par couper les cheveux à deux pouces du cuir chevelu, afin de pouvoir les faire tomber plus facilement avec le peigne; ils détachent ensuite les croûtes avec du saindoux ou à l'aide de cataplasmes de farine de lin, puis ils lavent la tête avec l'eau de syon. Ces lotions et ces onctions sont répétées pendant quatre à cinq jours, jusqu'à ce que le cuir chevelu soit nettoyé. C'est alors que commence le second temps du traitement, qui a pour but d'obtenir lentement et sans

douleur l'avulsion des cheveux sur tous les points où le *laxus* s'est développé. On fait tous les deux jours des onctions avec une pommade épilatoire; ces onctions doivent être continuées plus ou moins longtemps, suivant que la maladie est plus ou moins invétérée. Les jours où l'on ne met pas de pommades, on passe à plusieurs reprises un peigne fin dans les cheveux, qui se détachent sans douleur. Après quinze jours de ces pansements, on sème sur la tête, une fois par semaine, quelques pinces d'une poudre épilatoire; le lendemain on passe le peigne dans les cheveux sur les points malades, et on y pratique une nouvelle onction avec la pommade épilatoire. Ces onctions doivent être continuées plus ou moins longtemps, suivant la gravité de la maladie. On remplace alors la première pommade épilatoire par une seconde faite avec du saindoux et une poudre épilatoire plus active, avec laquelle on pratique également des onctions sur les points affectés, pendant quinze jours ou un mois, suivant la gravité de la maladie. Après ce terme on ne fait plus ces onctions que deux fois par semaine, jusqu'à ce que les rougeurs de la peau aient entièrement disparu. Les jours où l'on ne fait pas usage de la pommade, on peigne le malade une ou deux fois, ayant soin de ne pas trop appuyer le peigne, qu'on imprègne de saindoux ou d'huile. »

On aide à l'action de ce traitement en prescrivant deux ou trois bains alcalins par semaine.

La méthode des frères Mahon est réellement efficace dans un grand nombre de cas; mais elle échoue aussi quelquefois dans les teignes favosées invétérées. C'est alors qu'il faut recourir à des médications plus actives. « Ainsi M. Cazenave conseille des lotions avec le sulfure de potasse à la dose de 4 à 8 grammes pour 590 grammes d'eau, ou bien le liniment de Barlow, ainsi composé : sulfure de potasse 5 grammes, savon blanc 10, eau de chaux 210, alcool rectifié 4. Ces différentes lotions sur les surfaces malades sont répétées pendant plusieurs jours une ou deux fois par jour. Si elles causent trop d'irritation à la peau, il faut les altérer avec des lotions simplement émollientes (Kiliet

et Barthéz). — En cas d'insuccès par ces moyens, on aura enfin recours à la pommade d'iode de soufre préconisée par Biett en frictions légères matin et soir sur les surfaces malades. On a encore conseillé, dans les cas rebelles, des lotions avec de l'acide nitrique ou hydrochlorique étendus, des solutions de sulfate de zinc, de sulfate de cuivre, de nitrate d'argent, à la dose de 15 à 30 centigrammes dans 30 grammes d'eau distillée. Lorsque tous ces moyens échouent, on peut cautériser la surface malade avec le nitrate d'argent, comme le veut M. Bazdooque, ou même avec d'autres caustiques encore plus énergiques. On comprend d'ailleurs que cette cautérisation doit être entreprise avec précautions et appliquée partiellement et non pas simultanément sur tous les points malades d'une grande surface.

Nous dirons peu de chose d'un traitement très-connu autrefois, sous le nom de *traitement par la calotte* et auquel on a généralement renoncé depuis plusieurs années à cause des douleurs cruelles qu'il occasionne. Ce moyen consistait à appliquer sur tout le cuir chevelu une calotte enduite d'un mélange composé d'un grand nombre de drogues auxquelles il devait sa propriété agglutinative et irritante. Après 15, 24 jours et même plus d'application, cette calotte était arrachée avec violence entraînant avec elle les cheveux et très-souvent l'épiderme, et laissant ainsi dans une grande étendue le derme dénudé et douloureusement enflammé. On répétait au besoin l'application de la calotte et il est certain qu'après deux ou trois mois on obtenait souvent une guérison plus parfaite et plus durable que par tout autre moyen, mais achetée au prix des plus vives souffrances.

Le procédé de la calotte mérite d'être conservé, mais avec les modifications qu'y ont apportées M. Ordinaire, de Mâcon et M. Bannès, ancien chirurgien en chef de l'hospice de l'Antiquaille de Lyon, auteur d'un Traité récent de dermatologie qui fait le plus grand honneur à ce médecin en même temps qu'à la médecine lyonnaise. M. Bannès, par des observations exactes et répétées, a reconnu et démontré

que tous les inconvénients de l'ancien procédé de la cataplasme doivent être attribués beaucoup moins à la nature irritante des drogues composant le mélange agglutinatif qu'à son application trop prolongée. Si, en effet, on applique ce mélange ou tout autre analogue, au moyen de bandes séparées et non pas d'une seule pièce, et qu'on les enlève tous les deux ou trois jours, on prévient ainsi l'accroissement de l'inflammation, et l'écroulement des cheveux se fait sans trop de douleur. On applique ensuite de nouvelles bandes jusqu'à ce que tous les cheveux aient été arrachés et les surfaces malades convenablement modifiées. Si malgré cette manière de faire, on voit l'inflammation dépasser certaines limites, on la modère par des émollients avant de replacer de nouvelles bandes. Ce traitement dure en moyenne deux ou trois mois et donne en général des résultats satisfaisants. Voici d'ailleurs la formule du mélange agglutinatif auquel M. Faumès donne définitivement la préférence : « On traite 125 grammes de gomme ammoniac pulvérisée par 575 gr. de vinaigre rouge de vin dans une capsule de porcelaine et à une température voisine de l'ébullition ; on passe au travers d'un linge peu serré ; on verse de nouveau sur le résidu 150 grammes de vinaigre ; on le traite de la même manière, et on joint cette solution à la première. On laisse reposer quelques instants pour que les matières étrangères se précipitent ; on décante et on fait évaporer à une douce chaleur, jusqu'à consistance de miel demi-liquide. Ce mélange, quand il est convenablement fait, est bien lié, homogène, crémeux, sans grumeaux, et s'étend à froid aussi facilement sur des bandes de toile que l'emplâtre diaphane ou diachylon. Pour enlever les bandes il suffit de les saisir par un bout et de les arracher d'un seul trait avec un mouvement vif et brusque. Les cheveux sont très-nettement arrachés avec elles, pourvu qu'ils ne soient ni trop longs ni trop courts, quand on fait l'application de l'emplâtre, c'est-à-dire qu'ils aient à peu près cinq à six millimètres de longueur ; il est entendu qu'il faut arracher

les lamelles dans un sens contraire à la direction des cheveux (1). —

Dans les cas de teigne compliqués de la présence d'un grand nombre de pous, on commence par détruire ces animaux parasites. Une ou deux onctions avec l'onguent napolitain ou des lotions avec une solution de sublimé corrosif atteignent promptement et sûrement ce but. On combattra ainsi par des évellents ou des fondants les engorgements ganglionnaires qui accompagnent souvent l'existence des dermatoses.

Il nous reste à parler du traitement dépuratif que la prudence doit faire considérer comme indispensable dans la plupart des maladies chroniques de la peau. Les moyens qui rentrent dans cette modification sont externes ou internes. Les premiers sont les vésicatoires, les exutoires et les bains hydro-sulfureux, alcalins, mercuriels ou iodés, qui ont non-seulement une action locale sur la peau, mais agissent aussi sur l'ensemble de l'organisme par l'absorption des substances médicamenteuses qu'ils contiennent. Les seconds sont empruntés aux médications évacuantes, excitantes et altérantes. Les purgatifs sont les plus actifs et les plus employés. Ainsi on prescrit la calomélas, le jalap, le ricin, le séné, le sirop de fleurs de pêcher, celui de chicorée, la manne, les purgatifs salins, etc. Parmi ces médicaments ceux que nous préférons et que nous prescrivons le plus souvent sont le sirop de fleurs de pêcher chez les enfants très-jeunes, et, chez les autres, le séné à la dose de 5, 10 ou 15 grammes, en infusion. En y ajoutant une dose égale de café, on obtient une infusion dont la saveur, après y avoir ajouté du sucre en quantité suffisante, n'inspire en général que fort peu de répugnance. Dans le cours d'une maladie cutanée il est bon, sauf les cas de contre-indication, de répéter la purgation une fois par semaine ou au moins tous les quinze jours.

La plupart des tisanes recommandées dans le traitement des dermatoses agissent comme éliminatrices, laxatives

(1) Demis, *Année Dermatologique*, t. I, p. 511 et 512.

ou toniques, et c'est à ces divers titres qu'elles appartiennent à la médication dépurative. Elles sont d'ailleurs fort nombreuses. Nous ne citerons que celles de fleurs de violette, de sureau, de pensée sauvage, de racine de polypode de chêne, de bardane, de saponaire, de patience, de gentiane, l'infusion faite avec les sommités de heublon, et la décoction de douce-amère. C'est à cette dernière que nous donnons la préférence dans presque tous les cas. On a conseillé d'y ajouter de la saibepareille à la dose de 3 grammes pour 4 grammes de douce-amère. Les deux médicaments étant réduits en poudre, on les fait digérer dans l'eau froide pendant 24 heures, ensuite on filtre et on édulcore avec du sirop simple ou médicamenteux, tel que le sirop de Camérier, le sirop dépuratif du Codex ou le sirop de chicorée, etc. Lorsque les enfants refusent de boire toute espèce de tisane, on leur fait prendre par l'un des sirops que nous venons d'indiquer, à la dose d'une à plusieurs cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Le soufre, le mercure, l'iode forment la base de la plupart des médicaments altérants que peut réclamer le traitement des dartres et des teignes. Ainsi on prescrit le soufre sublimé bien lavé, à la dose de 30 centigrammes environ, avec une double quantité de sucre; on divise la poudre en trois paquets égaux, et on les donne tous les trois dans les 24 heures. La poudre de Plummer, généralement vantée, se compose de calomel et soufre doré d'antimoine, de chaque 4,30, sucre blanc 8. Ce mélange est divisé en 12 paquets égaux; on en donne trois par jour. Les autres préparations altérantes sont à peu près les mêmes que celles qu'on emploie contre la diathèse scrophuleuse, et nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit ailleurs sur ce sujet.

Les médications internes dont nous venons de donner un simple aperçu doivent toujours être continuées non seulement pendant toute la durée de l'affection cutanée, mais quelque temps encore après sa guérison. Seulement on en diminue graduellement l'énergie et on sépare par de plus longs intervalles l'administration des évacuants, à

meure que la guérison est plus ancienne. Sans ces précautions on s'expose à de fréquentes récidives, surtout aux changements de saison.

Quant à l'hygiène, il faut qu'elle soit générale et locale. La première sera adaptée aux circonstances présentes de l'état constitutionnel du malade et de l'intensité de la maladie locale. Quant à l'hygiène locale, on ne saurait trop insister sur la nécessité de maintenir la peau dans un état de propreté permanente par des lotions ou des bains assez fréquemment répétés. Mais que de fois le médecin ne peut que gémir sur l'infirmité de ses recommandations en face d'une extrême misère, ou de l'ignorance et de l'incertitude qui l'accompagnent!

SECTION II.

MALADIES DES YEUX.

Les maladies de l'œil sont fréquentes dans l'enfance, et si elles ne rentrent pas dans le domaine spécial de la chirurgie, nous leur aurions réservé dans cet ouvrage son place en rapport avec leur importance et nous aurions décrit d'une manière complète les conjonctivites, les kératites, les cataractes, les tumeurs et fistules lacrymales. Les espèces d'ophtalmies les plus fréquentes sont l'ophtalmie catarrhale, l'ophtalmie purulente des nouveau-nés, et l'ophtalmie scrophuleuse. La première et la troisième s'observent très-fréquemment à l'hôpital des Enfants-Malades, et la seconde à l'hospice des Enfants-Trouvés. La première serait la moins grave de toutes si les enfants étaient placés dans de bonnes conditions hygiéniques et entourés de soins intelligents. Mais à l'hôpital des Enfants-Malades, ces deux circonstances ne se rencontrent point, et souvent l'on voit une ophtalmie, d'abord simplement catarrhale,

revêtir une forme plus grave et s'accompagner de tous les désordres que l'ophtalmie purulente entraîne ordinairement à sa suite. D'ailleurs nous n'avons rien observé dans la marche de cette ophtalmie qui n'ait été généralement indiqué dans les traités spéciaux d'ophtalmologie. Nous en dirons autant de l'ophtalmie acrophulente et des différentes maladies de la cornée que nous avons pu observer. Le point de départ de ces diverses affections, aussi bien que des tumeurs lacrymales, se trouve, chez un très-grand nombre de malades, dans la diathèse acrophulente qui, sous l'influence de quelque cause occasionnelle comme les fièvres éruptives par exemple, se localise sur les organes de la vue et y constitue alors ce qu'on peut, avec M. Lugol, appeler la scrophule catarrhale. La fréquence de cette influence diathésique chez les enfants, ne doit jamais être perdue de vue par le praticien, car elle est la source des indications les plus rationnelles et les plus fondamentales que comporte le traitement de ces maladies.

Une autre cause d'ophtalmie qui agit spécialement et même exclusivement dans l'enfance est le travail de la dentition. Tant que la fluxion qui accompagne ce travail se borne à produire un peu de gonflement des paupières, de la rougeur de la conjonctive, des larmoiement, un peu de photophobie, il ne faut guère s'en inquiéter, d'autant plus que cette maladie est ordinairement très-rebelle tant que n'est point achevée l'éruption de la dent dont l'évolution entretient la fluxion faciale et oculaire. Cette ophtalmie coïncide souvent avec ce qu'on appelle fous de dents, croûtes de lait, gomme. On peut suivre facilement le mode d'extension de la maladie; de la joue l'inflammation envahit la paupière et bientôt l'ophtalmie se déclare. C'est pour cela que M. Trouseau lui donne le nom d'*ophtalmia ab inflammatione cutis*. Quand elle réclame un traitement à cause de son intensité, celui-ci doit être fondé sur une double considération. Il faut en effet combattre l'ophtalmie elle-même par les moyens ordinaires et ensuite l'attaquer dans sa cause, c'est-à-dire, modérer le travail de la dentition et le ralentir autant

que possible en deçà des limites de l'état physiologique.

Nous allons esquisser rapidement l'histoire des deux espèces d'ophtalmie qu'il importe le plus de connaître chez les enfants; c'est-à-dire, de l'ophtalmie des nouveau-nés, et de l'ophtalmie scrophuleuse.

DE L'OPHTALMIE DES NOUVEAU-NÉS.

L'ophtalmie des nouveau-nés est tantôt simplement catarrhale, d'autres fois purulente, et, dans ce dernier cas, malheureusement suivie trop souvent de désordres graves vers la cornée qui entraînent une cécité plus ou moins complète. Cette gravité s'observe surtout dans les maisons d'accouchement et dans les hôpitaux d'enfants; elle est très-rare dans la pratique privée, qui ne fournirait, en général, que des exemples d'ophtalmie catarrhale chez les nouveau-nés. Ces différences peuvent s'expliquer soit parce que les femmes qui accouchent dans les maisons de charité sont souvent atteintes de blennorrhagie dont le virus peut agir directement sur les yeux de l'enfant pendant que la tête traverse le vagin, soit par suite de l'encombrement des salles et de l'insuffisance des soins de propreté et de bonté nature qu'on donne aux nouveau-nés. On a remarqué ainsi que les ophtalmies purulentes sont ordinairement plus fréquentes et plus souvent funestes pendant les épidémies de fièvre puerpérale que lorsque les femmes récemment accouchées n'éprouvent pas d'accidents. Il faut donc admettre, avec M. Trousseau, que les conditions épidémiques qui impriment une si épouvantable gravité aux phlegmasies les plus légères des femmes en couches, sont pour beaucoup dans les suites funestes des ophtalmies des nouveau-nés. En dehors de ces causes on se trouve plus à mentionner que l'action du froid, qui est sans doute très-souvent la première origine de l'ophtalmie, mais qui n'est pas la véritable cause de la forme purulente qu'elle revêt, puisque dans de bonnes conditions hygiéniques elle se borne, en général, à produire une ophtalmie catarrhale.

L'ophtalmie purulente des nouveau-nés offre une grande ressemblance avec l'ophtalmie blennorrhagique des adultes, alors même qu'elle n'est pas due à l'action du virus gonorrhéique. Elle débute de deux manières : tantôt elle se déclare d'emblée, tantôt elle est précédée d'une ophtalmie simplement catarrhale dont elle est en quelque sorte la transformation. Ses caractères principaux sont une sorte d'irritation qui porte l'enfant à des mouvements instinctifs pour se gratter et lui fait fuir la lumière. Il pousse des cris lorsqu'on essaie de lui ouvrir les paupières, parce qu'elles sont le siège d'une vive douleur en même temps que d'un gonflement phlegmoneux qui s'étend à la conjonctive oculaire. La cornée elle-même se gonfle rapidement à cause de sa spongieuse. La conjonctive est rouge et ressemble, suivant la comparaison de M. Rognetta, à la membrane d'un intestin rectum ou d'un anus contre nature renversé. Les yeux, le nez et la figure entière participent plus ou moins à l'injection. Une matière muco-purulente tombe à flots sur la joue et excorie la peau ; elle est muqueuse, séreuse ou purulente, suivant le degré d'intensité de la phlogose. Souvent il arrive que, par suite du gonflement, l'un des paupières ou toutes deux se renversent, soit pendant les cris de l'enfant, soit pendant les manœuvres qu'on exerce pour y instiller des collyres ; elles restent quelquefois dans cet état de renversement, et le cercle tarsien étrangle en quelque sorte les tumeurs exubérantes, comme le prépuce dans le paraphimosis.

La maladie peut se terminer par résolution dans l'espace de quelques jours, mais trop souvent elle se termine par la fonte purulente du globe oculaire, suite du ramollissement ou de l'ulcération perforante de la cornée. Si les humeurs de l'œil ne s'évacuent pas à travers l'ouverture de cette membrane, c'est que la hernie de l'iris s'y oppose ordinairement, et dans ce cas le malade peut guérir avec un staphylome iris. D'autres fois c'est un staphylôme de la cornée, une cataracte, un ectropion, des granulations, etc., qui succèdent à l'ophtalmie dont ces maladies sont la conséquence.

Quant au traitement, voici comment le professeur Trousseau résume les indications thérapeutiques : « Si l'ophtalmie consiste seulement dans un gonflement léger des paupières, avec sécrétion muco-puriforme peu abondante, sans photophobie, sans rougeur vive de la conjonctive, il suffira, dans le plus grand nombre des cas, de faire des lotions fréquentes avec de l'infusion très-chaude de millefol ou de cerfeuil, d'instiller dans l'œil, une ou deux fois par jour, quelques gouttes d'un collyre fait avec de l'eau distillée, à la dose de 100 grammes, dans laquelle on aura fait dissoudre 2 centigrammes seulement de sulfate de zinc ou d'azotate d'argent. »

« Mais si l'ophtalmie semble prendre quelque intensité, il faut sans plus attendre recourir à la médication la plus héroïque que nous connaissions dans cette occurrence. Il faut faire préparer une solution très-concentrée de nitrate d'argent; cinq grammes de sel pour vingt-cinq à trente grammes d'eau distillée; et à l'aide d'un pinceau imbibé de cette solution, toucher vigoureusement la conjonctive et même la cornée, deux fois le premier jour, une fois les deux jours suivants; il est rare que, après trois jours de cette énergique médication, il n'y ait pas un tel assouplissement dans les symptômes que la maladie soit désormais sans danger; cependant il est raisonnable de recommencer, dans le cas où la suppuration continuerait encore avec quelque violence; et si, lorsque le mal semble à peu près guéri, on voit persister encore la rougeur légère de la conjonctive, il convient d'enduire le soir les paupières fermées de l'enfant avec un peu de la pommade suivante : bi-sulfide de mercure 1 gram., axonge 15. »

Les autorités sont maintenant si nombreuses en faveur du traitement par le nitrate d'argent qu'on est véritablement en droit de lui donner la préférence sur toute autre médication. Dans une épidémie récente observée à l'hôpital des Enfants-trouvés de Paris, et dont M. Dequevauville

a rendu compte dans un travail couronné par la Faculté de médecine, les collyres avec 10, 20, 30, 40 centigrammes de nitrate d'argent pour 20 grammes d'eau, instillés cinq à six fois par jour, et les fomentations d'eau blanche et d'eau salée ont donné les meilleurs résultats. Dans quelques cas sporadiques nous avons pu nous convaincre aussi de l'efficacité du sel d'argent.

DE L'OPHTHALMIE SCROPHULEUSE.

L'ophtalmie scrophuleuse est moins une espèce d'ophtalmie spéciale ou spécifique résultant d'une altération de tissu toujours identique par ses symptômes et ses caractères anatomiques, qu'un état morbide complexe dans lequel on retrouve deux éléments. L'un est variable par son siège, son intensité et ses autres caractères, c'est l'élément inflammatoire. Il peut siéger isolément ou simultanément sur la conjonctive, sur la cornée, l'iris, etc. Il peut indifféremment présenter une forme congestive ou simplement phlogogique, une forme papuleuse, une forme ulcéreuse; s'accompagner ou non de photophobie, etc. En un mot, la conjonctivite oculaire, palpébrale, ou ecule-palpébrale, angulaire, papuleuse; la kératite avec taies, ulcères, abcès; l'iritis et même l'inflammation des autres tissus de l'œil, peuvent participer, comme éléments, à ce qu'on doit appeler l'ophtalmie scrophuleuse. L'autre élément de cette maladie est, comme son nom l'indique, l'élément scrophuleux. Comment cet élément se caractérise-t-il, et à quels signes est-il reconnaissable? Suffit-il qu'un sujet porteur d'autres lésions scrophuleuses soit atteint d'une ophtalmie pour que celle-ci mérite le nom de scrophuleuse? et une ophtalmie peut-elle être dite scrophuleuse d'après les symptômes locaux qui lui appartiennent? Nous ne pensons pas qu'on puisse faire à ces deux questions une réponse absolument affirmative, surtout à la première. Il serait trop long pour nous d'entrer plus avant dans une discussion qui divise encore les ophtalmologistes et dans laquelle plusieurs nous semblent

avoir soutenu des opinions trop exclusives de part et d'autre. Il nous suffit de nous entendre avec la plupart des praticiens sur la maladie qui a reçu le nom d'ophtalmie scrophuleuse et qui, suivant nous, le mérite pleinement, bien qu'il puisse être quelquefois difficile d'en établir le diagnostic sur des preuves claires et irréfragables.

On comprend sans peine que nous ne saurions par conséquent nous occuper ici de la symptomatologie des blépharites, conjonctivites, kératites et iritis qui peuvent entrer comme éléments dans la constitution d'une ophtalmie scrophuleuse. Nous ne voulons insister que sur le traitement qu'elles réclament conjointement avec l'élément scrophuleux auquel elles sont associées. Les règles de ce traitement ont été fort bien tracées par notre honorable confrère, le docteur Stæber, dans le mémoire qu'il a publié en 1841 (1), sur l'ophtalmie scrophuleuse, et auquel nous emprunterons une grande partie de la courte description que nous allons donner.

« Dans l'ophtalmie scrophuleuse, dit M. Stæber, il est essentiel d'employer conjointement le traitement général et les moyens locaux. Parmi les remèdes généraux, l'ode et l'huile de foie de morue agissent trop lentement lorsqu'il s'agit d'arrêter les progrès destructeurs d'une ophtalmie. Les préparations antimoniales et mercurielles n'ont pas ce désavantage. Dans la grande majorité des cas, j'ai recours à la poudre de Plummer (composée de parties égales de calomel et de soufre doré d'antimoine), que je donne de manière à ce que les malades prennent cinq à dix centigrammes de calomel et autant de soufre doré dans la journée, en trois fois. Le malade continue l'usage de cette poudre pendant trois à quatre semaines, puis je le purge une ou deux fois. Si alors les symptômes scrophuleux n'ont pas disparu, je fais recommencer le malade après une interruption de huit à dix jours, et continuer

(1) V. les *Annales Oculistiques* de M. H. Guérin, à Bruxelles, nos d'août et de mai, 1841.

de nouveau pendant trois à quatre semaines (1). « Le poudre de Plummer agit, en général, à la manière d'un doux purgatif et occasionne deux ou trois selles dans la journée. Le mercure qui entre dans sa composition porte rarement son action sur la bouche chez les enfants, mais il n'en faut pas moins surveiller avec soin cet effet qui s'observe quelquefois et qui exige qu'on interrompe aussitôt l'usage du médicament.

Il est d'ailleurs probable que ce traitement n'agit pas seulement à la manière des évacuants, mais qu'il modifie par une action altérante la diathèse scrophuleuse. Cet état constitutionnel peut aussi, suivant les cas, être combattu par les autres médications connues et dont nous avons parlé ailleurs.

Plusieurs moyens peuvent être dirigés directement contre l'ophtalmiescrophuleuse. Les antiphlogistiques rendent peu de services dans la plupart des cas; ils sont cependant quelquefois d'une incontestable utilité pour abattre l'élément inflammatoire, surtout lorsque la phlogose occupe la conjonctive ou l'iris, et y présente un caractère aigu. Le tempérament sanguin du malade fournit une indication de plus. Toutefois la réduction antiphlogistique exige rarement un régime sévère et la saignée générale. Une ou deux émissions sanguines locales sont suffisantes, moins peut-être dans le but d'enlever d'emblée l'inflammation, ce qui n'est guère possible, que dans celui d'arrêter ses progrès. Nous rejetons même dans ce cas l'usage des collyres mucilagineux; il est rare qu'ils soient utiles, ainsi que les cataplasmes émollients dans les blépharites. Nous prescrivons de préférence un collyre avec 9,50 d'extrait de belladone, et 10 ou 20 gouttes de laudanum dans 125 grammes d'eau de roses.

La méthode réulsive consiste dans l'emploi des sétons, caustères, vésicatoires, pommades et emplâtres vésicés, des purgatifs et des dialégués. Leur usage est fréquent dans l'ophtalmie scrophuleuse. Le séton, le cautère sont réser-

(1) *La clinique des mal. des yeux*. — de la Fac. de Strasbourg, p. 51.

vés pour les cas les plus graves et les plus rebelles. Le vésicatoire est d'une application plus générale, et M. Stæber se lève beaucoup de la pommade et des emplâtres au tartre stibié. Ces topiques irritants doivent le plus souvent être appliqués à la unique. « On peut dire que dans les cas récents et dans ceux où l'inflammation et la photophobie sont légères, on peut se passer des révulsifs. Dans les cas anciens, au contraire, ainsi que dans ceux où l'injection et la photophobie sont intenses, les révulsifs sont nécessaires; ils le sont également lorsque l'ophtalmie s'accompagne d'une sécrétion anormale abondante, et chez les malades qui sont sujets à des rechutes; dans ce dernier cas il est essentiel d'entretenir la révulsion pendant longtemps, même après la disparition de l'ophtalmie (Stæber). »

Les purgatifs sont utiles et sans inconvénients lorsqu'on les administre à des intervalles convenables. Le calomel et le jalap sont préférables à tout autre purgatif, et il est avantageux de les associer. Quant au mercure donné dans le but d'amener une salivation, ce moyen doit être réservé pour des cas très-graves.

De toutes les maladies des yeux, l'ophtalmie serophuleuse est une de celles dans lesquelles la médication irritante substitutive donne les résultats les plus satisfaisants. Elle ne réussit pas seulement dans le cas où l'inflammation a peu d'acuité, mais aussi très-souvent dans celui où l'ophtalmie est très-aiguë. Seulement, comme dans ce second ordre de faits ce résultat n'est pas constant, et comme les irritants amènent même quelquefois des accidents, on ne saurait considérer cette médication comme applicable dans toutes les circonstances. Malheureusement il est presque impossible de prévoir, en face de cas à peu près semblables, quels malades se trouveront bien de son emploi, quels malades s'en trouveront mal; l'expérience peut seule donner au praticien le tact nécessaire en pareille occurrence.

Les irritants préconisés par M. Stæber sont le collyre mercuriel (sublimé corrosif 0,02, eau distillée 100, laudan-

saut de S. 3); la solution de pierre divine (pierre div. 0,50, eau dist. 100, laudanum de S. 2, ou extrait de hêtre vert 0,50); la pommade de précipité rouge (0,10, axonge 5); la pommade de flast (précipité blanc de mercure 0,25, laudanum de S., extrait de saturne ana 0,50, axonge 5), et la pommade de pierre infernale (0,10 à 0,50, axonge 5). Cette dernière réussit surtout dans les blépharites glanduleuses, tandis que le collyre mercuriel et la pommade de flast conviennent spécialement dans la conjonctivite et la kérato-conjonctivite. Le laudanum de Sydenham, pur ou étendu de moitié d'eau les premiers jours, porté à la dose d'une goutte sur l'œil, une ou deux fois par jour, favorise la cicatrisation des ulcères de la cornée. Dans les cas où la photophobie est très-intense et ne diminue pas dès les premiers jours du traitement irritant et révulsif, il faut recourir à la belladone, soit en frictions avec l'onguent napolitain, soit surtout en fomentations, comme le recommande M. Stæber, qui cite aussi un exemple de succès par l'application endermique de la muphène au front, dans un cas où la photophobie et l'inflammation avaient résisté opiniâtrément au traitement ordinaire.

SECTION III.

MALADIES DU NEZ.

Nous avons peu de choses à dire des maladies de l'appareil de l'olfaction. L'épistaxis et le coryza sont les seules qui, chez les enfants, offrent quelques particularités intéressantes.

DE L'ÉPISTAXIS.

L'épistaxis n'est pas une maladie de grande importance. De toutes les hémorrhagies spontanées c'est la seule qui

soit assez fréquente dans l'enfance, surtout aux approches de la puberté. On ne peut guères expliquer cette différence par rapport aux autres hémorrhagies, qu'en admettant que la muqueuse nasale participe à la vitalité active et au développement prépondérant des organes céphaliques.

L'épistaxis se rencontre de préférence chez les enfants dont la circulation est active et qui offrent déjà à un certain degré les attributs du tempérament sanguin, ou qui ont reçu de leurs parents une disposition héréditaire aux hémorrhagies. Toutes les causes de pléthore générale, toutes celles qui sont de nature à déterminer une hyperémie dans les organes de la tête, en particulier l'insolation, les coups et les chutes qui impriment un ébranlement, soit aux os, soit aux parties molles, agissent sur la production de l'épistaxis. Mais bien souvent aussi celle-ci survient en leur absence, et avant qu'aucun symptôme ait annoncé une hyperémie locale ou générale. Dans tous ces cas, l'hémorrhagie nasale est moins une maladie qu'un effort presque toujours heureux de la nature, qui fait cesser ou prévient tous les accidents qu'une congestion pourrait plus tard entraîner en se portant sur un organe important, sur le cerveau par exemple. Beaucoup de céphalalgie, trouvent leur solution dans ce flux sanguin qui opère une véritable crise. Dans l'immense majorité des cas l'épistaxis est peu copieuse et cesse d'elle-même. Ses symptômes n'offrent rien de particulier chez les enfants, et plus rarement encore chez eux que chez les adultes il est nécessaire de la combattre par des injections réfrigérantes et astringentes ou par le tamponnement.

L'épistaxis ne peut devenir alarmante que dans certains cas où elle est symptomatique d'une gêne de la circulation veineuse ou d'une diathèse hémorrhagique. La première cause qui se rattache ordinairement à une affection organique du cœur est rare dans l'enfance. La seconde l'est moins sans doute, mais nous n'avons pas besoin de répéter ici ce que nous avons dit ailleurs de ces formes graves de purpura dans lesquelles les diverses muqueuses, et spécialement celle des fosses nasales, exhalent une plaie ou

moins grande quantité de sang. Nous avons aussi déjà indiqué la conduite à tenir dans les cas de ce genre.

DE CORYZA.

Le coryza se caractérise anatomiquement par la rougeur, la tuméfaction et la diminution de consistance du tissu de la membrane pituitaire. Nous n'insisterons pas sur la description de ces modifications bien connues. Nous ferons remarquer seulement que l'étroitesse des fosses nasales, qui est d'autant plus prononcée que l'enfant est plus jeune, devient telle par le gonflement de la muqueuse, que même dans des cas d'inflammation légère le passage de l'air est rendu impossible, la cavité nasale est presque oblitérée. A plus forte raison il en est ainsi lorsque la membrane de Schneider est tapissée en totalité ou en partie par une couche pseudo-membraneuse. Le coryza cœcœus est en effet moins rare dans l'enfance qu'à tout autre âge. Chez un enfant mort le dix-neuvième jour après sa naissance, Billard a trouvé dans les fosses nasales une concrétion pseudo-membraneuse blanchâtre, et un peu salie par du sang exhalé à sa surface. Elle commençait au-dessus de la glotte et, au lieu de s'étendre dans la trachée-artère, remontait vers les aînés et les cornets du nez qu'elle recouvrait en s'y appliquant solidement. Au-dessous la muqueuse était très-tuméfiée et d'un rouge vif; elle était même saignante dans certains endroits (1). Il y a donc deux espèces de coryza, l'une constituée par une inflammation catarrhale, l'autre par une inflammation cœcœuse.

Le coryza catarrhal est de beaucoup le plus fréquent. Il survient sous l'influence directe ou indirecte du froid et de l'humidité, comme on l'observe chez les adultes. D'autres fois il est symptomatique d'une fièvre éruptive, de la rougeole surtout. Le coryza pseudo-membraneux

(1) Billard, *Traité des Mal des enf.*, 2^e édit., p. 505.

peut être rattaché aux mêmes causes que l'angine de même nature. Ainsi la coarctation plastique paraît due tantôt à l'intensité de l'inflammation, tantôt à sa nature spécifique, et dans ces deux cas il peut être idiopathique, c'est-à-dire indépendant d'un état général, ou au contraire subordonné à une affection de tous les systèmes, comme on le voit dans certaines fièvres éruptives. C'est surtout la scarlatine qui tend à modifier de cette manière la nature du coryza. Quant aux conditions organiques qui prédisposent les enfants nouveaux-nés à cette affection, Billard les a indiquées de la manière suivante : « Chez l'enfant naissant, la membrane pituitaire est toujours très-rouge et très-engorgée; elle est également d'une grande irritabilité, car souvent on voit des enfants qui viennent de naître, éternuer presque aussitôt qu'ils sont en contact avec l'air. Cette membrane sécrète aussi de bonne heure des mucosités abondantes; elles découlent presque continuellement du nez chez certains enfants. Ainsi donc, la congestion sanguine, la rougeur, l'irritabilité et l'abondance de sécrétion de la membrane pituitaire, chez les enfants naissants, démontrent la grande disposition de cette membrane à s'enflammer, et expliquent la fréquence du coryza chez les nouveau-nés (1). »

A mesure que les enfants avancent en âge, les symptômes du coryza diffèrent de moins en moins de ce qu'ils sont dans l'âge moyen. Mais chez les enfants à la mamelle il présente des phénomènes particuliers qu'il est bon de décrire avec soin. Cette description a déjà été très-bien faite par Billard; nous allons la reproduire en partie. L'éternuement fréquent est le premier signe du coryza. Bientôt des mucosités, d'abord blanches et épaisses, puis jaunes, verdâtres, et enfin puriformes, s'écoulent des narines. L'enfant qui dort presque toujours la bouche fermée, ne peut alors dormir sans la tenir ouverte; sa respiration est bruyante, et l'on peut reconnaître, au lieu d'un râle, un bruit de sifflement qui se passe dans les fosses

(1) Œuvres, t. III, p. 348 et 349.

nasales. Ce bruit se prononce davantage, et la difficulté de la respiration est plus grande à mesure que les mucosités nasales deviennent plus épaisses et plus abondantes. Elles s'opposent au passage de l'air, en se desséchant à l'orifice externe des narines qu'elles bouchent complètement; alors l'agitation, les cris et la physionomie de l'enfant expriment sa douleur et la gêne excessive qu'il éprouve. Si dans ce moment on lui donne le sein, son état d'anxiété et de suffocation redouble; il abandonne aussitôt le mamelon, parce qu'il ne peut exercer la succion, puisqu'il ne respire plus que par la bouche, et que celle-ci se trouve alors remplie par le mamelon et par le lait qui s'en écoule; de sorte que, se trouvant continuellement agité par le besoin de la faim et l'impossibilité de la satisfaire, il tombe bientôt épuisé de fatigue, de douleur et d' inanition, et ne tarde pas à périr avant même d'être arrivé à un degré de marasme avancé. »

La marche des symptômes est plus ou moins rapide; Billard dit qu'en trois ou cinq jours un jeune enfant peut périr d'un coryza. Le danger est toujours subordonné au degré de tuméfaction de la membrane pituitaire, à l'abondance et souvent à la consistance des mucosités sécrétées par la membrane enflammée. En général, le coryza est sans danger tant que l'enfant peut téter. On comprend d'ailleurs que la coïncidence d'une autre maladie doit singulièrement aggraver le pronostic. Ainsi on a vu le coryza se compliquer d'affections cérébrales dont on s'explique sans peine le développement par le voisinage de l'inflammation qui réagit sur le cerveau. Nous avons vu, chez un enfant de plus de deux ans, le coryza s'accompagner d'angine, et ces deux maladies réunies devenir la cause principale de la mort.

Chez les enfants à la mamelle il paraît que le coryza pseudo-membraneux est très-difficile à diagnostiquer; car Billard qui sur quarante enfants atteints de coryza a trouvé cinq fois des fausses membranes, dit que dans un seul de ces cas la présence de la concrétion coqueuse fut reconnue. Les quatre autres enfants n'avaient présenté que

les signes ordinaires d'une inflammation très-intense des fosses nasales. Chez les enfants plus âgés ce diagnostic est encore très-difficile lorsque la fausse membrane n'existe en même temps sur aucune partie de la gorge accessible à la vue, et lorsqu'on ne peut pas en apercevoir une portion à l'ouverture antérieure du nez. Cependant la coïncidence d'une scarlatine, la gravité des symptômes rationnels du coryza, surtout l'écoulement d'un liquide séro-muqueux, jaunâtre, d'une fétidité repoussante et analogue à celle de l'angine couenneuse, peuvent mettre sur la voie de la nature du mal. Dans un cas que nous avons observé chez un enfant de sept ans, tous ces symptômes existaient.

Le coryza couenneux peut être grave par lui-même, surtout chez les enfants très-jeunes; mais le principal danger vient des autres maladies qui l'accompagnent.

Chez les enfants à la mamelle le traitement du coryza exige des soins spéciaux. Généralement il faut suspendre l'allaitement maternel, parce que la succion est très-pénible et augmente la dyspnée. D'ailleurs l'enfant tette si mal et prend si peu de lait que son alimentation est nécessairement insuffisante. Il faut lui faire boire à la cuiller un peu de lait tiède, pur ou coupé avec une décoction d'orge ou de grain. Quand l'inflammation est violente, et surtout s'il y a des signes de congestion cérébrale, il faut pratiquer une émission sanguine, donner des lavements laxatifs et même le calomel par la bouche; enfin, au besoin, on applique des vésicatoires aux bras, à la nuque ou aux jambes, si l'état du cerveau le réclame. Les fumigations émollientes ne peuvent qu'être nuisibles en augmentant la tuméfaction de la muqueuse olfactive.

Lorsqu'il existe une concrétion pseudo-membraneuse, il faut ajouter aux moyens précédents les insufflations d'œuf ou de calomel porphyrisés et mélangés avec la poudre de gomme arabique. Il vaudrait encore mieux, si c'était possible, toucher l'intérieur des fosses nasales avec un pinceau imbibé d'une solution de nitrate d'argent ou

d'acide hydrochlorique, en suivant d'ailleurs les mêmes préceptes que pour l'angine coqueuse.

Les maladies qui compliquent le coryza réclament des moyens de traitement appropriés à leur nature.

SECTION IV.

MALADIES DE L'OREILLE.

La plupart des maladies de l'oreille n'offrent, chez l'enfant, qu'un médiocre intérêt; une seule, l'otite, se prête à des remarques que nous allons rapidement esquisser.

L'otite présente quatre variétés principales, suivant qu'elle est aiguë ou chronique, suivant qu'elle occupe l'oreille externe ou l'oreille interne.

L'inflammation aiguë du conduit auditif externe débute par une douleur en général assez intense, qui s'accompagne quelquefois de cris aigus chez les plus jeunes sujets. Chez quelques malades il est possible de reconnaître une rougeur assez vive et la tuméfaction de la membrane qui tapisse le conduit auditif. On observe en même temps des bourdonnements d'oreille et la surdité. Après une durée de 1 à 3 ou 4 jours, ces symptômes sont suivis d'un écoulement séro-purulent, jaunâtre ou verdâtre, épais, fétide, dont l'abondance et les caractères sont en rapport avec la violence de l'inflammation. L'otite arrivée à cette seconde période dure encore quelques jours, après lesquels elle guérit par la diminution graduelle de la suppuration, ou passe à l'état chronique et se change en otorrhée.

Lorsque l'inflammation aiguë siège dans l'oreille interne ou moyenne, ses symptômes sont plus graves : la douleur est beaucoup plus vive, les cris plus forts et plus continus ; les malades éprouvent une céphalalgie très-vive, qui s'exaspère, ainsi que la douleur de l'oreille, par les moindres mouvements de la tête, l'anxiété et l'agitation sont

continuelles; l'enfant est quelquefois soulagé par le dévêtement sur le côté malade, mais toutes les fois qu'on veut lui faire changer de position il pousse des cris aigus. La mastication, la toux, l'éternuement exaspèrent les douleurs. Lorsque la maladie se termine par suppuration, la douleur cesse aussi jusqu'au moment où le pus perce la membrane du tympan, l'otite interne, plus souvent que l'externe, s'accompagne de fièvre et de troubles sympathiques dans les fonctions générales; elle se complique même quelquefois d'inflammation des organes encéphaliques. Il est assez rare qu'elle guérisse d'une manière complète; souvent elle laisse à sa suite une surdité plus ou moins prononcée; dans d'autres cas elle est remplacée par une otorrhée avec ou sans désorganisation des parties dures.

Parmi les causes de l'otite il faut mentionner l'accumulation du cérumen qui, en se concrétant, agit comme corps étranger, l'introduction de corps étrangers venus du dehors, tels que des rayons de cerises, des gratiers, et autres objets analogues. On a vu des larves d'insectes déposées dans le conduit auriculaire donner naissance à de petits vers qui ont développé une otite. Nous ne devons pas omettre l'action d'un courant d'air froid sur l'oreille ou sur toute autre partie dont le refroidissement amène celui de tout le corps, la suppression de la transpiration, et par suite une fluxion vers l'oreille. On voit aussi la dentition et la fièvre typhoïde contribuer au développement de l'otite.

L'otorrhée ou otite chronique succède assez souvent à l'otite aiguë, et résulte des fois toutes les causes que nous venons d'énumérer. Les mêmes causes peuvent aussi, quand leur action est peu énergique, développer d'emblée cette maladie. Mais lorsqu'elle est primitive, les principales circonstances auxquelles il faut l'attribuer sont les suivantes: d'abord la membrane qui tapise le conduit auditif participant à la fois de l'organisation des muqueuses et de celle de la peau, offre par là toutes les conditions prédisposantes qui influent sur la fréquence des maladies des téguments internes et externes. En second

lieu, l'action du virus scrophuleux se fit et s'exerça sur les cavités articulaires, et imprima à leur inflammation les mêmes caractères que l'on retrouve si souvent dans les ophthalmies des enfans. Enfin beaucoup de causes occasionnelles sont spéciales à l'enfance, entre autres les fièvres éruptives qui, dans un certain nombre de cas, contribuent certainement au développement de l'otorrhée.

Le principal symptôme est un écoulement de matière muqueuse qui donne à la maladie le caractère d'un catarrhe plutôt que celui d'une inflammation franche. Cet écoulement varie de quantité, augmente généralement dans les temps humides, ou lorsqu'une autre sécrétion habituelle se suspend. Dans quelques cas il se tarit tout-à-coup, et, par suite d'une métastase, on voit survenir diverses maladies, telles que l'ophthalmie, un coryza, des engorgemens ganglionnaires, une dartre, ou une maladie viscérale quelconque. Quelquefois la suspension de l'écoulement tient à une recrudescence de l'inflammation, à l'état aigu qui cède ensuite peu à peu et rend à la maladie son caractère primitif. Enfin, dans quelques cas, la matière de l'écoulement forme des croûtes derrière lesquelles le liquide sécrété s'accumule peu à peu; cette rétention détermine de vives douleurs, peut donner lieu à la perforation de la caisse; le pus finit alors dans cette cavité qu'il désorganise. Cette désorganisation peut aussi survenir lentement par la propagation de l'inflammation chronique, et l'on voit des otorrhées se terminer par la carie du rocher ou de l'apophyse mastoïde, d'où résultent parfois des abcès intra-crâniens et des inflammations graves du cerveau ou du cervelet. Dans les cas les moins fâcheux l'otorrhée qui a duré un certain temps laisse presque toujours à sa suite un certain degré de surdité.

Le traitement de l'état aigu externe réclame rarement l'emploi des émissions sanguines. Cependant si la douleur est vive et s'accompagne de fièvre, il est convenable d'appliquer quelques sangsues aux apophyses mastoïdes, d'insérer dans le conduit auditif des liquides émolliens, huileux ou narcotiques, de réveiller avec les membres

inférieurs et le tube digestif. Tous ces moyens sont encore plus nécessaires et doivent être employés avec plus d'énergie quand l'inflammation occupe l'intérieur de l'oreille et fait craindre des accidents vers le cerveau. Après la saignée locale on peut recourir au vélicatoire ou à la pomade stibiée derrière le pavillon de l'oreille. D'ailleurs il ne faut pas oublier de tenir compte des causes de la maladie. Si elle dépend d'une concrétion cérumineuse, il faut chercher à la ramollir au moyen de douches et d'injections émollientes tièdes, préparées avec du lait, ou une décoction de racine de guimauve, de fleurs de safran ou de pavot. Lorsque l'otite résulte de ce que des insectes ou des vers se sont introduits dans le conduit auriculaire, on les tue en versant dans ce conduit un peu d'huile d'olive ou d'huile de pétrole, que le docteur Ménard recommande de préférence. Enfin, lorsqu'il s'agit d'un corps étranger non vivant, on pratique des injections avec une certaine force, et si elles ne réussissent pas on en vient à l'extraction avec une oreille ou des pinces, d'après les procédés opératoires connus. Ce n'est que dans les otites internes très-violentes, et lorsqu'on a lieu de croire que le pus déjà formé dans la caisse entrelient par sa présence des accidents graves, qu'il est permis de recourir à la perforation de la membrane du tympan pour évacuer ce liquide.

Dans le traitement de l'otorrhée, les moyens généraux qu'on dirige contre la diathèse scrophuleuse et dartreuse, le régime propre à fortifier la constitution et à détruire la disposition catarrhale, doivent être mis en première ligne. Après avoir soumis l'enfant à une modification évacuante et dépurative, après avoir appliqué un excutoire au bras ou dans le voisinage de l'oreille, on fait succéder aux injections émollientes, qu'on a employées d'abord, les injections astringentes, telles que l'eau végétal-minérale, l'eau de roses, les eaux de Tarbes et de Salerne, la solution de nitrate d'argent, etc. Il ne faut jamais brusquer la guérison de l'otorrhée; on doit même se hâter de provoquer son retour lorsque sa disparition trop prompte a fait déclarer quelque autre maladie, surtout si le cerveau paraît menacé.

CINQUIÈME PARTIE.

MALADIES DIVERSES.

Les maladies dont il nous reste à parler n'ont pu trouver leur place dans les quatre grandes divisions qui nous ont servi à mettre dans notre exposition, sous l'ordre le plus méthodique, du moins un arrangement simple et commode pour l'étude.

Nous ne décrirons pas le *rhumatisme*, en premier lieu parce qu'il est beaucoup plus rare dans l'enfance qu'aux âges suivants, et ensuite parce qu'il n'offre en réalité aucuns caractères spéciaux en rapport avec le jeune âge. Le rhumatisme articulaire aigu s'observe plus souvent que le rhumatisme chronique; comme chez l'adulte, il est le point de départ le plus ordinaire des péricardites et des maladies organiques du cœur qui s'observent chez un petit nombre de sujets, surtout aux approches de la puberté. Nous avons déjà indiqué cette connexion lorsque nous avons parlé des maladies des organes circulatoires.

Au lieu de consacrer un chapitre à l'étude générale des *fièvres*, nous avons préféré rattacher les fièvres muqueuse, bilieuse et typhoïde aux affections gastro-intestinales, et les fièvres éruptives aux maladies de la peau. Les faits nous manquent encore pour décider quelle place les fièvres adynamiques, ataxiques, putrides, etc., considérées comme pyrexies essentielles, doivent obtenir dans un traité de pathologie infantile. Nous avons dit quelques mots seulement de la fièvre catarrhale et de la grippe à propos de la bronchite, bien que nous soyons fort éloigné de confondre ces maladies. De même encore nous avons, en traitant du diagnostic de la méningite, présenté quelques considérations sur la fièvre cérébrale proprement dite; mais cette affection est trop rare pour que notre expé-

rience ait pu nous fournir sur ce sujet les éléments d'une description complète. Quant à la fièvre inflammatoire ou synoque, nous en avons observé quelques cas en l'absence de toute affection locale, et nous sommes assez disposé à croire qu'après la jeunesse, l'enfance est l'âge où cette maladie a le plus de tendance à se produire. Seulement les faits que nous avons observés n'ont rien offert dans leurs symptômes, leur marche et leur terminaison, qui ne rentre entièrement dans les descriptions ordinaires.

— Les *pleures intermittentes* non endémiques s'observent chez un petit nombre d'enfants, surtout chez des sujets de 10 à 15 ans, généralement placés dans des conditions analogues à celles qui développent ces fièvres chez l'adulte, c'est-à-dire exposés à des intempéries, à des travaux pénibles, etc. Mais on en rencontre aussi chez des sujets très-jeunes et même chez des enfants à la mamelle. La seule remarque qu'il soit utile de consigner ici sur ce sujet, c'est que la difficulté de faire avaler le sulfate de quinine à ces petits malades doit lui faire préférer la quinine brulée. M. Trousseau a montré tous les avantages de cette substitution; la quinine brulée est insipide, se ramollit à la chaleur des doigts, de telle sorte qu'on peut en faire des pilules aussi petites qu'on le veut, et les mêler au potage qu'on donne à l'enfant, qui les avale sans s'en douter; enfin ce médicament est aussi sûr dans ses effets que le sulfate de quinine.

CHAPITRE PREMIER.

SCÈNE DES VITELLO-NÉS.

L'ictère des nouveau-nés n'a plus l'importance que les auteurs anciens lui attribuaient. En effet, le plus souvent ce n'est qu'un phénomène physiologique lié à la transition de la vie intra-utérine à la vie indépendante, et qui

n'annonce ni ne détermine aucun trouble notable des principales fonctions. Chez presque tous les enfants, du deuxième au quatrième jour après la naissance, une teinte ictérique se répand sur la peau, colore même les conjonctives, devient plus foncée pendant un ou deux jours, puis se dissipe peu à peu; vers le huitième ou dixième jour de la vie, la peau a repris la teinte claire d'un blanc rosé qu'elle doit désormais conserver. L'absence de tout autre phénomène morbide et la constance de cet ictère chez tous les enfants nouveau-nés, prouvent qu'il n'est point réellement un état morbide. Telle est du moins l'opinion généralement adoptée de nos jours. Il reste seulement à trouver la cause prochaine de ce phénomène. Or, ici les auteurs sont loin d'être d'accord, les uns l'attribuant à une irritation du foie, d'autres à une ecchymose générale des téguments produite par le poids de l'air sur la surface du corps (Levet). On pourrait penser que ce phénomène est de même ordre que le renouvellement de l'épiderme qui a lieu dans les premiers jours de la vie, et que le milieu nouveau dans lequel l'enfant est plongé agissant de la même manière sur le pigmentum et sur l'épiderme, rend également nécessaire le renouvellement de l'un et de l'autre. Mais cette hypothèse se trouve renversée par ce fait que la coloration ictérique ne se rencontre pas seulement à la peau, mais aussi dans beaucoup d'autres organes.

M. Richard, de Nancy, pense que la puissance attractive du foie cessant sur la veine ombilicale dès que la section du cordon est faite, s'exerce alors sur la veine-porte avec assez de puissance pour livrer à l'absorption veineuse les matières noires et verdâtres dont le tube intestinal est rempli; cette matière rendue au torrent de la circulation par les veines hépatiques, répand sur toute la peau la teinte jaune-verdâtre qui constitue l'ictère des nouveau-nés (1).

Billard donne, contre toutes les opinions qui placent dans la circulation hépatique le point de départ de l'ic-

(1) *Traité prat. des mal. des enfants*, p. 135.

tière, une raison assez plausible : c'est que l'ictère étant quelquefois local, ne peut dépendre d'une cause générale qui étendrait son influence morbide sur toutes les parties du corps, comme les maladies du foie, par exemple. Il résulte aussi des nombreuses recherches de cet auteur, que le foie et la bile se trouvant, dans les cas d'ictère, dans des circonstances très-variables, il est difficile d'expliquer quel pourrait être l'état pathologique de cet organe, ou du produit de sa sécrétion propre à causer l'ictère; que cependant la congestion du foie et des téguments existant le plus souvent avec la jaunisse, il serait possible que le séjour de ce liquide dans les organes et le dépôt du sérum qu'il renferme, et qui est presque toujours jaune, fissent la cause de l'ictère. Mais ce n'est là pour Billard qu'une simple présomption entourée seulement de quelques probabilités (1).

Si l'ictère n'est point une maladie, il faut laisser à la nature le soin de dissiper cette coloration momentanée, et ne combattre que les maladies des organes cérébraux, thoraciques ou abdominaux, qui peuvent survenir dans le cours de l'ictère sans en dépendre en aucune manière.

CHAPITRE II.

ICTÈRE INFLAMMATOIRE DES NOUVEAUX-NÉS.

Cette maladie n'a été décrite dans aucun des traités que la science possède sur les maladies de l'enfance. Celui de M. Richard, de Nancy est le seul qui renferme, sur ce point, quelques indications rapportées à l'article est dans lequel il parle de l'hépatite des nouveaux-nés. C'est à M. Martin le jeune, ancien chirurgien en chef de la Cha-

(1) *Traité des malad. des enf.*, p. 732, 2^e édit.

rité de Lyon, qui nous devons une histoire complète de cette maladie. Jusqu'à ce médecin, à qui nous devons des travaux d'un grand intérêt et d'un mérite généralement reconnu, la diathèse inflammatoire n'avait été qu'entrevue dans quelques-uns de ses effets, que personne n'avait encore groupés, rapprochés et généralisés d'après leurs connexions et leur cause première. Le mémoire très-intéressant de M. Martin a été publié en 1830, quoique rédigé depuis plusieurs années, et après avoir été communiqué à l'Académie royale de médecine. C'est d'après ce travail original, auquel on a fait peu ajouté depuis, à notre connaissance, que nous allons donner un aperçu succinct de la diathèse inflammatoire des enfants nouveaux-nés.

« Je donne ce nom, dit M. Martin, à une maladie qui se développe peu de temps après la naissance, et qui présente dans les parties qui en sont le siège tous les phénomènes des phlegmasies aiguës. La peau, le tissu cellulaire, les appareils membraneux, les organes pareschymateux et glanduleux, sont tour à tour ou simultanément envahis par cette inflammation. Elle a d'abord les formes de l'érysipèle; elle prend ensuite celles du phlegmon ou pénétrant dans les tissus sous-cutanés. Elle me paraît constitutionnelle, et, comme je l'ai toujours observée sur tous les enfants des mêmes familles, je crois qu'elle est transmise par les parents (1). »

Les premières circonstances à mentionner dans l'étiologie de cette maladie sont relatives à la santé et au tempérament des parents. On remarque du côté du père les indices d'une forte constitution et d'un tempérament sanguin-bilieux; du côté de la mère, ceux d'un tempérament sanguin-lymphatique, en général une constitution vigoureuse, ou du moins une vitalité active et une bonne santé habituelle. Une menstruation abondante, persistant quelquefois pendant les premiers mois de la grossesse, des

(1) *Ann. et obs. prat. sur la diathèse inflammatoire des enfants nouveaux-nés*, p. 12, 1830. Lyon, 1830.

attaques de métrorrhagie pendant la gestation, un état phtorique caractérisé par des étourdissements, des pesanteurs de tête, de la dyspnée, des douleurs lombaires, des crampes, des hémorrhagies nasales, etc., telles sont les principales circonstances qui ont été remarquées dans tous les cas. Quoique ces faits fournissent une induction puissante sur la cause prochaine de la maladie, — si l'on réfléchit, dit M. Martin, que les mariages dans lesquels les époux sont pourvus de tempéraments semblables, ne doivent pas être rares, et que toutefois la maladie que je décris est heureusement du nombre de celles qu'on n'observe pas fréquemment, il faudra douter encore et suspendre son jugement. »

Les enfants qu'on a vus atteints de cette maladie présentaient tous en naissant les apparences d'une santé vigoureuse : ils prenaient le sein avec avidité. Leur peau était injectée et colorée d'un beau rouge, plus chaude et tellement sensible que le moindre attouchement donnait lieu à l'agitation et à la rétraction des membres. La respiration était gênée, pénible, comme dans l'immersion de la suffocation. Souvent les joues et les lèvres prenaient une teinte violette, et quelquefois les conjonctives présentaient des ecchymoses ou tâches rouges. Ces enfants rendaient, en général, une grande quantité de sécrétions : chez quelques-uns, le sang s'écoulait par le cordon, sans nul autre ligature. Chez d'autres on apercevait à la marge de l'anus de petits tubercles hémorrhoidaux (Martin).

La maladie s'annonce ordinairement dès le premier ou le deuxième jour après la naissance, par une rougeur érysipléale occupant un espace plus ou moins étendu, formant souvent de petites plaques circonscrites que l'on voit se couvrir de boutons pustuleux, de légères phlyctènes, et sur lesquelles s'établissent la suppuration et la gangrène quand la maladie suit son cours. Dans une seconde période elle envahit les membranes muqueuses des lèvres, de la bouche, du nez, des paupières, du prépuce, de l'extrémité de la verge, et le lieu d'insertion du cordon

ombilical; elle produit le coryza, des exsudations séro-sanguines et caillote puriformes, et des aphilles qui gênent la déglutition. Elle s'étend ainsi dans les tumeurs sous-cutanées, prend le caractère du phlegmon, et marche alors plus ou moins rapidement à la suppuration ou à la gangrène. Dans la troisième période le mal gagne les viscères, produit la tension et le météorisme de l'abdomen, des nausées, des vomissements sanguinolents ou simplement muqueux, l'engorgement du foie, parfois sensible au tact, des franchises suivies d'évacuations alvines verdâtres ou d'un jaune foncé, de fréquentes déjections d'urine, une respiration précipitée, haletante, laborieuse, le hoquet, l'assoupissement, la fixité de l'œil, des contractions des muscles de la face, des soubresauts, des secoues, des rétractions convulsives des membres. Enfin on remarque une fièvre ardente et continue, des sueurs, la rougeur et la pâleur alternatives du visage; alors la mort ne tarde pas à suivre.

A l'examen des cadavres on trouve la peau parsemée de taches violettes ou noires, gangréneuses dans certains points; des foyers purulents et des infiltrations sanguines dans le tissu cellulaire, des érosions et des ulcérations sur les membranes muqueuses. On reconnaît aussi souvent les effets de l'inflammation dans les poumons et dans les plèvres. Le cœur est gonflé et ses vaisseaux propres engorgés. Le foie présente des foyers purulents, d'autres fois un état d'induration; le cerveau paraît aussi enflammé, ou du moins congestionné. Enfin, dans les séreses, on constate des épanchements, le plus souvent sanguins, quelquefois mêlés de sérosité.

— En rapprochant, dit M. Martin, le tableau des phénomènes qui se succèdent dans le cours de cette maladie de celui de ses résultats observés dans les différents appareils d'organes, je ne pense pas qu'il puisse y avoir deux opinions sur sa cause prochaine et immédiate. Il n'en est pas tout-à-fait de même de sa cause prédisposante ou éloignée; mais, soit qu'on veuille la chercher dans les éléments de la formation et de la vie du fœtus, soit qu'on

l'attribue à une proportion surabondante de fluide sanguin transmis par la mère, ou à un excès d'irritabilité de la fibre vasculaire, excès incessamment accru dans l'enfant qui vient de naître par l'influence de l'air atmosphérique et du changement de température, par le contact des objets extérieurs, et en général par le nouveau mode d'existence que l'enfant subit, soit avant, soit après la parturition, on s'en rendra pas moins à conclure que cette maladie présente, depuis son commencement jusqu'à sa terminaison, une série de phénomènes qui appartiennent tous à l'ordre des phlogosies les plus intenses; et comme l'inflammation ne se concentre pas dans un espace circonscrit, qu'elle est étendue à tous les systèmes et à tous les appareils d'organes, j'ose croire que le nom de *diathèse inflammatoire des nouveau-nés* est le seul par lequel on puisse désigner convenablement cette maladie (1). »

Quoique notre expérience personnelle ne nous ait encore fourni aucun fait qui nous ait permis de contrôler par l'observation directe la conclusion que M. Martin a tirée de l'examen des faits de sa pratique, nous n'hésitons pas à partager son opinion sur l'existence incontestable d'une maladie que ses caractères symptomatiques, sa marche et son étiologie différencient suffisamment de toute autre affection. Le nom de *diathèse inflammatoire* nous paraît convenablement adapté à sa nature, que doivent mettre encore en évidence les résultats du traitement dont nous allons parler.

Abandonnée à elle-même ou mal traitée, la maladie se termine à peu près constamment par la mort. Si, au contraire, elle est combattue à temps et d'une manière convenable, elle se termine en général heureusement. Quand il doit en être ainsi, on voit les taches érysipélateuses disparaître les premières, sans desquamation consécutive, si ce n'est sur les points où existaient des phlyctènes et des pustules. Les symptômes dus à la coagulation et à la phlogose des membranes muqueuses et séreuses, des viscères,

(1) *Lect. 13*, p. 20.

du tissu cellulaire, sont plus lents à disparaître et ne cessent guère tout-à-fait que du douzième au quinzième jour de la maladie. Quelquefois même il survient des recrudescences, mais elles ne sont fâcheuses qu'autant qu'on ne continue pas le traitement rationnel.

Le traitement de la diathèse inflammatoire est préservatif ou curatif. Le premier a pour but de modifier la disposition pléthorique qui se rencontre chez la mère pendant la grossesse, et dont l'influence sur le développement du mal nous paraît incontestable. Quand une fois on a pu constater son existence et ses effets dans une ou plusieurs grossesses, et par un accouchement antérieur, on doit, même dans l'état de vacuité de l'utérus, diminuer l'hématose et dégorger localement l'appareil utérin par quelques applications de sangsues à la vulve, à l'anus et dans les régions sacrées. Pendant la grossesse, la saignée générale, celle du bras surtout, convient mieux et doit être ordinairement répétée plusieurs fois. On prescrit l'usage des bains tièdes, des lavements pour combattre la constipation, des boissons tempérantes, acides et délayantes, un régime peu substantiel, un exercice modéré et l'éloignement de toutes les causes qui peuvent amener des secousses morales. Dans l'emploi du traitement antiphlogistique, il ne faut pas se laisser arrêter par la pâleur du visage, qui peut très-bien coexister avec la pléthore, et qui, résultant alors d'un état plus dense de la peau qui rend son tissu moins perméable au sang, explique par cela même la disposition des autres organes à souffrir d'un reflux sanguin favorisé par le peu de vascularité des téguments externes. Tels sont les meilleurs moyens de prévenir, chez les femmes dont nous parlons, des métrorrhagies et des avortements qui ne sont pas rares, et de préserver l'enfant d'une maladie qui menace son existence aussitôt qu'elle commence.

Qu'en ait employé ou non ce traitement, lorsque la maladie se déclare chez un nouveau-né, il faut directement la combattre par les moyens suivants. Si elle se manifeste dès les premiers moments de la naissance par la rougeur,

la chaleur et la sensibilité douloureuse de la peau, il faut laisser couler abondamment le sang après la section du cordon ombilical. Ensuite on a soin de faire coucher l'enfant sur un plan incliné, de le peu couvrir et de ne point le serrer dans un maillot, mais de laisser à ses membres la facilité de se mouvoir et de se développer sans gêne. On s'abstient de lui faire prendre le sein pendant les premiers jours, et l'on trouble son appétit en lui faisant sucer de l'eau sucrée. On favorise l'évacuation du méconium par de petites doses de sirop laxatif doux; on prescrit des lotions d'eau tiède sur tout le corps, ou même un bain de temps en temps. Si malgré ces moyens la maladie se développe, on coupe le cordon au-dessous de la ligature pour obtenir une évacuation sanguine, et si cet essai ne réussit pas, on applique des sangsues aux membres inférieurs, au nombre de deux ordinairement, et l'on ne doit pas craindre d'y revenir plusieurs fois, jusqu'à ce que les accidents diminuent. Si l'inflammation se concentre dans un organe, c'est dans son voisinage qu'on placera les sangsues, c'est-à-dire derrière les oreilles, à la marge de l'anus, aux membres inférieurs, sur l'abdomen, et en particulier sur la région du foie, suivant que les organes de la tête, du thorax, de l'abdomen, et spécialement le foie, sont le siège principal de la fluxion sanguine. Si des tubercules hémorrhéoidaux existent, c'est sur eux qu'on doit faire mordre les sangsues. D'après les faits observés par M. Martin, il n'est pas douteux que ce traitement ne soit très-efficace, mais il ne faut pas l'employer avec timidité et céder aux préjugés ni à la tendresse mal entendue des parents, qui en contraindraient souvent l'emploi. Outre les émissions sanguines, quelques moyens accessoires sont ordinairement nécessaires. Ainsi on donne des absorbants en cas de transudées et de selles verdâtres, des antispasmodiques dans les crises nerveuses, etc. Quand l'abattement des forces annonce que l'inflammation est arrêtée dans son développement, les excitants à la peau, les sinapiques et les vésicatoires sont indiqués pour dissiper les derniers restes de la fluxion.

Quant à la question de savoir si les femmes placées dans les conditions que nous avons indiquées doivent nourrir leurs enfants, M. Martin n'hésite pas à se prononcer pour la négative.

CHAPITRE III.

OEDÈME DES NOUVEAU-NÉS.

L'oedème des nouveau-nés a aussi reçu le nom d'engorgement, d'insufflation, de sclérome, et dans ces derniers temps M. Valleix a proposé la dénomination d'œdème *lente des nouveau-nés*, qui lui a paru indiquée par la nature même de la maladie. Jusqu'ici l'usage a fait prévaloir la dénomination que nous conservons en tête de ce chapitre, parce qu'elle a l'avantage d'indiquer le symptôme le plus caractéristique de la maladie, sans rien préjuger sur sa nature, qui est encore aujourd'hui l'objet de nombreuses contestations.

Autant cette maladie est fréquente et meurtrière dans les hospices d'enfants-trouvés, autant elle est rare dans la pratique particulière. Sous ce double rapport elle se rapproche de la pneumonie et du muguet étudiés dans les premiers temps de la vie.

Symptômes.

Le début a toujours lieu à une époque très-rapprochée de la naissance. M. Valleix ne l'a jamais observé postérieurement au quatrième jour. Cette circonstance suffit pour placer le point de départ de la maladie dans quelque-une des conditions propres au passage de la vie intra-utérine à la vie indépendante. Nous verrons plus loin s'il est possible de déterminer positivement quelle est cette condition prédisposante.

Le tableau résumé de la maladie présente les phénomènes suivants : au début, coloration générale livide, refroidissement de tout le corps, plus marqué aux extrémités, assoupissement assez profond, gêne notable de la respiration qui se fait ordinairement par inspirations courtes, pénibles et séparées par des intervalles, bientôt oedème des pieds et quelquefois des mains. Dans une seconde période l'infiltration devient plus générale, la peau prend un aspect violet, surtout aux pieds et aux mains ; le pouls est lent et faible ; l'assoupissement est plus profond, les yeux restent fermés ; le cri prend une acuité remarquable. Dans les derniers jours l'oedème envahit presque tout le corps, le froid devient plus intense, une écume sanguinolente sort de la bouche dans un assez grand nombre de cas, et le malade s'éteint sans agonie pénible. Quand la guérison doit avoir lieu, la dyspnée et l'assoupissement cèdent les premiers, le malade ouvre les yeux quand on l'expose à la lumière, la chaleur revient dans toutes les parties du corps ; l'oedème commence à se dissiper dans les points envahis les derniers, et bientôt après l'enfant entre en convalescence.

Revenons maintenant sur l'examen détaillé des symptômes les plus importants.

« Ce n'est que dans ces derniers temps, dit M. Valleix, qu'on a vu dans l'oedème un symptôme caractéristique de la maladie ; on a reconnu, en effet, qu'il ne manquait dans aucun cas, et que, lorsqu'il n'existait pas, l'induration était due à un état pathologique ou cadavérique particulier, qui en avait inspiré à des observateurs peu attentifs (1). » L'oedème suit presque constamment la même marche dans son développement chez tous les sujets. Il commence par les extrémités inférieures, surtout par les pieds ; il fait des progrès et a déjà envahi les cuisses lorsqu'il se montre aux mains. Dans un cinquième des cas, M. Valleix l'a vu se déclarer aux mains en même temps qu'aux pieds, et plus rarement encore il l'a vu se manifester

(1) *Clin. des mal. des enfants nouveau-nés*, p. 514.

ter à une joue un jour avant qu'il n'envahit les pieds. Vers la fin et dans les cas graves, l'hypogastre, les fesses et les parties génitales s'infiltrèrent à leur tour, mais il est plus rare de voir l'œdème gagner la partie postérieure du tronc et surtout la poitrine. Il n'est jamais également considérable des deux côtés, et le côté le plus infiltré est toujours celui sur lequel on couche l'enfant. M. Valleix a plusieurs fois expérimenté qu'en plaçant le malade sur le côté opposé, l'infiltration était le lendemain plus considérable dans les parties devenues plus déclives. Les auteurs ont noté la saillie de la plante du pied, sa forme de dos d'âne au progrès de l'œdème, c'est un caractère qui se retrouve en effet dans tous les cas un peu graves. Quand l'œdème a gagné la face, les paupières sont souvent distendues au point de devenir demi-transparentes. Contre l'opinion des auteurs qui ont prétendu que les membres infiltrés ne conservent pas l'impression du doigt comme dans les hydropisies ordinaires, il est certain que l'enfoncement est d'autant plus profond et plus durable que l'œdème est plus considérable; quand il l'est très-peu, le tissu cellulaire restant souple, la dépression est moins sensible et s'efface rapidement.

Après l'œdème la coloration de la peau et le refroidissement sont deux symptômes très-importants. La peau est violacée, surtout aux extrémités; mais à cette teinte générale se mêle bientôt une coloration ictérique telle qu'on l'observe chez tous les enfants quelques jours après leur naissance, et qui n'offre ici rien de spécial, sinon qu'elle est souvent plus intense que chez les enfants non aseptémiques. Certains auteurs ont dit que la peau est adhérente aux parties profondes; mais c'est une erreur. Lorsque l'œdème commence on peut facilement faire de grands plis aux téguments, et si ceux-ci ne sont plus possibles quand l'œdème est considérable, on peut toujours faire glisser la peau sur les parties sous-jacentes et reconnaître qu'elle est encore mobile.

Le refroidissement se montre dans tous les cas un peu graves. M. Valleix ne l'a vu manquer que chez un sujet

légèrement affecté et qui a été guéri en peu de jours. C'est presque constamment par les extrémités qu'il commence. Dans les derniers jours de la vie, la température de tout le corps est tellement basse qu'elle fait éprouver une sensation pénible à la main. L'intérieur de la bouche participe au refroidissement général. Si l'on entoure le corps de luges chauds, il s'échauffe jusqu'à ce qu'il soit en équilibre de température avec les corps environnants; mais si on les enlève, la peau perd promptement sa chaleur acquise comme un corps inerte.

Il y a presque constamment des troubles respiratoires dans cette maladie, bien que la pneumonie ne se rencontre que dans un nombre de cas assez restreint. Ainsi on constate une gêne de la respiration caractérisée par une dilatation incomplète du thorax, par une inspiration brusque et très-courte, tandis que l'expiration est très-lente; en somme, la respiration est notablement ralentie. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que, dans certains cas de pneumonie, ce ralentissement persiste encore; mais généralement c'est le contraire qui a lieu. La moëlle qui doit aussi, en général, être atteinte l'hépatisation pulmonaire, peut correspondre à une portion de poumon qui n'a pas respiré. La pneumonie, quand elle survient, se déclare le plus souvent après que l'œdème a duré au moins deux ou trois jours. Elle est toujours une complication très-grave.

L'examen du pouls est rendu difficile par sa ténuité, par l'indocilité de l'enfant et par l'excès de bras; cependant il permet de reconnaître sa faiblesse et sa lenteur. Dans les cas simples il varie entre 60 et 80 pulsations par minute; s'il s'élève plus haut, c'est qu'une pneumonie est venue modifier l'énergie de la circulation. Mais l'absence de fièvre dans l'œdème est un fait généralement reconnu. Les battements du cœur, plus facilement appréciables que ceux du pouls, paraissent toujours faibles, lents et aléatoires. Il est évident par ces signes et par leur coïncidence avec la ténue asphyxique étendue à tout l'extérieur du corps, que la circulation est gênée et difficile.

Chez la plupart des malades il y a comme un regard d'ad-

sement général de toutes les sensations, et un assoupissement profond. M. Valleix dit que plusieurs d'entre eux, si on les abandonnait à eux-mêmes, mourraient sans se plaindre et sans paraître éprouver le moindre besoin. Si l'on veut leur faire pousser des cris, on n'y parvient qu'en les secouant rudement, quelquefois même il faut leur causer de la douleur, tandis que chez d'autres enfants, comme on le sait, le moindre attouchement excite des cris violents. L'agitation ne se manifeste au moment de l'exploration que si la maladie est très-légère, ou si une autre maladie grave, comme la pneumonie, vient la compliquer; à part ces cas exceptionnels, la torpeur des malades est très-prononcée. Elle s'annonce aussi par l'occlusion permanente des paupières, qui existe alors même que les paupières ne sont nullement œdémateuses, ou le sont trop peu pour s'écarter difficilement.

Audry, Anvity, Dugès, ont signalé des mouvements spasmodiques et convulsifs, le trismus et l'épisthosis. Ces assertions, déjà combattues par M. Léger, ont été réfutées par M. Valleix, qui n'a jamais observé rien de pareil. « Je suis certain, dit-il, que quand M. Dugès a avancé que les enfants étaient parfois assez raides pour qu'on pût les enlever tout d'une pièce en les prenant par la tête, il avait en vue l'état qu'on a appelé *endurcissement adipeux*, et qui est, comme on le verra plus loin, un état très-différent de la maladie qui nous occupe (1). »

Tous les observateurs ont reconnu les caractères remarquables du cri dans cette maladie. Dans tous les cas graves il est aigu, entrecoupé, extrêmement faible, souvent éteint et voilé; mais ces caractères n'existent que dans les premiers moments; peu à peu le cri devient plus fort, plus grave, et finit par se rapprocher du cri des enfants non œdémateux. Les recherches anatomo-pathologiques de M. Valleix lui ont démontré que le cri ne doit point ses caractères spéciaux à l'œdème de la glotte invoqué par quelques observateurs, mais plutôt à la gêne de la respiration.

(1) *Ouvrage cité*, p. 637.

Quant aux fonctions digestives, elles n'offrent aucun trouble grave; il y a de l'inappétence, mais pas de soif; la langue est humide, le ventre reste souple, indolent, il n'y a ni vomissements, ni diarrhée, si ce n'est dans quelques exceptions rares et dans les cas où une complication se manifeste vers les organes digestifs; c'est le muguet qui vient le plus souvent modifier l'aspect de la maladie sous ce rapport.

Caractères anatomiques.

Si nous rapprochons de l'examen des symptômes celui des lésions que la maladie laisse sur le cadavre, nous verrons qu'en incisant les parties tuméfiées il s'écoule une sérosité abondante, légèrement visqueuse et colorée en jaune vif. La section du derme laisse suinter de grosses gouttes de sang noir, provenant de la division de ses vaisseaux engorgés. Au-dessous, la première couche de tissu cellulaire, celle dans laquelle abonde le tissu adipeux et qui forme ce qu'on appelle le pannicule graisseux, offre un aspect granuleux très-prononcé; elle est divisée en petits grains séparés par des intervalles crénelés; et, lorsque l'infiltration est très-considérable, ces coépascules sont assez éloignés les uns des autres, et ne paraissent plus faire partie de la même membrane. Plus près de l'aponevrose on trouve le tissu cellulaire lamelleux énormément distendu par la sérosité, formant une masse gélatineuse transparente, et ayant acquis une épaisseur de cinq à dix millimètres et même plus. Quant au tissu cellulaire inter-musculaire, il est exempt d'infiltration.

Ce n'est pas seulement le tissu cellulaire qui contient une quantité anormale de sérosité, mais on trouve presque toujours de l'eau dans les plèvres, le péricarde, le péritoine et même dans les méninges ou dans les ventricules de l'encéphale. Quelque ces épanchements soient généralement assez peu abondants, il est probable néanmoins qu'ils ont une certaine part à la production des symptômes pendant la vie.

On trouve aussi dans beaucoup d'organes les caractères anatomiques d'une stase sanguine analogue à celle que nous avons vu se produire dans les capillaires de la peau. Ainsi on trouve rarement les poumons exempts d'un engorgement sanguin plus ou moins prononcé et qui quelquefois a fait place à une véritable hépatisation. Ainsi la muqueuse du larynx, de la trachée et des bronches, présente une couleur rouge foncée et des arborisations nombreuses. La muqueuse digestive, dans la plus grande partie de son étendue, est le siège d'une congestion non moins évidente, uniforme et offrant les caractères d'une congestion passive. Dans les organes très-vasculaires comme sont le foie, la rate, les membranes cérébro-spinales, le tissu cérébral lui-même, la congestion sanguine est toujours très-marquée. Enfin, dans l'appareil circulatoire, dans les sinus de la dure-mère, dans les plexus veineux rachidiens, aussi bien que dans les grosses veines qui aboutissent au cœur, dans les cavités de cet organe et jusque dans l'aorte et les grosses artères, on trouve une quantité énorme de sang noir liquide qui gonfle et distend tous ces vaisseaux, surtout les veines. « On se figure difficilement, dit M. Valleis, combien ces enfants contenaient de sang; la moindre ouverture faite à une veine, en inondait la table. J'ai vu, pour pouvoir pousser une injection dans les veines de l'œil par la jugulaire interne, faire écouler préalablement près de six onces de sang des veines du crâne, de la face, et des sinus de la dure-mère, chez un de ces petits sujets (1). »

Étiologie.

Malgré ses symptômes bien tranchés et ses caractères anatomiques si remarquables, l'œdème des nouveau-nés a été confondu par beaucoup d'auteurs avec deux états morbides qui en diffèrent beaucoup. Le premier est une inflammation œdémateuse des parties molles que la varia-

(1) Ouvrage cité, p. 513.

bilité de son siège et son étendue circonscrite, ses caractères inflammatoires locaux et la coïncidence ordinaire d'un état fébrile ne permettent point de confondre avec la maladie qui nous occupe. Le second est l'endurcissement adipeux. Or celui-ci n'est point une maladie, mais un simple phénomène morbide qui s'observe dans toute espèce d'affections du nouveau-né, mais seulement dans les derniers temps de la vie, et au moment de l'agonie. On comprend qu'il s'accompagne du refroidissement et d'absence dans le cri, sans que ces deux phénomènes établissent son identité avec l'oedème, puisqu'ils résultent de l'affaiblissement de la vie qui va s'éteindre. D'ailleurs, dans tout le cours de l'oedème, la peau est violette et mobile sur les parties sous-jacentes; dans l'endurcissement adipeux elle est blanche ou jaunâtre, et comme collée aux os. Le siège est aussi différent dans les deux cas : l'endurcissement occupe le plus souvent les joues, puis les parties supérieures et externes des membres, leurs parties internes, les fesses, le dos et la partie antérieure du thorax; nous savons que dans l'oedème il en est autrement. Dans celui-ci c'est la couche lamelleuse et profonde du tissu cellulaire qui est le principal siège de l'infiltration séreuse; dans l'endurcissement cette couche est sèche et mince, le pannicule graisseux est demi-ferme, et ne contient pas de sérosité; enfin le derme ne fournit point à la section de grosses gouttes de sang noir comme cela se voit dans l'oedème. Telles sont les principales différences de deux états qui ont été décrits comme des variétés d'une même maladie par certains auteurs. D'autres, les ayant complètement confondus, ont pris l'endurcissement pour le caractère anatomique, et imposé à la maladie les dénominations fausses d'endurcissement du tissu cellulaire, d'arthralgie centrale, d'arête compacte, de sclérose, etc.

Causes.

L'étiologie de cette affection est encore peu avancée. Parmi les causes prédisposantes et occasionnelles, il n'en

est que deux dont l'observation ait démontré l'influence réelle, ce sont la débilité et l'action du froid. Tous les auteurs ont admis la première; c'est sur des avortons, c'est-à-dire sur des enfants nés avant terme, que la maladie s'observe le plus souvent, et parmi les enfants nés à terme, elle atteint de préférence ceux qui se font remarquer par leur peu de développement. L'action du froid, quoique aussi réelle, a été contestée par quelques auteurs, entre autres par Paletta (1); mais les observations nombreuses et positives de Billard et de M. Valleix ne permettent pas le doute à cet égard. En réunissant les relevés de ces deux observateurs, on trouve que sur cinq cent quinze cas, recueillis dans les années 1826 et 1827, les mois de janvier, février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre en ont fourni quatre cent cinquante, ce qui donne une moyenne de cinquante-six cas pour chacun de ces mois les plus froids et les plus humides, à Paris; tandis que les mois de juin, juillet, août et septembre, qui sont les plus chauds et les plus secs, n'ont fourni que soixante-cinq cas, c'est-à-dire une moyenne de seize cas. M. Richard, de Nancy, a constaté des résultats analogues à l'hospice de la Charité de Lyon.

Quant à la cause prochaine de la maladie et à sa nature, il serait trop long de discuter les opinions des auteurs, car elles sont très-nombreuses et très-éloignées les unes des autres. M. Valleix, par les recherches importantes que nous avons citées si souvent dans le cours de ce chapitre, a démontré qu'il n'est pas possible d'attribuer l'œdème, comme l'ont fait Hulme, M. Troccon et Dugès, à une pneumonie, puisque celle-ci est une complication secondaire et assez rare d'ailleurs. Paletta prétend que la flaccidité des poumons en est la cause, et que le froid n'y est pour rien; les faits démentent cette manière de voir. M. Léger, qui paraît avoir soutenu les idées de Brochet, admet comme causes la non-oblitération des ouvertures fœtales, et la coagulation de la sérosité dans le tissu cellulaire,

(1) *Arch. gén. de méd.*, 1822, t. II, p. 165, et t. III, p. 275.

par suite d'une altération spéciale du sang. Mais la première ne se rencontre pas plus souvent chez les enfants oedémateux que chez ceux qui ne le sont point, et l'examen anatomique prouve que le sérum n'est nullement coagulé puisqu'il s'écoule facilement à l'incision des membres malades; il est aussi liquide dans le tissu cellulaire que dans les cavités séreuses. Quant à l'opinion de M. Denis, qui admet qu'il y a irritation inflammatoire du tissu cellulaire, coïncidant le plus souvent avec des phlegmasies gastro-intestinales, les symptômes pendant la vie, les lésions anatomiques après la mort, prouvent que rien n'est moins analogue au phlegmon que cette maladie, et que dans la plupart des cas les voies digestives sont dans un état sain ou à peu près sain.

L'opinion de M. Valleix nous paraît, quant à présent, la mieux fondée et la seule admissible. Il accorde la plus grande valeur à la gêne de la respiration et à la faiblesse de la circulation, et termine en disant : « Si nous rapprochons maintenant de ces lésions de fonctions, la congestion sanguine générale, indiquée pendant la vie, par la coloration livide de tout le corps, et après la mort, par l'engorgement de tous les vaisseaux, nous avons réuni les circonstances les plus remarquables de la maladie; et tout porte à croire que c'est à ce trouble de deux fonctions importantes et à la stase sanguine qui en est la suite, qu'il faut rapporter la production de l'œdème (1). » On comprend maintenant pourquoi M. Valleix avait proposé d'appeler la maladie *anphyræ leude des nouveau-nés*. Sans doute cette opinion laisse encore beaucoup à désirer, et ne définit point la nature du trouble de deux fonctions importantes qui est le point de départ de l'œdème. On se demande encore quelle est la cause de ce trouble, et s'il faut le rapporter à la simple difficulté que la respiration et la circulation extra-utérine aient à s'établir. Mais c'est précisément parce que cette opinion n'a plus le caractère hypothétique des opinions anciennes, qu'elle nous paraît plus

(1) Ouvrage cité, p. 632.

avancée. Elle est en rapport avec les faits, et c'est déjà un progrès; mieux vaut attendre de nouvelles observations pour dissiper le doute qui nous reste, que nous jeter dans des hypothèses.

Pronostic.

Le pronostic de cette affection est ordinairement très-grave. Il l'est d'autant plus, que l'enfant est plus faiblement constitué et la maladie plus ancienne. Si elle ne guérit pas dès le début, elle tend sans cesse à faire des progrès, parce que le malade ne prenant ni aliments ni boissons, la faiblesse qui en résulte augmente nécessairement la débilité primitive, et par là toutes les chances d'une terminaison funeste.

Traitement.

La thérapeutique se ressent de l'incertitude qui nous reste sur la nature de la maladie. Les auteurs ont préconisé, suivant les idées qu'ils ont adaptées sur ce point, soit les émissions sanguines, les bains émollients, soit les lavements stimulants, les lotions excitantes, aromatiques, les frictions irritantes, les vésicatoires, les bains de vapeur. M. Valleix a expérimenté ou vu employer la plupart de ces médications, et la seule qui lui ait paru avoir des avantages incontestables est celle des émissions sanguines. Il rapporte l'histoire d'un enfant qui supporta très-bien trois applications de sangsues rendues nécessaires par la gravité et la récurrence des symptômes; la maladie paraissait marcher vers la guérison; lorsque, après quatre ou cinq jours, l'invasion et les progrès rapides d'une pneumonie amenèrent la mort. « Frappé, dit M. Valleix, de l'amélioration qui avait suivi l'emploi des sangsues chez ce malade, je le continuai dans deux autres cas. Les saignées furent des plus abondantes; un des deux enfants surtout perdit beaucoup de sang pendant toute une nuit, et en eut encore à plusieurs reprises de gros caillots dans ses larges. Le résultat fut des plus satisfaisants, et ces deux malades, dont l'endurcissement avancé avait été constaté par

MM. Thérriot et Aubry, furent bientôt en état d'être confiés aux soins d'une nourrice et d'être envoyés peu de temps après à la campagne, en parfait état (1). — Enfin M. Valleix cite un cas rapporté par Mondière, dans lequel quatre sangsues à la base de la poitrine firent disparaître un croupé général, survenu chez une petite fille le lendemain de sa naissance. Palleta emploie également les sangsues et toujours avec vigueur : il dit avoir guéri quarante-deux malades sur quarante-trois : résultat incroyable, mais qui semble au moins venir à l'appui de cette médication.

Il paraît démontré que les émissions sanguines pour réunir doivent être abondantes. Quant au lieu d'application, il paraît peu important, puisqu'il s'agit seulement de décongestionner le système vasculaire plutôt que de combattre un état local. Si l'on veut néanmoins dégorgier plus vite les organes céphaliques, on mettra les sangsues aux tempes ou derrière les oreilles ; on les applique aussi tantôt à l'anus, tantôt à l'épigastre, tantôt sur le thorax, etc.

Le refroidissement des malades indique la nécessité d'envelopper le corps de linges chauds, de coton cardé, chauffé et enveloppé de taffetas ciré. Dans quelques cas, malheureusement trop rares, ces moyens simples et le séjour dans une salle chaude peuvent guérir des enfants atteints encore légèrement ou doués d'une constitution plus robuste. De toutes les boissons, la plus convenable est le lait maternel qu'il faut donner à l'enfant toutes les fois qu'il a la force de prendre le sein ; sinon, on lui donne, pour le nourrir, une décoction d'orge ou de farine de seigle, coupée avec du lait.

Enfin, pour prévenir le développement de la maladie, il faut, à la naissance des enfants, surtout dans les saisons froides, prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'action du froid sur la surface de la peau.

(1) *Œuvres compl.*, p. 570.

CHAPITRE IV.

HYDROPIE.

L'affection que nous avons décrite sous le nom d'œdème des nouveau-nés est la seule espèce d'hydropisie qui offre une certaine fréquence dans les premiers jours de la vie. Nous savons qu'elle appartient exclusivement à cette époque, et ne se rencontre jamais plus tard avec l'ensemble des caractères que nous lui avons assignés. Les autres espèces d'hydropisies sont encore assez rares jusqu'à l'âge d'un à deux ans, et ce n'est qu'à partir de la première dentition qu'on en observe un certain nombre de cas.

CAUSE.

La maladie reconnaît différentes causes dont l'indication nous permettra de renvoyer le lecteur à d'autres parties de cet ouvrage. Nous ne devons insister ici que sur les espèces d'hydropisie dont il n'a pas encore été question.

1^o Les hydropisies consécutives à des lésions organiques qui apportent un obstacle au retour du sang vers le cœur, ne sont en général ni très-fréquentes, ni absolument rares dans l'enfance. De ces diverses lésions organiques nous savons déjà que celles du cœur et des gros vaisseaux ne commencent à se montrer que vers la fin de l'enfance. Celles du foie et de la rate, qui à un âge plus avancé deviennent des causes assez fréquentes d'hydropisie, sont bien plus rares dans le premier âge. Nous ne trouvons à mentionner ici parmi les hydropisies par cause mécanique, que celles qui résultent des maladies tuberculeuses de l'abdomen et du thorax. Les indurations ganglionnaires du mésentère et du médiastin compriment quelquefois les grosses veines de ces régions, rétrécissent leur calibre et peuvent alors faire naître des épanchements dans le tissu cellulaire et dans les séreuses. Toutefois cela n'arrive te-

distinctement qu'à un degré fort avancé des phthisies tuberculeuses. Dans l'abdomen, les tubercules développent quelquefois une ascite dès les premiers temps de leur formation; mais alors c'est plutôt par suite de l'irritation du péritoine qui les accompagne, que par l'obstacle apporté au cours du sang veineux. Des résultats semblables s'observent dans la cavité crânienne, où les épanchements sont le plus souvent l'effet de l'irritation séreuse des membranes séreuses; dans quelques cas plus rares dont nous avons cité des exemples, ils résultent de la compression des sinus.

2° Nous n'avons rien à dire des hydropisies symptomatiques de l'inflammation des plèvres, du péritoine et des séreuses encéphaliques, nous en avons fait l'histoire ailleurs.

3° Les cachexies, en désorganisant la constitution, finissent par s'accompagner d'hydropisie. On ne rencontre guère chez les enfants que la cachexie scorbutique qui ait cet effet, et encore faut-il distinguer les cas où les lésions tuberculeuses locales expliquent ce résultat. D'ailleurs cet accident final des cachexies est en lui-même d'une médiocre importance.

4° L'anémie, simple effet d'un mauvais régime, ou résultant de diverses maladies, telles qu'une hémorrhagie abondante, un flux diarrhéique, etc., devient cause d'hydropisie chez un certain nombre d'enfants. L'anémie chlorotique agit quelquefois de même aux approches de la puberté. Dans ces deux ordres de cas, le jeune âge n'est la source d'aucune différence dans les symptômes, la marche et le traitement de cette classe d'hydropisies. Il suffit d'appliquer ici les notions de la pathologie ordinaire.

5° Les hydropisies qu'il faut regarder comme plus spéciales à l'enfance sont celles qui ont une marche aiguë et surviennent généralement à l'occasion d'une modification des fonctions de la peau. Cette membrane, remarquable dans le premier âge par la délicatesse de son tissu, par son impressionnabilité, par l'activité des sécrétions dont elle est chargée, peut, sans aucune maladie antérieure, être

assez énergiquement modifiée par l'action du froid pour perdre pendant un certain temps la faculté de dépouiller le sang de ses principes aqueux ; alors l'ésalation étant plus active dans le tissu cellulaire et dans les sécrètes, peut devenir la source d'une hydropisie. On observe assez souvent des cas de ce genre, mais les épanchements séreux surviennent plus facilement encore vers la fin ou pendant la convalescence des fièvres éruptives. L'action du froid sur la peau, à une époque où la desquamation de l'épiderme n'est pas encore achevée, a presque toujours des effets fâcheux. Les sujets récemment atteints d'une rougeole ou d'une variole sont plus disposés à des affections catarrhales ou inflammatoires ; mais à la suite de la scarlatine c'est le plus souvent une hydropisie qui se déclare. C'est donc principalement de l'hydropisie scarlatineuse qu'il va être ici question.

Symptômes.

L'hydropisie qui se manifeste dans les conditions que nous venons d'indiquer a, comme nous l'avons dit, une marche aiguë. Ordinairement précédée par des symptômes généraux peu intenses, tels qu'un sentiment de malaise, de faiblesse et d'accablement, des vomissements, des urines troubles, etc., elle ne s'annonce pas toujours en premier lieu dans les parties les plus éloignées du centre circulatoire, comme les pieds et les mains ; quelquefois c'est la face qui s'infiltre la première. Les jours suivants elle gagne de proche en proche les régions voisines, occupe ainsi tous les membres et la face, puis arrive au tronc. En même temps qu'elle gagne en étendue, elle augmente et soulève de plus en plus la peau, de manière à produire un gonflement énorme. Celui-ci varie d'ailleurs beaucoup, quant à son degré, suivant les parties du corps. Il est plus considérable dans les régions où le tissu cellulaire est lâche et lamelleux. Ainsi, au dos des pieds et des mains, l'enflure, plus sensible qu'à la région plantaire ou palmaire, détermine ordinairement une saillie ovale, limitée par

les ligaments annulaires du tarse et du carpe; aux paupières elle gonfle quelquefois le tissu cellulaire sous-cutané et sous-muqueux à un tel point que ces voiles membraneux ne peuvent plus s'écarter et mettre l'œil à découvert; enfin, dans d'autres cas, le volume du scrotum, du pénis, des lèvres de la vulve, est augmenté d'une manière effrayante.

Les symptômes locaux et généraux de cette espèce d'anasarque sont très-différents de ceux qu'on observe dans les hydropiques passives ou mécaniques. En effet, l'enflure est résistante au toucher et conserve moins longtemps l'impression du doigt, qui n'est bien manifeste qu'autant qu'on déprime fortement les téguments; elle se répand plus régulièrement dans les diverses parties du corps, n'en occupe que rarement une petite étendue, et n'obéit point aussi sensiblement aux lois de la pesanteur que dans les hydropiques symptomatiques. La peau offre une élévation de température généralement très-appreciable, bien que modérée; elle est même assez souvent colorée en rose et presque érythémateuse; le plus souvent sèche, elle est aussi quelquefois haliteuse et visqueuse; le malade éprouve dans toutes les parties infiltrées une sensation de chaleur, des élancements, des picotements et même une véritable douleur. Dans la plupart des cas le pouls est fébrile, c'est-à-dire sensiblement plus fréquent et plus développé qu'à l'état de santé; il y a de la soif qui paraît plutôt en rapport avec la fièvre qu'avec l'hydropie elle-même; les urines offrent une couleur rouge faocée, due à la matière colorante du sang; elles sont souvent comme boueuses, laissent précipiter un sédiment abondant blanchâtre, et sont toujours peu copieuses.

Tels sont les symptômes de l'hydropie aiguë, tant qu'elle n'occupe que le tissu cellulaire des régions extérieures. Heureusement, dans la plupart des cas, elle s'arrête à ce degré et n'envahit point les cavités séreuses splanchniques. Après être restée un petit nombre de jours à cette période d'état, on la voit diminuer et abandonner successivement les différentes parties du corps dans un ordre inverse de celui suivant lequel elles se sont infil-

trées. En même temps, et même avant le déclin de l'anasarque, les symptômes locaux et généraux qui annonçaient un état inflammatoire subaigu, diminuent et disparaissent; la sécrétion rénale reprend son activité et élimine le sérum qui est rentré dans le torrent de la circulation. D'autres fois on constate des sueurs ou une diarrhée qui contribuent également à la guérison.

Mais l'hydropisie aiguë n'est pas toujours anémiol bénigne; si elle s'étend aux cavités séreuses, aux organes essentiels à la vie, et si l'art n'arrête pas promptement ses progrès, elle peut amener la mort. M. Boquerel a rapporté l'histoire d'une jeune fille qui, étant en sueur, tombe dans un courant d'eau froide, et fut prise, le soir même de cet accident, d'un commencement d'anasarque qui augmenta rapidement, résista à toute médication et fit succomber la jeune enfant deux mois après (1). Ce résultat fâcheux s'observe spécialement à la suite de la scarlatine, mais n'arrive pas toujours de la même manière.

C'est rarement l'ascite qui amène la mort; de toutes les hydropisies internes c'est, dans le cas qui nous occupe, la plus susceptible de résolution; car elle ne compromet pas immédiatement les fonctions les plus essentielles au maintien de la vie. Il n'en est pas ainsi quand les plevres et le péricarde se remplissent d'eau; si ces épanchements sont abondants ils deviennent plus d'une fois la cause d'une terminaison funeste. Enfin le danger est encore plus grand et se manifeste plus rapidement quand l'hydropisie a pour siège la cavité de l'arachnoïde ou celle des ventricules encéphaliques. Nous n'avons pas besoin de revenir sur les symptômes de cette espèce d'hydrocéphale qui nous a occupé ailleurs, non plus que sur ceux de l'hydrothorax et de l'ascite.

Il est une remarque que nous avons déjà eu occasion de faire, mais qu'il est bon de reproduire ici, c'est que ces épanchements dans les cavités séreuses, bien différents de ceux qui surviennent dans la méningite, dans la pleurésie,

(1) *Ann. des hôp. des enf.*, mai 1812.

dans la péricardite et dans la péritonite, s'accomplissent indépendamment de toute phlogose ; ils peuvent persister quelques jours et disparaître par absorption sans inflammation de la séreuse ; c'est ce que nous avons pu observer plus d'une fois dans le péritoine et même dans les plèvres. Toutefois dans celles-ci l'inflammation est assez fréquente ; toute hydrothorax déjà considérable et d'autant de plusieurs jours doit faire craindre le développement d'une phlegmasie qui sera par elle-même une nouvelle cause d'aggravation dans les accidents locaux et généraux.

Dans beaucoup de cas l'hydropisie ne se borne pas au tissu cellulaire commun et aux cavités séreuses, elle envahit aussi le tissu cellulaire sous-muqueux qui entre dans la composition des organes membraneux ; on voit même la sérosité infiltrer le tissu propre de tous les organes. Nous en avons cité un exemple détaillé dans notre 1^{re} observation (t. 1). Nous rappellerons que dans ce fait remarquable il fut permis de constater, outre l'anasarque et les épanchements dans les cavités séreuses, l'infiltration du tissu musculaire du cœur, celle du parenchyme pulmonaire, celle du tissu propre de la muqueuse gastro-pulmonaire dans la presque totalité de son étendue, et enfin celle du tissu cellulaire sous-jacent à cette membrane, d'où résulta l'œdème des replis aryéno-épiglottiques qui devint la cause de la mort.

Nous avons établi, d'après ce fait et quelques autres moins complets, que l'œdème du tissu cellulaire sous-muqueux du larynx peut exister et amener la mort sans coïncider avec aucune inflammation de cet organe. Or, nous n'avons pas vu sans surprise M. Valleix, dans un travail récent (1) sur la nature et la cause prochaine de l'œdème de la glotte, donner de ce fait une interprétation tout-à-fait erronée, sans doute parce qu'il n'était rien moins que favorable à l'opinion soutenue par ce médecin sur la coïncidence constante de l'inflammation avec l'hydropisie aryéno-épiglottique. M. Valleix prétend que ce fait isolé

(1) *Annales de Médecine*, Janvier 1837.

n'est point concluant, qu'il y avait, avant que la suffocation se manifestât, etant, par conséquent, que l'obstacle matériel fût sensible pour le malade, en embarras, une douleur vers la gorge, en un mot, des symptômes d'une légère angine. Nous répondrons que rien de tout ce que M. Valleix avance n'existait; ce dont il peut se convaincre en relisant notre observation dans notre première édition ainsi bien que dans celle-ci. Nous ne voyons pas pourquoi l'œdème ary-téno-épiglottique consécutif à la scarlatine ne serait pas aussi indépendant, dans certains cas, de toute angine, que l'anasarque l'est, en général, de l'inflammation du tissu cellulaire du reste du corps.

Par tout ce que nous venons de dire de l'extension de l'hydropisie à un grand nombre d'organes, on comprend combien de symptômes nouveaux, dus à ces états locaux secondaires, peuvent prendre naissance et s'ajouter à ceux de la maladie primitive.

On a fait dans ces derniers temps, sur l'hydropisie scarlatineuse, une remarque que nous ne pouvons point passer sous silence. On a noté la présence de l'albumine dans l'urine, et chez certains sujets qui ont succombé, on a constaté les lésions du rein propres à la maladie connue sous les noms de maladie de Bright, de néphrite albumineuse, d'albuminurie, etc. Nous ne voulons contester en aucune manière la réalité des faits observés par les médecins anglais, par M. Rayer, Constant, etc.; mais, d'après nos observations, nous sommes porté à croire qu'on s'est un peu trop hâté d'admettre, sinon la constance, du moins la généralité de ce double phénomène. Nous avons eu plusieurs fois occasion d'examiner l'état des reins chez des enfants morts par suite d'une hydropisie scarlatineuse, sans avoir pu y découvrir rien d'anormal. Il faut ajouter que, dans ces cas et dans plusieurs autres non suivis de mort, nous n'avions trouvé aucunes traces d'albumine dans les urines en les traitant, soit par la chaleur, soit par l'acide nitrique. L'albuminurie ne s'est montrée à nous que chez un petit nombre de malades, et avant d'admettre que les hydropisies scarlatineuses reconnaissent

pour cause l'action exercée par l'eryanthème sur les reins, nous pensons que de nouvelles recherches sont nécessaires.

Hypothesis.

Le diagnostic des hydropiques ne peut être étudié d'une manière générale, car il varie suivant le siège qu'elles occupent. Il est généralement facile dans l'anasarque et dans l'ascite, qui se caractérisent assez par la distension de la poitrine et la persistance de l'impression du doigt. Lorsque le liquide est renfermé dans une cavité à parois molles, comme dans l'ascite et l'hydrocèle, la fluctuation fait reconnaître la maladie. Si l'on a affaire à des épanchements dans les plèvres, dans le péricarde, à un œdème des poumons ou du larynx, c'est par l'analyse combinée des signes fournis par la percussion et l'auscultation et des symptômes dus aux troubles fonctionnels, que l'on parvient à formuler un diagnostic en général assez rigoureux. Mais pour les épanchements encéphaliques tous les signes physiques manquent, et l'on est réduit à l'appréciation des signes rationnels fournis par ces maladies, qui alors empruntent une grande valeur de leur coexistence avec d'autres hydropiques internes et externes et de la nature des antécédents du malade. D'ailleurs le diagnostic ne doit pas s'arrêter à la connaissance de l'hydropisie, mais remonter à celle des causes. Pour cela il convient d'étudier la marche que la maladie a suivie et suit encore dans son développement. S'il est lent et ne s'accompagne d'aucuns signes qui annoncent un état pléthorique ou inflammatoire général et local; en un mot, si l'hydropisie semble passive ou mécanique, il faut tâcher de déterminer le genre et le siège de l'affection organique dont elle est la conséquence. Dans les hydropiques dites actives, il ne sera pas indifférent de distinguer celles qui se rattachent à la scrofule de celles qui peuvent dépendre d'une autre cause. Pour les premières, l'état albamineux des urines, la desquamation de la peau, la coïncidence d'engorgements parotidiens seront d'un grand secours dans certains cas où, comme nous

seulement à peu près certain de l'avoir vu, l'éruption a pu passer inaperçue, par suite soit de la négligence des parents, soit du peu de gravité de la maladie. Nous avons observé deux cas d'hydropisie très-probablement scarlatineuse chez deux petits ramoneurs, âgés l'un de onze ans, l'autre de trois; il est probable que la couleur noire de la peau avait empêché d'apercevoir l'éruption scarlatineuse dont il n'avait existé que quelques symptômes rationnels.

Prognostic.

Le pronostic est très-variables, suivant les différentes espèces d'hydropisie, et doit en général être porté avec réserve. En ce qui touche les hydropisies aiguës en particulier, tant qu'elles sont en voie d'accroissement, et surtout si cet accroissement est rapide, on doit craindre que d'un moment à l'autre l'hydropisie ne détermine des épanchements sérieux dans les cavités splanchniques, l'œdème pulmonaire, celui de la glotte, etc.; accidents d'une gravité inégale, mais toujours incomparablement plus grande que celle d'une simple anasarque. Si celle-ci, au contraire, existe seule, ou si elle n'est accompagnée que d'un peu d'ascite ou d'hydrothorax; si en même temps la fièvre et la chaleur locale sont tombées; si, par conséquent, tous les accidents, arrivés au point que nous venons d'indiquer, sont stationnaires, à plus forte raison s'ils paraissent déjà sensiblement décroissants, enfin surtout si ces indices, déjà satisfaisants par eux-mêmes, coïncident avec des urines ou des sueurs abondantes, ou avec une diarrhée dépourvue d'aillores de tout mauvais caractère, il y a tout à espérer. Il faut seulement se tenir en garde contre une recrudescence que pourrait produire l'action du froid ou toute autre cause.

Traitement.

En parlant ici du traitement des hydropisies, nous n'avons en vue ni celui qui s'adresse aux maladies dont l'hydropisie est la conséquence, ni les moyens spéciaux en rap-

port avec les différents sièges qu'elle peut affecter isolément ou simultanément. Nous resterons ici dans les indications générales. La division des hydropisies en actives et passives, si généralement suivie par les anciens, est d'une application extrêmement utile en pratique, et doit par conséquent être conservée. Seulement il ne faut pas croire que ces deux genres d'hydropisies existent dans la nature comme des individualités absolues et toujours séparées; chez le même sujet une hydropisie peut pendant quelque temps revêtir la forme active, puis la forme passive. Le praticien doit donc se conduire uniquement d'après le jugement qu'il porte actuellement sur la forme de la maladie.

Nous avons vu que les hydropisies qui offrent le plus d'intérêt chez les enfants, les hydropisies scarlatineuses surtout, se rapportent à la forme active de ces maladies; c'est du moins ce qui arrive le plus ordinairement. Il y a donc lieu, dans la généralité des cas, de recourir à une médication débilitante dont l'usage doit être proportionné à l'intensité de la réaction et à l'état des forces des malades. Les moyens qui en forment la base sont les saignées générales ou locales, les bains émollients et la diète. Tant qu'il y a dans l'hydropisie qu'on observe réunion de ces deux choses, savoir : 1^o progrès de l'hydropisie, 2^o état sthénique et plus ou moins fébrile, la médication débilitante nous paraît indiquée, tandis qu'elle est formellement contre-indiquée, malgré l'existence du premier de ces phénomènes, si le second manque, c'est-à-dire si le malade est dans un état atonique. D'ailleurs l'hydropisie, dans la période d'acuité, peut aussi être combattue par quelques-uns des moyens qui conviennent plus spécialement dans la seconde période. Les purgatifs, par exemple, ne nous ont jamais paru contre-indiqués par la forme sthénique; les diurétiques nous paraissent aussi pouvoir être mis en usage, tandis qu'il faut proscrire les sudorifiques internes et externes.

Avant de prescrire les purgatifs il faut être sûr que l'état des voies digestives ne les contre-indique pas. Si, par

exemple, il existe une diarrhée abondante, et surtout si ce flux se lie à un état inflammatoire, ils sont dangereux parce qu'ils peuvent augmenter la phlegmasie, ou au moins inutiles puisque le flux diarrhéique qu'ils doivent produire s'est établi spontanément. En l'absence de ces contre-indications on ne doit pas hésiter de prescrire l'huile de ricin, les sels neutres, le calomélas ; puis, si ces purgatifs doux ne suffisent pas, on arrive aux drastiques tels que le jalap, la gomme-gutte, la scammonée, l'huile de croton, l'hellébore, la caloqueinte, l'aloès, etc. La plupart de ces médicaments ont malheureusement une saveur si désagréable et parfois si difficile à masquer, que les enfants refusent de les prendre. Le calomel et la gomme-gutte sont ceux sur lesquels on peut le plus compter. La gomme-gutte, généralement trop peu employée, peut être donnée dans une potion émulsive à la dose d'autant de fois un centigramme que l'enfant a d'années. D'ailleurs les effets des purgatifs seront toujours surveillés avec soin, et l'on en suspendra l'usage aussitôt qu'ils sembleront dépasser le but qu'ils doivent seulement atteindre.

Les diurétiques conviennent aussi, avons-nous dit, dans les deux formes des hydropisies. Seulement, dans la forme active, il ne faut pas les administrer dans une grande quantité de véhicule, parce que l'ingestion de boissons abondantes peut contribuer aux progrès de l'hydropisie. Le nitrate de potasse nous paraît aussi sûr dans ses effets que tout autre diurétique, et peut-être le plus innocent dans son action sur la muqueuse digestive. L'état de cette membrane peut en effet contre-indiquer ou faire suspendre la digitale et la scille qui sont de très bons diurétiques, lorsqu'en les emploie à dose un peu élevée, mais qui alors peuvent irriter l'estomac.

Lorsque les hydragogues sont employés dans les hydropisies qui ont revêtu la forme passive, soit dès leur début, soit après avoir offert quelque temps la forme active, il faut, pour en suspendre ou en continuer l'usage, tenir exactement compte des effets qu'ils produisent sur les épanchements séreux. S'ils amènent dans l'hydropisie une diminution

proportionnée à l'abondance des évacuations, et si l'organisme les supporte bien, on peut persister dans la même voie. Dans le cas contraire il faut y renoncer et laisser reposer les organes un certain temps avant d'y revenir. On doit toujours d'ailleurs étudier la tendance qui se manifeste chez certains malades, tantôt vers un flux urinaire, tantôt vers un flux diarrhéique, afin d'agir dans le même sens. Il suffit quelquefois d'aider faiblement la nature pour que la guérison s'opère.

La médication sudorifique est moins sûre que les précédentes et offre l'inconvénient d'augmenter la diathèse séreuse, lorsqu'on emploie des boissons abondantes. Cet inconvénient est également à craindre dans les formes active et passive de l'hydropisie. En outre, dans la première, tous les sudorifiques qui ont une action excitante sur la circulation générale et sur la calorification cutanée sont souvent suivis des résultats les plus fâcheux. Ainsi les bains de vapeur que l'on prescrit assez souvent dans l'hydropisie scarlatineuse, ne nous paraissent opportuns qu'après la cessation de l'état athenique qui accompagne presque constamment le début de cette maladie. Plus d'une fois nous avons vu leur usage, dans la première période, suivi d'une aggravation incontestable. Le fait que nous avons cité à propos de l'œdème de la glotte (L. I), en est un exemple, et nous pourrions en ajouter d'autres. Au contraire, employés au moment où le marche de la maladie cesse d'être ascendant, et après avoir eu recours à la médication débilitante, les bains de vapeur nous ont paru fort utiles et sans danger.

Nous avons indiqué ailleurs le traitement de l'hydropisie aiguë des séreuses de l'encéphale; nous n'avons point à y revenir ici. Celui de l'hydrothorax, de l'hydropéricaride et de l'ascite est le même en général que celui de la pleurésie, de la péricardite et de la périlonite, aussitôt que ces épanchements s'accompagnent d'inflammation. On doit même y recourir lorsque l'inflammation n'est encore qu'incipiente, ce qui est toujours à craindre tant que l'hydropisie est de forme athenique. Si ces épanchements

n'ont point de tendance à s'accompagner d'inflammation, et pourtant ne cèdent pas au traitement général, on les combat par des moyens locaux irritants, tels que les rubéfiants et les vésicatoires, etc. Enfin, dans les cas où ils sont si abondants que les organes comprimés ne peuvent plus fonctionner, et où par conséquent la vie est immédiatement menacée, la paracentèse du thorax ou de l'abdomen peut à la rigueur devenir nécessaire.

CHAPITRE V.

SCROPHULES EXTERNES ET RACHITISME.

Remarques préliminaires.

Nous avons admis ailleurs (t. I, p. 475), sans nous étendre néanmoins sur les raisons qui légitiment notre manière de voir, que les maladies dites scrophuleuses sont constituées anatomiquement, tantôt par la tuberculisation des organes, tantôt par des lésions de tissu nullement tuberculeuses, et que ces dernières seules devraient conserver le nom de scrophules. Mais, retenu par l'usage et par cette considération, que les cachexies tuberculeuse et scrophuleuse, si elles ne sont pas identiques, sont au moins très-analogues par leur nature, nous avons embrassé dans un même chapitre l'étude de leurs causes et de leur traitement en général. Nous avons ensuite, dans différentes parties de cet ouvrage, décrit les affections tuberculeuses des organes thoraciques, abdominaux et encéphaliques, et il est résulté implicitement de cette exposition que la maladie scrophuleuse proprement dite, c'est à-dire en tant que différente de la tuberculisation, n'existe pas ou n'est pas connue dans les organes des trois grandes cavités. Il nous reste maintenant à étudier les maladies des organes externes auxquelles on donne ordinairement le nom de

scrophules et nous devons d'abord rechercher quel doit être le sens précis de ce mot appliqué à certaines maladies du système locomoteur, de l'appareil lymphatique, du tissu cellulaire et des organes des sens. Nous avons déjà parlé de l'ophthalmie et de l'otorrhée scrophuleuses; mais à cette occasion nous n'avons pas dû entrer dans la discussion d'un problème que nous ne pouvons, même maintenant, qu'aborder d'une manière superficielle, c'est-à-dire sans descendre à des détails dont la place est surtout dans un traité de pathologie générale.

Il y a des tumeurs blanches qu'on appelle *scrophuleuses*, et il est certain qu'elles méritent cette dénomination à cause de leur mode de développement, de leur marche, qu'aucun remède local ne peut arrêter, et de leur coïncidence avec d'autres maladies dites *scrophuleuses*. Or, plusieurs de ces tumeurs amènent souvent une désorganisation profonde dans les parties molles et dures des articulations, sans s'y accompagner, à aucune époque de leur durée, de la formation d'un produit tuberculeux. La même chose existe pour la carie et la nécrose. Quoique les travaux de Delpech et les belles recherches de M. Nichet et de M. Nélaton aient démontré, non seulement l'existence des tubercules dans le tissu osseux, mais encore fait voir qu'ils y sont plus fréquents qu'on ne l'avait pensé jusqu'alors, cependant il est incontestable que beaucoup de caries et de nécroses sont tous les jours considérées comme de nature *scrophuleuse*, bien qu'elles puissent parcourir toutes leurs périodes sans jamais se compliquer de tuberculation des parties cariées ou nécrosées.

Le rachitisme présente le même fait, d'une manière plus évidente encore, car, dans la majorité des cas où il entraîne la déformation du squelette, les tubercules manquent non-seulement dans les os les plus déformés, mais encore dans tous les autres organes, et ce n'est que par exception qu'on en trouve dans d'autres points de l'économie. Si donc on prenait les mots de *scrophule* et de *tubercule* dans un sens identique, on pourrait à la rigueur, comme l'ont fait quelques auteurs, considérer le rachitisme comme une maladie

essentiellement différente des scrophules. C'est ce qu'a fait, avec quelque apparence de raison, M. Ruff, en s'appuyant sur l'observation de vingt sujets rachitiques dont l'examen nécroscopique ne lui a montré que six fois des tubercules dans divers organes. Ce médecin, pour qui scrophules et tubercules sont deux termes synonymes, fait aussi remarquer, comme preuve d'une différence essentielle entre ces maladies et le rachitisme, la fréquence de celui-ci chez les enfants très-jeunes, tandis que les scrophules ou tubercules ne deviennent fréquents qu'à partir de quatre ou cinq ans. Mais, à nos yeux, cette raison n'est rien moins que péremptoire; car il peut très-bien se faire qu'en raison de l'état physiologique du système osseux chez les très-jeunes enfants, le vice scrophuleux porte spécialement son action sur ce système, tandis que plus tard il la portera sur d'autres organes, tels que le système lymphatique, le système tégumentaire, etc. Enfin, si M. Ruff, placé dans un service de scrophuleux, n'a point vu des enfants rachitiques offrant de vastes engorgements ganglionnaires, des affections profondes des os, quelques-uns enfin des symptômes caractéristiques des scrophules, cela ne pourrait-il pas tenir, en supposant son observation exacte, et nous sommes loin de l'accorder, à ce que, quoique lié à un même principe, le rachitisme serait une immunité contre les tubercules, et réciproquement ? de même que dans une famille on voit l'apparition d'une tumeur blanche être, pour l'un de ses membres, une espèce de sauve-garde contre les affections viscérales qui atteignent les autres. Quant à nous, quoique l'identité de la cachexie tuberculeuse et de la cachexie scrophuleuse ne nous soit point démontrée, nous pensons, d'après leur analogie, d'après celle que présente le rachitisme avec elles et surtout avec la cachexie scrophuleuse, qu'il y a entre les effets de ces trois espèces de maladies des rapports assez intimes pour qu'on ne doive pas en faire des genres pathologiques essentiellement distincts. Voici les principales raisons que nous invoquons :

1° L'enfance est l'âge le plus prédisposé aux scrophules

et au rachitisme, et si celui-ci est plus fréquent depuis l'âge de six mois jusqu'à deux ou trois ans, c'est peut-être uniquement parce que la nutrition du tissu osseux, extrêmement active à cette époque, appelle sur lui l'action du vice scrophuleux, de même que plus tard la prépondérance du système lymphatique rend les scrophules ganglionnaires plus fréquentes; de même encore qu'à la puberté l'appareil respiratoire devient le siège le plus ordinaire de la tuberculisation. 2^e Les mêmes causes prédisposantes, résultant du sexe, du tempérament, de la constitution, de l'hérédité, se retrouvent dans le rachitisme et dans la cachexie scrophuleuse. Relativement à l'hérédité, on trouve cette même influence réciproque que nous avons notée ailleurs, c'est-à-dire que des parents atteints de tubercules ou de scrophules ont des enfants qui deviennent rachitiques, tandis que des parents qui portent les traces de rachitisme donnent le jour à des enfants qui plus tard périront de la cachexie scrophuleuse ou tuberculeuse. On trouve les mêmes rapports pour la plupart des causes qui résultent d'une mauvaise hygiène ou de maladies antérieures. Qu'elles agissent chez un enfant très-jeune, il deviendra le plus souvent rachitique, tandis qu'un enfant plus âgé sera ordinairement affecté d'écrevisses ou d'une tuberculisation viscérale. Il y a donc identité dans les causes. 3^e Les sujets qui ont été rachitiques dans leur première enfance présentent presque toujours dans la suite les indices plus ou moins visibles de la cachexie scrophuleuse, et souvent en sont affectés à un haut degré. 4^e Enfin le traitement qui convient au rachitisme est, de l'aveu de tous les auteurs, absolument semblable à celui de la cachexie scrophuleuse, et les modifications dont il est susceptible sont seulement en rapport avec le siège de la maladie dans le système osseux.

Nous dirons encore une fois que si le rachitisme, considéré au point de vue anatomique, ne peut être rapporté à une altération tuberculeuse, puisque ce n'est point un de ses caractères de s'accompagner d'un dépôt de matière tuberculeuse, même dans les os qu'il affecte au plus haut

degré, et puisque les tubercules des os n'attaquent pas de préférence les sujets dont le système osseux est atteint de rachitisme, et que si l'on admet dans les parties molles des lésions qui méritent le nom de scrophulemes proprement dites, rien n'empêche de comprendre qu'une lésion de même nature, c'est-à-dire étrangère à la présence de la matière tuberculeuse, puisse exister aussi dans les os. En un mot, puisqu'on reconnaît une scrophule catarrhale ou muqueuse, il faut aussi reconnaître une scrophule osseuse, susceptible elle-même de varier dans ses formes, dont la plus importante, suivant nous, n'est autre que le rachitisme. On sait, d'ailleurs, que depuis fort longtemps cette opinion a été admise par un grand nombre d'auteurs, et, pour n'en citer qu'un, nous dirons que pour Hufeland, « la cause fondamentale est la maladie scrophuleuse. Le rachitisme n'est qu'une modification spéciale de cette affection, une métastase qu'elle opère sur le système osseux, une *maladie scrophuleuse des os* (1). »

Nous ne pousserons pas plus loin cette discussion; car, tout en montrant vers quelle manière de voir nous penchons, nous déclarons n'avoir pas encore des idées parfaitement arrêtées sur une question pour la solution de laquelle il nous manque encore plusieurs données. Contentons-nous de faire entre certaines maladies les rapprochements qu'elles comportent, et ne cherchons pas à nous élever jusqu'à des généralisations que l'état de la science n'autorise point encore.

Description des différentes variétés de scrophules.

Les affections dites scrophuleuses du tissu cellulaire et des ganglions lymphatiques sont dans le même cas que celles des os et des jointures. Ainsi les abcès froids et les tumeurs ganglionnaires, les écoulements peuvent résulter d'un dépôt de matière tuberculeuse, et dans d'autres cas

(1) *Manuel de méd. prat.*, trad. de Jourdan, p. 517.

en être complètement indépendants. Quant aux maladies de la peau et des ossements des cavités muqueuses, qui sont généralement regardées comme de nature scrophuleuse, l'anatomie pathologique est complètement impuissante à établir qu'elles dépendent de la présence de la matière tuberculeuse, soit dans le tissu dermoïde ou muqueux lui-même, soit dans ses glandes sécrétrices, ou dans quelque-astre de ses éléments anatomiques. Tout ce que nous pouvons y voir, c'est une modification pathologique de la vitalité de l'organe affecté, bien distincte de l'inflammation franche et idiopathique.

La description des lésions tuberculeuses ou scrophuleuses des organes externes appartient, en grande partie, à la chirurgie ou à quelques branches spéciales de la pathologie. C'est ce que nous avons eu déjà l'occasion de dire en parlant de certaines affections de la peau, de l'œil et de l'oreille, dont le développement est manifestement soumis à l'influence de la cachexie scrophuleuse. Il en est de même des phlegmons chroniques ou abcès froids, des engorgements ganglionnaires, des caries et des nécroses; nous ne ferons par conséquent que résumer la description de ces maladies. Nous serons plus explicite sur le rachitisme dont l'étude, jusqu'à présent, est restée en très-grande partie dans le domaine de la médecine proprement dite.

Scrophule cutanée. — Alibert et M. Lagaë ont décrit une altération spéciale de la peau due à la cachexie scrophuleuse, sous le nom de scrophule cutanée; M. Guenou lui donne celui d'indurations scrophuleuses de la peau. Ces indurations qui se remarquent particulièrement au cou et à la face autour des aîles du nez, forment des saillies oblongues, arrondies, semblables à des bourrelets, d'autres fois de petites masses isolées ou rassemblées, ou enfin de petites plaques irrégulières. Elles sont d'un rouge violet qui augmente d'intensité dans les grandes chaleurs ou dans les grands froids, et presque toujours indolentes. Elles peuvent rester longtemps en cet état; mais le plus souvent elles finissent par s'enflammer; le tissu qui les forme se ramollit et devient spongieux; peu à peu il

s'infiltre de pus qui se rassemble en petits foyers à la surface et dans l'épaisseur du derme, pour s'ouvrir bientôt au dehors par de petits trous et donner lieu à des nécrosations grisâtres, irrégulières, qui se couvrent de croûtes si on les laisse exposées à l'air. Ces ulcérations superficielles offrent tous les caractères des nécroses scrophuleuses que nous indiquerons dans un instant. Il ne faut pas confondre les indurations cutanées avec les tubercules du lupus qui s'ulcèrent, détruisent et rongent les parties voisines à la manière du cancer de la face.

Abcès scrophuleux. — Les abcès scrophuleux sont cutanés ou sous-cutanés. Les premiers, dit M. Guérant, « par leur forme, leur peu d'étendue et leur couleur, se rapprochent beaucoup des plaques indurées dont nous avons parlé ; mais ils en diffèrent en ce qu'ils offrent dès leur origine une mollesse remarquable au toucher... Ils se terminent quelquefois par résorption ; et alors il reste seulement à l'endroit qu'ils occupaient une teinte rouge violacée, qui est plus visible pendant les grandes chaleurs et le froid. S'ils s'ouvrent spontanément, ils donnent lieu à l'écoulement d'un pus sanieux ou séro-purulent comme celui de quelques furoncles, et ensuite à des ulcérations plus ou moins profondes (1). »

Les abcès sous-cutanés produits par l'action du vice scrophuleux sur le tissu cellulaire ont constamment la marche lente et sourde des abcès froids. On les rencontre dans toutes les régions et à une profondeur variable, affectant tantôt le tissu cellulaire sous-cutané, tantôt celui qui est au-dessous des gaines aponeurotiques. Il en existe assez souvent plusieurs à la fois sur le même individu. Ils se présentent d'abord sous la forme d'une tumeur dure, sans rougeur ni chaleur, circonscrite, qui peu à peu se ramollit et fournit une fluctuation d'abord obscure, ensuite plus évidente. A cet état, ils restent parfois très-longtemps stationnaires, mais enfin se terminent par résorption ou par évacuation au dehors. Dans ce second cas la peau rou-

(1) *Des. de med. et. élém.* t. III, p. 163.

git, puis devient violacée, s'amine; quelques douleurs accompagnent ce travail inflammatoire qui est toujours lent. L'ouverture de l'abcès donne issue à un pus séreux, jaunâtre, c'est-à-dire mal élaboré, au milieu duquel on trouve des flocons albumineux ou d'aspect caséux qui permettent souvent de croire que l'abcès a eu pour origine un dépôt de matière tuberculeuse dans le tissu cellulaire.

Scrophule ganglionnaire. — Les engorgements ganglionnaires sont un des effets les plus fréquents de la maladie scrophuleuse. On les rencontre surtout au cou, ensuite aux aisselles et aux aines. Les ganglions qui occupent le trajet des gros vaisseaux des membres s'engorgent aussi très-souvent, et, chose remarquable, on voit chez les scrophuleux se développer des tumeurs qui offrent tous les caractères des ganglions engorgés dans des régions où, à l'état normal, on n'en rencontre aucuns. Il semble que ce soit d'abord de simples renflements nausés des vaisseaux lymphatiques qui se transforment ensuite en véritables ganglions. Quoi qu'il en soit, les tumeurs ganglionnaires se développent sans ou presque sans inflammation, augmentent de volume en se confondant avec celles du voisinage pour former des masses parfois énormes, plus ou moins bosselées. Tantôt libres et roulant sous la peau, tantôt adhérentes à cette membrane et aux parties sous-jacentes, elles restent souvent stationnaires et complètement indolentes dans le premier cas, tandis que dans le second, au bout d'un temps variable, elles tendent à se ramollir, à s'infiltrer de pus et à s'ouvrir au dehors. Un certain degré d'inflammation précède toujours cette terminaison; les engorgements deviennent douloureux, la peau rougit et s'échauffe, la fluctuation se manifeste, la peau s'ulcère et laisse écouler un pus de mauvais caractère comme celui des abcès froids. L'examen de ces engorgements sur le cadavre, montre dans la première période les ganglions très-développés, en partie rouges ou transformés en un tissu dense, grisâtre et comme fibreux; la plupart contiennent de la matière tuberculeuse en plus ou moins grande quantité, mais d'autres n'en présentent

aucune trace et peuvent comme les pécuniers se terminer en s'absorbant. Quand la suppuration a lieu, elle se forme ordinairement d'abord dans le tissu cellulaire qui entoure les ganglions ou dans les points les plus malades de ceux-ci seulement; dans d'autres portions la désorganisation est moins avancée, et son achèvement s'appuie à la prompte cicatrisation des abcès serophuleux, qui n'est possible qu'après la fonte complète par la suppuration de toutes les parties malades. Tandis que dans le centre le foyer s'organise, à la circonférence le mal fait de nouveaux progrès, envahit les parties voisines et la suppuration est inintermittente.

Ulères serophuleux. — Toutes les lésions que nous avons examinées jusqu'à présent déterminent les ulères serophuleux dont les caractères communs sont : un aspect blafard, des bourgeons mous et mal organisés, donnant facilement naissance à des fongosités et à des végétations difficiles à réprimer; le pus qu'ils fournissent est séreux, d'autres fois sanieux; la peau se décolle à la circonférence de l'ulcère, s'amincit; dénudée de son tissu cellulaire elle ne peut plus se recoller par sa face profonde. La cicatrisation est toujours lente, irrégulière, se fait sur un point et non sur un autre, et ne marche pas concentriquement de la circonférence au centre. De là ces cicatrices vicieuses et difformes, semblables à des espèces de crêtes, de végétations, de bourrelets saillants au-dessus du niveau de la peau; de là encore ces dépressions profondes et inégales dues à l'enroulement en dedans des bords de la plaie qui adhèrent au fond de la cicatrice.

Tels sont, en résumé, les principaux ravages que la maladie serophuleuse détermine dans la peau, le tissu cellulaire et les ganglions lymphatiques. Qu'elle agisse sur les muscles, sur les tissus fibreux, ce sont encore des engorgements chroniques, avec ou sans dépôt de matière tuberculeuse, dont la tendance ordinaire est d'aboutir par la suppuration et la désorganisation des tissus, des ulères d'une cicatrisation toujours difficile. C'est dans les régions articulaires que ces désordres ont en général le plus de

gravité, donnent lieu à ce qu'on appelle les tumeurs blanches scrophuleuses.

Scrophule osseuse. — Lorsqu'elle agit sur le système osseux, la cachexie scrophuleuse y détermine plusieurs sortes d'altérations. Ainsi on remarque le gonflement des périoste, celui du tissu osseux lui-même, puis la carie et la nécrose. Les recherches anatomiques nous ont montré que ces maladies existent tantôt avec, tantôt sans dépôt de matière tuberculeuse. Nous renvoyons aux ouvrages de chirurgie pour leur description et nous arrivons au rachitisme.

Cette maladie appartient presque exclusivement à l'enfance, car il est bien reconnu aujourd'hui que les déviations du rachis qui surviennent vers la puberté sont le résultat d'un autre genre d'affection. Sur 246 cas examinés par M. J. Guérin, l'invasion a eu lieu aux époques suivantes :

Avant la naissance.	3 cas.
Dans le cours de la 1 ^{re} année.					95
— — — 2 ^e					176
— — — 3 ^e					28
— — — 4 ^e					19
— — — 5 ^e					10
De 6 à 17 ans	5
Total	246 cas.

Caractères anatomiques et effets directs du rachitisme. — Le rachitisme affecte le plus souvent les os longs, ou du moins y détermine des déformations toujours plus sensibles. Leurs extrémités se gonflent et augmentent le volume des articulations; en même temps le corps de l'os s'amincit et ne tarde pas à se courber en divers sens, mais ordinairement en suivant ses courbures naturelles. Les jambes se courbent ordinairement en arc, de manière à présenter leur convexité en dehors, leur concavité en dedans. Les fémurs sont arqués en avant, plus souvent encore en dehors, comme les tibiaux, et alors tantôt les ge-

noix rentrent en dedans et les jambes sont portées en dehors, écartées l'une de l'autre par un angle très-ouvert; tantôt la courbure des tibias et des fémurs étant dirigée dans le même sens, les extrémités inférieures forment, par leur rapprochement, une espèce d'ellipse. — La première de ces déformations, dit M. Guersent, est souvent due à la mauvaise habitude de porter les enfants rachitiques dans les bras, ce qui entraîne de plus en plus les genoux en dedans, surtout du côté où on a l'habitude de porter l'enfant; de sorte que, lorsque ces enfants sont debout, ils sont obligés, pour retrouver au centre de gravité, de rapprocher les genoux en jetant les jambes en dehors, de contourner quelquefois les pieds de manière à appuyer sur le bord interne du tarse, ce qui les oblige à marcher en chevauchant et avec une telle difficulté que toute espèce de progression est souvent impossible. Dans la seconde variété de déformation, les genoux sont, au contraire, très-écartés l'un de l'autre, et les enfants ne peuvent marcher qu'avec presque autant de difficulté que dans le cas précédent. Ils sont forcés de rapprocher les pieds en les contournant en dehors, d'appuyer sur le bord externe du tarse, et de décrire à chaque pas des demi-cercles de rotation avec les extrémités inférieures (1). —

Les os longs des membres supérieurs se dévient le plus ordinairement dans le sens de leurs courbures naturelles; mais, en général, ils sont moins déformés que ceux des membres inférieurs, à la déviation desquels le poids du corps contribue puissamment. Les os du métatarse, du métacarpe, et les phalanges, ne sont pas assez longs pour être arqués dans un sens quelconque; ils sont seulement quelquefois plus gonflés que dans l'état normal.

Les clavicules doivent à leur usage d'arcs-boutants des omoplates, qui leur fait supporter tous les efforts du bras et de l'épaule, la déformation très-prononcée qu'elles présentent souvent; leur courbure sternale devient beaucoup plus arquée et forme un demi-cercle convexe en avant.

(1) *Dict. de méd.*, 2^e éd., t. XXV, p. 328.

Lorsque le rachitisme envahit la poitrine, il y produit des déformations très-remarquables qui ont été bien décrites par MM. Billiet et Barthès : « Si on vient à examiner le malade dépouillé de ses vêtements, on est frappé de la forme singulière de sa poitrine; le sternum, qui paraît fortement projeté en avant, est bombé, presque anguleux de haut en bas; immédiatement après lui, les cartilages se portent en arrière, comme s'ils allaient toucher la colonne vertébrale; de là résulte un aplatissement extraordinaire des régions axillaires, qui sont rentrées, concaves.

« Ce premier coup d'œil ne suffit pas pour saisir tout l'ensemble des difformités de la poitrine; on voit bientôt que, sur les côtés du thorax, il existe une série de saillies qui répondent à l'union des cartilages et des côtes, en sorte qu'elles forment deux lignes qui, parties du haut du thorax en avant, se dirigent en bas et en dehors, de manière à circonscire entre elles une sorte de rampart, soit arrondi, soit anguleux, plus large à la partie inférieure qu'à la supérieure formée par le sternum, qui est poussé comme en avant par les cartilages costaux. Ces saillies arrondies, sautoirées, dépendant évidemment des os, plus considérables à la base de la poitrine, siègent à la partie la plus déprimée du thorax, ou un peu en avant, et semblent toucher les côtes du corps des vertèbres; le rétrécissement existe dans presque toute la hauteur depuis la deuxième ou troisième côte, jusqu'au dessous du mamelon; à ce niveau les fausses côtes se relèvent et forment une saillie qui enveloppe la partie supérieure de l'abdomen, augmentent ainsi la dépression thoracique, et ajoutent l'apparence à la réalité.

« D'autre part, les viscères abdominaux ne pouvant être déprimés par les parois molles qui les renferment, se dessinent parfaitement; le foie à droite, l'estomac à gauche, soulèvent les fausses côtes, mais presque toujours inégalement, en sorte que la poitrine paraît un peu déjetée, tantôt à droite, tantôt à gauche. Le ballonnement des intestins, habituel au bas âge, complète la forme squarrique de l'abdomen; en sorte que ce globe abdominal est comme

coiffé par la partie inférieure de la poitrine qu'il dilate, tandis que la partie supérieure reste déprimée (1). —

Vue en arrière, la déformation du thorax est moins sensible, et, quand elle existe, elle ne tient pas ordinairement au thorax lui-même, mais aux omoplates ou au rachis. Les premières, en effet, acquièrent souvent une épaisseur considérable qui les rend beaucoup plus saillantes.

Quant au rachis, sa courbure la plus ordinaire a lieu dans le sens antéro-postérieur, de manière à présenter une convexité plus ou moins prononcée depuis le milieu du dos jusqu'au sacrum. Cette courbure s'efface en grande partie lorsqu'on soulève l'enfant; on la dirait uniquement due à la faiblesse des muscles extenseurs du rachis. Comme elle diminue la hauteur verticale de l'abdomen, elle contribue à repousser en avant les viscères de cette cavité et à augmenter sa forme globuleuse. Le rachis peut aussi éprouver des inflexions latérales à la production desquelles nous croyons que l'attitude et l'atonie musculaire ont la plus grande part; car primitivement la déformation des os a lieu également des deux côtés de la ligne médiane. Dans quelques cas ces déformations se réunissent et se combinent avec celles du sternum, qui est tantôt arqué et prédominant en avant, ou plus rarement incurvé en deux sens opposés, suivant sa longueur.

Les os du bassin, devenus rachitiques, s'inclinent et se cantonnent de diverses manières. Le sacrum et le pubis, se rapprochant l'un de l'autre, raccourcissent le diamètre antéro-postérieur; d'autres fois le rapprochement a lieu d'un côté à l'autre; enfin le simple épaississement des os du bassin peut produire un rétrécissement général plus ou moins régulier de la cavité pelvienne.

Si le rachitisme se développe de très-bonne heure, les os du crâne n'étant point encore ossifiés, éprouvent ordinairement des premiers son action fléchissante. Le ramollissement de leur tissu les fait céder à l'impulsion du cer-

(1) *Recherches sur la déformation de la poitrine chez les enfants et sur la déformation de cette cavité; Journal des con., med., chir.,* avril 1810.

veau qui s'hypertrophie en obéissant simplement, pour ainsi dire, à sa seule force d'expansion. Si le rachitisme se développe plus tard, à une époque où les fontanelles sont complètement ossifiées, le volume de la tête augmente peu, mais les os s'épaussissent et présentent çà et là de nombreuses bosselures, surtout dans les points où le tissu spongieux existe en plus grande quantité. Des déformations semblables existent à la face, qui s'élargit en travers et semble se déprimer de haut en bas; les os des pommettes sont saillants, la racine du nez plus large, la mâchoire est épaisse et volumineuse; ses branches se réunissent avec le corps presque perpendiculairement, et forment par conséquent des angles moins obtus et plus saillants qu'à l'état normal.

La déformation des omoplates est plus rare que celle des autres os plats; mais, quand elle existe, elle est quelquefois assez considérable pour gêner beaucoup les mouvements de l'épaule.

La déformation que nous venons de décrire dans les diverses parties du squelette est le résultat des modifications que le rachitisme imprime à la structure du tissu osseux. Ces altérations, qui ont été dans ces derniers temps l'objet de recherches détaillées, se réduisent à une espèce de vascularisation du tissu osseux qui se dépourville de ses sels calcaires. Son élasticité et sa flexibilité sont singulièrement augmentées; on peut courber un os plat, un os long, les tordre sans les rompre, « ainsi que les racines de certaines plantes (Rufé). » Sur le cadavre on peut facilement des fractures incomplètes. La lésion des fibres osseuses ne fait exsuder du sang fluide, même au niveau de la substance compacte. Le périoste offre en général peu d'altération. Il en est de même de la moelle qui est seulement moins rouge qu'à l'état normal; la membrane médullaire est ordinairement très-mince. Dans quelques cas de rachitisme existant au plus haut degré, on trouve une couche membraneuse grisâtre, très-mince, qui s'adapte avec la moelle; c'est ce que Béchard paraît avoir indiqué sous le nom de membrane médullaire des os rachitiques.

quand le corps de l'os présente des courbures, le canal médullaire est nécessairement déformé, rétréci et réduit à un très-petit canal rapproché de la convexité de la courbure, tandis que la concavité paraît formée par une hypertrophie du tissu compacte qui oblitère la cavité de l'os. Généralement la lame qui forme les parois du canal médullaire est plus dure qu'à l'état normal. Mais au dehors la substance compacte du corps de l'os est composée de plusieurs couches superposées représentant un ensemble de cylindres concentriques, organoles les uns dans les autres, dont les plus externes sont plus flexibles et se détachent facilement du périoste. Entre ces lames existe une matière sanguinolente qui facilite leur dédoublement et annonce l'augmentation de vascularité du tissu osseux.

Le tissu spongieux qui occupe l'extrémité de la diaphyse des os longs, est plus rouge, plus mou, plus imprégné de suc médullaire qu'à l'état normal. Ses cellules semblent plus grandes; mais à mesure qu'on se rapproche de l'épiphyse, cet aspect change complètement. Le tissu spongieux est imbibé d'une grande quantité de sang, contenu dans des cellules extrêmement petites qui forment, suivant la comparaison de M. Ruff, une éponge très-fine, à mailles très-serrées. Cette portion de l'os est manifestement gonflée et plus volumineuse qu'à l'état sain; c'est elle qui produit le renflement des extrémités des os longs. Suivant la description de M. Ruff, l'éponge fine serait un tissu de nouvelle formation, mais pour nous ce n'est qu'une modification pathologique du tissu normal. Au-delà de cette portion de l'os on trouve ordinairement peu altéré le cartilage qui unit la diaphyse à l'épiphyse; puis l'épiphyse elle-même qui s'éloigne peu de son état normal, si ce n'est qu'elle se détache plus facilement du reste de l'os, et que son ossification moins régulière permet de rencontrer, au milieu de la portion ossifiée, de petits noyaux cartilagineux qui sont en retard sur les parties voisines. Le tissu spongieux ou diploé des os plats présente un aspect analogue à celui des os longs; souvent il se boursouffle et écarte les deux tables de l'os. Quelquefois la portion écailleuse du

temporal acquiert de cette manière de quatre à six millimètres d'épaisseur.

Marche du rachitisme. — Telles sont les altérations que le rachitisme produit dans les os, et qui nous font considérer cette maladie comme un état de vascularité anormale qui s'oppose au dépôt des éléments terreux dans le canvas de ces organes. Dans la description qu'il a donnée de ces altérations, M. J. Guérin s'est attaché à distinguer leurs phases successives, et a divisé la marche du rachitisme en plusieurs périodes. Dans la première, dite d'incubation, une matière sanguinolente s'épanche dans tous les interstices du tissu osseux, dans les cellules du tissu spongieux, dans le canal médullaire, entre le périoste et l'os, entre les lamelles concentriques de la diaphyse, entre les épiphyses et les diaphyses, entre les noyaux épiphysaires et leurs cellules, dans les os courts et les os plats comme dans les os longs, en un mot, dans toutes les parties du squelette et dans tous les points du tissu osseux où se distribuent les radiales des vaisseaux nourriciers. De cet épanchement résulte le dédoublement des parties composantes du tissu et le gonflement, le boursoufflement des différentes portions du squelette. Pendant la période de déformation, en même temps que la trame du tissu osseux perd de sa consistance et se ramollit, la matière qui continue à se déposer dans tous les interstices du tissu osseux tend à s'organiser; elle passe successivement de la forme cellulo-vasculaire à la forme cellulo-spongieuse. Enfin, dans l'état de *consommation rachitique*, le dédoublement et l'écartement des parties composantes du tissu osseux a été tel que leur réunion ne s'est pas opérée, et que l'organisation de la matière épanchée n'a pas eu lieu dans cet état; les cloisons et les lamelles osseuses sont restées écartées, et la consistance de l'os primitif a été réduite au point que leur couche extérieure n'est plus formée quelquefois que par une pellicule mince. Lorsqu'au contraire le rachitisme tend vers la guérison, le tissu cellulo-spongieux de nouvelle formation passe à l'état de tissu compacte, et se confond avec l'ancien tissu qui reprend sa dureté première. Ainsi s'explique

l'augmentation d'épaisseur et de largeur qui persiste si longtemps après que les progrès du rachitisme se sont arrêtés. Chez les adultes guéris depuis longtemps, la texture des os offre une compacité et une dureté supérieures à celles de l'état normal. Dans cet état, que M. J. Guérin appelle *éburnation rachitique*, on ne distingue plus aucune trace de la réunion des éléments de l'ancion os avec ceux de l'os nouveau (1).

Les recherches de M. J. Guérin ont démontré ce qui avait été méconnu ou nié par plusieurs auteurs, savoir, que dans le rachitisme, outre la déformation et l'altération du tissu osseux, il y a arrêt de développement et retard de l'ossification. « La plupart des os du squelette rachitique sont toujours relativement moins développés en longueur et en largeur que les os du squelette normal; cette réduction, qui est indépendante de celle résultant des déformations, s'opère suivant la même loi que ces dernières, c'est-à-dire successivement de bas en haut, et graduellement de haut en bas... La réduction plus grande des membres inférieurs, comparée à celle des membres supérieurs, établit entre ces parties des rapports de longueur qui répètent et perpétuent ceux de l'âge où la maladie s'est développée. » Quant au retard de l'ossification, on en trouve la preuve dans la persistance d'un nombre plus marqué de noyaux cartilagineux, dans la disjonction des épiphyses et la réunion plus tardive des pièces composantes des os multiples.

Troubles fonctionnels du rachitisme. — Dans tout ce qui précède nous n'avons eu en vue que les caractères tirés de l'examen du squelette revêtu ou non de ses parties molles. Maintenant nous avons à décrire les symptômes proprement dits de la maladie, c'est-à-dire les troubles fonctionnels qui se rattachent à sa présence. Ces troubles ont deux sources : l'une est l'état cachectique dont le rachitisme n'est, suivant nous, qu'un des effets; l'autre est la défor-

[1] V. le Mémoire de M. J. Guérin, *loc. cit.*, année 1859, p. 422-448, 481.

nation du squelette, qui peut agir d'une manière toute mécanique sur tel ou tel organe, et déterminer ainsi des phénomènes locaux primitifs résultant de la déformation elle-même.

La maladie débute rarement par la déformation des os : M. Guérin a vu cependant trois enfants chez lesquels les os s'étaient courbés sans que la santé parût avoir été préalablement affectée. Nous avons été aussi témoin de quelques cas de ce genre, et dernièrement nous avons donné des soins à un enfant qui, sans avoir éprouvé aucun trouble notable des fonctions viscérales, avait déjà les membres noués et le thorax sensiblement déformé. Mais dans la plupart des cas on constate pendant la période d'incubation que nous avons décrite, des dérangements gastro-intestinaux, de la diarrhée, le ballonnement du ventre, des sueurs nocturnes, un mouvement fébrile, un sentiment de faiblesse et, suivant M. J. Guérin, une sensibilité marquée de tout le système osseux. La tristesse, la morosité, l'altération des traits, l'étiollement général, la faiblesse musculaire, l'amaigrissement, annoncent un état morbide général dont la nature ne peut être encore reconnue, mais suffisant pour faire craindre quelque chose de grave, surtout quand ces symptômes persistent et augmentent malgré un traitement en apparence rationnel.

Dans la seconde période ou de déformation, le gonflement commence ordinairement par les malléoles, les genoux et les poignets. Ces articulations doublent quelquefois de volume et deviennent noueuses. Puis se manifestent les courbures des jambes, des épaules, des os du tronc et des membres supérieurs. Les troubles généraux qui existaient pendant la première période augmentent encore d'intensité ; ainsi le métabolisme et la diarrhée persistent, les sueurs et les urines deviennent de plus en plus copieuses, il y a un mouvement fébrile et une chaleur à la peau analogues à la fièvre hectique. La sensibilité du système osseux s'accroît ; la marche et la station debout sont impossibles ; il semble que les contractions musculaires n'aient

meine énergie, ne peuvent surtout se soutenir, ou causent une sensation douloureuse dans les os qui empêche la volonté de les commander; car on observe que celles qui ont pour effet, en agissant sur les os, de vaincre de grandes résistances, sont les plus difficiles de toutes. Ainsi les rachitiques meuvent les bras qui ont peu de poids par eux-mêmes, tandis que les muscles du cou peuvent à peine quelquefois soutenir la tête, qui se porte dans tous les sens comme chez les sujets hydrocéphaliques. Ainsi encore le diaphragme agit avec une grande liberté pendant que les muscles respirateurs qui doivent soulever les côtes semblent avoir perdu toute leur puissance.

Le rachitisme du crâne s'accompagne assez souvent d'un développement anormal de l'encéphale, auquel se joint, ainsi constamment, du moins quelquefois, une activité très-remarquable des facultés intellectuelles. Suivant M. Guéracé cette sur-activité s'explique chez les rachitiques parce que leurs forces physiques, qu'ils ne peuvent exercer, étant beaucoup plus faibles comparativement qu'chez la plupart des autres enfants, toute leur activité se dirige et se concentre exclusivement vers le cerveau et les porte naturellement à plus d'attention, de réflexion et de jugement. « Au reste, poursuit ce médecin, cette précoce des facultés intellectuelles, qui est une sorte de conséquence de l'inactivité du système musculaire, n'est pas propre aux enfants rachitiques : on l'observe de même chez beaucoup de tuberculeux et chez tous ceux qui sont atteints de maladies chroniques qui s'opposent au développement des forces physiques. »

Les déformations rachitiques du bassin n'ont, en général, aucune conséquence grave relativement aux fonctions des organes pelviens, si ce n'est dans le cas de grosseur où elles deviennent des causes fréquentes et dangereuses de dystocie que nous n'avons pas à exposer ici. Elles peuvent aussi contribuer avec celles du rachis et des membres inférieurs à gêner la station et la progression. Il est facile de concevoir combien les nombreuses déviations que peuvent éprouver les os des membres supérieurs, sous l'in-

fluence du rachitisme, doivent entraver et modifier l'exercice des fonctions de ces membres.

Le rachitisme du thorax donne lieu à des troubles fonctionnels et à des symptômes qui ont été bien décrits par MM. Rilliet et Barthou : « Si l'on s'approche d'un enfant dont la poitrine est déformée par le rachitisme, on est frappé de l'aspect tout particulier qu'il présente : maigre, chétif, peu développé pour son âge, ses traits, ses mouvements respiratoires, indiquent l'oppression à laquelle il est en proie; ses yeux gros, saillants, largement ouverts, sa figure peu colorée ou légèrement violacée aussi bien que ses lèvres, son nez, dont les ailes se dilatent largement, impriment à sa physionomie une expression toute spéciale; puis, quand on voit qu'il préfère la position assise, que souvent il se tient avec ses deux mains à la barre de son lit, comme s'il voulait donner plus de force à ses muscles inspireurs, que les inspirations se répètent trente-deux, quarante, quelquefois même soixante fois par minute, on peut croire, en présence d'une telle oppression et d'un tel faciès, que le jeune malade est atteint d'un accès d'asthme ou d'une grave affection des organes thoraciques (1). » On conçoit facilement ces effets par la gêne considérable qu'apporte au jeu des poumons le rétrécissement de la poitrine. Le cœur lui-même peut être gêné dans ses mouvements. Le rachitisme du thorax, déjà grave par les conséquences que nous venons d'indiquer, devient une des complications les plus fâcheuses qu'on puisse rencontrer dans le catarrhe bronchique, la pneumonie et en général dans toutes les affections des organes thoraciques, aussi bien que dans celles des organes abdominaux qui sont de nature à gêner l'abaissement du diaphragme.

Le rachitisme s'arrête souvent dans sa marche après avoir déformé seulement les membres à un faible degré, et sans avoir envahi ni l'épine ni le thorax. Alors les troubles fonctionnels diminuent et disparaissent. Le ventre perd sa dureté et son volume, les urines deviennent plus

(1) *Mémoires cités*, p. 152.

rare et plus colorées, les sueurs moins abondantes, les forces renaissent, la digestion, la circulation et la respiration reprennent leur énergie et leur régularité. On voit même dans quelques cas la maladie quoique arrivée à un degré alarmant s'amender et ensuite rétrograder lentement. Seulement il faut d'autant plus de temps pour que la résolution soit complète, que les courbures des os sont plus prononcées, et dans un trop grand nombre de cas les os se consolident dans leur forme vicieuse; d'où des difformités qui peuvent durer toute la vie et compromettre les fonctions, soit des organes pulmonaires et circulatoires, soit de l'arbre lors de l'accouchement. Il n'y a guère que les courbures légères des membres et le gonflement des extrémités articulaires des os qui soient susceptibles d'une résolution complète.

Lorsqu'au contraire la maladie continue sa marche, la mort peut en résulter, soit que les troubles digestifs, les sueurs et la fièvre entraînent le malade à la manière des flux caliculatils et de la fièvre hectique, soit que les troubles de la respiration dégénèrent en une véritable asphyxie. Mais outre ces cas dans lesquels la mort s'explique par des désordres appréciables, on la voit parfois survenir d'une manière inattendue chez des enfants qui ne paraissent encore rachitiques qu'à un degré modéré, et sur le cadavre on ne trouve dans aucun organe des lésions propres à expliquer cette brusque interruption de la vie. Dans deux cas de ce genre soumis à notre observation, nous n'avons pu découvrir la cause prochaine de la mort. A-t-elle eu lieu par un accès d'asthme nerveux que le rachitisme du thorax a rendu plus promptement funeste en augmentant la dyspnée? C'est l'hypothèse qui nous a paru la plus probable d'après le rapport des personnes qui donnaient des soins aux malades.

Traitement.

Le traitement général ou interne des scrophales esternes est absolument le même que pour le rachitisme; le traitement local seul diffère.

Nous avons peu de chose à ajouter sur les diverses médications de traitement interne à ce que nous en avons dit précédemment, quand nous avons étudié d'une manière générale les affections scrophuleuses et tuberculeuses. Nous ferons remarquer toutefois que ces médications peuvent être bien plus souvent employées et plus efficaces dans le cas de scrophules externes, parce que les viscères sur lesquels elles portent leur action primitive sont assez souvent sains et peu irritables. Ainsi les médicaments astringents, l'iodo, l'or, l'hydrochlorate de baryte, les toniques amers, les ferrugineux, les évacuants, les préparations sulfureuses, etc., peuvent être employés avec plus de persistance et d'énergie. Nous avons donné sur l'emploi de ces divers moyens thérapeutiques tous les détails qu'ils nous ont paru exiger et nous nous dispenserons d'y revenir. Il en est un seul dont nous avons omis de parler et qui jouissant depuis ces derniers temps d'un certain crédit, demande que nous y arrétions un instant notre attention : c'est l'huile de foie de morue.

C'est surtout en Allemagne que ce médicament a été l'objet de nombreux éloges; en France il est aussi déjà généralement apprécié. MM. Trommsdorff et Padeux avaient qu'à leur connaissance il n'a été employé en France que par Bertouzeau de Tours; mais ils n'indiquent pas l'époque à laquelle ce praticien y a eu recours. Ce qui est plus certain, c'est que M. Starck a fait ses premiers essais sur ce médicament dès 1831, et le prescrivait souvent pendant le semestre de 1834 à 1835 à la clinique interne de la faculté de Strasbourg où il remplaçait Lobstein. Cet honorable médecin préconise ce moyen surtout dans les affections scrophuleuses du système osseux et fibreux. Dans ces dernières années il est entré plus largement dans la pratique générale et l'on a vanté son efficacité même dans les cas de tuberculisation viscérale. M. Bonnet l'a employé, à l'Hôtel-Dieu de Lyon, sur une large échelle et n'a eu en général qu'à s'en louer. Depuis que nous sommes placé à la tête d'un service chirurgical dans le même hôpital, nous en avons aussi retiré plusieurs fois des avantages incontestables.

On peut consulter sur ce sujet le travail inséré dans la *Gazette médicale de Paris*, par M. Taufflieb, qui a judicieusement reconnu et déterminé les limites dans lesquelles ce médicament est doué d'une efficacité incontestable. Ses recherches, dit-il, l'ont conduit à des résultats qui lui donnent la conviction que l'huile de foie de morue est réellement un remède précieux qui restera à la science comme une de ses plus belles acquisitions. Cependant il se hâte d'ajouter que son efficacité est loin d'être absolue, et qu'elle ne s'étend pas sur toutes les catégories des maladies scrophuleuses. Parmi celles que l'huile de foie de morue peut guérir, il en est qui ne cèdent à son usage que sous l'influence de certaines conditions dont l'accomplissement est indépendant de l'action de ce remède et qui sont relatives aux lésions locales. Ce médicament agit en effet sur la disposition rachetique elle-même en modifiant directement la nutrition. S'il paraît dans quelques cas exciter les sécrétions urinaire, cutanée et intestinale, cette action n'est point assez constante pour le ranger dans la classe des diurétiques, des sudorifiques ou des purgatifs. M. Taufflieb le considère comme un médicament *nutritif* ou réparateur, c'est-à-dire rétablissant d'une manière quelconque les fonctions de nutrition perverties. Cette manière de voir est à peu près la même que celle de MM. Trousseau et Pédieux qui placent l'huile de foie de morue au nombre des toniques.

Les observations de M. Taufflieb semblent prouver que de toutes les maladies scrophuleuses ce sont les caries, le rachitisme, le carreau, et les tumeurs blanches qui guérissent le plus souvent par l'usage de cette médication; il faut toutefois remarquer que les caries avec plaie et engorgement des parties molles exigent que le traitement général par l'huile de foie de morue soit secondé par un traitement local. Les engorgements des ganglions lymphatiques autres que ceux de l'abdomen résistent à ce médicament dont l'action paraît douteuse et même nulle dans la phthisie tuberculeuse un peu avancée. D'ailleurs il ne faut pas oublier qu'il doit être administré avec persévérance et

pendant plusieurs mois pour produire des résultats avantageux (1).

Ce médicament se prescrit à la dose de deux, trois ou quatre cuillerées à bouche par jour pour les adultes; aux enfants, on donne le même nombre de cuillerées à café. Son odeur et sa saveur désagréables rendent son administration difficile chez les enfants. Pour diminuer leur répugnance on leur place le nez pendant qu'ils avalent le remède, et pour en masquer le mauvais goût on les fait gargariser avant et après l'ingestion avec un peu d'eau-de-vin ou d'une liqueur telle que celle d'anisette, etc. Ces liqueurs ont aussi pour but de prévenir les éruptions désagréables que l'huile de morue occasionne souvent. On peut se servir pour le même fin d'une infusion de café ou de toute autre substance aromatique. Le docteur Fehr, donne l'huile de morue sous la forme suivante, surtout chez les enfants : Huile de morue trente grammes ; sous-carbonate de potasse tombé en déliquium, huit grammes ; huile de calamus aromatiques, trois gouttes ; sirop d'écorces d'oranges, trente grammes. On donne au moins deux cuillerées à café de ce mélange le matin et autant le soir. Enfin on peut donner l'huile dans un looch blanc. D'ailleurs il faut parmi les diverses espèces d'huile de morue qu'on trouve dans le commerce, préférer celle qui est brune et a dû être préparée par la coction des foies de morue préalablement abandonnés à la putréfaction.

Nous n'insisterons pas sur la nécessité de recourir à un traitement hygiénique quels que soient les moyens pharmaceutiques mis en usage. Sans lui ceux-ci resteraient presque toujours sans effet, et nous nous sommes attachés ailleurs à démontrer son importance en même temps qu'à exposer d'une manière aussi complète que possible les règles qu'il faut observer pour le diriger convenablement.

Tout ce que nous avons dit ailleurs de l'efficacité des bains d'air comprimé, s'applique parfaitement au traite-

(1) V. le Mémoire de H. Tauffsch, *Geni méd.* 1859, p. 245.

ment du rachitisme et des autres affections scrophuleuses. Un travail récent de notre savant confrère le docteur Praxès (1) a mis encore en évidence l'action éminemment saine de cette ingénieuse méthode qui participe à la fois de l'hygiène et de la thérapeutique.

Les lésions scrophuleuses extenses, outre les topiques antiphlogistiques, résolutifs, fondants, excitants, caustiques, réclament souvent des moyens chirurgicaux que nous ne pouvons ici qu'indiquer, tels que l'ouverture des abcès, l'excision des portions de peau décollées, des cicatrices difformes, des végétations, etc., l'extraction des séquestres, la résection des os, enfin l'amputation dans les cas les plus graves. Faisons seulement observer que les opérations sérieuses ne doivent être tentées qu'avec réserve : 1^o parce que bien souvent des lésions locales qui offrent toutes les apparences de l'incurabilité, guérissent lorsque l'état de la constitution vient à se modifier favorablement ; 2^o parce qu'une maladie scrophuleuse locale opère souvent une dérivation qui prévient, arrête la localisation du mal dans un autre organe plus important, ou du moins retarde ses progrès.

Depuis le mémoire de Dupuytren sur les dépressions congénitales latérales de la poitrine, on sait que le gonflement des amygdales coïncide assez souvent avec le rachitisme du thorax. Dupuytren, quoiqu'il n'eût pas vu entre ces deux états morbides une relation positive de cause à effet, avait cependant préconisé dans ce cas l'ablation des amygdales. M. Robert, de Paris, regarde cette coïncidence comme très-fréquente : les enfants chez lesquels il l'a remarquée ont la poitrine en carène, le nez petit, ce qui tient au peu d'usage qu'ils font de cet organe, car ils respirent par la bouche; ils ont la respiration stertoreuse, et cet obstacle à l'entrée de l'air est une cause de débilité générale par suite d'une hématoxe vicieuse qui peut à la longue les entraîner au tombeau. Dans ce cas, des précautions ménagées sur la saillie du sternum, un traitement général

(1) *Ann. de méd. de Lyon*, novembre, 1844.

tonique, et, par-dessus tout, l'excision des amygdales, ramenant à la santé ces petits êtres souffrants.

Le rachitisme comporte aussi l'emploi de quelques moyens locaux dans le but de remédier aux difformités qui en sont la suite. Ici il est essentiel de distinguer les deux époques différentes de la maladie. Dans la première, tant que le ramollissement continue ses progrès, il faut éviter de faire marcher les enfants, parce que le poids du corps augmenterait les courbures des os. Il faut les tenir couchés sur des sachets de fougère ou de plantes aromatiques séchées, ou bien on les laisse jouer en plein air sur des matelas ou des tapis, ou enfin on les promène en voiture dans de petits chariots. Lorsque, au contraire, la période de ramollissement fait place à celle de résolution et de consolidation, lorsque le tissu osseux modifié dans sa nutrition s'accroît des sels calcaires que jusqu'alors il était impuissant à s'approprier, on peut permettre aux enfants de marcher; l'exercice leur est alors favorable et contribue au redressement des os.

Enfin il est indiqué de recourir aux moyens orthopédiques toutes les fois que les courbures sont telles que l'action normale des muscles tend plus à les augmenter qu'à les faire disparaître. Dans ce cas, il faut y avoir recours le plus tôt possible, c'est-à-dire avant que la consolidation s'opère complètement dans une position vicieuse. C'est alors que des machines bien faites peuvent rendre les plus grands services. Aux membres inférieurs en particulier, il est souvent utile de recourir à l'emploi des tiges métalliques convenablement ajustées; elles font office de tuteurs, combattent non-seulement les courbures osseuses, mais encore tendent à prévenir les encoches et les déviations articulaires rendues si faciles par le relâchement des ligaments qui succède aux gonflements cartilagineux. D'ailleurs on doit renoncer aux machines aussitôt qu'on est convaincu de leur inutilité, et que leurs inconvénients ne sont compensés par aucun avantage.

CHAPITRE VI.

CÉPHALOMATOME.

On donne le nom de céphalomatome à une tumeur sanguine qu'on observe sur le crâne des enfants nouveau-nés. Elle diffère de la tumeur sanguine ordinaire, c'est-à-dire du trambus qui se forme, chez la plupart des enfants, par la compression du col utérin et des détroits pelviens sur la tête pendant le travail de l'accouchement, en ce que dans le trambus le sang est infiltré et forme une tumeur pâteuse au sommet de la tête; tandis que dans le céphalomatome le sang est rassemblé en une collection fluctuante qui siège le plus ordinairement sur les côtés de la tête, sur les pariétaux au-dessous et en arrière de la bosse pariétale et plus souvent sur celui du côté droit que du côté gauche. Dans presque tous les cas le sang est placé entre le péricrâne et le tissu de l'os dénudé; par exception on le rencontre quelquefois entre le péricrâne et l'aponévrose, plus rarement encore dans l'intérieur du crâne. Le céphalomatome sous-aponévrotique n'a guère été observé qu'à la suite de violences exercées sur la tête du fœtus dans les manœuvres d'un accouchement laborieux. C'est par conséquent du céphalomatome sous-péricrânien, qui diffère du précédent sous tous les rapports, qu'il va être ici spécialement question.

Cette maladie n'est pas fréquente, à moins qu'on ne suppose avec quelques auteurs qu'elle est souvent méconnue. C'est ce que pense M. Burchardt (1), qui l'a rencontrée 13 fois sur 1402 accouchements, à la maison royale de Breslau, dans l'espace de sept ans, ce qui fait 1 sur 108; tandis que M. Baron pense qu'elle se rencontre une fois sur 596 enfants à peu près, et que M. Valleis n'en a trouvé que 5 cas sur 1927 enfants, ce qui donne 1 sur 387.

(1) *Expositio*, t. II, p. 227, 228.

Caractères anatomiques.

Sur 60 cas observés par M. Valleix et par M. Barchard, sur 57 malades, la maladie ne siégeait que 3 fois sur l'occipital et une fois sur le frontal droit; 55 fois elle siégeait sur l'un ou l'autre pariétal, 34 fois à droite, 20 fois à gauche; 2 fois le côté ne fut pas indiqué. 45 malades n'avaient qu'une tumeur, 5 en présentaient deux chacune et 2 en portaient trois à la fois.

Quand on étudie les conditions anatomiques du céphalématome pendant la vie ou après la mort, on remarque que le cuir chevelu a presque toujours sa couleur normale et son aspect ordinaire. L'épiphyse crânienne est également intacte. Le péricrâne, au-dessous duquel le sang est rassemblé, conserve en partie sa transparence, mais présente un épaissement notable. Sa surface profonde est lisse et polie; aux limites de la tumeur elle adhère fortement à l'os et ne peut être décollée sans une certaine force. Cette surface n'est pas toujours en contact immédiat avec le sang; celui-ci est quelquefois contenu dans une espèce de capsule ou de sac sans ouverture, développé d'un côté sur l'os du crâne, de l'autre sur la face interne du péricrâne, et fermé par une membrane mince, tantôt blanchâtre, filamenteuse, comme cellulaire, tantôt plus solide et analogue à une lame très-fine de cartilage ou à la membrane interne d'une artère.

La portion d'os sur laquelle repose la tumeur n'offre en général que des altérations fort légères. La table externe de l'os n'est pas à peu près constamment détruite, comme l'avaient pensé Michælis et Paletta, car elle n'existe pas encore en quelque sorte chez l'enfant nouveau-né. Elle présente l'aspect rugueux et les filtres rayonnés qu'on trouve à l'état normal dans le pariétal, et, seulement dans quelques cas, des granulations osseuses disséminées à sa surface et dues à l'activité de l'ossification. Lorsque cette surface, touchée pendant la vie, après l'incision de la tumeur, paraît lisse et polie, c'est le plus souvent parce

qu'elle est tapissée par la membrane dont nous avons parlé. A la circonférence du céphalématome on remarque une saillie qu'on a appelée *bourrelet*, *cercueil* ou *cercle osseux*, qui donne, comme dans les tumeurs sanguines décrites par J. L. Petit, la sensation d'une déperdition de substance faite aux os, vis-à-vis la partie centrale de la tumeur. Cette sensation n'est qu'une illusion, mais l'existence du *bourrelet* autour du céphalématome est bien réelle et presque constante, à moins que la maladie ne soit encore très-récente. Zeller et Naegele l'expliquent par une dépression de l'os dans le point occupé par la masse sanguine, et M. Pigné prétend que l'ossification imparfaite du crâne, se trouvant arrêtée dans un point par la pression du sang, marche dans les parties environnantes qui, en s'épaississant, forment la saillie circulaire. M. Valleix, qui a toujours vu ce *bourrelet* formé par une production osseuse élevée au-dessus du niveau de l'os, dont on pourrait facilement la détacher, soit avec l'ongle, soit en glissant le scalpel au-dessous d'elle, et le pariétal n'offrir, après son ablation, aucun changement dans sa courbure naturelle, pense avec raison, suivant nous, que cette production est de la nature de celles que Leubstein a nommées *ostéophytes*.

Dans les commencements, le sang contenu dans la tumeur est rouge et liquide, puis il devient noir et s'épaissit; plus tard enfin, sa portion liquide se résorbant de plus en plus, il est réduit à une masse sanguine plastique et gélatineuse, ou transformé en une masse osseuse. Quant aux vaisseaux de l'extérieur du crâne, ils sont ordinairement exempts de toute altération.

Le volume du céphalématome est variable depuis celui d'une noisette jusqu'à celui d'un œuf de poule; quelquefois même la tumeur couvre presque tout le pariétal. Sa forme est ordinairement ovale, et la saillie qu'elle fait au-dessus du niveau du crâne est plus ou moins élevée, suivant l'époque de l'évolution de la maladie. Les tumeurs situées sur l'occipital ou sur le frontal ont en général une forme arrondie.

Symptômes.

Oùtre les signes tirés du siège, de la forme, du volume et des caractères anatomiques de la tumeur, le céphalématome présente encore d'autres symptômes importants. Le plus remarquable est la fluctuation, le plus souvent très-évidente, quelquefois obscure; la tumeur est tendue, résistante, plus molle au sommet que dans les autres points de son étendue; le plus ordinairement, en la dépassant avec le doigt, on parvient à sentir l'os qui en forme le fond; ce signe n'est difficile à percevoir que lorsqu'elle est volumineuse. Même dans ce cas, M. Valleix dit qu'il y a toujours réussi, en ayant la précaution de placer le doigt sur le bourrelet de la circonférence et de le pousser ensuite vers le centre de la tumeur, en augmentant graduellement la pression. Une forte compression de la tumeur ne produit ni diminution dans son volume, ni perte de connaissance, ni convulsions. Le bourrelet osseux, placé sur les limites du céphalématome, en constitue un signe non moins important et à peu près constant, à moins que la maladie ne soit fort peu avancée.

Dans la plupart des cas, le céphalématome ne se développe, ou du moins ne fixe l'attention du médecin et des personnes qui donnent des soins à l'enfant, qu'un certain temps après l'accouchement, c'est-à-dire du deuxième au cinquième jour après la naissance. Dans quelques cas on a constaté sa présence chez le fœtus dans le sein de sa mère; dans quelques autres on a pu, en quelque sorte, assister à son développement pendant le travail de la parturition, mais il est généralement admis que son début est postérieur à la naissance chez presque tous les enfants qui en sont affectés. La tumeur met peu de temps pour acquiescer son entier développement; M. Valleix dit qu'il suffit quelquefois d'un petit nombre d'heures, mais qu'il n'est pas rare de la voir augmenter pendant un jour ou deux. M. Borchardt admet qu'elle augmente jusqu'au septième ou neuvième jour, et que son augmentation a lieu bien

plus en hauteur qu'en extension de sa base, dont la circonférence est d'autant plus exactement circonscrite que la tumeur prend plus d'élévation. — Du septième au neuvième jour (1), dit cet auteur, les tumeurs sont arrivées à leur apogée. Dans huit cas que j'ai abandonnés à la nature cet état dura de sept à vingt-un jours; après cette époque, ces tumeurs firent moins tendues, plus affaissées, et donnaient une sensation particulière de crépitation au toucher; puis la fermeté qu'acquît la paroi externe de la capsule de la tumeur annonça que la guérison faisait des progrès, les bords redevinrent irréguliers, ronds, comme évanés. Néanmoins ils se rapprochèrent mutuellement, de manière à ne laisser enfin qu'une petite ouverture, sorte de fontanelle déjà indiquée par Oslander, laquelle finissait elle-même par se fermer entièrement.... Je n'ai jamais observé le moindre signe d'inflammation ou de suppuration. La guérison a toujours été fort tardive, et n'a été généralement accomplie qu'entre la septième et la neuvième semaine. L'état de santé de ces nouveau-nés était le suivant : 20 étaient parfaitement sains et prenaient bien la mamelle; 16 étaient affectés d'ictere; 1 qui vint prématurément mourut de marasme; 2 eurent plusieurs attaques d'apoplexie (coups de sang) qui se succédèrent jusqu'à ce que la tumeur eût été ouverte par l'opération; 1 fut pris de trismus et 6 de faiblesse générale. Ainsi la plupart de nos enfants vinrent au monde malades. Chez un grand nombre on ne pouvait reconnaître une altération des organes qui servent à la nutrition et à la digestion. En général, il me parut que les pulsations des carotides avaient une force anormale chez beaucoup d'entre eux. Il ne fut pas rare d'observer un état de somnolence et, dans le sommeil, des mouvements spasmodiques des muscles de la face. Lorsqu'on touchait les tumeurs avec ménagement, elles ne paraissaient pas douloureuses; si l'exploration se prolongeait, les enfants devenaient d'abord inquiets, ils agitaient la tête pour éviter le toucher, et ils finissaient par jeter des cris qui pro-

(1) *Ibid.* cit., p. 328.

voquaient ordinairement des congestions vers la tête. »

Depuis que la nature du céphalématome est mieux connue, on peut dire que son diagnostic est généralement facile. On évitera de le confondre avec l'encéphalocèle qui se fait presque toujours à travers les sutures et les fontanelles, qui est agitée de battements isochrones à ceux du pouls, dont la pression fait naître les signes de la compression du cerveau, toutes circonstances qui manquent à peu près toujours dans le céphalématome. Dans les deux maladies on éprouve la sensation d'une perforation de l'os; mais, tandis qu'elle est apparente dans l'une, elle est réelle dans l'autre, c'est-à-dire dans la hernie. L'hydrocéphalie ne peut ressembler au céphalématome que dans le cas où le liquide soulèverait les fontanelles et s'étendrait plus ou moins loin entre les os et le péri-crâne, de manière à former une tumeur; mais alors elle a des signes trop tranchés pour ne pas être facile à distinguer de toute autre affection. Les fungus de la dure-mère, très-rare dans l'enfance, présentent à peu près les mêmes caractères que l'encéphalocèle. Les loupes, les tumeurs érectiles ne présentent ni fluctuation, ni bourrelet osseux. Les abcès ont une marche très-différente et des caractères propres. Enfin les tumeurs sanguines simples ordinaires, œdémateuses ou séro-sanguines sont pâles, conservent l'impression du doigt, ne sont ni fluctuantes, ni circonscrites, mais diffuses et sans bourrelet osseux à leur circonférence. La peau qui les recouvre est d'une couleur plus ou moins foncée, et elles siègent sur toutes les parties du crâne où les pressions, les contusions peuvent être exercées. Le céphalématome pourrait être plus facilement confondu avec une tumeur sanguine sous-aponévrotique; mais, outre que celle-ci est fort rare, on ne l'a constatée qu'à la suite de violences rendues nécessaires par un accouchement laborieux; elle diffère souvent par son siège et toujours par l'absence de bourrelet osseux.

Le céphalématome se termine presque toujours d'une manière heureuse, soit par résolution, soit par cicatrisation, lorsqu'on a fait l'opération. Les enfants qui meurent

pendant qu'ils sont atteints doivent le plus souvent cette issue fâcheuse à d'autres maladies coïncidentes.

CAUSE.

L'étiologie du céphalématome n'est pas très-bien connue; des opinions diverses se sont produites et n'ont pu être encore parfaitement conciliées. M. Valleix pense que la maladie est due à une pression circulaire de l'utérus pendant le travail de l'enfantement, pression qui à un faible degré produit seulement une ecchymose entre le pariétal et le péricrâne, et à un degré d'action plus violente amène une collection sanguine. Ce qui, suivant M. Valleix, prouve que cette ecchymose n'est que le premier degré du céphalématome, c'est que l'une et l'autre ont le même siège. La même cause peut produire, 1^o une simple coloration, 2^o une infiltration évidente, 3^o une destruction de tissu avec épanchement d'une couche sanguine. Dans 2 cas M. Valleix a examiné le pariétal du côté opposé à celui qui portait la tumeur, et il a trouvé sur lui une portion d'ecchymose semi-ovale, en tout semblable aux taches qu'on rencontre chez presque tous les enfants entre le péricrâne et le tissu osseux. Si le céphalématome n'est pas plus fréquent, c'est que les cas les plus favorables à sa production sont ceux où une très-grande partie du pariétal se présente au col, à l'exclusion des autres parties du crâne, ce qui est assez rare. On voit, lorsque, par la pression, on fait transuder le sang à travers les pariétaux du crâne d'un nouveau-né, que le point où cette transudation se fait avec plus de facilité se trouve immédiatement au-dessous de la bosse pariétale. Il existe là trois ou quatre orifices par lesquels les vaisseaux transmis presque directement versent de grosses gouttes de sang qui se réunissent bientôt en nappe et finissent par ruisseler de tous côtés; c'est aussi là que le péricrâne se décolle avec le moins d'effort. Ainsi, lorsque le céphalématome est petit, est-il ordinairement placé en peu au-dessus de la bosse pariétale (1). Quoique la théorie de M. Valleix

(1) Valleix, *Chn. des mal. des enfants nouveau-nés*, p. 551.

paraît très-satisfaisante, elle ne saurait s'appliquer aux cas de céphalématome trouvés sur le fœtus avant le travail de l'accouchement. Si ces faits sont bien réels une explication plus large est encore à trouver.

TRAITEMENT.

Les méthodes de traitement conseillées contre le céphalématome sont l'expectation, les résolutifs, la compression, les caustiques et l'incision.

On a vu, par ce que nous avons dit des huit cas où le docteur Bichard a mis l'expectation en usage, quels résultats on peut en attendre. Elle ne saurait convenir que lorsque la tumeur est peu volumineuse, sans signes d'inflammation qui fassent craindre sa terminaison par suppuration.

M. Bichard a employé les résolutifs dans 26 cas. 13 malades guérirent, la plupart en 2 ou 3 semaines. 4 enfants périrent de diverses maladies pendant le traitement, sans qu'on ait pu les attribuer à celui-ci. Chez 4 autres sujets on ajouta la compression aux résolutifs qui avaient échoué. Sur ces quatre malades un mourut de trismus le 14^e jour; un autre de convulsions, le 21^e jour; un troisième a guéri en 25 jours; enfin chez le quatrième la compression déterminant quelques accidents, on eut recours à l'incision, et la guérison arriva promptement; enfin les cinq autres tumeurs n'ayant présenté aucun amendement par les résolutifs furent incisées et guérirent très-bien. Les résolutifs employés étaient des fomentations chaudes composées avec du vin et des substances aromatiques. On eut quelquefois recours au liniment ammoniacal et à l'onguent mercuriel.

La compression est une méthode infidèle; le plus souvent les mouvements de l'enfant la rendent impraticable, ou elle ne peut être supportée.

Les caustiques devant nécessairement déterminer l'inflammation et la suppuration de la tumeur ne sauraient être préférés à l'incision qui amène le plus souvent la guérison et dont les suites sont extrêmement simples. Mascari et Faletta, pensant à tort que l'os est nécrosé, ont

conseillé de passer un sêton dans la tumeur pour en provoquer la suppuration. Ils ont mis cette méthode en pratique, mais elle n'est plus défendue par personne.

De toutes les méthodes l'incision est celle qui réussit le mieux. Employée de prime abord dans 16 cas par M. Ehrhard, la guérison s'en est toujours suivie en très-peu de temps. D'autres avant ce médecin en avaient déjà reconnu les avantages. Il est généralement établi aujourd'hui en précepte que si le céphalématome a un volume médiocre, c'est-à-dire n'excede pas la moitié d'un œuf de poule, on peut se contenter d'appliquer des résolutifs et d'attendre. « Mais si le céphalématome est plus considérable, s'il n'a pas diminué au bout de quelques jours, il faut l'ouvrir sans délai, parce que le crâne, conservant sa vascularité, offrira plus de chances à un recollément prompt des parties molles. On ne doit pas redouter que l'écoulement continue par l'orifice des petits vaisseaux, car ils sont déjà oblitérés et recouverts d'une fausse membrane. L'incision peut être faite avec la lancette ou avec le bistouri; il vaut mieux la faire trop grande que trop petite. La dénudation du crâne n'est pas dangereuse chez les nouveau-nés; la grande vitalité de ces parties rend leur mortification impossible et le recollément des téguments très-facile (Vallois). »

Le seul inconvénient de l'incision, c'est qu'en la faisant on peut diviser un rameau artériel et donner lieu à une hémorrhagie qui s'arrête difficilement chez les enfants. Smellie cite un cas de mort survenue de cette manière. Après l'incision il faut donc surveiller l'enfant, et si le sang continue de couler, il faut, sans balancer, renverser les bords de la plaie, chercher le vaisseau ouvert et le lier.

Après l'incision et la sortie du sang, les téguments sont flasques et ridés; bientôt une inflammation légère et profonde se manifeste, un écoulement séro-sanguin s'établit, puis diminue rapidement. L'adhésion des surfaces décollées se fait dans une grande étendue à la fois, et la guérison est parfaite de dix à vingt jours au plus après l'opération. Le pansement se réduit à maintenir les lèvres de la

plaie écartées par quelques fils de charpie pour favoriser l'écoulement des liquides; on applique par dessus de la charpie, une compresse et un bandage circulaire. Il survient très-rarement de la fièvre.

C'est en suivant ces préceptes que nous avons tout récemment conduit à bonne fin le céphalématome d'un enfant venu au monde par un accouchement d'ailleurs très-naturel chez une femme primipare bien conformée. La tumeur ne fut aperçue que le quatrième ou cinquième jour après la naissance. Elle avait le volume d'un œuf de poule. On appliqua d'abord des résolutifs. Le onzième jour, la tumeur semblait avoir un peu augmenté; nous en pratiquâmes l'ouverture avec la lancette, il en sortit environ 50 grammes d'un sang noir et liquide. Les jours suivants un peu de suppuration s'établit; la guérison fut complète le 25^e jour après l'opération.

Les résolutifs et l'incision conviennent également contre le céphalématome sous-aponévrotique. Quant à celui qui se fait fort rarement entre la dure-mère et les os, et dont les symptômes sont ceux d'un épanchement interne comprimant le cerveau, son traitement doit être le même que dans le cas d'apoplexie. S'il coïncide avec un céphalématome externe, il faut se hâter d'ouvrir celui-ci, parce que si, comme on l'a vu une fois, les deux collections sanguines communiquent à travers une fissure de l'os, l'évacuation de la tumeur sanguine sous-péricrânienne peut amener celle du céphalématome sous-méningien, et faire disparaître tous les accidents ordinairement graves qu'il entraîne à sa suite.

CHAPITRE VII.

SYPHILIS DES ENFANTS NOUVEAU-NÉS.

L'enfant peut recevoir de ses parents le germe de la maladie vénérienne, et en présenter les symptômes au moment de la naissance ou plus ou moins de temps après. Cette transmission funeste d'une des maladies les plus tristes qui affligent l'humanité s'opère de plusieurs manières. Dans le cas qui se rapproche le plus de ce qui a ordinairement lieu chez l'adulte, l'enfant est infecté au moment de son passage à travers le canal vulvo-utérin affecté de blennorrhagie ou d'ulcérations syphilitiques. La peau du fœtus est le plus souvent protégée contre ce contact par la couche de matière grasse dont elle est recouverte, mais les muqueuses externes, et surtout celle des paupières, sont plus exposées à éprouver les effets du virus. C'est ainsi qu'un certain nombre d'enfants sont affectés de blennorrhagie oculaire dès les premiers jours de leur vie. Des chancres et autres symptômes primitifs pourraient se développer de la même manière. Dans les autres modes de transmission dont nous allons parler, c'est à l'état constitutionnel que la maladie existe d'emblée chez l'enfant.

Le père et la mère peuvent être sains au moment de la conception, mais pendant sa grossesse la mère contracte la syphilis. Si celle-ci devient constitutionnelle, le sang que l'enfant reçoit de sa mère étant infecté peut lui transmettre la maladie. Toutefois cela n'arrive qu'assez rarement; si la maladie de la mère n'est pas ancienne et tout-à-fait constitutionnelle, le fœtus peut rester à l'abri de ses effets.

Dans un troisième cas la syphilis constitutionnelle existe chez les parents avant le moment de la conception. Si c'est du côté de la mère, la transmission peut s'expliquer de deux manières: ou bien, comme dans le cas précédent,

c'est par le sang qui sert à sa nutrition, pendant la gestation, que le fœtus reçoit la maladie, ou bien c'est par l'ovule que la transmission a lieu. Du côté du père, le sperme fécondant peut être imprégné du principe générateur de la syphilis et le transporter au germe de l'embryon. Dans ces deux derniers cas, il faut admettre l'infection d'une substance sécrétée, soit adhésive par les uns, nié par les autres, mais qui au fond n'est pas plus invraisemblable que l'altération du sang que nous avons vu suffire à la transmission de la syphilis. Nous savons bien que cette altération des fluides sécrétés, due au virus syphilitique, est difficile à démontrer directement, et que la réalité de son influence sur la communication de la maladie est très-contestable chez l'adulte. Mais il n'est pas défendu de supposer que cette altération, trop faible pour agir sur des tissus arrivés à leur entier développement, peut exercer une action plus puissante sur la matière vivante, encore si faiblement organisée, si molle, si délicate, qui forme les premiers rudiments de l'être embryonnaire. Des faits bien observés par des hommes dignes de foi doivent laisser peu de doute à cet égard.

Enfin le quatrième mode de transmission de la vérole aux enfants nouveau-nés a lieu par la lactation. Un enfant très-sain, s'il tette une femme infectée, peut contracter la maladie, alors même que le mamelon n'est le siège d'aucune lésion. C'est ici le lait vicié qui devient l'agent de la communication. De même que dans d'autres circonstances la salive d'un enfant syphilitique, alors même que la lèuche est saine, peut transmettre la maladie à sa nourrice en développant des chancre sur les mamelons. Ces deux faits prouvent d'une manière péremptoire que les liquides sécrétés peuvent contenir et transmettre le virus syphilitique, et dans certaines circonstances agir de la même manière que le pus d'un chancre primitif, c'est-à-dire agir sur le lieu même où le contact a lieu et comme par un espèce d'insémination.

Outre ces quatre modes de transmission qu'on peut considérer comme presque spéciaux à la syphilis des nou-

veau-nés, on comprend qu'à la rigueur un jeune enfant peut contracter la maladie lorsque, par des baisers ou toute autre action de la part d'une personne affectée, le virus syphilitique est transporté sur une surface du corps de l'enfant que sa structure rend capable d'en éprouver l'influence contagieuse.

En somme l'action des causes de la syphilis sur l'enfant est telle que lorsque la maladie est congénitale elle est toujours et d'emblée constitutionnelle ; si elle est contractée pendant ou après la naissance elle peut être tantôt constitutionnelle d'emblée, tantôt locale d'abord, c'est-à-dire, caractérisée par les symptômes dits primitifs et ne devenir constitutionnelle que plus tard.

Les symptômes de la syphilis des nouveau-nés n'offrent par eux-mêmes rien de spécial, et de toutes leurs variétés il n'en est aucune qui ne se retrouve avec les mêmes caractères qu'aux autres âges de la vie. Lorsque la syphilis est congénitale ces symptômes peuvent être manifestes au moment de la naissance, mais plus souvent encore ils ne se développent que plus ou moins de temps après que l'enfant a vu le jour, et avant leur apparition, on peut constater les apparences d'une bonne santé. Une constitution chétive, la maigreur, l'apparence de la décrépitude, quelque pouvant résulter d'une infection syphilitique latente, n'ont aucune valeur absolue comme symptômes syphilitiques, parce qu'elles peuvent exister indépendamment de toute syphilis. Ces circonstances sont plus concluantes lorsque les commémoratifs font connaître l'existence de la cachexie syphilitique chez les parents, ou lorsqu'il s'y joint des symptômes syphilitiques proprement dits. On sait d'ailleurs que, sans se révéler par des altérations de tissu caractéristiques, le principe virulent peut entraîner la mort du fœtus avant le terme de la grossesse. L'avortement est fréquent chez les femmes dont le fœtus provient d'un père ou d'une mère en proie à une diathèse syphilitique invétérée.

Il ne peut pas entrer dans notre plan de donner une description complète des symptômes de la syphilis ; nous

devons pour cela renvoyer aux traités généraux sur les maladies vénériennes et au traité spécial de Bertin (1). Nous nous bornerons à une indication sommaire.

Sur les membranes muqueuses, la maladie se manifeste par des écoulements purulents, verdâtres, jaunâtres, par l'ophthalmie purulente, par des végétations en forme de choux-fleurs et de poireaux, par des ulcères arrondis, ordinairement superficiels, fœculents ou grisâtres, faisant quelquefois des progrès rapides, passant facilement à la gangrène, soit par inflammation, soit par appauvrissement de la constitution, siégeant principalement à l'anus, aux parties génitales, à la bouche, aux commissures des lèvres, par des tubercules plats ou pustules humides ayant leur siège à peu près sur les mêmes parties.

À la peau les symptômes sont ceux des syphilides tuberculeuses, des pustules d'ecthyma, des tubercules plats ou pustules humides, des taches cuivrées plus ou moins irrégulières, des ulcères précédés ou non de syphilide pustuleuse ou tuberculeuse, ayant plus ou moins les caractères ordinaires des ulcères vénériens et ordinairement situés en plus grand nombre aux environs de l'anus, à la partie interne et supérieure des cuisses, à l'ombilic, entre les doigts ou les orteils.

La syphilis, quand elle porte son action sur le système lymphatique, ce qui n'est pas très-commun, s'y annonce par des engorgements ganglionnaires, qu'on peut regarder comme des bubons consécutifs, et siégeant dans différentes régions, au col, aux aines, etc. Les périostoses sont rares, mais le sont moins encore que les exostoses. Le tissu cellulaire serait peut-être plus souvent le théâtre des désordres dus à la syphilis. On y rencontre des abcès aigus ou chroniques, quelquefois très-multipliés, sous forme de petites tumeurs tuberculeuses sous-entées ayant principalement leur siège sous le cuir chevelu. Quant aux désordres que la syphilis peut produire dans le système nerveux et dans les

(1) *Traité de la maladie vénérienne chez les enfants nouveau-nés, les femmes enceintes et les accouchées*, 1819, in-8°.

autres organes, ils sont très-nombreux et très-divers; ce n'est en général que par leur coïncidence avec d'autres symptômes syphilitiques et par leur disparition sous l'influence du même traitement qui amène la guérison de ces derniers que leur véritable cause peut être reconnue.

« Tous ces divers symptômes, dit M. Fournier, d'après qui nous avons tracé les indications précédentes, présentent à peu près l'aspect, la forme, la marche, les terminaisons que les mêmes symptômes chez l'adulte, en faisant la part, facile à faire d'ailleurs, de la modification que doivent leur imprimer la fragilité, la rapidité des mouvements vitaux dans un âge aussi tendre, la délicatesse de la peau et la facilité avec laquelle elle s'enflamme, la disposition très-lymphatique à cet âge, l'état plus ou moins détérioré, quoique non apparent quelquefois, d'une constitution si neutre, si frêle, en proie à la diathèse syphilitique, etc., sans compter d'ailleurs l'influence des autres dispositions héréditaires, du tempérament natif, du mode de nourrissement auquel l'enfant est soumis, du lieu qu'il habite, des climats, des saisons (1). »

Le diagnostic offre très-souvent de sérieuses difficultés. En face des symptômes qu'il observe chez l'enfant, le praticien doit s'attacher à reconnaître leurs caractères spéciaux et distinctifs et se diriger dans cette appréciation d'après les mêmes principes que dans les cas de syphilis chez l'adulte. Mais les commémoratifs sont loin de lui offrir les mêmes ressources dans le premier cas que dans le second; car il faut remonter aux antécédents prochains ou éloignés de la santé du père et de la mère dont beaucoup de circonstances peuvent retarder ou empêcher les aveux. Mais le cas le plus difficile de tous est sans contredit celui dans lequel la syphilis se déclare chez un enfant pendant la lactation, et dans lequel la nourrice et l'enfant sont tous les deux infectés au moment où ils sont soumis à l'examen du médecin. Comme dans ces procès obscurs dans lesquels chaque partie, obéissant aux motifs d'un intérêt sordide,

(1) *Précis théorique et pratique sur les malad. vénériennes*, t. II, p. 535.

charge répartie adverse, il est bien difficile de démêler la vérité et de distinguer au travers de renseignements souvent contradictoires lequel des deux, de la nourrice ou du nourrisson, a été infecté le premier, et a probablement, par conséquent, infecté l'autre. Lorsque le mamelon a été toujours exempt d'altération, il est peu probable que la nourrice ait reçu la maladie de son nourrisson, parce que le contact de la bouche de celui-ci aurait d'abord développé des symptômes syphilitiques primitifs sur le mamelon. D'un autre côté, s'il est prouvé que la nourrice n'a jamais eu de symptômes primitifs sur les organes glairaires, il est difficile de comprendre qu'elle ait pu communiquer la maladie à son nourrisson; il est bien plus probable qu'elle l'a reçue de celui-ci. Il nous est impossible de descendre dans l'examen détaillé de ces difficultés qui, en médecine légale, doivent rendre le médecin extrêmement réservé, mais qui heureusement ont moins d'importance dans la médecine pratique, parce que, quelle que soit l'origine du mal, du moment où il existe chez la nourrice et chez l'enfant, il faut l'attaquer chez tous les deux, sans se préoccuper d'autre chose au point de vue du traitement.

La syphilis doit être considérée comme une maladie grave chez les nouveau-nés. Beaucoup d'enfants qui en naissent entachés meurent peu de temps après la naissance. Ceux dont la constitution n'est pas radicalement viciée et affaiblie auront toujours à subir les chances d'un traitement mercuriel qui offre plus d'inconvénients à cet âge qu'à toute autre époque de la vie.

Ce traitement s'emploie de deux manières : tantôt on fait passer les remèdes par le lait de la nourrice, tantôt on les donne directement à l'enfant. La première méthode est de rigueur, lorsque la nourrice est elle-même malade; elle convient encore mieux que la seconde si la nourrice est saine, pourvu que l'état de ses organes permette l'emploi des remèdes anti-syphilitiques. Dans ces deux cas le traitement mercuriel est administré à la mère en vue de guérir l'enfant. On donne donc le mercure en frictions ou

à l'intérieur. On commence toujours par une plus petite dose que celle que l'on fait prendre aux adultes pour les guérir eux-mêmes de la syphilis. On débute par 4 ou 5 milligrammes de deuto-chlorure de mercure, ou proportionnellement de toute autre préparation mercurielle à l'intérieur, ou bien 1 gramme d'onguent mercuriel en frictions. On augmente ensuite progressivement d'une petite quantité tous les trois à quatre jours, en observant l'effet du mercure sur les voies gastriques, sur le système nerveux de l'enfant; car ce métal peut facilement déterminer des coliques, la diarrhée, un amaigrissement rapide, des convulsions. La nourrice prend en même temps une tisane adoucissante, des bains simples, et suit un régime doux et léger. Si elle présente elle-même des symptômes syphilitiques à la peau ou ailleurs, il faut lui appliquer, selon les cas, les pansements convenables, des bains médicamenteux, un traitement modifié, si c'est nécessaire, par les tisanes, les sirops sudorifiques, les opiacés, etc. L'essentiel, comme le dit M. Baumès, est de faire en sorte que le traitement ainsi administré à la nourrice n'aille pas porter le trouble dans l'économie de l'enfant. Quoique le traitement administré à la nourrice puisse très-bien guérir le nourrisson de tous les symptômes qu'il présente, il ne faut pas cependant négliger l'emploi, contre les symptômes extérieurs, des mêmes topiques qu'on met en usage chez les adultes dans des circonstances analogues. On a seulement la précaution de diminuer les doses des substances actives qui entrent dans ces topiques, afin de ménager la sensibilité et l'irritabilité des organes de l'enfant. Ainsi, quand l'enfant porte une syphilide, on lui fait prendre des bains de sublimé en réduisant la dose de ce sel au dixième environ de celle qu'on emploierait chez l'adulte.

Lorsque la nourrice n'est point syphilitique, et lorsque des circonstances particulières font répugner à l'emploi du traitement indirect, ou si l'enfant est sévré, il faut alors traiter celui-ci directement. Les frictions mercurielles sont contre-indiquées dans le premier âge par l'irritabilité de la peau et par la nécessité des soins de pro-

préfé. Si cependant on n'est pas arrêté par ces inconvénients, on commence par une fraction de 20 à 40 centigr., tous les deux jours, et on augmente progressivement jusqu'à 0,75 ou 1 gram. et même plus, si l'enfant est déjà un peu fort, de 1 à 3 ans par exemple. Beaucoup de praticiens préfèrent le mercure à l'intérieur et surtout le sublimé en liqueur dans un peu de lait ou d'eau sucrée à une dose très-petite d'abord, comme 2 à 3 milligram., si l'enfant est à la mamelle. La dose est progressivement augmentée selon l'effet produit, et l'indication qui se présente, jusqu'à 5, 6 ou 8 milligram., et même 1 centigr., si l'enfant est sevré et beaucoup plus fort; dans cette progression on tient nécessairement compte de la constitution de l'enfant, de la ténacité et de l'intensité de la maladie. A ces moyens l'on joint les topiques et les bains, comme nous l'avons dit plus haut, et l'on fait prendre à l'enfant de l'eau d'orge pour boisson. Quand la maladie résiste, quand elle est invétérée, il faut ajouter aux moyens précédents de petites doses de sirops indurifiques, de sirop de Guaiacum, de sirop de Larrey. On peut aussi recourir aux autres préparations mercurielles comme le mercure saccharin, le mercure d'Hanemann, le mercure gonflé de Plenk, qui se prennent en poudre, en pâles, en solution ou suspension dans des liquides adoucissants, en sirops, etc. Enfin, lorsque la maladie est rebelle au traitement direct, il faut y ajouter le traitement indirect, c'est-à-dire, par la nourrice, à moins de contre-indications formelles.

Dans l'administration des mercuriens, « il faut savoir, dit avec raison M. Baurès, s'arrêter comme on le fait chez l'adulte, lorsqu'il se présente quelque symptôme d'irritation. Ce n'est pas la salivation qu'on a à craindre à cet âge, mais bien l'inflammation des voies gastriques, les désordres du système nerveux. Il est une époque surtout où il faut être très-attentif à l'effet produit par le mercure, c'est celle de la première dentition, passage de la vie de l'enfant fertile en orages qu'il faut continuellement chercher à conjurer (1). »

(1) *Loc. cit.*, t. II, p. 244.

Lorsque des symptômes de syphilole s'ajoutent à ceux de la syphilis, ce qui n'arrive guère qu'après l'époque de la première dentition, il faut unir l'iode au mercure ou même recourir à l'iode seul, car souvent le mercure est nuisible dans cette occasion. Si l'iode lui-même paraît insuffisant, ce qui arrive surtout chez les enfants dont le tempérament lymphatique est très-manifeste, il faut l'associer au fer et donner le proto-iodure de fer à la dose de 5 à 20 centigr. par jour ou une solution d'iodure de potassium et de proto-iodure de fer (ana 0,1; eau dist. 30), à la dose d'une à six cuillerées par jour. C'est dans ces cas plus que dans tout autre que la médication dépurative est la plus impérieusement commandée et doit être suivie avec la plus grande persévérance.

Lorsqu'une femme contracte la syphilis pendant sa grossesse, est-il nécessaire ou convenable de la soumettre à un traitement antisyphilitique pour prévenir la maladie chez l'enfant qu'elle porte? On s'accorde généralement aujourd'hui pour répondre affirmativement à cette question. Le traitement mercuriel bien appliqué ne nuit pas au fœtus et ne fait pas avorter la femme, comme quelques auteurs l'ont cru; il prévient au contraire certainement l'infection constitutionnelle de l'enfant en détruisant celle de la mère. Si la mère n'a que des symptômes primitifs et récents, on peut à la rigueur s'abstenir d'un traitement général si un traitement local bien approprié à ces symptômes en a amené la prompte disparition. Si des chancre existent au moment de l'accouchement sur les parties génitales, il faut les cautériser avec le nitrate d'argent, et, si c'est une blennorrhagie, il faut faire des lotions ou des injections avec une solution de ce sel. Enfin, quand on sera obligé de soumettre une femme enceinte à un traitement mercuriel on le fera avec la réserve que commandent doublement sa susceptibilité et celle de l'enfant à éprouver les effets de la médication hydrargyrique. La disparition fluxionnaire et pléthorique, l'état nerveux qui se montrent chez la plupart des femmes enceintes rendent ordinairement nécessaire, comme voie de préparation

à l'emploi des mercuriaux, le traitement antiphlogistique par les émissions sanguines, les bains et les boissons délayantes, un régime adoucissant, et quelquefois des calmants et des antispasmodiques. Lorsque la femme est près d'accoucher, le traitement mercuriel ne doit pas être commencé, ou bien on doit le suspendre pour y revenir trois ou quatre semaines environ après l'accouchement.

TABLE

DU TOME SECOND.

SUITE DE LA SECONDE PARTIE.

Maladies de l'abdomen	1
SECTION II. — Maladies de l'estomac et de l'intestin. <i>ibid.</i>	
Case. I. — De l'indigestion	2
Case. II. — Hémorrhagies gastro-intestinales	7
Case. III. — De l'inflammation gastro-intestinale.	15
Case. IV. — Diacrisis ou lésions de sécrétion de la muqueuse gastro-intestinale	28
ARTICLE PREMIER. — Diacrisis muqueuse ou folliculeuse	29
ART. II. — Diacrisis acrescente	82
ART. III. — Diacrisis séreuse	92
ART. IV. — Diacrisis flatulente ou ventreuse.	94
ART. V. — Diacrisis vermineuse	96
Case. V. — Ramollissement de la muqueuse gastro-intestinale	118
Case. VI. — Fièvre typhoïde.	119
Case. VII. — Invagination des intestins	165
SECTION III. — Maladies des annexes de l'appareil digestif	171
Case. I. — Maladies des glandes annexes à l'ap- pareil digestif	<i>ibid.</i>
ARTICLE PREMIER. — Maladies des glandes salivaires	<i>ibid.</i>
ART. II. — Maladies du foie.	172
ART. III. — Maladies de la rate et du pan- créas	177
ART. IV. — Maladies du péritoine.	179
SECTION IV. — Maladies des organes génito-urinaires.	183
Case. I. — Maladies des voies urinaires	184

ARTICLE PREMIER. — Catarrhe vésical.	184
ART. II. — Incontinence d'urine	186
CHAP. II. — Maladies des organes génitaux	191
ARTICLE PREMIER. — Catarrhe vulvaire ou leucorrhée	192
ART. II. — Gangrène de la vulve	202
SECTION V. — Tubercules de l'abdomen	204

TROISIÈME PARTIE.

Maladies du système nerveux	233
SECTION I. — Maladies des centres nerveux sans altération matérielle appréciable ou névroses.	235
CHAP. I. — Contracture.	236
CHAP. II. — Convulsions cloniques	243
ARTICLE PREMIER. — Affection convulsive	246
ART. II. — Chorée.	249
SECTION II. — Maladies des centres nerveux avec altération matérielle appréciable.	258
CHAP. I. — Hypérémies et hémorrhagies encéphalo-rachidiennes	262
CHAP. II. — Inflammations et hydropisies encéphalo-rachidiennes	265
ARTICLE PREMIER. — Méningite et hydrocéphale aiguës simples	262
ART. II. — Méningite aiguë tuberculeuse	266
ART. III. — Méningite et hydrocéphale chroniques	274
CHAP. III. — Tubercules des centres nerveux.	266

QUATRIÈME PARTIE.

Maladies des organes des sens	285
SECTION I. — Maladies de la peau	ibid.
CHAP. I. — Fièvres éruptives.	286
CHAP. II. — Maladies diverses de la peau	292
ARTICLE PREMIER. — Erythème.	295
ART. II. — Erysipèle des nouveau-nés.	296

ART. III. — Millaire	562
ART. IV. — Varicelle.	563
ART. V. — Vaccine	565
ART. VI. — Purpura	571
ART. VII. — Postules et pemphigus des nouveau-nés	576
ART. VIII. — Dartres et teignes	579
SECTION II. — Maladies des yeux	586
SECTION III. — Maladies du nez.	605
SECTION IV. — Maladies de l'oreille.	611

CINQUIÈME PARTIE.

Maladies diverses.	615
CHAP. I. — Ictère des nouveau-nés	616
CHAP. II. — Diathèse inflammatoire des nou- veau-nés.	618
CHAP. III. — Œdème des nouveau-nés.	635
CHAP. IV. — Hydropisies	635
CHAP. V. — Scrophules et rachitisme.	649
CHAP. VI. — Céphalématome	675
CHAP. VII. — Syphilis des nouveau-nés	685



TABLE GÉNÉRALE ANALYTIQUE.

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

A.

- ARCÈS — des poissies, I, 175. — Scrophuleux, II, 655.
 ARDOR (MALADIES DE L'), I, 601, II, 1. — Tubercules, II, 104.
 ACCIDENTS DE LA DENTITION, I, 692.
 ACESCECE GASTRO-INTESTINALE, II, 82.
 AFFECTION CONVULSIVE, II, 265. — Causes, 247. — Âge et autres causes prédisposantes, 247. — Pléthore, anémie, 251. — Influences atmosphériques, 252. — Maladies thoraciques, 254. — Troubles digestifs, 254. — Flux abondants ou supprimés, 257. — Sensations anormales, 258. — Affections morales, 261. — Fatigues intellectuelles, 262. — Maladies cérébrales, 262. — Résumé sur les causes, 263. — Symptômes, 265. — Convulsions partielles, 264. — Eclampsie, 266. — Durée, 272. — Terminaison, 273. — Diagnostic, 276. — Pronostic, 276. — Traitement, 286. — Saignées, 283. — Antispasmodiques, 286. — Médications appropriées à la nature des causes, 289.
 AFFECTION VERMINÉUSE, II, 96.
 AGE (INFLUENCE DE L'). V. Introduction.
 ANASARQUE, II, 56.
 ANÉVRISMES DU CŒUR, I, 470.
 ANGINE CUTURALE, I, 654. — Diphthérique, 656. — Gangréneuse, 666. — Scarlatineuse, 667. — Simple, 654.
 ANGINE LARYNGÉE ŒDÉMATIQUE, I, 450. — Sa nature non inflammatoire dans certains cas, 453. — 19^e Obs. clin. sur un œdème laryngé dépendant d'une hydropisie scarlatineuse, chez un enfant de 7 ans, 456. — Chez le nouveau-né, 465. — Traitement, 466.
 ANGINE LARYNGÉE PSEUDO-MEMBRANEUSE ou croup, — I, 373. — Caractères anatomiques, 375. — Causes, 378. — Symptômes, 383. — Variétés, 387. — Diagnostic, 389.

- Pronostic, 391. — Traitement, 393. — Traitement médical, 393. — Saignée, *ibid.* — Affusions froides, 395. — Contre-stimulants, *ibid.* — Altérants, 396. — Vomitifs, 398. — Expectorants et sternutatoires, 401. — Révulsifs, 402. — Sédatifs, *ibid.* — Traitement chirurgical, 403. — Cautérisation de la glotte, 404. — Trachéotomie, 406. — Propriété opératoire, 409. — Nouveaux procédés opératoires, 415. — Traitement après l'opération, 420. — Prophylaxie du croup, 422.
- ANGINE LARYNÉE STRIPTELENE ET PSEUDO-CROUP, I, 423. — Caractères anatomiques, 424. — Obs. de spasme du larynx, par Constant, 425. — Causes, 427. — Symptômes, 429. — 17°. Obs. clin. sur un cas de pseudo-croup, suivi de mort chez un enfant de 5 ans, 432. — 18°. Obs. clin. sur un cas de pseudo-croup chez un enfant de 11 ans, 436. — Difficultés du diagnostic, 440. — Spasme idiopathique du larynx, 444. — Asthme thyroïdique, 441. — Pronostic, 445. — Traitement, 447.
- ANGURES, I, 529.
- APOPLEXIE — cérébrale, II, 331. — Des nouveau-nés, II, 334. — Méningée, I, 142; II, 332. — Pulmonaire, I, 321. — Rachidienne, II, 329.
- ASCITE, II, 185.
- ASTHÈNE lente des nouveau-nés, v. Œdème.
- ASTHME, I, 164. — Thyroïdique, 441.
- ATAXO-DYNAMIQUES (sembrômes), dans la fièvre muqueuse, II, 57. — Dans la fièvre typhoïde, 161. — Dans les fièvres éruptives, 524.
- ATÉLECTASIE des poumons, I, 181.
- AUSCULTATION en général dans l'enfance, I, 73.

B.

- BILE. — Son rôle dans la digestion chez les enfants, II, 82. — Son influence sur certaines formes de diarrhée, 175.
- BILIEUX (FLUX), II, 173.
- BOUCHE (MALADIES DE LA), I, 626.
- BOUCHES (ÉTATS DES) dans la coqueluche, I, 129. — Dans la

pneumonie lobulaire, 154. — Dans le catarrhe bronchique, 98. — Dans les phthisies thoraciques, 563, 564.

PROVINCES (MALADIES DES), I, 50.

PROVINCIE, I, 35. — Son rôle dans la pneumonie lobulaire, 197, 202. — Dans la coqueluche, 129, 144, 155. — Dans la fièvre typhoïde, II, 129, 161, 167. — Dans les fièvres éruptives, 519.

C.

CARIE SCOPULIFORME, II, 655.

CARIFICATION DU TISSU PULMONAIRE, I, 185.

CARRAU, II, 104.

CATARRHE BRONCHIQUE, I, 95. — Caractères anatomiques, 98. — Causes, 107. — Symptômes, 111. — Diagnostic, 116. — 1^{re} Obs. clin. sur un cas de catarrhe suffocant suivi de mort, 118. — Pronostic, 122. — Traitement, 123.

CATARRHE EN GÉNÉRAL, I, 57. — Sa fréquence expliquée : 1^{re} par l'activité des sécrétions muqueuses, 82. — 2^e Par celle de la circulation capillaire dans le tissu muqueux, 84. — 3^e Par l'irritabilité des muqueuses, 88. — 4^e Par les conditions spéciales de la peau dans l'enfance, 91. — 5^e Enfin par certaines causes prédisposantes ou occasionnelles, 92.

CATARRHE VÉSICAL, II, 181.

CATARRHE VULVAIRE, II, 192. — Causes, 193. — Symptômes, 196. — Durée, 199. — Traitement, 199.

CENTRES NERVEUX (MALADIES DES), II, 225, 323. — Hypérémies et hémorrhagies, 328. — Inflammations et hydrocèles, 335. — Tubercules, 466.

CÉPHALOMATONE, II, 675. — Caractères anatomiques, 676. — Symptômes, 678. — Causes, 681. — Traitement, 682.

CHOLÉRA DES ENFANTS, II, 173.

CHOLÉRIE, II, 299. — Nature, 299. — Obs. clin. sur un cas de cholérite suivi de mort, 301. — Causes, 304. — Âge, 304. — Sexe, 306. — Héritéité, 306. — Influences atmosphériques et épidémiques, 306. — Emotions, frayeur, 307.

- Causes pathologiques, 338. — Symptômes, 340. — Marche et durée, 343. — Terminaison, 344. — Traitement, 345. — Bains froids, 345. — Bains sulfureux, 346. — Purgatifs, 347. — Émétiques à haute dose et drastiques, 348. — Antispasmodiques et stupéfiants, 348. — Toniques, 349. — Électricité, 350. — Strychnine, 352. — Médications complexes, 355. — Indications rationnelles, 356.
- CONTRACTURE, II, 236. — Causes, 257. — Symptômes, 258. — Traitement, 252.
- CONVULSIONS CLONIQUES, II, 243. — Toniques, 245.
- COQUELUCHE, I, 125. — Anatomie pathologique, 128. — État des bronches, 129. — État des nerfs de la 8^e paire, 131. — Causes, influence de l'âge, 132. — Sexe, tempérament, 133. — Influence épidémique et contagieuse, 134. — Note sur un cas de contagion observé par M. Lacour, 135. — Symptômes, 135. — 1^{re} Période dite catarrhale, 136. — Période convulsive, 136. — Période de déclin, 139. — Durée, terminaison, 139. — Diagnostic, 140. — Complications, 141. — Accidents nerveux, 141. — 2^e Obs. clin. sur une coqueluche compliquée d'apoplexie méningée, 381. — Affections catarrhales, 144. — Phlegmasies, 145. — Constitutions épidémiques, 148. — Traitement, soins généraux, 149. — Stupéfiants, 151. — Antispasmodiques et antipériodiques, 154. — Evacuants, 155. — Moyens divers, 157. — Indications dans les cas compliqués, 160.
- COÛRE, II, 607.
- CROÛTE, I, 573.

D.

- DAME DE ST.-GEY, II, 599.
- DARTRES, II, 579.
- DENTITION DIFFICILE, I, 605. — Caractères anatomiques, 606. — Causes, 606. — Symptômes, 609. — Complications, 613. — Diagnostic, 617. — Traitement, 618.
- DENTITION IRRÉGULIÈRE, I, 602.
- DIAGNE AIGESCENTE, II, 82. — Preuves de son existence tirées de la physiologie, 82. — De la pathologie, 83.

— De la thérapeutique, 84. — Causes, 84. — Symptômes, 85. — Traitement, 89.

DIACRISE PLYAVENTE OU VENTEUSE, II, 94.

DIACRISE MUQUEUSE OU FOLLICULAIRE, II, 97. — Caractères anatomiques, 51. — Altérations diacritiques simples des follicules intestinaux, 51. — Inflammation et ulcération des follicules, 55. — 20^e et 21^e obs. clin. sur ce sujet, 54, 56. — Causes, 58. — Symptômes des diacrisis muqueuses apyrétiques, 45. — Symptômes des fièvres muqueuses, 47. — Épiphénomènes et complications, 55. — 22^e Obs. clin. sur un cas de fièvre muqueuse rémittente avec accidents cérébraux, 58. — Traitement des diacrisis muqueuses apyrétiques, 64. — Médication expectante, 65. — Evacuants, 68. — Astringents, 72. — Traitement des fièvres muqueuses, 74. — Traitement des diacrisis folliculeuses compliquées, 78.

DIACRISE SÉRÉUSE OU COLLIQUATIVE, II, 97.

DIACRISE VERMEUSE, II, 96. — Description des vers, 96. — Causes, 98. — Symptômes, 101. — Complications, 103. — Diagnostic, 111. — Pronostic, 112. — Traitement, 115.

DIACRISIS GASTRO-INTESTINALES, II, 28.

DIARRHÉE, I, 54. — Biliaire, II, 173. — Muqueuse, 45. — Sérique, 92.

DIARRHÉE INFLAMMATOIRE DES NOUVEAUX-NÉS, II, 618.

DIPHTHÉRIE BUCCO-PHARYNGIENNE, I, 656. — Causes, 657. — Symptômes, 659. — Variétés, 662. — Traitement, 664.

DYSCHOLÉRIE, II, 119.

DYSENTHÉE, II, 54.

DYSPEPSIE MUCREUSE, II, 29.

E.

ECLAUSE, II, 266.

ECZEMA, II, 579.

EMBRAS GASTRIQUE, II, 45. — Gastro-intestinal, 45. — Intestinal, 45.

EMPHYÈME PULMONAIRE, I, 164.

- ENCÉPHALITE, II, 245.
 ENFANCE, I, 1. — Ses caractères physiologiques, 3. — Idée qu'on doit se faire de la force vitale dans l'enfance, 6. — Applications à la pathologie et à la thérapeutique, 16. — À l'hygiène, 24.
 ENTÉRIQUE, II, 17.
 ENTORSE, II, 94.
 EPIDEMIE, II, 276.
 EPIDEMIE, II, 605.
 ERYSIPÈLE, II, 556. — Causes, 557. — Symptômes, 558. — Traitement, 560.
 ERYTHÈME, II, 355.
 ESTOMAC (MALADIES DE L'), II, 1.
 EXPLORATION CLINIQUE des enfants malades, I, 65. — Habitude extérieure, 67. — Cri, état du poulx, 69. — Examen de la respiration, 71. — Des organes et fonctions de la digestion, 75. — Comarémentaire, 77.

F.

- FATIGUE, II, 584.
 FIÈVRE. — Bilieuse, II, 47. — Cérébrale, 58. — Inflammatoire, 616. — Intermittente, 616. — Moqueuse, 47.
 FIÈVRE TYPHOÏDE, II, 119. — Historique, 120. — Anatomie pathologique, altérations des follicules intestinaux, 123. — Des ganglions mésentériques, 127. — De la rate, des bronches, etc., 125. — Causes, influence de l'âge, 131. — Autres causes, 134. — Symptômes, début, 136. — 2^e Période, 137. — 3^e Période, 138. — Caractères spéciaux chez les enfants, 140. — Complications, 143. — 22^e obs. clin. sur un cas de perforation, 144. — Diagnostique, 148. — 23^e Obs. clin. sur un cas de fièvre typhoïde prise pour une méningite, 150. — Pronostic, 154. — Traitement, 156. — Indications générales, 157. — Anti-phlogistiques, 158. — Evacuants, 159. — Fébrifuges, 160. — Sédatifs, 161. — Toniques et excitants, 162. — Expectation, 163.
 FIÈVRES, II, 615.
 FLEX. — Bilieux, II, 172. — Musculeux, 45. — Séreux, 37.

- FOIE (MALADIES DU), II, 177. — Tubercules du foie, I, 528; II, 213, 225.
- FOLLICULES DE LA BOUCHE. — Siège des aphthes, I, 659.
- FOLLICULES GASTRO-INTESTINAUX. — Époque de leur développement, II, 29. — Leurs altérations dans la diacrise muqueuse simple, 31. — Dans la diacrise muqueuse avec phlogose, 33. — Dans la fièvre typhoïde, 123.
- FORMES NASALES. — Leurs maladies, II, 605.

G.

- GALE, II, 579.
- GANGLIONS MONOCHQUES. — Altérés dans la pneumonie lobulaire, I, 187. — Tuberculeux, 531, 561.
- GANGLIONS MÉSENTÉRIQUES. — Altérés dans la fièvre typhoïde, II, 127. — Tuberculeux, I, 528; II, 208.
- GANGRÈNE. — De la bouche, I, 645. — De la gorge, 656. — De la vulve, II, 202.
- GASTRALGIE, II, 88.
- GASTRITE, II, 15. — Folliculaire de Billard, 59.
- GASTRO-ENTÉRITE, II, 15.
- GASTRO-INTESTINALE (INFLAMMATION), II, 15.
- GASTRO-INTESTINALES (HÉMORRAGIES), II, 7.
- GLOTTIS (OŒDÈME DE LA), I, 420. — Spasme, 172.
- GRIPPE, I, 109.
- GRANULATIONS DE LA VIEILLE, II, 571.

H.

- HÉMATOCHAKIS, II, 339.
- HÉMOPTYSIE, I, 80.
- HÉMORRAGIES ENCÉPHALO-RACHIDIENNES, II, 129. — Hémorrhagie interstitielle de la pulpe nerveuse, II, 330, 333. — Hémorrhagie des méninges, I, 142; II, 312, 335.
- HÉMORRHOÏDES DE LA PEAU, II, 571.
- HÉMORRHOÏDES GASTRO-INTESTINALES, II, 7. — Causes, 8. — Symptômes, 12. — Traitement, 14.
- HÉPATITE, II, 172.
- HÉRPÈS, II, 579.

HYDROCÉPHALIE ACUTE SIMPLE. II, 332. — Son existence démontrée, 333. — 26^e Obs. clin. sur un cas d'hydrocéphale, scarlatineuse, 339. — 27^e Obs. clin. sur un cas analogue observé par Marshall Hall, 363. — Liée aux maladies des reins, 363. — Symptômes, 363. — Traitement, 365.

HYDROCÉPHALIE ACUTE TUBERCULEUSE. II, 366.

HYDROCÉPHALIE CHRONIQUE. II, 434. — Caractères anatomiques, 435. — Causes, 438. — Causes mécaniques, 439. — 27^e Obs. clin. sur une tumeur tuberculeuse du cerveau comprimant le sinus droit chez un enfant de 3 ans, 443. — 28^e Obs. clin. sur la même maladie chez un enfant de 5 ans, 447. — 29^e Obs. clin. sur la même maladie chez un enfant de 4 ans, 451. — Symptômes, 453. — Traitement, 461.

HYDROPIQUE. II, 637. — Causes, 637. — Symptômes, 639. — Marche, 641. — Diagnostic, 644. — Pronostic, 645. — Traitement, 645.

HYPERÉMIE ENCÉPHALO-RACHIDIENNE. II, 529, 537.

I.

ICTERE. II, 172. — Des nouveau-nés, 616.

INFLUENCE. II, 581.

INCONTINENCE D'URINE. II, 185. — Causes, 187. — Traitement, 190.

INFECTION. II, 1. — Chez les enfants de 1 à 15 ans, 3. — Chez les enfants à la mamelle, 3.

INFLAMMATION GASTRO-INTESTINALE. II, 10. — Son importance chez les enfants, 14. — Description de la gastrite folliculaire de Villard, 20. — Symptômes considérés en général, 25. — Traitement, 27.

ÉTAT GÉNÉRAL DE L'ÂGE. Étudiée par la statistique, I, 27. — Sur la fréquence des maladies en général dans l'enfance, 31. — Sur la fréquence des maladies en général aux différentes périodes de l'enfance, 56. — Sur la fréquence des maladies en particulier aux différentes périodes de

- Sur la fréquence des complications, l'enfance, 27. — Sur la terminaison des maladies, 42. — Sur la mortalité, 42. — Sur la mortalité dans l'hôpital des maladies de Paris, 55.
- INFLAMMATION DE L', II, 14. — Hémorrhagies, 7.
- INTÉSTIN, Maladies en général, 1. — Tubercules, 208.
- EXPLICATION DES INTÉSTINS, II, 165. — 24^e Obs. clin. sur un cas d'invagination chez un enfant de 11 mois, 166. — Torsion, 168.

L.

- LARYNITE. — Œdémateuse, I, 459. — Pseudo-membraneuse, 572. — Simple, 573. — Striduleuse, spasmodique, 425.
- LARYNX (MALADIES DU). I, 372. — Spasme, 422.
- LEUCORRÉE DES PETITES FILLES, II, 435.

M.

- MALADIE TACHÉTIÉE DE WIELAND, II, 571.
- MALADIE TUBERCULEUSE. — En général, I, 471. — Étiologie, causes inhérentes à l'organisation, influence de l'âge, fréquence des tubercules dans l'enfance, 476. — Sexe, tempérament, 487. — Constitution, 490. — Prédisposition, 492. — Héritéité, 495. — Causes résultant d'une mauvaise hygiène, 501. — Influences atmosphériques, 505. — Alimentation, 507. — Viciation de l'air, 508. — Gymnastique mal dirigée, 511. — Contagion, 512. — Causes pathologiques, 512. — Syphilis, 515. — Cachexies, 514. — Fièvres, 515. — Inflammation, 519. — Dyspepsie, 521. — Comparaison des tubercules sous le rapport de leur siège, 524. — Traitement, 532. — Traitement préservatif, 533. — Moyens de prévenir la transmission héréditaire des tubercules, 535. — Moyens de prévenir la tuberculisation après la naissance, 536. — Allaitement, 538. — Alimentation, 539. — Aération, 541. — Éducation gymnastique, 543. — Vêtements,

- etc., 545. — Traitement curatif, 545.
 curative, 549. — Médicaments altérans, 549. — Toniques, 551. — Evacuans, 552. — Emission sanguines, 553. — Sautoires, 553. — Moyens complets, 554. — 2^e Indication curative, 556. — 3^e Indication curative, 557. — Traitement palliatif, 558.
- MARIBLES** (ENCOREMENT DES) chez le nouveau-né, II, 432.
- MÉCONIUM** (RÉTENTION DE), cause de convulsions, II, 24.
- MÉNINGITE SICLE SIMPLE**, II, 351.
- MÉNINGITE AIGUE TUBERCULEUSE**, II, 356. — Historique, 361. — Anatomie pathologique, 363. — Etat des membranes, 369. — Epanchement, 373. — Etat de l'encéphale, 375. — Tubercules dans les autres parties du corps, 377. — Causes, 379. — Influence de l'âge, 379. — Sexe, 382. — Tempérament, constitution, 383. — Hérité, 383. — Causes extérieures, 383. — Causes pathologiques, 384. — Résumé sur l'action des causes, 385. — Symptômes, début, 385. — 1^{re} Période, 387. — Délire, 388. — Etat de la sensibilité, 390. — Lésions de mouvement, 391. — Faciès, décolorés, 391. — Etats du pouls, 392. — Etat de la respiration et de la digestion, 393. — 2^e Période, 394. — Durée, 395. — Diagnostic, son importance, 396. — Pseudo-méningite, 402. — Cas cités par M. Piet, 402, 404. — Appréciation, 406. — 28^e Obs. clin. sur un cas d'affection cérébrale simulant la méningite chez un enfant de 4 ans, 410. — Fièvres cérébrales différentes des méningites, 418. — Pronostic, 420. — Traitement, 422. — Saignées, 423. — Réfrigérans, 425. — Evacuans, 429. — Altérans, révulsifs, etc., 432.
- MÉNINGITE CHRONIQUE**, II, 435.
- MÉSOLÉPHALE** (TUBERCULES DE), II, 473.
- MÉTÉORISME ABDOMINAL**, II, 94.
- MÉTÉORISME**, II, 192.
- MELANGE**, II, 362.
- MORTALITÉ** dans l'enfance, I, 42. — Causes de la mortalité dans l'hôpital des Enfants-malades de Paris, 55.
- MUCOS**, I, 667. — Caractères anatomiques, 668. — Siège, 668. — Aspect de la fausse membrane, 669. — Son

siège précis, 673. — Etat de la matrice sous-jacente, 675. — Causes, influence de l'âge, 676. — Autres causes prédisposantes, 677. — Causes occasionnelles, 678. — Symptômes, 1^{re} période, 680. — 2^e Période, 681. — 3^e Période, 682. — Durée, 684. — Diagnostic, 684. — Pronostic, 685. — Nature, 686. — Traitement, 690. — Abaissement, 690. — Soins hygiéniques, 692. — Topiques, 692. — Antiphlogistiques, 694.

MÉLIER, II, 352.

N.

NÉPHRITE ALIMENTAIRE, dans l'hydronie scarlatineuse, II, 643.

NÉVROSES, II, 235.

NEZ (MALADIES DE), II, 605.

O.

ŒDÈME DE LA CLOTTE, I, 450.

ŒDÈME DES NOUVEAU-NÉS, II, 625. — Symptômes, 625. — Caractères anémiques, 630. — Diagnostic, 631. — Causes, 632. — Pronostic, 635. — Traitement, 635.

OPHTHALMIE, II, 597. — Des nouveau-nés, 598. — Scrophuleuse, 601.

OREILLE (MALADIES DE L'), II, 611.

OS (TUBERCULES DES), II, 658.

P.

PACCHONI (GLANDES DE), différentes des granulations tuberculeuses de la poitrine, II, 275.

PANCRÉAS (MALADIES DU), II, 177. — Tubercules, I, 525; II, 214.

PAROTIDES (MALADIES DES GLANDES), II, 171.

PEAU (MALADIES DE LA), II, 435.

PERFORATIONS PULMONAIRES, I, 356. — Inflammatoires, 365. — Tuberculeuses, 357.

PÉRICARDE, I, 463.

PÉRITONÉE (MALADIES DE), II, 178.

PÉRITONITE — aiguë, II, 173. — Chronique, 212.

PHARYNX (MALADIES DE), I, 624.

PHLÉGÈNE, I, 471.

PHTHISIE PULMONAIRE, I, 559.

PITUITAIRE, II, 285.

PLEURISME, I, 332.

PLEURISME AIGÛ, I, 337. — Caractères anatomiques, 337.

— Causes, 338. — Symptômes et marche, 349. —

12^e Obs. clin. sur un cas de pleuro-pneumonie chez un enfant de 3 ans, 345. — Variétés, 346. — 14^e Obs. clin. sur un cas de pleurésie diaphragmatique chez un enfant de 10 ans, 347. — Traitement, 351.

PLEURISIE CHRONIQUE, I, 353. — 12^e Obs. clin. sur un cas de pleurésie chronique chez un enfant de 11 ans, 355.

PNEUMONIE, I, 367.

PNEUMONIE DES NOUVEAUX-NÉS, I, 286, 288, 305, 309, 311, 318.

PNEUMONIE LOCALE, I, 284. — Caractères anatomiques, 285.

— Causes, 286. — Symptômes, 287. — 2^e Obs. clin. sur

un cas de pneumonie avec délire, 293. — 10^e Obs. clin.

sur un cas de pneumonie avec accidents nerveux spasmodiques, 297. — 11^e Obs. clin. sur un cas de pneumonie latente avec méningite, 300. — Durée, terminaison et pronostic, 305. — Diagnostic, 310. — Traite-

ment, 312. — Chez les enfants d'un à quinze ans, 312.

— Chez les enfants à la mamelle, 318.

PNEUMONIE LOCALE, I, 168. — Caractères anatomiques,

168. — Variétés, 169. — Pneumonie lobul disséminée,

170. — Pn. lobul. généralisée, 172. — Pn. lobul. pseudo-

lobaire, 175. — Suppuration du pœmon, 176. — État-

fœtal, ou atelectasie du pœmon, 181. — Carnification,

183. — État des bronches, 184. — De la plèvre, 186. —

Siège, 187. — Causes, 190. — Âge, 191. — Sexe, tem-

pérament, 192. — Saisons, 193. — Refroidissement, 195.

— Séjour à l'hôpital, décèsibus, 195. — Maladies anté-

rieures, 197. — Cause prochaine de la pneumonie

lobul., 202. — Symptômes, 214. — Toux, expectoration, 215. — Dyspnée, 216. — Signes physiques, 217; dans la pn. lobul. disséminée, 218; dans la pn. lobul. généralisée, 220; dans la pn. lobul. pseudo-lobaire, 222. Habitude extérieure, 223. — Fièvre, 225. — Troubles digestifs, 227. — Etat des sécrétions, de l'innervation, 228. — Formes de la pn. lobul., 230. — 3^e Obs. clin. sur un cas de pn. lobul. avec éréthisme général chez un enfant de 5 ans, 232. — 4^e Obs. clin. sur un cas de pneumonie adynamique, 236. — Marche, durée et terminaison, 240. — 5^e Obs. clin. sur un cas de pneumonie fournissant un type de pneumonie lobulaire généralisée, 241. — Diagnostic et pronostic, 251. — Nature de la pn. lobul., 259. — Traitement, 262. — Indications tirées de la nature de la maladie, 264. — 6^e Obs. clin. sur un cas de pn. lobul. imminente arrêtée par le vésicatoire, chez un enfant de 8 mois, 266. — 7^e Obs. clin. sur un cas de pneumonie chez une jeune fille de 11 ans; accidents produits par l'émétique à haute dose, 276. — 8^e Obs. clin. sur un cas de pneumonie guérie par un traitement complexe, chez un enfant de 2 ans, 279. — Indications tirées des causes de la maladie et des circonstances accessoires, 284.

PNEUMO-THORAX, I, 336. — Consécutif à la tuberculisation pulmonaire, 357. — Consécutif à l'inflammation et à la suppuration du pommou, 365. — 16^e Obs. clin. sur ce sujet, 365.

POISSON, II, 584.

POUMON (MALADIES DE), I, 162.

PRUNO, II, 579.

PRUNO-CROUX, I, 432.

PRYLISME — 36 à la dentition, I, 609; dans la variole, II, 519.

PERFURA MÉMORABILIA, II, 571.

PETULAS DES NOUVEAU-NÉS, II, 376.

R.

- RACHITISME, II, 649, 653. — Déformation, 653. — Lésions de texture du tissu osseux, 667. — Troubles fonctionnels, 665. — Marche, 668. — Terminaison, 669. — Traitement, 669.
- RAMOLLISSEMENT DE LA MOELLE SPINALE-INTERSTICIELLE, II, 115.
- RAMOLLISSEMENT DU CERVEAU, II, 346. — Note sur un cas de ramoll. cérébral circonscrit chez un enfant de 7 ans; 347. — Note sur un cas de ramollissement cérébral très-étendu chez un enfant de 3 ans, 349.
- RAGE (MALADIES DE LA), II, 177. — Tubercules, 214.
- RAIS (MALADIES DES), II, 182. — Tubercules, 213.
- RAISMATISME, II, 616.
- ROUELE, II, 552.
- ROUGEOLE, II, 486. — Caractères anatomiques, 487. — Causes, 490. — Incubation, 491. — Épidémies, 493. — Symptômes et marche, 501. — Variétés, 502. — Complications, 514. — Diagnostic, 525. — Pronostic, 531. — Traitement, 533.

S.

- SCARLATINE, II, 456. — Caractères anatomiques, 487. — Causes, 490. — Épidémies, 496. — Symptômes et marche, 504. — Variétés, 506. — Complications, 514. — Diagnostic, 525. — Pronostic, 531. — Traitement, 533.
- SCIERÈME, II, 625.
- SCROPHULE, II, 649. — De la peau, 654. — Du tissu cellulaire, 655. — Des ganglions lymphatiques, 657. — Du système osseux, 658. — Traitement, 669.
- SEPSIS DE LA CROÛTE, I, 423.
- STOMATITE, I, 626.
- STOMATITE APTÉRIQUE, I, 619.
- STOMATITE ÉPITHÉLIALE, I, 627.
- STOMATITE CANCÉREUSE, I, 645.
- STOMATITE PSEUDO-MEMBRANEUSE, I, 634.

STOMATITE PUSTULEUSE, I, 634.
 STOMATITE ULCÉREUSE, I, 634.
 STRABISME, II, 265.
 SUETTE MILIAIRE, II, 562.
 SYPHILIS DES NOUVEAU-NÉS. II, 685

T.

TEIGNES, II, 579. — Vésiculeuse, 580. — Pustuleuse, 581.
 — Furfuracée ou squammeuse, 586. — Faveuse, 584. —
 Traitement, 587.
 TÉTANOS DES NOUVEAU-NÉS, II, 340.
 THYMUS (hypertrophie du), I, 441.
 TRACHÉOTOMIE. — Dans le croup, I, 406. — Dans l'œdème
 de la glotte, 467.
 TUBERCULES EN GÉNÉRAL, I, 476.
 TUBERCULES DE L'ABDOMEN, II, 204. — Anatomie pathologi-
 que, 205. — Altérations des ganglions, 205. — Du tube
 digestif, 208. — Du péritoine, 210. — Des autres orga-
 nes, 213. — Causes, 214. — Symptômes, 217. — Trou-
 bles digestifs, 218. — Signes physiques, 220. — Marche
 et durée, 224. — Complications, perforations tubercu-
 leuses, 225. — Tubercules des reins, 226. — Pronostic,
 228. — Traitement, 230.
 TUBERCULES DES CENTRES NERVEUX, II, 466. — Anatomie pa-
 thologique, 467. — Causes, 474. — Symptômes, 475. —
 Diagnostic, 480. — Pronostic, 482. — Traitement, 483.
 TUBERCULES DU THORAX, I, 559. — Anatomie pathologique,
 561. — Etat des ganglions bronchiques, 561. — Des pou-
 mons, 566. — Causes, 571. — Influence de la pneumo-
 nie, 573. — Symptômes, 579. — Signes physiques, 581.
 — Pronostic, 587. — Traitement, 589.
 TYPHOÏDE (FIÈVRE), II, 119.

U.

ULCÈRE DE LA BOUCHE, I, 634.
 ULCÈRES-folliculeux de l'estomac, II, 20. — De l'intestin, 124.

ULCÈRES SCROPHULEUX, II, 657.

URTICAIRE, II, 552.

URÉTÈRES TUBERCULEUX, II, 226.

V.

VACCINE, II, 565.

VARICELLE, II, 563.

VARIOLE, II, 486. — Anatomie pathologique, 488. — Causes, 490. — Epidémies, 499. — Symptômes et marche, 507. — Variétés, 511. — Complications, 514. — Diagnostic, 525. — Pronostic, 531. — Traitement, 533.

VERS INTESTINAUX, II, 96.

Y.

YEUX (MALADIES DES), II, 597.

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE ANALYTIQUE.



Nouvelles Publications chez SAVY JEUNE.

- Brachet.** — *Traité complet de l'hypochondrie, ouvrage couronné par l'Académie de Médecine*; 1 fort vol. in-8. Paris et Lyon, 1844. — Prix. 9 fr.
- Brachet.** — *Traité pratique des convulsions dans l'enfance, 2^e édit. revue et augmentée*, 1 vol. in-8. Paris et Lyon, 1837. — Prix. . . 7 fr.
- Brachet et Fouilloux.** — *Physiologie élémentaire de l'homme*, 1 fort vol. in-8. Paris. — Prix. 6 fr.
- Martin (Jeune).** — *De l'habitude, de son influence sur le physique et le moral de l'homme, et des dangers qui résultent de sa brusque interruption*, 1 vol. in-8. Paris et Lyon, 1843. Prix. 2 fr 50 c.
- Gauthier.** — *Observations pratiques sur le traitement des maladies syphilitiques, par l'iodure de potassium*; 4 vol in-8. Paris et Lyon, 1843. — Prix. 3 fr.
- Baumès.** — *NOUVELLE DERMATOLOGIE, ou Précis théorique et pratique sur les Maladies de la Peau, fondé sur une nouvelle classification médicale, suivi d'un exposé de principes généraux pouvant servir de guide dans le choix des eaux minérales naturelles, etc.*, 2 gros vol. in-8, avec planches coloriées; Paris et Lyon, 1842. — Prix. 16 fr.
- Baumès.** — *Précis théorique et pratique sur les maladies vénériennes; contenant le traitement de chaque symptôme, etc., avec un formulaire spécial*; 2 vol. in-8. Paris et Lyon, 1840. Prix. . . . 12 fr.
- Richard (de Nancy).** — *Traité sur l'éducation physique des enfants, à l'usage des mères de familles*, 1 vol. format anglais. Paris et Lyon, 1843. — Prix. 4 fr.
- Rainard.** — *Traité de Pathologie et de Thérapeutique générales vétérinaires*; 2 vol. in-8, Paris et Lyon, 1841. — Prix. . . . 10 fr.
- Lecoq.** — *Traité de l'extérieur du cheval et des principaux animaux domestiques*; 1 fort vol. in-8. Paris et Lyon, 1843. — Prix. . . . 9 fr.
- Lecoq.** — *Des Annexes du Fœtus dans les principales espèces d'animaux domestiques*, in 8, Paris et Lyon, 1843. — Prix. . . . 4 fr.
- Lecoq.** — *Notes anatomiques sur l'opération de l'hyovertébrotomie, ou fonctions des poches gutturales des solipèdes*, in-8, avec une planche. Paris et Lyon. — Prix. 1 fr.
- Grogner.** — *Cours de multiplication et de perfectionnement des animaux domestiques*, 3^e édition, revue et augmentée d'un traité sur les porcs, par Magne, 1 fort vol. in-8, Paris et Lyon, — Prix, 10 fr.
- Magne.** — *Principes d'agriculture et d'hygiène vétérinaire, 2^e édit. augmentée*, 1 fort vol. in-8. Paris et Lyon, 1843. — Prix. . . 10 fr.
- Magne.** — *Traité d'hygiène vétérinaire appliquée aux études des règles d'après lesquelles il faut diriger le choix, le perfectionnement, la multiplication, l'élevage, l'éducation du cheval, de l'âne, du bœuf, etc.* 2 vol. in-8. Paris et Lyon, 1843. — Prix. . . . 14 fr.
- Verguin.** — *Traité de Chimie élémentaire*, 1 vol. in-12, avec planches intercalées dans le texte. Paris et Lyon, 1843. — Prix. 3 fr. 50 c.